


# الغذاء و التغذية



دكتورة

ايڤيس عازر نوار

أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد المنزلي سابقا

كلية الزراعة - جامعة الاسكندرية

دار المعرفة الجامعية









# الغذاء والتغذية

تأليف

الأستاذة الدكتورة

إيڤيس عازر نوار

قسم الاقتصاد المنزلى

كلية الزراعة - جامعة الإسكندرية

## حقوق الطبع والنشر محفوظة

لا يجوز طبع أو استنساخ أو تصوير أو تسجيل أي جزء من هذا الكتاب  
بأي وسيلة كانت إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الناشر

دار المعرفة الجامعية

للطبع والنشر والتوزيع

• الإدارة: ٤٠ شارع سوتير - الأزاريطة - الإسكندرية

ت: ٤٨٧٠١٦٣

• الضرع: ٣٨٧ شارع قنال السويس - الشاطبي - الإسكندرية

ت: ٥٩٢٣١٤٦

## إهداء الطبعة الأولى

- إلى أستاذ الجيل ...
- إلى الأستاذ الذى يمثل الأب الروحى للعلوم الاجتماعية الزراعية فى الدراسات الجامعية بمصر عامة وفى جامعة الإسكندرية على وجه الخصوص...
- إلى منشء ومؤسس أقسام الاقتصاد الزراعى والمجتمع الريفى والإرشاد الزراعى والاقتصاد المنزلى بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية ...
- إلى الوالد الذى يمثل لنا جميعاً الأستاذ الذى يرفع تلاميذه فى رفق وحنو...
- إلى الأستاذ الذى وقف بإصرار إلى جانب القيم والمثل الأخلاقية فى تصميم وشجاعة فأصبح لنا جميعاً -نحن أبنائه وبناته- النموذج الذى نحب أن نسير على دربه ...
- وما أقل أمثاله فى عالمنا المعاصر ...

إلى

**الأستاذ الدكتور محمد منير الزلاقي**

أستاذ ورئيس مجلس قسم الاقتصاد الزراعى

بكلية الزراعة - جامعة الإسكندرية

(الأسبق)

إليه أقدم باكورة إنتاجى لخدمة أبنائى من شباب مصر وأملها، داعية له من الله أن يتمتع بالعمر والصحة ليستمّر دائماً فى العطاء.



## إهداء الطبعة الثانية

إلى

روح

المرحوم الأستاذ الدكتور

محمد منير الزلاقي

لما قدمه من عطاء وبذله من جهد

طوال حياته

أسكنه الله فسيح جناته





أقدم هذا المرجع فى طبعته الثانية حيث كانت الطبعة الأولى عام ١٩٧٥ تحت رقم إيداع ٤٧٤٣ / ١٩٧٥ ولاحقت المؤلفة تقديم علم الغذاء والتغذية حتى عام ٢٠٠٢، وهذا المجهود المتواضع أرجو أن أقدمه لكل طالب علم وباحث فى هذا الميدان ليشبع رغبته فى البحث العلمى والتوصل إلى كل جديد فيه لنخدم جميعاً وطننا العزيز مصر.

المؤلفة

١٠ أكتوبر ٢٠٠٢



# الفهرس

الصفحة

الموضوع

تقديم

لغات تاريخية

## الباب الأول التعريف بعلم التغذية

٢١	تطور مفهوم التغذية
٢٢	أبعاد التغذية
٢٢	بعد طبيعى
٢٢	بعد استعاضى اقتصادى
٢٣	بعد ثقافى
٢٣	بعد إرشادى
٢٣	جوانب التغذية
٢٣	أكادىمى تطبيعى
٢٤	إستراتيجى وديناميكى
٢٤	مصطلحات عامة مرتبطة بالتغذية
٣٢	حالة الغذاء فى العالم
٣٦	الأسباب الرئيسة لأزمة الغذاء فى العالم
٣٧	إنتاج الغذاء فى مصر
٤٢	مسببات انخفاض الاكتفاء الذاتى
	الحالة التغذوية :
٤٥	فى العالم
٤٨	فى بعض الدول العربية
٤٨	فى مصر
٥٤	وظائف الغذاء
٥٤	فسيولوجية
٥٥	استماعية
٥٥	نفسية
٥٦	تركيب جسم الإنسان

## الباب الثانى الكربوهيدرات

٦٣	مقدمة
٦٣	تكوينها
٦٣	أقسام الكربوهيدرات
٦٤	السكريات الأحادية
٦٦	مشتقات السكريات الأحادية
٦٩	السكريات الأوليحية
٧٠	عديدات السكريات
٧١	عديدات السكريات المتحانسة
٧٩	عديدات السكريات غير المتحانسة
٨٣	وظيفة الكربوهيدرات
٨٨	مصادر الكربوهيدرات فى غذاء الإنسان
٩١	الحالة الغذائية للكربوهيدرات حول العالم
٩١	الكميات المقررة من الكربوهيدرات

## الباب الثالث الليبيدات

٩٥	مقدمة
٩٥	أقسام الليبيدات
٩٥	الليبيدات البسيطة
٩٦	الدهون
٩٧	الشعوع

الصفحة	الموضوع
٩٧	ديزل الليبيدات
٩٨	الليبيدات المركبة
٩٨	فوسفوليبيدات
١٠٣	جليكو ليبيدات
١٠٥	الليبيدات المشتقة
١٠٨	الأحماض الدهنية
١٠٨	أقسام الأحماض الدهنية
١١١	مناظرات الأحماض الدهنية غير المشبعة
١١٤	أقسام الأحماض الدهنية العادية المصنفة
١١٥	تصنيف الأحماض الدهنية عديدة عدم التشبع
١١٨	الايكوزانويدات
١٢١	المواد الهيدروكربونية
١٢١	الستيرويدات والكحولات والستيرولات
١٢٤	مدرجة الزيوت والدهون
١٢٤	معاملة الدهون بالحرارة
١٢٥	أقسام الدهون حسب محتواها من الأحماض الدهنية
١٢٥	تقسيم الأغذية حسب محتواها من الدهون
١٢٧	وجود الأحماض الدهنية في الكائنات الحية النباتية والحيوانية
١٣١	مصادر الليبيدات
١٣٢	وظائف الليبيدات
	الدهون
١٣٣	الأحماض الدهنية غير المشبعة
١٣٩	التأثيرات المتباينة لمركبات الايكوزانويدات
١٤٢	الأحماض الدهنية المشبعة
١٤٢	الكوليسترول
١٤٣	الفوسفوليبيدات
١٤٤	المقررات البرمية للدهون
١٤٦	تغذية الدهون حول العالم
١٤٧	تغير استهلاك الدهون منذ فجر التاريخ
١٤٧	استهلاك الدهون حول العالم
١٥٠	تغير استهلاك الدهون خلال القرن العشرين

#### الباب الرابع البروتينات Proteins

١٥٤	تركيب البروتينات
١٥٥	بناء البروتين
١٥٧	أقسام البروتين
١٥٧	بروتينات بسيطة
١٥٩	بروتينات مركبة
١٦٠	بروتينات مشتقة
١٦١	أقسام الأحماض الأمينية حسب دخولها في تكوين البروتين
١٦٢	تركيبها وخصائصها
١٦٧	المتابوليزم
١٦٧	قدرة الجسم على تكوينها
١٧٠	خصائص البروتين
١٧٠	حسب طبيعة تكوينها
١٧١	حسب تنظيم محتواها من الأحماض الأمينية
١٧٥	وظائف البروتين
١٧٥	بناء الأنسجة وخصائصها
١٧٧	تركيب الإنزيمات والمركبات والأحماض المضادة
١٧٧	مادة منظمة

الصفحة	الموضوع
١٧٨	صيانة التفاعلات الحيوية بالأنسجة
١٧٨	نقل العناصر الغذائية
١٧٩	ونفاذ بعض الأحماض الأمينية
١٨١	القيمة التغذوية للبروتين
١٨٢	تقدير القيمة التغذوية للبروتين
١٨٣	دورة التزوجين في جسم الإنسان
١٨٥	الطرق الحيوية وأسسها
١٨٦	النمو وتغير وزن الجسم
١٨٦	PER نسبة كفاءة البروتين
١٨٧	NPR صافي احتجاز البروتين
١٨٨	GPV القيمة الإجمالية للبروتين
١٨٨	Repletion الاستعادة
١٨٨	NGI مؤشر نمو التزوجين
١٨٩	التوازن التزوجيني
١٨٩	NB التوازن التزوجيني
١٩١	BV القيمة الحيوية
١٩١	NPU صافي استخدام البروتين
١٩٣	NPU تقسيم بروتين الوجبة باستخدام
١٩٣	NPU تقدير كمية البروتين/السعرات باستخدام
١٩٣	مؤشر التوازن التزوجيني
١٩٥	Egg replacement إسحلال البيض
١٩٥	محتوى الجسم من التزوجين
١٩٥	N retention نسبة احتجاز الليزوجين
١٩٥	Mitchell طريقة
١٩٦	Nrepletion * استعادة تزوجين الجسم
١٩٧	Regeneration تعويض وتجديد مكونات الدم والكبد
١٩٧	بروتين الكبد
١٩٨	إنزيمات الكبد
١٩٨	بروتينات البلازما
١٩٩	بروتينات البلازما والهيوجولوين
٢٠٠	بناء الهيوجولوين
٢٠٠	بعض محتويات البلازما والبول
٢٠٠	الأحماض الأمينية في البلازما
٢٠٠	AAR نسب الأحماض الأمينية
٢٠١	مستوى الكبريت والتزوجين في البول
٢٠٣	الطرق الكيميائية
٢٠٤	Chemical score الدرجة الكيميائية
٢٠٦	SCS الدرجة الكيميائية بطريقة مبسطة
٢٠٦	EAAI مؤشر الأحماض الأمينية الأساسية
٢٠٨	درجة جودة البروتين
٢٠٩	تقدير القيمة التغذوية للبروتين من محتواه
٢١١	من الأحماض الأمينية
٢١١	Available Amino Acids تقدير الأحماض الأمينية المتاحة
٢١٢	الطرق الكيميائية
٢١٢	الطرق الإنزيمية
٢١٢	الطرق الميكروبيولوجية
٢١٣	القدرة التكميلية للبروتين
٢١٦	مصادر البروتين
٢١٨	المقروءات الغذائية اليومية للفرد
٢١٩	الاحتياجات اليومية من الأحماض الأمينية الأساسية

الباب الخامس  
المغضم والامتصاص واليتابوليزم

٢٢٥

٢٢٨

٢٢٩

٢٣٣

٢٣٧

٢٣٩

٢٣٩

٢٤٢

٢٤٣

٢٤٣

٢٤٥

٢٤٥

٢٤٩

٢٥١

٢٥٤

٢٥٦

٢٥٧

٢٥٩

٢٦٠

٢٦٣

٢٦٤

٢٦٥

٢٦٥

٢٦٩

٢٧٤

٢٧٥

٢٧٧

٢٧٨

٢٧٨

٢٨٠

٢٨٢

الباب السادس  
الحاجة إلى الطاقة

٢٨٥

٢٨٦

٢٨٦

٢٩٠

٢٩٢

٢٩٤

٢٩٤

٢٩٦

٢٩٧

٢٩٩

٣٠٠

٣٠١

٣٠٢

٣٠٣

المغضم

المغضم في الدم

المغضم في المعدة

المغضم في الأمعاء الدقيقة

الامتصاص

امتصاص الماء

امتصاص الكربوهيدرات

امتصاص الدهون

امتصاص البروتينات

اليتابوليزم

يتابوليزم الكربوهيدرات

يتابوليزم الجلوكوز

يتابوليزم الجليكوسين

تنظيم سكر الدم

يتابوليزم الدهن

ليبيدات الدم

يتابوليزم الكيلومكرون

بعض الحالات الشاذة لتخزين الدهون

يتابوليزم الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة

دهون الكبد

تنظيم توليد الطاقة من الجلوسيدات الثلاثية

يتابوليزم الفوسفوليبيدات

يتابوليزم الكوليسترول والليوبروتينات

يتابوليزم البروتين

بروتينات البلازما

مستوى الأحماض الأمينية في البلازما

المغذ الإيجابي للبروتين

التعادل الديناميكي للبروتينات والأحماض الأمينية

تخزين البروتين

العلاقة بين يتابوليزم الكربوهيدرات والدهون والبروتينات.

اضطراب يتابوليزم

مقدمة:

تيل القيمة السعيرة للأغذية

الطرق المباشرة

الطرق غير المباشرة

النسبة التنفسية

تيل يتابوليزم

الطرق المباشرة

الطرق غير المباشرة

صور طاقة الغذاء التي يستفيد منها الإنسان

احتياج الجسم للطاقة

طاقة يتابوليزم القاعدي- طاقة يتابوليزم الراحة

النشاط العضلي

التأثير الحراري نتيجة تناول الغذاء

طاقة يتابوليزم القاعدي

العوامل التي تؤثر في يتابوليزم القاعدي



الموضوع	الصفحة
مطاقة ميتابوليزم الراسة	٣٠٤
مطاقة النشاط العضلي	٣٠٦
العوامل التي تؤثر في مطاقة النشاط العضلي	٣٠٧
التأثير الحراري نتيجة تناول الغذاء	٣٠٩
الاحتياج الكلي للطاقة في اليوم	٣٠٩
الكيميات الموصى بها لتناول الطاقة اليومية	٣١١
العوامل التي تؤثر في الاحتياج الكلي للطاقة	٣١٢
النشاط العقلي	٣١٥
حساب الطاقة الكلية للشخص	٣١٦
توازن الطاقة	٣١٦
استخدامات الطاقة في جسم الإنسان	٣١٧
حفظ درجة حرارة الجسم	٣١٨
توليد الحرارة	٣١٨
فقد الحرارة	٣١٩
آثار نقص أو زيادة الطاقة.	٣١٩

## الباب السابع

### الفيتامينات

٣٢٣	مقدمة
٣٢٦	تسمية الفيتامينات وتقسيمها
٣٢٨	خصائص عامة للفيتامينات
٣٣٢	مشابهات الفيتامينات
٣٣٣	تقدير الفيتامينات في الغذاء
٣٣٤	العوامل التي تؤثر في تمثيل الفيتامينات
٣٣٦	الكيميات الموصى بها
٣٣٦	الفيتامينات التي تذوب في الدهون
٣٣٦	فيتامين A
٣٣٧	الكاروتين
٣٥٠	فيتامين D
٣٥٩	فيتامين E
٣٦٦	فيتامين K
٣٧٠	الفيتامينات التي تذوب في الماء
٣٧٣	مجموعة فيتامينات ب B
٣٧٣	مقدمة
٣٧٣	التيامين
٣٨٠	الريوفلافين
٣٨٥	النياسين
٣٩٢	البيروكسين
٣٩٨	الكوبالامين
٤٠٣	حامض البنتوثيك
٤٠٧	-حامض الفوليك
٤١٤	البيرين
٤١٨	الكولين
٤٢٢	فيتامين C
٤٣٢	مشابهات الفيتامينات
٤٣٣	بيوفلافينويدات
٤٣٦	كارنتين
٤٣٧	يوكويتون
٤٣٨	اينوسيتول
٤٣٩	حامض ليبويك
٤٣٩	حامض بنحاميك
٤٤١	حامض أمينوبزويك

الصفحة

٤٤٢  
٤٤٣  
٤٤٥

الموضوع  
حماض أورثك  
لثويل، إجمداين  
فيتامين ل

الباب الثامن  
العناصر المعدنية

٣١٨

٤٥١

٤٥٣

٤٥٩

٤٦١

٤٦٦

٤٧٩

٤٨٣

٤٨٥

٤٩٤

٤٩٨

٥٠٠

٥٠١

٥١٥

٥٢٠

٥٢٧

٥٣١

٥٣٧

٥٣٩

٥٤٢

٥٤٨

٥٥٢

٥٥٤

٥٦٢

٥٦٥

الباب التاسع  
الماء

٥٦٩

٥٦٩

٥٧١

٥٧٢

٥٧٢

٥٧٤

٥٧٥

٥٧٥

٥٧٥

٥٧٧

٥٧٧

٥٧٨

٥٧٨

٥٧٨

الباب العاشر  
تغذية الفئات الخاصة

٥٨٣

مقدمة

تقسيم العناصر المعدنية

أهمية العناصر المعدنية

فقد العناصر المعدنية أثناء تصنيع الأغذية

أولاً : العناصر المعدنية الكبرى

الكالسيوم

الفوسفور

المغنسيوم

الكبريت

الصوديوم

البوتاسيوم

الكالورين

ثانياً : معادن الأكار

الحديد

الزنك

اليود

المنجنيز

النحاس

الكوبلت

الموليبدنم

الكوروميوم

الفلورين

الكاديوم

السليسيوم

الألمنيوم

السليكون

مقدمة

توزيع الماء في الجسم

وطائف الماء

التوازن المائي

أولاً : المصادر التي يحصل بها الجسم على الماء

ثانياً : فقد الماء من الجسم

كيفية تنظيم الجسم للماء والإليكتروليتات

أولاً : حساسة العطش

ثانياً : عن طريق الكلى

نقص الماء

الجفاف

زيادة الماء في الجسم

الاستسقاء

التسمم المائي

احتياجات الماء

أولاً : التغذية أثناء الحمل

الصفحة	الموضوع
٥٨٣	مقدمة
٥٨٤	الاحتياجات الغذائية
٥٩١	ثانيًا: تغذية الأم أثناء الرضاعة
٥٩١	الاحتياجات الغذائية
٥٩٤	بعض العوامل التي تؤثر في تغذية الأم أثناء فترات الإنجاب
٥٩٦	ثالثًا: التغذية أثناء الطفولة
٥٩٦	١- الرضيع
٥٩٦	مقدمة
٥٩٧	الاحتياجات الغذائية
٦٠١	أسلوب تغذية الرضيع
٦٠١	الرضاعة الطبيعية
٦٠٣	الرضاعة غير الطبيعية
٦٠٤	التغذية المختلطة
٦٠٤	التغذية التكميلية
٦٠٥	التغذية الإبدالية
٦٠٥	الأطعمة التي تمنع للطفل أثناء فترة الرضاعة
٦٠٧	فوائد الرضاعة الطبيعية
٦٠٧	الغضام
٦٠٩	٢- تغذية الطفل الرضيع ناقص الوزن
٦١٠	٣- تغذية الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة
٦١٠	مقدمة
٦١١	الاحتياجات الغذائية
٦١٣	٤- تغذية الطفل في عمر ٧ - ١٠ سنوات
٦١٣	الاحتياجات الغذائية
٦١٣	العوامل المؤثرة في تغذية الطفل
٦١٥	مر رابعًا: التغذية في مرحلة المراهقة (١١ - ١٨ سنة)
٦١٥	مقدمة
٦١٥	الاحتياجات الغذائية
٦١٧	للمشاكل الغذائية التي يتعرض لها الفرد خلال مرحلة المراهقة
٦٢٥	خامسًا: تغذية المسنين
٦٢٥	مقدمة
٦٢٦	خصائص هذه المرحلة والاحتياجات الغذائية
٦٣٠	سادسًا: وجبات النباتيين
٦٣٠	تعريفها
٦٣٠	خصائص هذه الوجبات
٦٣٢	سابعًا: تغذية المعاقين
٦٣٢	مقدمة
٦٣٣	الاحتياجات الغذائية
	الباب الحادى عشر
	العلاج التغذوى
٦٣٩	مقدمة
٦٤٠	أولاً : التكيف البيولوجى والمواءمة أو التأقلم
٦٤١	تنظيم التفاعلات الحيوية داخل الخلية
٦٤١	ميكانيزمات الجسم لمواكبة الظروف غير الطبيعية
٦٤٤	التكيف في حالة نقص طاقة الغذاء
٦٤٤	أهمية للتكيف في حالة نقص بروتين الغذاء
٦٤٧	ثانيًا : استجابة الفرد لنقص الغذاء والعناصر الغذائية
٦٤٧	النمط الأول
٦٤٧	النمط الثانى
٦٥٥	ثالثًا : الاضطرابات والأمراض المرتبطة بسوء التغذية والعلاج التغذوى
٦٥٥	مقدمة

الصفحة	الموضوع
٦٥٥	الكروايبور كور
٦٥٩	المراحمى
٦٦٣	اليدانة
٦٦٦	النحافة
٦٦٦	أمراض القلب والأوعية الدموية
٦٧٤	السرطان
٦٧٦	ارتفاع ضغط الدم
٦٧٨	مرض السكر
٦٨٠	قرحة المعدة وقرحة الاثني عشر
٦٨١	القرص
٦٨٢	تليف الكبد
٦٨٣	الحساسية
٦٨٤	مشاشة العظام
٦٨٤	تسوس الأسنان
	<b>الباب الثاني عشر</b>
	<b>الغذاء الصحي</b>
٦٨٩	مقدمة
٦٨٩	تخطيط الوجبات
٦٩٠	أسس تخطيط الوجبات الغذائية
٦٩١	تقسيم الأغذية
٦٩١	التقسيم الثلاثي
٦٩٢	التقسيم الرباعي
٦٩٣	التقسيم السباعي
٦٩٣	التقسيم إلى ١١ مجموعة غذائية
٦٩٤	المرشد الغذائي
٦٩٥	بديلات الطاقة
٦٩٩	أمثلة للأغذية وبديلاتها
٧٠٣	التوازن الغذائي
	<b>الباب الثالث عشر</b>
	<b>دراسة الحالة التغذوية</b>
٧١٥	مقدمة
٧١٥	التحصى الإكلينيكي
٧١٦	الاعتبارات البيوكيميائية
٧١٧	دراسة الإحصاءات الحيوية
٧١٨	دراسة المقاييس الجسمية
٧١٨	بالنسبة للأطفال
٧٢٠	بالنسبة للبالغين
٧٢٣	المسح الغذائي
	قوائم التوازن الغذائي
٧٢٥	المراجع
٧٤٩	الملاحق

## تقديم

منذ بدء الخليقة والإنسان ولآلاف بل الملايين السنين والإنسان يبحث عن غذائه، وهذا البحث عن الغذاء قد شكل التاريخ حيث أثر على الشعوب من حيث نموها، هجرتها، واستيطانها فى أماكن جديدة ... بل أثر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبلدان العالم ... فكان للبحث عن الغذاء دور فى تطوير الملاحة واكتشاف العالم الجديد واتسعت دائرة التجارة، وكان سبباً فى قيام الحروب ... كما اختلفت القبائل بعضها عن بعض حسب معتقداتها الغذائية، وكان لاكتشاف معدى الغذاء أى الطهارة عن أثر الحرارة على الأغذية والمواد الخام، وذلك قبل التاريخ قد وضع الأسس الأولى لعلم الكيمياء ... وكان لطاحونة الماء التى كانت تستخدم فى طحن الحبوب دور فى وضع أسس التصنيع والتكنولوجيا .. بل كانت كثير من الحروب تؤجل لبعد موسم الحصاد لأن القدماء توصلوا إلى أن الجنود الشعبى أقدر على هزيمة الجنود الجائعين.

وقد بدأ الاهتمام بالتغذية من منطلق الاهتمام بصحة الإنسان، حيث ترتبط صحة الإنسان بالطعام ومكوناته وأسلوب وطريقة إعداده وتناوله، واتسع نطاق الاهتمام بالتغذية حتى أصبحت من العلوم المحورية التى تدور حولها علوم أخرى، بل ومن العلوم الاستراتيجية التى توضع فى ضوءها خطط الدول وسياساتها.

ومن هنا انطلق الاهتمام بمصادر وإنتاج الغذاء النباتية والحيوانية، فصار الاهتمام بدراسة التربة وأنواعها ووسائل استصلاح الأراضى وغيرها من العلوم الضرورية لإنتاج المحاصيل والمزروعات التى توفر ما يحتاجه الإنسان من غذاء، كما صار الاهتمام بالحيوانات من ماشية، أغنام، دواجن، أسماك، محاريات ... وكيفية إنتاجها وتربيتها ورعايتها صحياً .. وأصبح هذا من القضايا التى شغلت المسئولين. فأنشئت لها أقسام فى الجامعات التى اهتمت بتوفير المتخصصين لضمان توفير غذاء الإنسان، وصارت لها اقتصاديات للإنتاج والتصدير وركيزة رئيسية لاقتصاد الدولة.

إن التغذية ومكونات الغذاء تشكل الحاجات الأساسية Basic needs للإنسان بمعنى أنها أصبحت ضرورية لبقائه، وغياب هذه الضرورة تهدده بالفناء، ومن ثم صارت عاملاً من العوامل الأساسية لسياسة الدولة وعلاقاتها بالدول الأخرى .. ومن

العوامل المحركة للحروب والاستعمار لضمان الحصول على الغذاء الذى يضمن بقاء الشعوب المغيرة.

وتسعى كل دولة لتكون دولة مكتفية بذاتها بمعنى أنها قادرة على توفير غذاء شعبها ومن ثم تكون مستقلة وحررة فى تشكيل قراراتها، ومن هذا المنطلق صارت التغذية مقرونة بالحقوق السياسية ودعامة من دعائم حرية الإرادة للدولة، واهتمت كل دولة بضرورة المحافظة على الاكتفاء الذاتى ورصدت جزءاً كبيراً من الميزانية لتطوير علم التغذية والعلوم المرتبطة بصحة الإنسان وصحة وسلامة الغذاء على أسس علمية سليمة.

ولهذا أصبحت الحاجة ملحة للاهتمام بالعلوم الطبيعية والاجتماعية نظراً لاحتياج الإنسان إلى التزود بالمعارف الفنية لتطوير حياته وبالمعارف الاجتماعية لتنظيم العلاقات الإنسانية فى المجتمع الذى يعيش فيه، ولتطوير تلك العلوم الطبيعية ومحصلة ذلك كله هو تحقيق سيطرة الإنسان على العوامل الطبيعية، بطرق وأساليب تيسر له تحقيق أقصى درجات السعادة والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية.

وتهتم كليات الزراعة بتدريس العلوم الطبيعية المتصلة بالأرض والزراعة وتهتم فى نفس الوقت بالعلوم الاجتماعية المتصلة بالإنسان الذى يعمل ويعيش على الأرض والزراعة، ولذا فإن الأهداف العامة لمجموعة العلوم الزراعية بكليات الزراعة هى زيادة الإنتاج وتعديله بأقل النفقات مع تنظيم الاستهلاك بالقدر الذى يحقق رفع مستوى معيشة الأمة ومستوى أفرادها على السواء.

وعلى هذا فيمكن تقسيم العلوم الزراعية إلى ثلاث أقسام رئيسية : يهدف القسم الأول منها إلى التعرف على ما يمكن إنتاجه من الحاصلات والخدمات وأسباب ذلك، ويدخل فى نطاق هذه المجموعة من العلوم علم الاقتصاد الزراعى. ويهدف القسم الثانى إلى التعرف على طرق الإنتاج ووسائل تحسينه ويدخل ضمن هذه المجموعة زراعة المحاصيل الحقلية والبستانية والكيمياء الزراعية والحشرات... إلخ. أما القسم الثالث من العلوم الزراعية فيتضمن علومًا تهدف إلى التعرف على ما يمكن استهلاكه من الحاصلات والخدمات وأكثر طرق الاستهلاك فعالية ويدخل ضمن هذا القسم علم الاقتصاد المنزلى. فالعلوم الحديثة لم تهمل الإنسان، وأصبح إنتاج الإنسان هو أحد الأقسام الرئيسية للدراسات الحديثة.

والمقصود بإنتاج الإنسان هو توفير متطلباته الغذائية والكسائية والإيرادية والسلوكية، وهذا من اختصاص علم الاقتصاد المنزلى. وتحسين الإنسان عن طريق علم الاقتصاد المنزلى معناه زيادة الإنتاج وهو عامل هام فى تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، فالإنسان هو أحد عوامل الإنتاج الرئيسية التى هى الأرض ورأس المال والعمل والإدارة، وهذان الأخيران يمثلان فى الإنسان.

وتعترض الإنسان كثير من المشكلات، من بينها المشكلات الغذائية.

إن عالمنا المعاصر فيه الكثير من المفارقات بل والمتناقضات.

فهناك دول يزيد فيها الإنتاج حتى إنها تلقى بالفائض عنه فى عرض البحر حتى لا تنخفض قيمة المحصول بناءً على قاعدة "العرض والطلب". وهناك دول تشكر من الفقر الذى يحل بشعوبها إلى حد الموت جوعاً.

هناك شعوب تخشى من التخمّة على اقتصادياتها، وهناك شعوب تشكر من نقص الطعام أو نقص نرعات خاصة من الطعام لا يستطيع أن يستغنى عنها الجسم. فالفارق هائل وضخم بين الدول الغنية والدول الفقيرة، وفى عالمنا المعاصر يزداد الغنى غنى ويزداد الفقير فقراً.

وهى صورة رهيبة تمثل المأساة الحقيقية لا من الناحية الإنسانية والأخلاقية فحسب بل ومن الناحية السياسية أيضاً.

فمستقبل البشرية مهدد بقيام ثورات الجائعين من الشعوب، ويوم تقوم هذه الثورات فلا حدود ولا ضمان للجائع إذا ثار، ويومها يواجه سكان كوكبنا الأرض تهديداً لا مثيل له لمستقبل البشرية على هذا الكوكب. ويحاول هذا المرجع أن يلقي الضوء على جانب هام من الجوانب التى يعانى منها الإنسان فى كل زمان ومكان.

فهو يتناول الغذاء والتغذية فى كل المجالات بالبحث العلمى المدعم بالتجارب العملية؛ لأن الأمراض الناجمة عن التغذية لا تصيب الفقير وحده بسبب ضعف إمكانياته الاقتصادية، وإنما تصيب الغنى أيضاً بسبب جهله بالأسلوب الصحى فى التغذية.

وهنا يأتى دور الاقتصاد المنزلى والقائمين عليه من إسهام فى حل المشكلات الغذائية، مما يقوم به من أبحاث وتجارب لمقابلة احتياجات الإنسان الغذائية تحت كل



الظروف، ومن بذل الجهد دون ملل حتى ينتشر الوعي الغذائي بين كل الطبقات بحيث يشمل كل المستويات.

فما يقوم به الاقتصاد المنزلى من نشر الوعي بين الطبقات الفقيرة يختلف عما يقوم به بين القادرين...

فبين الطبقات الفقيرة يبذل الاقتصاد المنزلى جهده لنشر الوعي عند ربة البيت لمساعدتها على تقديم وجبات غذائية رخيصة -تتفق مع ميزانية الأسرة- بحيث تفي هذه الوجبة باحتياجات الجسم من البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمواد المعدنية وغيرها.

وأما مع القادرين، فإن الاقتصاد المنزلى يقوم بدور التوعية حتى لا يقتصر الطعام فى بيوت الأغنياء على أنواع معينة دون الاهتمام بأنواع أخرى يكون الجسم فى حاجة إليها...

وهناك أيضاً دور الاقتصاد المنزلى فى تعديل الكثير من العادات الغذائية السائدة الموروثة منذ آلاف السنين عند أى شعب من الشعوب، وفى هذا المجال فإن على الاقتصاد المنزلى عبء ضخيم، ذلك لأن تغيير العادات يحتاج إلى جهد ووقت طويلين، لأنها عادات سادت عدة قرون، فلا يمكن أن تتوقع تعديلها فى وقت قصير أو جهد محدود.

أقدم هذا الكتاب للمهتمين بغذاء الإنسان وتغذيته كما أقدم هذا الكتاب لطالبات وطلاب كلية الزراعة، وبه أحاول أن أضعهم أمام أول درجات البحث العلمى، راجية منهم مواصلة البحث فى هذا المجال الحيوى، فشعلة العلم تنتقل من جيل إلى جيل، وعلى الجيل الحاضر أن يحمل المشعل من الجيل الذى سبقه على أن يضيف زيتاً جديداً إلى الشعلة حتى تظل تضيء...

راجية كل دارس وباحث التوفيق لما فيه خير بلدنا الحبيب : مصر، التى من أجلها يهون كل صعب وكل جهد.

المؤلفة

١٠ أكتوبر ٢٠٠١

## لمحة تاريخية :

حاول الناس كثيراً الوصول إلى حلول لمشاكل التغذية، ولكنهم لم يحرزوا تقدماً كبيراً، إلى أن ظهر علم الفسيولوجى وغيره من العلوم التى كان لها إسهامات كثيرة منها الفيزياء، الكيمياء، البيولوجى، الطب والزراعة فى إحراز تقدم ملحوظ، وفى القرن العشرين أصبح علماً له بنيته ومقوماته العلمية مثل غيره من العلوم الأخرى.

وباستعراض تاريخ نشوء علم التغذية نرجع إلى الوراء إلى لافوازيه Lavoisier العالم الفرنسى (١٧٤٣ - ١٧٩٤) بعد تجاربه الشهيرة التى قام بها فى فرنسا واستفاد بما توصل إليه من سبقوه من علماء فى تفسير ظاهرة التنفس وتوصل إلى معرفة مكونات الهواء الجوى من غازات النتروجين والأكسجين، وأن الأكسجين يعمل على أكسدة ما تناوله الإنسان من غذاء وطعام وهذا يشبه تماماً حرق أى مادة فى البيئة خارج جسم الإنسان، وينتج عن ذلك حرارة وثانى أكسيد كربون.

وقد انتهى لافوازيه إلى أن الشخص الذى يعمل يحتاج إلى طعام أكثر من الآخر الذى لا يعمل .. وأن الأطفال يحتاجون إلى حرارة أكثر من البالغين، وأن الشخص البدين يموت قبل الشخص النحيف.

ولا زالت التغذية محور اهتمام الإنسان ويذل الإنسان جهداً كبيراً لتوفير احتياجاته الأساسية من الغذاء بجانب ما يحتاجه من الكساء والإيواء.

وقديماً اهتم الإنسان المصرى القديم بالغذاء واعتبره من الأسس اللازمة لسلامة صحته ومع ذلك أشار قدماء المصريين إلى أنه لابد من عدم الإفراط فى تناول الطعام لأنهم وجدوا أن الإكثار منه يؤدى إلى العديد من الأمراض.

كما كان قدماء المصريين يتناولون بعض الأغذية رمزاً للاحتفال بأعيادهم .. فكانوا يشكلون الخبز على هيئة عرائس تقدم للأطفال فى أعيادهم، وكانوا يقدمون أطعمة خاصة فى عيد الطبيعة المعروف حالياً بشم النسيم، ومن بين هذه الأطعمة الملائنة، البصل، البيض، الفسيخ .. وأصبحت من القائمة اللازمة لمائدة شم النسيم ومرتبطة بعبادات وتقاليد المصرى القديم.

كما كان المصري القديم يستخدم الخس وزيت بذوره فى علاج كثير من أمراض الجهاز الهضمى والعصبى والأمراض الروماتيزمية وأيضاً لزيادة حيوية الجسم الجنسية كما ورد فى البرديات الطبية.

وفى عهد الإغريق قبل الميلاد كان العلماء يعتبرون أن الجسم يتكون من دم ومواد مخاطية وعصارات مثل عصارة الصفراء.

كما كتب سقراط الفيلسوف اليونانى ديالوجاً مع تلميذه أطلق عليه Economecus ونقله إلينا الكاتب اليونانى Xenophon وكان هذا الديالوج عن إدارة المنزل والحقل وأشار فيه إلى إدارة الغذاء، كما أشار أبو قراط (أبو الطب) اليونانى (٤٦٠-٣٦٤ قبل الميلاد) أن الغذاء هو أحد احتياجات الجسم اللازمة والأساسية لاستمرار الحياة، وقام بتدريس قيمة الوجبات الغذائية، ولكنه كان يعتقد أن الغذاء يتكون من عنصر غذائى واحد، ثم كتب Galen عالم الفيزياء الإغريقى عن التشريح والتغذية والصحة وكان الجميع يؤمنون بكلامه بلا جدال.

وبعد تقدم العلوم وازدهار البحث العلمى فى أوروبا ابتدأ العديد من العلماء فى مختلف مناحى العلوم من بيولوجى وبكتريولوجى وتشريح وكيمياء وفيزياء فى توجيه اهتماماتهم إلى الغذاء وأهميته لاستمرار الحياة ولتجنب المرض والوقاية منه.

ومن هؤلاء العلماء Santoris Sanctorius (١٥٦١ - ١٦٣٦) الذى قام بالعديد من التجارب حيث كان يزن نفسه ويحسب كمية الأكل التى تناولها ولكنه لم يجد جواباً لسواله عن سبب زيادة وزنه بعد الأكل، أما John Mayo (١٦٤٣ - ١٦٧٩) فقام بعدة تجارب على الحيوانات وخلص منها أن عملية تنفس الهواء ينتج عنها تنقية الدم التى فيها يتحول الدم الوريدى إلى دم شريانى، وهذا فتح المجال أمام العلماء لمعرفة الكثير عن الهواء ومكوناته.

وجاء بعد ذلك Joseph Black (١٧٢٨ - ١٧٩٩) الذى توصل بعد إجراء تجاربه المختلفة أن غاز ثانى أكسيد الكربون يعكس ماء الجير وأطلق عليه مصطلح الهواء الثابت Fixed air وتوصل إلى أن جميعه نطرده إلى الخارج أى تخرج هذا الجزء الثابت من الهواء من أجسامنا. أما غاز الهيدروجين فقد أطلق عليه Cavendish (١٧٣١ - ١٨١٠) مصطلح "الهواء المحترق"، بينما الغاز المتبقى فقد أطلق عليه فيما

بعد Rutherford (١٨٧١ - ١٩٣٧) مصطلح غاز النتروجين، واكتشف Priestly الإنجليزي (١٧٣٣ - ١٨٠٤) و Sheele السويدي (١٧٤٢ - ١٧٨٦) كل على حدة غاز الاكسجين وأطلقا عليه "هواء النار" واستفاد Lavoisier (١٧٤٣ - ١٧٩٤) من تجارب من سبقوه وتوصل إلى تركيب الهواء كما سبق ذكره، كما أن الغذاء يحترق بواسطة الأكسجين وينتج عن ذلك حرارة وثاني أكسيد الكربون.

أما William Olin Atwater (١٨٤٤) الذي يعتبر الأب الروحي لعلم التغذية فقام بتجارب معملية كثيرة، من بينها تبادل الغازات بين الدم والأنسجة وقياس السرعات الحرارية calorimetry وهى أول خطوة فى معرفة الاحتياجات التغذوية nutrition requirements. كما أعطى قيم السرعات الناتجة عن احتراق ١ جم من كل من الكربوهيدرات والدهون والبروتين وهى ٤، ٩، ٤ كالورى، وهى المستعملة الآن. كما أجرى تجارباً على أشخاص للدراسة الهضم، كما قام بدراسات على القيم التغذوية للحبوب واللحوم والخضروات والفواكه. كما درس أثر طرق إعداد وطهى الأغذية.

وفى سنة ١٨٩٤ رصد الكونغرس الأمريكى مبلغ عشرة آلاف دولار لى تقوم وزارة الزراعة بإجراء بحوث وكتابة تقارير عن القيم الغذائية لأنواع مختلفة من الغذاء الإنسانى، وتقديم وجبات كاملة من الغذاء الصحى والنسب الملائمة بحيث تكون اقتصادية أكثر من الغذاء العادى ومنذ ذلك الوقت أصبح علم التغذية علماً يدرس على نطاق واسع، وفى سنة ١٨٩٦ نشر Atwater أول مجلة تشمل جدولاً عاماً عن القيم الغذائية للطعام فى بلاد مختلفة.

وأتجه Atwater إلى البحث عن وجبة اقتصادية كاملة فى الوقت الذى كان البروتين والكربوهيدرات هما المصدران الهامان للطاقة، أما الفواكه والخضروات فقد كانت غالية الثمن وتعتبر من الكماليات، كما أوضح خطورة استهلاك أطعمة ذات نوعية واحدة، وأيضاً الأطعمة التى تحتوى على كميات زائدة من الدهون والنشا والسكر تمد الجسم بالحرارة والقوة، أما محتواها من المواد النتروجينية فهو قليل نسبياً وهى التى تكون الدم والعضلات.

كما ذكر Atwater أنه يمكن زيادة المحاصيل ورفع محتواها من النتروجين عن طريق اتباع طرق زراعة أفضل واستعمال أسمدة أكفأ.

ولتوضيح أهمية الغذاء أوضح Atwater فى كتابه أن قدرة أى شخص على القيام بأى عمل تعتمد على التغذية، كما ذكر أن الغذاء الذى يتناوله الإنسان يستخدمه فى بناء أنسجته ويستهلكه ليعطى طاقة فى صورة حرارة ليحفظ الجسم دافئاً ويعطيه الطاقة التى يستخدمها فى العمل، وأضاف أن الطعام الصحى هو الذى يكون متفقاً مع احتياجات الجسم، وأن أرخص أنواع الطعام فى نظره هو ما يعطى أكبر قيمة غذائية بأقل التكاليف وأن الطعام الاقتصادى هو الطعام الصحى الرخيص فى نفس الوقت.

وأظهر William Prou فى كتابه عن الكيمياء ووظائف الهضم أن الطعام يحتوى على ثلاث عناصر أساسية : السكر والمواد الزيتية والمواد الزلالية.

ثم بدأ عهد جديد سنة ١٨٦٦ عندما أظهر François Magendie عالم الفسيولوجى فى فرنسا أن الكلاب تموت إذا أعطيت سكر أو زبد أو زيت فقط، ولكنها تعيش إذا أعطيت طعاماً يحتوى على نيتروجين. كما أن Renault (١٨١٠ - ١٨٧٨) برهن فى عملية التنفس أن نسبة ثانى أكسيد الكربون الناتج إلى الأكسجين المستهلك تعتمد على نوع الغذاء، ومنه عرفت النسبة التنفسية respiratory quotient. واكتشف Claude Bernard (١٨١٧ - ١٨٧٨) الفرنسى الجليكوجين glycogen وأهمية عصير البنكرياس فى هضم وامتصاص الدهون.

وأوضح Leibig (١٨٠٣ - ١٨٧٣) من ألمانيا أهمية الكربوهيدرات والدهون بالنسبة للإنسان؛ حيث أنها لازمة لتوليد الطاقة اللازمة من خلال تأكسدها فى الجسم، واعتقد أن البروتين هو مصدر نيتروجين البول.

وأظهر Voit الألمانى (١٨٣١ - ١٩٠٨) أن الإنسان يحتاج إلى البروتين لبناء أنسجة جسمه ويحتاج إلى الكربوهيدرات والدهون لتوليد الطاقة اللازمة للعمل الميكانيكى.

وفى سنة ١٨٦٥ توصل Stohman و Henneberg فى ألمانيا إلى طريقة التحليل التقريبي proximate analysis وهى ماتزال تستعمل لآن. كما تمكن Johanna Keldahl الدنماركى عام ١٨٨٣ من عمل طريقة قياس النيتروجين من المواد العضوية، وقد ساعد كل ذلك فى تطور علم التغذية.

وعرف Boussingault (١٨٠٢ - ١٨٧٨) التوازن الغذائي food balance وتم حسابه باستخدام حيوانات التجارب، بتقدير الفرق بين مكونات الغذاء والفضلات من العناصر العضوية والأملاح المعدنية. واستمر Bidder (١٨١٠ - ١٨٩٤) ومعه Schmidt (١٨٢٢ - ١٨٩٤) فى إجراء هذه التجارب، وتوصلا إلى أن هناك حداً أدنى للتمثيل الغذائي food utilization حتى إذا لم يتناول الحيوان أى غذاء أو لم يقيم بأى نشاط جسمى، وهذا ما يعرف اليوم بميتابوليزم الراحة (القاعدى) resting basal metabolism.

وفى عام ١٩٠٠ أى فى أوائل القرن العشرين اكتشف Wollesten الحامض الأمينى amino acid وأن أبسط أنواعه هو glycine ولكنه لم يعرف طبيعة هذا الحامض، وقد عرفه Braconnet على أنه أحد نواتج التحليل المائى للجيلاتين gelatin. ثم اكتشف باقى الأحماض الأمينية. وفى ١٩٣٠ ابتداءً Rose فى إجراء تجاربه المشهورة على الأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية، وكان آخرها تجارب حامض Threonine. وفى عام ١٩٥٥ وضع Rose المقررات اليومية من الأحماض الأمينية.

كما اكتشف خلال القرن العشرين باقى الفيتامينات والمعادن. وكانت أول محاولة لعزل الفيتامين فى عام ١٩٣٢ حيث تمكن King من عزل فيتامين "C" من عصير الليمون، وأمكن عزل فيتامينات أخرى ومعرفة خصائصها واحتياج الجسم منها، وكان اكتشاف فيتامين B<sub>12</sub> عام ١٩٤٨.

ومنذ عام ١٩٥٥ واكتشاف الميكروسكوب الإلكتروني وتقدم التحليلات الكيميائية الدقيقة، واستخدام العناصر المشعة radioactive isotopes كل ذلك أتاح الفرصة لدراسة التابوليزم على مستوى الخلية ومكوناتها subcellular components أو organelles ... وتراكت المعلومات الخاصة بتركيب الخلية والدور الهام للعناصر الغذائية فى النمو والتطور والصيانة. وأصبح واضحاً دور العناصر الغذائية فى بناء الإنزيمات ومركبات الخلية المختلفة، وأن غياب أحد هذه المركبات قد يؤدى إلى فشل الخلية فى أداء وظائفها ثم موتها.

إن دراسة الخلية قد أثار الاهتمام بدور الوراثة وأثره على الاحتياجات

الغذائية. وساعد ذلك فى تفسير ظهور حالات الإعاقة واضطراب الميتابوليزم. كما أن دور التغذية فى نمو المخ وتكوين السلوك والجهاز المناعى ومقاومة الضغوط والظروف البيئية وعوامل التلوث... كلها مداخل جديدة ينبغى الاهتمام بها.

كما أن التغذية العلاجية therapeutic nutrition أصبحت موضع اهتمام المتخصصين فى التغذية، فأصبح النظام الغذائى مهماً فى العلاج.

وأصبح اهتمام المتخصصين كبيراً بما لدى الناس من معلومات عن بعض الأغذية والعناصر الغذائية ودورها فى علاج أو تجنب لبعض الأمراض، وقد تكون هذه المعلومات صحيحة أو خاطئة؛ لهذا يهتم المتخصصون بالعمل على تصحيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة لدى الناس والتعرف على احتياجاتهم وثقافتهم بالمعرفة البسيطة والطريقة الملائمة، مع الاهتمام بإحداث تغيرات سلوكية بين الناس تسفر عن تحسن فى حالتهم التغذوية والصحية.

واتسع نطاق الاهتمام بالتغذية فى كل دول العالم، وكذلك فى المنظمات العالمية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة (FAO) التى أصبحت منذ ١٩٤٤ مسؤولة عن تحسين الحالة التغذوية لسكان العالم كأحد السبل إلى السلام العالمى... وأيضاً منظمة الصحة العالمية (WHO) منذ ١٩٤٨ وقد خصصت جزءاً من مواردها لحل مشكلة التغذية العالمية... وكذلك وكالة التنمية العالمية (AID)... وغيرها من المنظمات، هذا بالإضافة إلى المنظمات المحلية فى الدول المختلفة...

وعبر السنوات... فقد ظهر من خلال البحوث المختلفة أن التغذية الجيدة دون نقص أو زيادة شرط أساسى للصحة الجيدة وتقوى الفرد من الأمراض المختلفة التى قد تكلف الدول ملايين الدولارات... للعلاج أملاً فى الشفاء، وأصبح الطعام الآن

غذاء... يمد الجسم باحتياجاته الغذائية الأساسية للحياة

وداء... يسبب المرض إذا كان المتناول مختلفاً عن احتياجاته

ودواء... يستخدم على حدة أو مع العقاقير فى علاج كثير من الأمراض.



الباب الأول  
**التعريف بعلم التغذية**



## تطوير مفهوم التغذية :

### Development of Nutrition Concept :

شهد مفهوم التغذية تطوراً كبيراً خلال النصف الثاني من القرن العشرين وأصبح علم التغذية مجالاً متسعاً من المعرفة واسع الحدود. وقد عرفت التغذية فى موسوعة المعرفة البريطانية بأنها علم الغذاء والعناصر الغذائية المرتبطة بالصحة.

وفى عام ١٩٦٣ قام مجلس الغذاء والتغذية للجمعية الطبية الأمريكية Council on food and nutrition of the American Medical Association بتعريف للتغذية كما يلى :

يتضمن علم التغذية دراسة الغذاء وما يتضمنه من مركبات وعناصر غذائية، وظيفتها داخل الجسم، العلاقة بينها وبين حالات صحة الإنسان ومرضه، طرق هضم الغذاء، امتصاص العناصر الغذائية، كيفية انتقالها داخل الجسم، وسائل استفادة الجسم منها وإخراجها، كما أضاف المجلس أن التغذية لابد أن تهتم ببعض النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع.

وفى عام ١٩٦٨ اقترح Sir Harold Himsworth سكرتير عام مجلس البحوث الطبية بإنجلترا أن علم التغذية لا يتوقف فقط على المعرفة فى العلوم الأساسية ولكنه يهتم بترجمة نتائج البحوث المتخصصة والاستفادة منها وكذلك خبرات المتخصصين.

ثم قام Hegsted عام (١٩٦٩) بوضع تعريف للتغذية وأشار أن دراسة كل العمليات المتعلقة بالتغذية التى سبق الإشارة إليها -ليست قاصرة- إلى حالات المرض ولكنها تشمل جميع الأفراد بدون استثناء، وأضاف أن دراسة التغذية تتضمن الاهتمام بالسياسة الزراعية للتعرف على الناتج من المحاصيل كمصادر للعناصر الغذائية وكذلك طرق التسويق وتصنيع وإعداد هذه المنتجات حتى تصل إلى المستهلك لأن ذلك يؤثر على قيمتها الغذائية، كما يمتد علم التغذية كما وضعه Hegsted ليشمل دراسة النواحي الثقافية والتقاليد والعادات الغذائية للمجتمع مع الاهتمام بدراسة المستوى الاقتصادى لأفراد المجتمع.

كما أصبح علم التغذية يهتم بدراسة العلاقة بين الكائن الحى والبيئة التى يعيش فيها، فالملحوظ أنه عندما قام الإنسان باستئناس الحيوان وأيضاً عندما عرف الزراعة وأنتج العديد من المحاصيل قد غير من النظم الإيكولوجية، كما تغيرت الأغذية التى اعتاد عليها الإنسان قديماً مما أدى إلى تغير محتواها من العناصر الغذائية.

وبدراسة ما كتبه Joshua Lederberg (١٩٦٨) الحائز على جائزة نوبل لاكتشافاته فى الوراثة حيث ذكر فى موضوع "الصحة فى عالم الغد" -أشار بأن الثورة البيولوجية قد أظهرت العديد مما كان غامضاً على الإنسان فعرف الكثير عن الخلايا وعن الأحماض النووية DNA، RNA ... وأظهر اهتماماً بأثر هذه الثورة البيولوجية على الإنسان وحالته الصحية والتغذية .. وقد عرف الكثير عن الأمراض وكيفية تقليل مخاطرها - كما عرفت الشيخوخة aging وما يحدث على مستوى الخلية .. واتسع علم التغذية ليشمل النهوض بصحة المجتمع وحالته التغذوية عن طريق نشر الوعي الغذائى بين أفراد المجتمع من جميع الطبقات.

وبناءً على ما سبق فقد اتسعت اهتمامات التغذية وتعددت أبعادها.

## أبعاد التغذية :

### Dimensions of Nutrition :

للتغذية أبعاد عدة يمكن تضمينها فى أربعة أبعاد كما يلى :

#### البعد الأول :

يشير إلى الجانب الطبيعى ويشمل حقل المعرفة والمعلومات التى يتضمنها علم التغذية والتى يستمدّها من علوم الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، البيولوجى، الفسيولوجى ... إلخ ويطبقها ويستفيد منها بهدف تحسين الحالة التغذوية والصحية للإنسان ويحميه من الإصابة بأمراض مختلفة سواء أكانت ناتجة من سوء التغذية، أو معدية، مع تحسين فى مناعته ضد الأمراض.

#### البعد الثانى :

يشير إلى الجانب الاجتماعى والاقتصادى حيث يناقش أثر التغذية على المجتمع وأهمية ذلك، كيف تعمل التغذية على مقابلة الاحتياجات الأساسية للفرد من الأغذية كما أشار إليها Maslow ومراعاة إمكانيات البيئة ومصادرها، دراسة موسمية المحاصيل

والمنتجات النباتية والحيوانية، أسعار الأغذية وتذبذبها، القوة الشرائية للأفراد ودراسة خصائص المجتمع، وكيفية التعرف على مشاكل التغذية فى المجتمع وتحديد السائد منها عن طريق عمل البحوث الاجتماعية والاقتصادية وعمل برامج لحل هذه المشاكل.

### البعد الثالث :

ويشير إلى الجانب الثقافى ويشمل دراسة العادات والتقاليد الغذائية للمجتمع بصفة عامة وعند الاحتفال بالأعياد والمواسم والمناسبات بصفة خاصة، الاهتمام بالمعتقدات الغذائية والأمثلة الشعبية المتعلقة بدراسة الأغذية المحببة والمفضلة والمتجنبة وأسباب ذلك.

### البعد الرابع :

ويشير إلى الإرشاد التغذوى ونشر الوعى، وذلك لأن هذا البعد كما تشير إليزيس نوار (٢٠٠٢) هو الجسر الذى تنتقل بواسطته نتائج البحوث والنظريات إلى واقع المجتمع وفى تناول عامة أفراده، وهذا يتطلب ليس فقد التبسيط بل تفعيل المعلومة الأكاديمية وانتقالها من النظرية إلى التطبيق فى سهولة ويسر للنهوض بالمجتمع ورفاهيته، وهذا يتطلب أيضاً الاهتمام بالكرادر القادرين على تحقيق ذلك.

### جوانب علم التغذية :

#### Aspects of Nutrition Science :

يوجد تقسيمين لجوانب التغذية كما يلى :

التقسيم الأول ويتضمن جانبين :

الجانب الأول : وهذا يشير إلى الجوانب الأساسى basic أى الأكاديمى

academic للعلم ويشمل :

- الحقائق facts المستخرجة من واقع التجارب المعملية والشواهد الأمريكية الخاصة بعلم التغذية.

- المفاهيم concepts المرتبطة بالمصطلحات والرموز الخاصة بعلم التغذية.

- المبادئ principles العلمية الخاصة بالعلاقات بين مكونات التغذية وتأثيرها فيما بينها.

- القوانين Laws المرتبطة بين أساسيات التغذية وتأثيرها على أجهزة الجسم المختلفة.

- النظريات theories المرتبطة بعلم التغذية.

**الجانب الثانى :** يشير إلى الجانب التطبيقى applied للعلم ويشمل تطبيق المعارف الأساسية المشار إليها فى تغذية الفرد خلال مراحل حياته المختلفة مثل تغذية رضيع infant nutrition، تغذية طفل child nutrition ... إلخ.

أما التقسيم الثانى فيشمل أيضاً جانبين :

ولكن من وجهة نظر مختلفة هما :

**الجانب الأول** وهو وصفى descriptive ويعرف بأنه جانب استاتيكي static وهذا يهتم بدراسة العناصر الغذائية اللازمة للجسم، تركيبها، خصائصها، أما الجانب الثانى فهو ديناميكي dynamic وهو يهتم بدراسة وظائف العناصر الغذائية ودورها الأساسى لحياة الإنسان.

### **مصطلحات عامة مرتبطة بالتغذية :**

ترتبط التغذية بالغذاء ومكوناته من عناصر غذائية nutrients ارتباطاً كبيراً، كما يتضح من التعريفات التالية :

**التغذية Nutrition :**

هى مجموع العمليات التى يحصل بها الجسم على المواد اللازمة لنشاطه وغموره وتحديد خلاياه. كما تهتم التغذية بدراسة بعض النواحي المتعلقة بإنتاج الغذاء واستهلاكه من عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسيكولوجية وإعلامية، نظراً لارتباط ذلك بحالة الفرد التغذوية.

**العناصر الغذائية Nutrients :**


هى المواد أو المكونات الكيميائية التى يتكون منها الغذاء، وتشمل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والفيتامينات والمعادن والماء، وتعمل هذه المكونات على إمداد الجسم بالطاقة وعلى بناء وتحديد وتعويض الأنسجة، كما تنظم العمليات الحيوية بالجسم.

**علم التغذية Science of Nutrition :**

يختص علم التغذية بدراسة العناصر الغذائية nutrients اللازمة للفرد من كربوهيدرات ودهون وبروتينات وفيتامينات وأملاح معدنية وماء، وما يحتاجه الجسم منها حسب العمر والجنس والظروف الجوية والحالة الاقتصادية وطبيعة العمل والحالة الصحية.

كما يهتم هذا العلم بدراسة مسار هذه العناصر الغذائية داخل الجسم والدور الذى تقوم به ومدى الاستفادة منها ونواتج ذلك، والأضرار الناتجة عن نقصها وزيادتها عن حاجة الجسم، وأهمية التوازن الكمى والكيفى من هذه العناصر والعلاقة بينها...

وعلم التغذية فريد فى نوعه؛ إذ يحتاج الإنسان إلى تطبيقه باستمرار فى حياته اليومية للحفاظ على صحته وتحسينها وزيادة قدرته على العمل. وترتبط التغذية بغيرها من العلوم والمعارف الأخرى فى منظومة فريدة من نوعها (شكل ١ - ١).



شكل (١ - ١) ارتباط التغذية بالعلوم والمعارف الأخرى

### المقررات الغذائية Nutritional Requirements :

المقررات الغذائية هى المقدار اللازم تناوله يوميًا من كل عنصر غذائى لمقابلة احتياج الفرد، حتى لا يصاب بالأمراض الغذائية نتيجة النقص المتكرر لهذا العنصر فى غذاء الإنسان.

### الكميات اليومية الموصى بها Recommended Daily Allowances :

الكميات اليومية الموصى بها ليتناولها الإنسان يوميًا من العناصر الغذائية تفرق ما يلزم لمقابلة احتياج الفرد اليومى وتلك لتغطية كل الفروق الفردية فى الاحتياجات الغذائية بين الناس، وهذا متبع فى الدول المتقدمة حيث وفرة الغذاء تسمح بذلك.

## الحالة التغذوية Nutritional Status :

الحالة التغذوية هي حالة الجسم الناتجة من العمليات الحيوية التى تحدث فى الجسم نتيجة تناول الغذاء. ويمكن تقدير الحالة التغذوية بوحدة أو أكثر من الطرق الآتية، وهى: دراسة المقاييس الجسمية Anthropometric measurements، الاختبارات البيوكيميائية Biochemical Investigations لبعض سوائل الجسم أو بعض الأنسجة، الفحوص الإكلينيكية Clinical Examinations كما يمكن التعرف على الحالة التغذوية لأى شعب من الشعوب عن طريق دراسة الإحصاءات الحيوية Vital Statistics مثل نسبة وفيات الأطفال والرضع فى الألف.

## أقسام الحالة التغذوية :

تقسم الحالة التغذوية الكلية إلى خمسة أقسام حسب Sinclair (١٩٤٨) :

### ١- الحالة التغذوية المفرطة Excess nutriture :

وفيهما يكون تناول الغذاء أكثر مما يحتاجه الجسم كثيراً، مما يعوق الجسم عن أداء وظائفه ويؤدى إلى تغيير بنى الجسم عن الوضع الطبيعى.

### ٢- الحالة التغذوية الطبيعية Normal nutriture :

وفيهما يكون تناول العناصر الغذائية مناسباً كمّاً وكيفاً، مما ينتج عنه البنى الطبيعى للجسم وقيامه بوظائفه طبيعياً، كما يسمح للجسم بتخزين كميات مناسبة من هذه العناصر.

### ٣- الحالة التغذوية الفقيرة Poor nutriture :

وفيهما يكون تناول العناصر الغذائية أقل مما يحتاجه الجسم، ولا يحدث خلل فى وظائف الجسم أو بنياته ولكن المخزون من العناصر الغذائية لا يكون مناسباً.

### ٤- الحالة التغذوية السيئة غير الملحوظة Latent malnutriture :

وفيهما يكون تناول من الغذاء أقل مما يحتاجه الجسم كثيراً، حيث يحدث خلل فى وظائف الجسم وبنياته، ولكن بصورة غير ملحوظة.

### ٥- الحالة التغذوية السيئة إكلينيكيًا Clinical malnutriture :

ويكون تناول من الغذاء منخفضاً عما يحتاجه الجسم كثيراً لدرجة ظهور الحالة المرضية، وذلك نتيجة نقص واحد أو أكثر من العناصر الغذائية.



وليس هناك حد فاصل يفصل بين هذه الحالات الخمس السابقة، فتعاقب الحالات التغذوية من حالة إلى حالة تدريجيًا بتناول كميات غير مناسبة من الغذاء، يليها انخفاض في مستوى العناصر الغذائية المخزنة، ثم حدوث خلل في وظيفة الجسم، ثم تظهر الحالة المرضية.

### الصحة Health :

الصحة كما عرفتها منظمة الصحة العالمية (WHO) (١٩٦٨) هي اكمال الحالة البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية. فالصحة ليست بمجرد غياب المرض أو اختفائه.

والتغذية والصحة ليسا لفظين مترادفين، ولكنهما مترابطان؛ إذ أنه بدون التغذية الجيدة، لا يمكن الوصول إلى الصحة التامة. كما تؤثر الحالة الصحية للفرد على مدى ما يتناوله واستفادته من العناصر الغذائية اللازمة.

### التغذية السليمة Proper Nutrition :

هي التغذية الكافية التي تتضمن إمداد الفرد بالكميات المثلى من العناصر الغذائية والكميات الكافية وبالنسب الملائمة ومن مصادر غذائية متنوعة تغطي المجموعات الغذائية المختلفة حتى يتسنى للفرد الاستفادة منها، في النمو وصيانة أنسجة جسمه وتخزين العناصر الغذائية في أنسجة جسمه بكميات مناسبة، وقيام أعضائه بوظائفها بطريقة طبيعية ليتمتع بحالة تغذوية طبيعية (تسمى رشاد وإيزيس نوار ٢٠٠٠) ومن علامات التغذية السليمة أن يكون وزن الفرد مناسبًا لسنه وجنسه وهيكل جسمه ويتمتع بالحياة والنشاط وقوة العضلات، وكفاءة في العمل ومقاومة الأمراض.

### المجموعات الغذائية Food groups :

لسهولة اختيار الأغذية قسمت الموارد الغذائية إلى مجاميع بحيث تشمل كل مجموعة الأغذية المتشابهة لحد ما فيما تحتويه من عناصر غذائية يمكن الاسترشاد بها عند الاختيار، على أن يراعى أن يحتوى الغذاء اليومي على غذاء أو أكثر من كل مجموعة من المجاميع الغذائية (منى بركات وآخرون ١٩٩٢).

## قائمة الغذاء Menu or Food List :

قائمة الطعام عبارة عن بيان بالأطباق المعدة المختلفة على أن يكون محتواها وإعدادها ومظهرها شيئاً وتكاليها مناسبة.

## الوجبة Meal :

هى مجموعة الأطعمة التى تقدم معافى وقت واحد على مائدة الطعام.

## الوجبة المتزنة Balanced Meal :

هى الوجبة التى تحتوى على كل العناصر الغذائية اللازمة وتكون النسب بين العناصر الغذائية أو بين بعض عناصر غذائية معينة تناسب احتياج الجسم واستفادته منها.

## وجبة سريعة Meal Meal :

هى الوجبة سريعة الإعداد مثل البيض المسلوق، ساندوتش هامبورجر Hamberger ... إلخ.

## وجبة خفيفة Light Meal :

وهى الوجبة سهلة الهضم بغض النظر عن مدة الإعداد، وهى الوجبة التى يكون فيها نسبة الدهون منخفضة ويغلب عليها المواد الكربوهيدراتية.

## وجبة ثقيلة Heavy Meal :

وهى الوجبة بطيئة الهضم والتى يرتفع فيها نسبة المواد الدهنية كما فى حالات الفطائر والأغذية المعدة بالتحمير والقللى.

## الوجبة الصحية Healthy Meal :

هى الوجبة الغذائية التى تراعى فيها خصائص التغذية السليمة كما سبق على أن تكون خالية من الميكروبات الضارة والطفيليات والمواد الكيميائية الضارة ومضافات additives الأغذية غير الطبيعية وأن تتوفر فيها الشروط والإجراءات الضرورية خلال إعدادها (منى بركات وآخرون ١٩٩٢).

## سوء التغذية Malnutrition :

ويقصد به عدم ملائمة الغذاء نوعاً وكمًا، إما بزيادة أو نقص واحد أو أكثر من العناصر الغذائية، ويؤدى نقص كمية الغذاء ونقص واحد أو أكثر من العناصر

الغذائية إلى حالة نقص التغذية *undernutrition* وقد يصل انخفاض الغذاء إلى حالة الجوع *starvation*. ويظهر نقص التغذية في حالة المجاعات أو الإصابة بحالة مرضية خطيرة في الجهاز الهضمي تمنع من امتصاص *absorption* العناصر الغذائية. كما تؤدي زيادة الغذاء عن الحد اللازم *overnutrition* إلى العديد من الحالات المرضية المختلفة.

فالنحافة الناتجة عن عدم كفاية الغذاء أو لخلل في أحد أجهزة الجسم، تعرض صاحبها للضعف والإرهاق وسرعة التعب، وتقلل من مقاومته للأمراض، كما وأن زيادة وزن الجسم أو السمنة من علامات سوء التغذية حيث كثيراً ما تعرض صاحبها للأمراض المختلفة مثل أمراض القلب والسكر والضغط ..

### التقرب الغذائي والتغذوي : *Surveillance*

هذا المصطلح مستمد من الكلمة الفرنسية *Surveiller* وتعني أن يقوم مسئول بإجراء مراقبة دقيقة (WHO ١٩٧٦) ويعرف الرصد والمراقبة بأنه نظام تجميع بيانات معينة بصفة دورية وتحليلها للتعرف على مؤشرات الحالة التغذوية الحالية والمستقبلية مجتمع ما، وتشمل هذه البيانات معلومات إيكولوجية خاصة بالتركيب السكاني والبنية الأساسية، مصادر البيئة وكمية ونوعية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، الدخل والاستهلاك، الحالة التغذوية والصحية، وتجمع هذه البيانات عادة من الجهات الرسمية المسؤولة مثل وزارات الزراعة، الصحة، التعليم، الاقتصاد ... وتستخدم هذه البيانات لعمل دراسات تابعة وتصميم البرامج اللازمة واقتراح العلاج.

### المسح الغذائي : *Dietary Survey*

يستخدم المسح عند دراسة وتقييم الحالة التغذوية لفئة أو جماعة من الأفراد، مع دراسة العوامل والأنشطة المرتبطة والمسببة لتلك الحالة التغذوية، وتفيد في تحديد مستويات الحالة التغذوية مما يمكن العلاج.

### القيمة الغذائية : *Nutritive Value*

القيمة الغذائية للغذاء (سواء قبل أو بعد الإعداد) هي مقدار ما يحتويه الغذاء من العناصر الغذائية المختلفة. ويمكن تقدير العناصر الغذائية معملياً بتحليل الغذاء بواسطة الطرق الكيميائية المختلفة، أو حيويًا باستخدام حيوانات التجارب، أو ميكروبيولوجيًا باستخدام الكائنات الدقيقة. وتوضح جداول تحليل الأغذية محتوى

الأغذية من العناصر الغذائية المختلفة، والتي يمكن عن طريقها حساب القيمة الغذائية للأغذية المختلفة.

وبمعرفة القيمة الغذائية يمكن حساب مقدار ما تناوله الفرد من العناصر الغذائية، وهذا ما يعبر عنه بالمستوى الغذائي للعنصر أو العناصر الغذائية Level of nutrient(s) intake(s).

### : Caloric Density of Foods الكثافة السعيرية للغذاء

تعرف الكثافة السعيرية للغذاء بأنها القيمة الحرارية للغذاء مقاسة بالكالوري/١ جم غذاء. وتتأثر الكثافة السعيرية بنسبة المواد الهيدروكربونية أو نسبة الماء أو كليهما حيث تزيد الكثافة السعيرية بزيادة نسبة المواد الهيدروكربونية أو بانخفاض نسبة الماء.

### : Nutrient Density كثافة العنصر الغذائي

كثافة العنصر الغذائي هي كمية العنصر الغذائي الموجود في كمية من الغذاء يتولد عن احتراقها ١٠٠٠ كالوري.

### : Index of Nutrient Quality (INQ) دليل جودة العنصر الغذائي

ويقدر هذا الدليل بمقارنة كمية العنصر الغذائي في الطعام أو الوجبة بالنسبة لمقدار الطاقة الموجودة في نفس كمية الغذاء، ثم تقارن هذه النسبة بالدليل القياسي لجودة هذا العنصر الذي يساوي :

#### المقررات الغذائية لهذا العنصر المقررات الغذائية للطاقة

فإذا كان دليل جودة العنصر في الغذاء يعادل دليل الجودة القياسي لهذا العنصر، فإن هذا يعني أن كمية العنصر في الوجبة تمد الفرد باحتياجاته من هذا العنصر، ويكون دليل الجودة لهذا العنصر = ١.

### : Empty Calories السعرات الجوفاء

تعرف السعرات الجوفاء أو الفارغة بأنها السعرات المتولدة عن حرق غذاء يحتوي على كربوهيدرات فقط، مثل السكر أو النشا، أما السعرات غير الجوفاء فهي التي تنتج من حرق غذاء يحتوي على عناصر غذائية أخرى مع الكربوهيدرات، مثل

الخبر، فعند احتراقه داخل الجسم يتكون عنه طاقة مع بروتينات وفيتامينات ومعادن،  
والتي يحتوى عليها الغذاء.

#### **الفجوة الغذائية Food Gap :**

هى الفرق بين حجم الطلب على الأغذية، والموارد المتاحة من المصادر  
الغذائية المحلية. وهذا مؤشر عن عدم كفاية الغذاء المنتج محلياً، ويستكمل الاحتياج  
عن طريق الاستيراد.

#### **الأمن الغذائى Food Security :**

يعرف الأمن الغذائى بأن يكون الغذاء متاحاً لجميع السكان فى كل الأوقات  
بالكميات التى تفى باحتياجاتهم، وذات قيمة غذائية عالية، وبسعر مناسب.

#### **الاكتفاء الذاتى Food Sufficiency :**

الاكتفاء الذاتى هو أن الإنتاج المحلى يغطى المطلوب من السلع، أى مدى  
مقابلة الطلب من الإنتاج المحلى للسلع الغذائية المختلفة. بل قد يكون هناك فائض  
يمكن تصديره.

#### **علم الأغذية Food Science :**

يعرف هذا العلم فى اليونانية باسم Bromatology (broma=food) هو العلم  
الذى يختص بدراسة مصادر العناصر الغذائية واختيار الأغذية وبجميع الأغذية، وأثر  
المعاملات المختلفة التى تبجرى للأغذية بدءاً بالمعاملات الزراعية المتعددة ومعاملات  
الإعداد والطهى والتبريد والتجفيف والحفظ والتخزين والتسويق.. على القيمة الغذائية  
وجودة الغذاء، وكذلك سلامة الغذاء وصحته، وأسباب تلوث الغذاء وطرق اكتشاف  
تلوثه وقياسه، وتلافى ذلك.

#### **الأغذية Foods :**

هى كل الأغذية الصالحة لغذاء الإنسان من محاصيل نباتية وحيوانية، وقد  
يتناولها الإنسان بدون طهى أو معاملة حراريًا مثل بعض الخضروات والفواكه، ولكن  
يحتاج البعض الآخر إلى طهى ومعاملات حرارية مثل اللحوم والحبوب والبقول.  
والأغذية هى مصدر العناصر الغذائية اللازمة للإنسان.

## الأطعمة Foods :

هى الأغذية الصالحة لتناول الإنسان بعد إعدادها فى صورة مناسبة لتناولها، مثل الخبز واللحوم المطهية، وغيرها من الأطباق المختلفة.

### التغيرات البنية غير الإنزيمية Non-Enzymatic Browning :

وهى تفاعلات تنتج من احتراق السكر (كرملة) أو ناتجة عن تفاعل ميلارد Maillard-reaction الذى تتحد فيه المجموع المختزلة للسكريات والمجموع الأمينية للبروتينات تحت ظروف معينة من الحرارة والرطوبة، وهذه تقلل من القيمة الغذائية للبروتين فإن كان الحامض الأمينى اللايسين هو الذى دخل فى تفاعل ميلارد يعنى هذا أنه فقد وظيفته بالنسبة للجسم، وهو كما سيأتى ذكره من الأحماض الأمينية المنخفضة فى الحبوب.

### حالة الغذاء فى العالم<sup>(١)</sup> :

سبق أن خرج علينا مالثس Malthus (١٧٦٦ - ١٨٣٤) بنظريات عن العلاقة بين زيادة السكان وزيادة إنتاج الأرض، وأوضح ذلك بأن ذكر أن عدد السكان فى العالم يتزايد وفق متوالية هندسية، بينما يتزايد إنتاج الأرض وفق متوالية عددية؛ أى أن الزيادة الرهيبية فى عدد السكان لا تلاحقها الزيادة فى إنتاج الأرض، مما يودى إلى انخفاض مستوى المعيشة فى العالم، بل إنه أوغل فى تشاؤمه حتى أنه قال أن العالم لن يجد خلال ٣٠ سنة ما يستطيع أن يعول به شعبه، وكانت نظريته هذه قبل أن توتى الثورة الصناعية فى أوروبا ثمارها وقبل أن تنتشر فى العالم انتشاراً واسعاً وسريعاً.

ولاشك أن عدد سكان العالم قد تضاعف منذ عام ١٩٥٠، فوصل إلى أكثر من بليون نسمة عام ١٩٧٤ ثم إلى خمسة بلايين عام ١٩٨٧، إلا أنه قد جاء فى أحد التقارير الواردة فى مجلة Economist البريطانية بتاريخ ١٣/٦/١٩٨٧ أن الحد الأعلى النظرى لقدرة الكوكب الذى نعيش على أرضه تفى باحتياجات ١٣٢ ألف بليون نسمة؛ أى أضعاف أضعاف العدد الحالى لسكان العالم.

فقد نجد أن كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوروبية المشتركة لديها فائض هائل من الموارد الغذائية، يكلف تخزينه حوالى أربعة بلايين من الدولارات

<sup>(١)</sup> ليزيس نوار وآخرون (١٩٩٠).

سنوياً، ويتراكم هذا الفائض عاماً بعد عام. بل وتنفق الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ما يربو على المائة بليون (مليار) دولار سنوياً كدعم مالى لقطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى ليستمر إنتاج المزيد من الغذاء.

وعلى الجانب الآخر، نجد دول أخرى تعاني من نقص الغذاء والمجاعات، والحالة أوضح ما تكون فى إفريقيا والتي تقاس من أعلى معدلات لزيادة السكان. فإن معدل الزيادة فى الإنتاج الغذائى بالدول النامية بصفة عامة حوالى ٠,٣٪ سنوياً بينما الطلب على الغذاء ينمو بمعدل حوالى ٤٪ سنوياً. والسبب فى تلك الفروق الشاسعة يتركز فى غياب التناسق بين توزيع البشر وقدرة المناطق التى يعيشون فيها على توفير الغذاء لهم.

ولو استمر الوضع كما هو عليه الآن فى إفريقيا فإن احتياجاتها من استيراد الغذاء سيتضاعف ثلاث مرات بمجرد الحفاظ على مستويات الاستهلاك.

وقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقد الخمسينيات فى مد بعض دول العالم الثالث بالمعونة الغذائية تحت شعار "الغذاء من أجل السلام"، وكان هذا ليس دافعاً من نوايا إنسانية بقدر ما كان دافعاً سياسياً. وفى منتصف الستينيات، بدأ برنامج مماثل للسوق الأوروبية المشتركة وللدوافع نفسها، ولقد أفادت تلك البرامج فى التخلص من فائض الإنتاج الزراعى لتلك الدول.

ولقد كان للمعونة الغذائية مجموعة من الآثار السلبية بالغة الخطورة على الدول النامية، منها تغيير بعض العادات الغذائية التى توصل الاعتماد على استيراد الغذاء -ومن أمثلة ذلك : التحول من الاعتماد على الذرة أو الشعير أو غيرهما من مصادر الكربوهيدرات إلى القمح المستورد، والتوقف عن صناعة الخبز منزلياً والاعتماد على ما تقدمه مخازن مركزية من أنواع لم تكن مألوفة فى الريف ولا فى الحضر. كما أدت سياسة الاعتماد على المعونة الغذائية إلى تدهور أوضاع الإنتاج الزراعى الوطنى بشكل متزايد؛ إذ أن تقديم الغذاء مجاناً أو بأسعار مخفضة لا يتيح للفلاح أن يبيع إنتاجه من الغذاء بأسعار تغطى تكلفته إنتاجه- وهكذا تصبح الدولة المثقلة بالمعونة أسيرة لمقد مى المعونة، مثل ما يصبح "المدمن" أسير من يزوده. مما لا يستغنى عنه من المخدرات !!

ولذا يجب أن تكون المعونة فى صورة أخرى، وهى "المعونة الفنية"، حيث

تتمشى مع المثل الصينى القائل بأنه من الأفضل أن تعلم إنساناً الصيد بدلاً من أن تعطيه سمكة. ولذا فإن المعونة الفنية تتمثل فى مساعدة الدول التى تشكو من نقص الغذاء على إدارة مواردها بكفاءة، واستغلال ما يتوافر لديها من عوامل إنتاج حتى تنقلص احتياجاتها من استيراد الغذاء بالتدريج. إلا أن المعونة الفنية لا يمكن أن تعود بالفائدة المرجوة إلا إذا أحسن المسئولون فى الدول التى تتلقى المعونة استخدامها.

وبالرغم من أن مشكلة الغذاء فى العالم المعاصر، بكل تعقيداتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه لا بد من أن نسلّم بضرورة تحقيق التوازن بين معدلات نمو السكان وبين قدرات المناطق التى يعيشون فيها على توفير احتياجاتهم من الغذاء. فمشكلة الغذاء تعتبر شكلاً من أشكال العلاقة بين العرض والطلب، أو بين الإنتاج والاستهلاك ولها أبعاد متعددة أهمها البعد الأمنى، وكان هذا سبباً فى شيوع استخدام مصطلح الأمن الغذائى بسبب الارتباط الوثيق بين كل من الغذاء والأمن، فالغذاء أحد حاجات الإنسان الضرورية، ولذا فإن الدولة التى لا تستطيع تأمين الطعام لشعبها من مصادر محلية، تصبح عاجزة أمام الضغوط والتحديات التى تواجهها، مما يعرض أمنها للخطر، وحريتها واستقلالها للإنقاص. فالغذاء سلعة غير مرنة، لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها ولو إلى حين، كما أن السلع التى تستورد من الخارج لا يمكن التحكم فى أسعارها، وقد يصعب توفيرها فى بعض الأوقات.

ولذا فإن مفهوم الأمن الغذائى يشمل ضمان توفير بعض المواد الغذائية فى الأسواق المحلية على مدار السنة وبأسعار مناسبة وذات قيمة تغذوية تكفل للإنسان بقاءه حياً وأداء مهامه الاقتصادية بصورة صحية.

وهناك بعض الدلائل التى تحدد الأمن الغذائى لبلد ما، نذكر منها ما يلى:

- نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الاستراتيجية (ذات النمط الغذائى الاستهلاكى السائد).


- نسبة الإنتاج الغذائى المصدر إلى الإنتاج الغذائى المستورد.

- نسبة الإنفاق على الغذاء إلى إجمالى الدخل القومى.

- نسبة قيمة المستوردات الغذائية إلى إجمالى الاستيراد.

ويوضح الشكل (١-٢) نموذج مبسط لشرح مدى التوازن بين إنتاج واستهلاك الغذاء وأثره على كل من الأسعار النسبية للغذاء ومتوسط نصيب الفرد منه.





شكل (٢-١) التوازن بين الإنتاج واستهلاك الغذاء والعوامل المؤثرة عليه<sup>١</sup>

<sup>١</sup> Houck & Barr (١٩٧٧).

فعلى الجانب الأيسر نجد مدخلات إنتاج الغذاء والتي تتمثل فى توفير الأرض الصالحة لزراعة، وتوفير مياه الري، وتوفير العمالة المدربة، وتوفير التكنولوجيا المناسبة، وتوفير التقارى المحسنة والأسمدة والمبيدات... إلخ. وعلى الجانب الأيمن، نجد عوامل الطلب على الغذاء، والتي تشمل النمو السكانى ومقدار الدخل والقوة الشرائية، ويلاحظ أنه بزيادة إنتاج الغذاء عن الاستهلاك، فإن المؤشر الكبير للميزان يتجه ناحية اليسار ليعنى إنخفاض الأسعار النسبية للغذاء، وفى نفس الوقت يتجه المؤشر الصغير للميزان للجهة اليمنى ليعنى زيادة متوسط نصيب الفرد من الغذاء. وعلى العكس عند زيادة الاستهلاك عن المتوافر من الغذاء، فيتجه المؤشر الكبير ناحية اليمين ليعنى ارتفاع أسعار الغذاء، ويقابله اتجاه المؤشر الصغير ناحية اليسار أى انخفاض متوسط نصيب الفرد من الغذاء المتاحة.

ويلاحظ أن الزيادة السكانية، وخاصة إذا صاحبها ارتفاع مستوى الدخل؛ ولا يراكمه زيادة فى الإنتاج يودى إلى اتساع الفجوة الغذائية وتعرض الأمن الغذائى للخطر. وحديث بالذكر أنه لا تعنى حالة الاتزان حصول الأفراد على احتياجاتهم المناسبة من الأغذية والعناصر الغذائية، فهذا يختلف من بلد إلى آخر، أى أن حالة الاتزان تعنى فقط الاكتفاء الذاتى وليس الأمن الغذائى، فالاكثفاء الذاتى قد يعنى أن نستهلك ما تنتجه، بصرف النظر عن المستوى الغذائى سواء من ناحية كم أو كيف. الأسباب الرئيسية لأزمة الغذاء فى العالم :

يمكن حصر أهم أسباب أزمة الغذاء على المستوى العالمى فيما يلى :

#### ١- سوء الأحوال الجوية :

مثل عدم سقوط الأمطار فى مناطق تعتمد فى زراعتها على الأمطار، كذلك هبوب الأعاصير وجفاف الآبار، وتغير حالة الجو. بما يفسره العلماء بأنه ناتج عن البقع الشمسية أو تزايد ثانى أكسيد الكربون والتلوث وتغير طبقة الأوزون. فسوء الأحوال الجوية فى العالم أدى إلى انخفاض نسبة المنتج من الحبوب وبصفة خاصة القمح والأرز، فتدل البيانات على أن إنتاج كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أستراليا من الحبوب انخفض إذا ما قورن بالستينيات. كما وأن كلاً من روسيا والصين وغيرهما تستورد كميات كبيرة من الحبوب.

## ٢- ارتفاع معدل الزيادة السكانية :

سبق الإشارة إلى أن عدد سكان العالم قد تضاعف منذ عام ١٩٥٠ - ١٩٧٤ ليصل إلى أكثر من بليون نسمة، ثم إلى خمسة بلايين عام ١٩٨٧، ثم إلى حوالى سبعة بلايين عام ٢٠٠٠. وهذه الزيادة فى معدلات النمو السكاني لا يواكبها زيادة ماثلة فى معدلات إنتاج الغذاء، ويتضح تأثير ذلك فى الدول النامية عنه فى الدول المتقدمة.

## ٣- ارتفاع أسعار الأسمدة ومصادر الطاقة :

ويكفى لتوضيح أثر هذا العامل فى أزمة الغذاء العالمى ما عبرت عنه "باندرا نيكاسا" رئيسة وزراء "سرى لانكا" حينما قالت فيما يشبه صرخة الاحتجاج والمرارة : «لقد أصبح نصف مواردنا من النقد العالمى مخصصاً لمواجهة الارتفاع فى أسعار الطاقة والنصف الآخر لمواجهة الارتفاع فى أسعار السماد، ولا يبقى فى النهاية شئ للتمية».

## إنتاج الغذاء فى مصر :

مصر لها من الهبات والمؤهلات ما ينبغى أن يضعها فى الصفوف الأولى من البلاد الزراعية فى العالم؛ إلا أن الواقع غير ذلك. فالمساحة المزروعة تمثل نحو ٣٪ فقط من المساحة الكلية لمصر والتي تبلغ حوالى مليون كيلومتر مربع. وتدل تقارير وزارة الزراعة أن مصر شهدت فى الربع قرن الأخير تناقصاً مستمراً فى نسبة الاكتفاء الذاتى فى عدد كبير من السلع الغذائية، والأرقام تدل على أن معدل النمو السنوى فى الزراعة لم يزد على ٢,٥٪ تقريباً خلال الفترة من عام ١٩٧٥ إلى عام ١٩٨٠، فى الوقت الذى بلغ فيه معدل استهلاك الأغذية حوالى ٥٪ خلال نفس الفترة.

فقد تحولت مصر من بلد مصدر للقمح أثناء الحرب العالمية الثانية وما قبلها، إلى بلد مستورد. ثم زادت معدلات الاستيراد زيادة سريعة خصوصاً فى عقد السبعينيات، واقتزن ذلك بانخفاض كبير فى المساحة المزروعة من القمح، وأصبحنا الآن نعتمد على العالم الخارجى لتزويدنا بأكثر من ٥٠٪ من استهلاكنا للقمح، وليس الوضع أحسن حالاً بالنسبة لمحاصيل أساسية أخرى مثل الذرة والبقول. فبالنسبة للبقول يلاحظ عدم زيادة إنتاجيته منذ حوالى خمسة عشرة عاماً بالرغم من الزيادة السكانية

خلال هذه الفترة والتي لا تقل عن خمسة عشرة مليون نسمة. ويلاحظ عدم استيرادنا للقول في السنوات الأخيرة أدى إلى ارتفاع أسعاره ارتفاعاً ملحوظاً مما أثر على الاستهلاك، حيث انخفض مستوى نصيب الفرد من القول انخفاضاً ملحوظاً.

وفي حالة الأرز، نجد تناقصاً مستمراً في الفائض الذى يمكن تصديره، وقد تحول مصر في المستقبل القريب من بلد مصدر للأرز إلى بلد مستورد كما حدث في حالة القمح. وتكرر نفس الظاهرة في عدد من المواد الغذائية الأخرى، بما فى ذلك الألبان ومنتجاتها واللحوم بأنواعها.

فبعد أن كانت مصر تتمتع باكتفاء ذاتى فى بعض السلع الغذائية أصبحت تستوردها. وبصفة عامة يمكن القول إن متوسط نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الرئيسية اتجه إلى الانخفاض ليصل إلى ٧١٪ عام ١٩٨٧/٨٦. فى المقابل زادت قيمة الر واردات الغذائية من ١٤ مليون دولار عام ١٩٧٠ إلى ٣,٦٥ مليار دولار عام ١٩٨٦، أى بما يعادل ١٠ مليون دولار يومياً، ويوضح جدول (١ - ١) حجم المعونات الغذائية.

جدول (١-١) حجم المعونات الغذائية (حبوب غذائية) للبلاد العربية

الوحدة = ألف طن متري<sup>(١)</sup>

البلد	١٩٧٤	١٩٨٣
اليمن الشمالى	-	٨٣
تونس	١	١٦٠
لبنان	٢١	٦٩
اليمن الجنوبى	٣٨	٩
سوريا	٤٧	٢٨
موريتانيا	٤٨	٧١
السودان	٥٠	٣٣٠
الجزائر	٥٤	٢
الأردن	٦٣	٤٠
المغرب	٧٥	١٤٢
الصومال	١١٠	١٨٩
مصر	٦١٠	١٨١٦

فيتضح من بيانات الجدول (١-١) أن مصر وحدها حصلت على نحو ٦٣٪ من مجموع المعونات الغذائية للدول العربية خلال عام ١٩٨٣، والتي هي على شكل حبوب غذائية (قمح بصفة أساسية وذرة)، ويوضح جدول (٢-١) قيمة الواردات السنوية.

جدول (٢-١) توزيع البلاد العربية وفق قيمة وارداتها السنوية للفترة ١٩٨٠ - ١٩٨٤<sup>(١)</sup>

البلاد	القيمة بالمليون دولار
السعودية	٤٠٠٠ - ٥٠٠٠
مصر، الجزائر	٢٠٠٠ - ٢٥٠٠
ليبيا، العراق	١٠٠٠ - ١٥٠٠
الكويت، دولة الإمارات	٧٠٠ - ٨٥٠
لبنان، اليمن الشمالي، سوريا، الأردن	٤٠٠ - ٦٠٠
المغرب، اليمن الجنوبي، قطر، البحرين، تونس، عمان	٢٠٠ - ٣٠٠
السودان، جيبوتي	٥٠ - ١٠٠
موريتانيا، الصومال	بلدان تزيد صادراتها
	الغذائية عن وارداتها بمعدل
	١٠ - ٥٠ مليون

ويلاحظ من جدول (١ - ٢) أن مصر تعتبر من أكثر الدول العربية -بعد السعودية- من حيث ما تنفقه على وارداتها الغذائية خلال الأعوام (٨٠ - ١٩٨٤) وتمثل واردات مصر من الغذاء حوالي ٣١٪ من مجموع الواردات من جميع السلع والبضائع الأخرى غير الغذائية. (البنك الدولي، ١٩٨٥).

ويجب أن نشير هنا إلى أن هناك فرقاً كبيراً من الواردات الغذائية والمعونات الغذائية فالواردات الغذائية تتمثل فيما تقوم الدولة بشرائه من الأسواق العالمية، ومن المؤكد أن عدد من الدول العربية سوف تبقى مدة طويلة معتمدة على الخارج في نسبة غير ضئيلة من المواد الغذائية الأساسية. والمشكلة الحقيقية ليست في الاعتماد على

<sup>(١)</sup> المنظمة العربية للتنمية الزراعية - الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية للأعوام ١٩٨٤، ١٩٨٥.

الخارج فقط، ولكنها تكمن فى الاعتماد على المعونات لسد الفجوة الغذائية والتي تعطى مصدر المعونة مركزاً يؤثر عاجلاً أو آجلاً على استقلالية القرار السياسى والاقتصادى للبلد المتلقى للمعونة، ومن ناحية أخرى، فإن المعونات الغذائية تؤدى فى كثير من الأحيان إلى تشويه الأسعار الزراعية على مستوى المنتج مما يضعف الحافز على زيادة الإنتاج ويساعد على تأجيل عمليات التصحيح الاقتصادى، ولذا فالمطلوب تغيير طبيعة المعونة بحيث يزول منها العنصر الاستهلاكى وتتحول إلى معونات إنتاجية، سواء فى قطاع الزراعة أو غيره من القطاعات الأخرى.

وتوضح بيانات جدول (١-٣) مدى حدة مشكلة العجز الغذائى فى مصر بمقارنتها بالدول العربية الأخرى، حيث تمثل نسبة وارداتها من الأغذية إلى صادراتها الإجمالية حوالى ٦٨٪، وهى من أعلى النسب، مما يدل على حدة مشكلة العجز الغذائى فى مصر، على العكس نجد أن المملكة العربية السعودية والتي تستورد أغذية بما يوازى ٤,٥ بليون دولار سنوياً، وهى أعلى قيمة لمستوررات الغذاء بين البلدان العربية؛ إلا أن قيمة هذه المستوررات شكلت ٥٪ فقط من قيمة صادرات المملكة خلال تلك الفترة (١٩٨٤-١٩٨٥).

جدول (١-٣) توزيع البلاد العربية وفق نسبة وارداتها من الأغذية إلى صادراتها الإجمالية بما فيها الصادرات الغذائية<sup>(١)</sup>

نسبة صافى الواردات الغذائية إلى جملة الصادرات	البلاد
٤ - ٥ ٪	السعودية، الكويت، الإمارات، قطر
٦ - ١٠ ٪	ليبيا، عمان، المغرب، السودان
١٣ - ١٥ ٪	تونس، العراق، الجزائر
٢٧ ٪	سوريا
٤١ - ٤٦ ٪	لبنان، اليمن الجنوبي
٥٦ ٪	الأردن
أعلى من ٨٥ ٪	البحرين، اليمن الشمالى
٦٨ ٪	مصر

(١) المنظمة العربية للتنمية الزراعية - الكتاب السنوى للإحصاءات الزراعية للأعوام ١٩٨٤، ١٩٨٥.

ويوضح جدول (٤-١) إنتاج، واستهلاك، استيراد، وتصدير، والفاقد، ونسبة الاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية فى مصر عام (١٩٨١).

جدول (٤-١) إنتاج واستهلاك، استيراد، وتصدير، فاقد، نسبة الاكتفاء الذاتى من الأغذية خلال عام ١٩٨١ (الكميات بالألف طن متري)<sup>(١)</sup>

الغذاء	الإنتاج	الاستهلاك	الوارد	الصادر	الفاقد	الاكتفاء الذاتى %
القمح والدقيق	١٨٦٧	٦٤١٠	٥٩٨٠	-	٢٥٥	٢٩,١٣
الأرز	٢٣٨٤	١٣٥٥	-	١٣٥	٤٥	١٧٥,٩٤
البطاطس	١١٩٦	٧٢٤	٥٠	٩٦	١١٥	١٦٥,١٩
البقول	٣١٤	٣٤٩	١٤٦	-	١٨	٨٩,٩٧
الخضروات	٥٨٣٥	٤٣٥٠	-	١١٣	٥٤٨	١٣٤,١٤
الفاكهة	٣٨٠٠	٢٥٣٤	١٠١	١٩٧	٢٢٩	١٤٩,٩٦
السكر	٨٦١	١٢١٣	٣٥٢	-	-	٧٠,٨٩
الزيوت	٢٧٩	٤٤١	٣٣٦	-	١١	٦٣,٢٧
اللحوم الحمراء	٣٤٠	٤٥٠	١٤٩	٢٣	١	٧٥,٥٦
الدواجن	١٤٠	٢٢٦	٨٦	-	-	٦١,٩٥
الأسماك	١٣٩	١٩٣	٧٣	-	-	٧٢,٠٢
البيض	٨٥	٧٤	٢	-	٢	١١٤,٨٦
الألبان	١٨٩٣	٣٠٩٣	١٢٠٠	-	-	٦١,٢٠
ومنتجاتها						
المجموع	١٩١٣٣	٢١٤١٢	٨٤٧٥	٥٦٧	١٢٢٤	٨٩,٣٦

ويلاحظ من بيانات جدول (٤-١) أن كمية الإنتاج لا تتساوى مع الاستهلاك فى كثير من المواد الغذائية. ويلاحظ أن نسبة الاكتفاء الذاتى لمختلف الأغذية انخفضت فى عام ١٩٨٧ عن تلك الواردة فى الجدول، مما يوضح مشكلة الغذاء فى مصر واتساع الفجوة الغذائية المستمر.

<sup>(١)</sup> محسوبة من بيانات وزارة الزراعة المصرية - مؤتمر أزمة الغذاء فى إفريقيا - لندن ١٩٨٧ (S. Nour).

## مسببات انخفاض الاكتفاء الذاتى :

ومما لاشك فيه أن هناك أسباب رئيسية أدت إلى انخفاض الاكتفاء الذاتى من الموارد الغذائية يمكن حصرها فيما يلى :

- ١-زيادة السكان بمعدلات عالية.
- ٢-عدم زيادة الرقعة المنزرعة زيادة ملحوظة.
- ٣-زيادة الميل الحدى لاستهلاك بعض الأغذية.
- ٤-انخفاض نسبة العاملين فى الزراعة وزيادة الهجرة من الريف.
- ٥-فرض أسعار جبرية على بعض المحاصيل دون الأخرى.
- ٦-فاقد الغذاء أثناء المعاملات الزراعية وما بعد الحصاد.

## أولاً : الزيادة السكانية :

تدل بيانات جدول (١-٥) أن معدل الزيادة السكانية حوالى ٢,٢٩٪ خلال الفترة من ١٩٥٢-١٩٦٠، ارتفع ليصل إلى ٢,٦٧٪ سنوياً خلال الفترة ١٩٦٦-١٩٧٦، ووصل إلى ٢,٨٦٪ من ١٩٧٦-١٩٨٦، ويعتبر هذا المعدل عالياً، أى أن عدد السكان زاد حوالى ١٣٤٪ خلال الفترة من ١٩٥٢-١٩٨٦. وترجع الزيادة السريعة فى عدد السكان إلى تحسين المستوى الصحى وخفض معدل الوفيات من ٩٠ فى الألف خلال الخمسينات إلى ٤٠ فى الألف خلال عقد الثمانينات.

جدول (١-٥) عدد السكان والمساحة المنزرعة والمساحة المحصولية فى مصر

من ١٩٥٢ - ١٩٨٦<sup>(١)</sup>

السنة	عدد السكان (مليون)	المساحة المنزرعة (مليون فدان)	المساحة المحصولية (مليون فدان)
١٩٥٢	٢١,٠٢٢	٥,٧٦١	٩,١٦٧
١٩٦٠	٢٦,٠٨٥	٥,٩٠٠	١٠,٣٧٠
١٩٦٦	٣٠,٠٨٣	٥,٦٥٠	١٠,٤٨٨
١٩٧٦	٣٨,٢٢٨	٥,٧٠٠	١١,١٦١
١٩٨٦	٤٩,١١٢	٦,٣٨٥	١٢,٨١٨

<sup>(١)</sup> بحسبة من بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات وزارة الزراعة المصرية، ومأخوذة من مؤثر أزمة الغذاء فى إفريقيا - لندن ١٩٨٧ (S.Nour).



## ثانيًا: المساحة المنزرعة والمساحة المحصولية :

يلاحظ من جدول (١-٥) أن المساحة المنزرعة زادت من ٥,٧٦١ مليون فدان عام ١٩٥٢ إلى ٦,٣٨٥ مليون فدان عام ١٩٨٦ أى بنسبة قدرها ١١٪ فقط، بينما زادت المساحة المحصولية من ٩,١٦٧ مليون عام ١٩٥٢ إلى ١٢,٨١٨ مليون فدان عام ١٩٨٦ أى بنسبة قدرها حوالى ٤٠٪، وترجع زيادة المساحة المنزرعة بنسبة ضئيلة إلى أسباب منها التحدى على الأراضى الزراعية إما بالتجريف أو بالبناء. وتدل تقارير وزارة الزراعة المصرية على أنه خلال هذه الفترة فقدت مساحة من الأرض المنزرعة تقدر بحوالى مليون فدان، بينما مساحة الأراضى المستصلحة لم تزيد عن ٠,٨ مليون فدان، وذلك خلال الفترة من ١٩٦٠ - ١٩٧٦.

ويمكن أن نستخلص من بيانات جدول (١-٥) أن نصيب الفرد من كل من المساحة المنزرعة والمساحة المحصولية قد انخفض على التوالى، من ٠,٣ - ٠,٤ فدان عام ١٩٥٢ ليصل إلى ٠,١٣ - ٠,٢٦ فدان عام ١٩٨٦. ولذا لابد من زيادة الإنتاج الزراعى عن طريق زيادة إنتاجية الغذاء من المزروعات المختلفة أى الزيادة الرأسية، وذلك عن طريق تحسين مدخلات الإنتاج الزراعى واستخدام التكنولوجيات المناسبة، إلى جانب الزيادة الأفقية باستصلاح واستغلال أراضى جديدة.

## ثالثًا : زيادة الميل الحدى لاستهلاك الغذاء :

تدل إحدى دراسات الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسى بمصر سنة ١٩٨٧ أن هناك زيادة فى استهلاك المواد الغذائية ترجع علالة على ارتفاع مستويات الدخل مع ثبات الإنتاج إلى زيادة الميل الحدى للاستهلاك، وهذا يرجع إلى زيادة القوة الشرائية عن حجم الإنتاج المتاح محليًا. فتدل تلك الدراسة على أن هناك ارتفاعاً أو تضخمًا فى الدخل النقدية، مما ضاعف الطلب على المواد الغذائية وساعد ذلك على اتساع الفجوة بين حجم الناتج المحلى من الحاصلات الزراعية الأساسية وحجم الاستهلاك، الأمر الذى اقتضى اعتمادًا متزايدًا على الواردات لسد الفجوة الغذائية.

كما لوحظ أنه لا يوجد فرق معنوى إحصائيًا بين نمطى الاستهلاك فى الريف والحضر، وهذه تعتبر ظاهرة جديدة فى المجتمع المصرى، والتى ترجع إلى تغيرات اقتصادية واجتماعية عديدة.

#### رابعاً: انخفاض نسبة العاملين فى الزراعة وزيادة الهجرة من الريف :

تشير تقارير البنك الدولى عن التنمية فى العالم لعام ١٩٨٢، وكذا مؤشرات التنمية الدولية، وتقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية لعام ١٩٨٣ إلى أن نسبة العاملين فى الزراعة المصرية انخفضت من ٥٨٪ عام ١٩٦٠ إلى ٥٠٪ عام ١٩٨٠، ويرجع ذلك الانخفاض إلى تحلف الريف، وزيادة الهجرة إلى المدن أو خارج البلاد بسبب انخفاض دخول العاملين فى الزراعة، والتي تمثل فى مصر حوالى ٤١٪ من متوسط الدخل العام للسكان، فتدل تقارير البنك الدولى لعام ١٩٨٠ أن متوسط الدخل السنوى للفرد فى مصر حوالى ٥٤٣ دولار أمريكى، بينما متوسط الدخل السنوى للعاملين فى الزراعة ٢٢٤ دولار أمريكى فقط. وبطبيعة الحال، فإن العناصر البشرية المهاجرة تتمثل فى الفئات الشابة القادرة على العمل والعطاء والإنتاج، مما يرفع من نسبة كبار السن والنساء والأفراد من غير المنتجين، ويزيد من معدلات الإعاقة ويخفض من مستويات الإنتاجية الزراعية.

ولا تقتصر هذه المؤشرات السلبية على الريف الذى يخسر قواه البشرية المنتجة، بل ينعكس على المدن حيث يزداد الضغط على مرافقها وخدماتها، علاوة على زيادة الحاجة إلى إنتاج الغذاء؛ لأنه كلما نمت المدن زادت الحاجة إلى الطعام.

#### خامساً : فرض أسعار جبرية على بعض المنتجات الزراعية :

تعد الأسعار والسياسات التسعيرية من أهم العوامل الاقتصادية لتوجيه الموارد بكفاءة استخداماتها فى العمليات الإنتاجية المختلفة.

ولذا يقتضى الأمر فى بعض الأحوال ضرورة التدخل الحكومى لتعديل أسعار بعض السلع المنتجة محلياً، فيعود على المزارع المنتج أقل عائد، بينما يحصل القطاع الحضرى على دعم استهلاكه من العائد الزراعى. ويرجع ذلك إلى إهمال الحكومة لتكاليف الإنتاج الفعلية وعدم توفيرها للعائد المحفز للمنتج، بينما ينعم المستهلك بدعم أسعار المنتجات الغذائية. وتدل تقارير البنك الدولى (١٩٨٥) فى هذا الشأن أن الأسعار الحقيقية المتدنية للمزارع المصرى، وبخاصة بعد الارتفاع الجنونى فى تكاليف الإنتاج، حيث أن نسبة الزيادة فى أجور العمال الزراعيين بلغت ٥٠٪ بالنسبة لبعض المحاصيل الرئيسية مثل القمح والأرز والقصب والبصل. كما أن الأسعار المزرعية تقل

عن الأسعار التصديرية، مما أدى إلى انخفاض الهامش الربحي للمزارع. هذا علاوة على ترك محاصيل أخرى دون تحديد أسعار جبرية لها وتركها لقوى العرض والطلب فى السوق، وبخاصة المنتجات الحيوانية والخضروات والفاكهة، مما أدى إلى انخفاض نسبى فى دخل منتجى المحاصيل التصديرية والمحاصيل الغذائية الأساسية، الأمر الذى يخلق حافزاً لدى المزارعين للتحويل إلى زراعة المنتجات الأخرى الأكثر ربحية. فمثلاً، طبقاً لأسعار عام ١٩٧٧ كان هناك فرقاً كبيراً بين العائد النقدى للإنتاج من الفدان لكل من المحاصيل الحقلية (القمح، الذرة، والفاكهة والخضراوات) إذ يبلغ الإنتاج النقدى من الخضراوات نحو أربعة أمثال الناتج من المحاصيل الحقلية، ونحو مرتين ونصف الناتج من الفواكه.

**سادساً: فاقد الغذاء أثناء المعاملات الزراعية وما بعد الحصاد :**

يساهم الفاقد فى الغذاء فى زيادة حدة أزمة الغذاء فى مصر وغيرها من الدول، وتقول الإحصائيات الدولية أن ٣٠٪ من الغذاء المنتج على المستوى العالمى يتم فقده، وتصل هذه النسبة فى بعض الدول الإفريقية إلى ٤٠٪ من الحبوب، وتفقد هذه النسبة المرتفعة أثناء الحصاد وعند التخزين والنقل، يضاف إلى ذلك فقد الغذاء نتيجة للإصابة بالحشرات أو الميكروبات والذى يؤدى إلى تلف وفساد الغذاء وبالتالي فقده.

وتوضح إحصائيات وزارة الزراعة المصرية (١٩٨١) أن الفاقد من المحاصيل أثناء الحصاد والنقل والتخزين... وغيرها يمثل أكثر من ٧٪ من الإنتاج (جدول ١-٤)، ويقدر هذا الفاقد بنحو ٤٠٠ مليون جنيه مصرى، إلا أن بعض الدلائل تؤكد أن هذا الرقم أقل من الحقيقى كثيراً. كما وأن الفاقد فى المنتجات الحيوانية يقدر بنحو ثلاثة آلاف طن سنوياً (جدول ١-٤).

وفى تقرير آخر (عالم الشاذلى ١٩٨١) اتضح أنه يفقد سنوياً بسبب الأمراض التى تصيب الماشية والأغنام حوالى ٦٠ ألف طن من اللحوم، وحوالى ٥٠٠ ألف طن من الألبان بما يقدر بنحو ٢٠٠ مليون جنيه مصرى سنوياً.

### **الحالة التغذوية فى العالم :**

تشير الإحصائيات والبيانات الخاصة بالحالة التغذوية والصحية للبشر على مستوى العالم كله إلى أن هناك تقدماً واضحاً خلال العقدين الأخيرين، وأهم دلالات الحالة التغذوية والصحية هما العمر المتوقع للإنسان، ومعدل الرفاهية بين الأطفال.

ويبين جدول (٦-١) مؤشرات الحالة التغذوية والصحية فى مناطق العالم المختلفة خلال الأعوام ١٩٧٠-٦٥، ١٩٩٠-٨٥ (WHO ١٩٨٥).

جدول (٦-١) مؤشرات الحالة التغذوية والصحية  
فى مناطق العالم المختلفة<sup>(١)</sup>

المنطقة	العمر المتوقع للإنسان (بالسنة)		معدل وفيات الأطفال (لكل ألف)	
	١٩٧٠-٦٥	١٩٩٠-٨٥	١٩٧٠-٦٥	١٩٩٠-٨٥
إفريقيا	٤٣,٩	٥١,٣	١٥٨	١٠١
الولايات المتحدة الأمريكية	٦٧,٥	٧٣,٠	٣٩	٢٤
أمريكا اللاتينية	٥٨,٧	٦٥,٥	٩١	٥٧
آسيا	٥٣,٣	٦١,١	١١٠	٧٤
أوروبا	٧٠,٦	٧٤,٠	٣٠	١٣
الاتحاد السوفيتى	٦٩,٦	٧٢,١	٢٦	٢٢

ويتضح من جدول (٦-١) أنه على الرغم من أن هناك تقدماً كبيراً فى الحالة التغذوية والصحية لمختلف مناطق العالم، إلا أنه مازال هناك فجوة كبيرة بين الدول المتقدمة والدول النامية، فنلاحظ أن الفرد الأوروبى أو الأمريكى يعيش أكثر من عشرين عاماً أطول من الإفريقى، وفى قارة آسيا نجد تفاوتاً كبيراً فى تلك المؤشرات والدلائل التغذوية والصحية، فمثلاً يصل العمر المتوقع للإنسان فى اليابان إلى حوالى ٧٧ سنة، بينما نجده فى سيراليون ٣٦ سنة فقط.

كما وأن احتمالات موت الطفل الذى يولد فى بلد نام فقير قبل أن يبلغ عامه الأول يفوق مثيله الذى يولد فى بلد صناعى عدة أضعاف.

وقد اختارت منظمة الصحة العالمية (١٩٨٥) عمراً متوقعاً للإنسان يبلغ ٦٠ سنة ومعدل وفيات للأطفال أقل من ٥٠ وفاة لكل ألف طفل لتكون هدفاً صحياً أدنى لمعدل العالم النامى خلال الأعوام الأولى من القرن الواحد وعشرين.

<sup>(١)</sup> منظمة الصحة العالمية (١٩٨٥).

وعموماً، فإن الجوع وسوء التغذية من الأسباب الرئيسية للمشاكل الصحية فى الدول النامية، فيقدر عدد سكان العالم ممن يحصلون على سرعات حرارية أقل من تلك اللازمة لقيامهم بأعمالهم بحوالى ٢٠٪ من سكان العالم؛ أى أكثر من ألف مليون حالياً. وفى إفريقيا وحدها يوجد ما يزيد عن ١٥٠ مليون فرد يعانون من نقص الغذاء (منظمة الصحة العالمية، ١٩٨٧)، وفى كل يوم يموت نحو ٤٠ ألف طفل نتيجة لأمراض تتصل بالجوع. كما وأن نقص التغذية يتسبب فى اعتلال الصحة والضعف والوهن، كما يتسبب فى مقاومة أقل للأمراض المعدية، وخطورة أكثر للمرض إذا ما أصيب به الإنسان.

وتدل أيضاً إحصائيات منظمة الصحة العالمية (١٩٨٥) على أنه يصاب سنوياً أكثر من نصف مليون طفل بالعمى نتيجة لنقص فيتامين (A)، كما أظهرت الدراسات الحديثة أيضاً أنه هناك علاقة بين استيفاء الطفل لحاجته من فيتامين (A)، وخطر الموت نتيجة الإصابة بالإسهال والحصبة والأمراض الأخرى المعدية. وترتبط المشاكل الصحية فى الدول النامية بالبيئة إلى حد كبير، وبالموارد الطبيعية وأساليب التنمية، فالمشاكل الصحية تبدأ بنقص الغذاء والمياه النقية، ثم نقص الرعاية الصحية المناسبة.

كما أن أهم أمراض الدول المتقدمة، والتي ترجع إلى الإفراط فى استهلاك الغذاء، علاوة على عوامل القلق، هى غالباً أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. ويوضح جدول (١-٧) الأسباب الرئيسية للوفيات فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية والعالم كله.

جدول (٧-١) الأسباب الرئيسية للوفيات (١٩٨٠)<sup>(١)</sup>

الأسباب	الدول المتقدمة		الدول النامية		العالم كله	
	العدد بالآلاف	%	العدد بالآلاف	%	العدد بالآلاف	%
الأمراض المعدية والطفيلية	٨١٠	٧,٦	١٦٠٢٠	٣٩,٩	١٦٨٣٠	٣٣,١
السرطان	٢٠٥٠	١٩,٢	٢٢٠٠	٥,٥	٤٢٥٠	٨,٤
أمراض القلب والأوعية	٥٧١٠	٥٣,٥	٧٦٢٠	١٩,٠	١٣٣٣٠	٢٦,٢
أمراض تتعلق بالحمل والوضع	١٧٠	١٠,٦	٣٠٨٠	٧,٧	٣٢٥٠	٦,٤
التسمم	٦٩٠	٦,٥	١٩٨٠	٤,٩	٢٦٧٠	٥,٣
أسباب أخرى غير محددة	١٢٤٠	١١,٦	٩٢٤٠	٢٣,٠	١٠٤٨٠	٢٠,٦
جميع الأسباب	١٠٦٧٠	١٠٠,٠	٤٠١٤٠	١٠٠,٠	٥٠٨١٠	١٠٠,٠

ويمكن أن نتبين من جدول (٧-١) أهم أمراض الفقر وأمراض الثراء، ومنها يتضح أن أمراض القلب والأوعية الدموية تحتل المركز الأول في أمراض الثراء، وتحتل الأمراض السرطانية المركز الثاني في أسباب الوفاة، ولكن الوفيات الناتجة عنه تكاد تصل إلى ثلث الناتجة عن أمراض الجهاز الدورى والقلب، وهذه الأمراض صارت تحتل المركز الثانى في أسباب الوفيات فى الدول النامية بعد الأمراض المعدية والطفيلية.

### الحالة التغذوية فى بعض البلدان العربية :

يوضح جدول (٨-١) متوسط استهلاك الطاقة والبروتين والدهن فى بعض بلدان الدول العربية، توضح النتائج أن هناك تغير ملحوظ فى المستهلك من مصادر الطاقة الغذائية خلال الربع الأخير من القرن العشرين حيث زاد الاستهلاك فى بعض الحالات بين الستينيات والتسعينيات من القرن العشرين.

### الحالة التغذوية فى مصر :

تتركز مشكلات التغذية التى تؤدى إلى تفشى أمراض سوء التغذية فى الكم والكيف، فنقص الكمية عن الحد المطلوب يؤدى إلى أمراض نقص التغذية، ونوعيته تؤدى إلى عدم استيفاء الغذاء للعناصر الضرورية بالقدر اللازم للجسم.

<sup>(١)</sup> منظمة الصحة العالمية (١٩٨٥).

جدول (٨-١) متوسط استهلاك الطاقة والبروتين والدهن / الفرد / اليوم<sup>(١)</sup>

السنة	١٩٦١			١٩٧١			١٩٨١			١٩٨٥		
البيان	طاقة	بروتين	دهن	طاقة	بروتين	دهن	طاقة	بروتين	دهن	طاقة	بروتين	دهن
البلد	كالوري	جسم	جسم	كالوري	جسم	جسم	كالوري	جسم	جسم	كالوري	جسم	جسم
الإمارات	٢٨١٤	٧٢,٥	٨٥,٢	٣٢٠٨	٧٨,٢	٧٦,١	٣١٩٩	١٠١,٦	١١٠,٣	٣٣٠٩	١٠١,٦	١١١,٥
الجزائر	١٧٣٦	٤٧,٩	٣٢,١	١٨٣٤	٤٨,١	٣٥,٩	٢٦,٤	٦٦,٩	٥٩,٦	٧٨٦٦	٧٦,٦	٦١,٢
الأردن	٢٣١٨	٥٦,٣	٤٨,١	٢٤٩٧	٦٨,٣	٦٢,٢	٢٦٣٩	٦٨,٩	٥٦,٩	٢٦٣٤	٧١,٤	٦٢,٠
السعودية	١٧٧٧	٤٨,١	٢٦,٥	١٨٨٦	٤٨,٣	٣٢,٩	٢٧٧٧	٧٧,٧	٨٠,٢	٢٨٧٤	٨٦,٥	٨٢,٥
السودان	١٨٣٢	٥٥,٩	٥٣,٨	٢٢٠٩	٦١,٦	٦٨,٢	٢٣١٢	٦٨,٦	٧٦,٨	١٩٧٤	٧٥,٢	٦٣,٧
الصومال	١٦٩٩	٥٩,٠	٥٦,٤	١٧١٤	٥٨,١	٦٢,٨	٢٠٧٥	٦٢,٠	٧٨,٥	١٩٠٦	٥٩,١	٦٥,٢
الكويت	٢٥٩٤	٧٦,٨	٧٦,٠	٢٦٤٠	٧٤,٦	٧١,٣	٢٩٦١	٩٠,٠	٩٢,٠	٣١٩٥	٩٥,٣	١٠٤,٩
العرب	٢١٤١	٥٧,٣	٣٥,٣	٢٤٦٤	٦٥,٥	٤٢,١	٢٦٩٧	٧١,٢	٤٩,٦	٣٠٢٠	٨١,٣	٥٥,٦
اليمن	١٩٠٨	٥٨,٩	٣٦,٤	١٩٦١	٥٨,٨	٣٦,٠	٢٠٧٠	٦١,٨	٦١,٨	٢١٤٢	٦٠,٠	٣٣,٥
تونس	٢١٠٣	٥٦,٤	٤٣,١	٢٩٦٨	٦٣,١	٦٢,١	٢٧٧٩	٧٧,٥	٩٣,٣	٣٣٣٢	٩٠,٩	٨٥,٧
موريتانيا	٢٣٦٢	٦٥,١	٥٩,٧	٢٤١٢	٦٤,٢	٦٥,٠	٣١٠٥	٨٤,٢	٩٣,٧	٣٠٠٣	٧٨,٦	٨٢,٧
لبنان	٢٤٦٦	٦٥,٠	٦٢,٢	٢٤٧٤	٦٤,٢	٦١,٩	٢٨٧٥	٨٣,٠	٨٥,٢	٣٢٧٤	٨٦,٢	٩٧,١
ليبيا	١٦٥٤	٣٩,٢	٣٢,٢	٢٥٠٦	٦٠,٥	٧٣,٨	٣٥٦٤	٨٨,٠	١٢٨,٩	٣٢٢٤	٨٠,٥	١٠٨,٣
مصر	٢٢٧٢	٦١,٣	٤٥,٢	٢٤١٧	٦٤,٧	٥٣,٣	٣٢٠٦	٧٩,٤	٧٢,٣	٣٣٣٥	٨٧,٣	٧٨,٤
العالم	٢٢١٢	٦١,٩	٤٩,٤	٢٤٥٥	٦٥,٢	٥٦,٠	٢٦١٠	٦٨,٥	٦٢,٧	٢٧١٠	٧١,٠	٦٨,٥

<sup>(١)</sup> منظمة الأغذية والزراعة ١٩٩٢. نشرة الإحصاءات الزراعية.

ويمكن حصر أهم أسباب هذه المشكلة فى الفقر والجهل وتفشى الأمراض  
المستوطنة بين سكان الريف.

وهناك أسباب أخرى لا تقل أهمية عن السابقة تتمثل فى العادات الغذائية  
والتقاليد الاجتماعية الضارة التى ليس من اليسر تغييرها إلا على مدى سنوات طويلة.  
فالعادات الغذائية التى تكونت وتأصلت فى الفرد منذ نعومة أظافره يحتاج تغييرها  
توعية الفقراء، بل يجب أن توجه أيضاً إلى القادرين، فالجهل التغذوى قد يتفشى بين  
الفقراء والقادرين وبين الجهلة والمتعلمين على السواء.

وبالتوعية ونشر الثقافة التغذوية الصحية، يمكن إرشاد الأفراد إلى كيفية  
تكوين وجبات متوازنة متنوعة، والتعريف بالبدائل الغذائية وطرق الطهى السليمة...  
وغيرها، وهذه إحدى الوظائف الهامة للإرشاد الاقتصادى المنزلى.

**يوضح جدول (٩-١) متوسط نصيب الفرد فى مصر من بعض الأغذية:**



جدول (٩-١) متوسط نصيب الفرد المصرى اليومى بالجرام من الأغذية  
(خلال سنوات ٥٢، ٧٠، ٨٠، ١٩٨١)

من RDA	RDA	١٩٨١	١٩٨٠	١٩٧٠	١٩٥٢	الغذاء
٦٣	٢٦١٨	١٦٥٤	١٥٧١	١٣١٢	٩٣٣	جملة الغذاء
١٠٠	١٣٩٩	١٣٩٤	١٣١٨	١١٤٣	٧٦٦	الأغذية النباتية
٢١	١٢١٩	٢٦٠	٢٥٣	١٦٩	١٦٧	الأغذية الحيوانية
٢٧٠	٢٧٨	٧٥١	٦٦٨	٦١٩	٤٦٤	القمح
٢٥٢٥	٢٣١	٥٧	٥٣	٣٥	٢١	الأرز والبطاطس
١٢٨	١٨	٢٣	٢١	٣٠	٢٩	البقوليات
٥٢	٣٥٢	٢٨٧	٣١٦	٢٤٥	١٠٠	الخضروات
٤٨	٣٥٠	١٦٧	١٥٧	١٤٠	١٠٠	الفواكه
٩٤	٨٥	٨٠	٧٤	٥١	٤٤	السكر
٣٤	٨٥	٢٩	٢٩	٢٣	٨	الزيت
٢٠	١١٤	٢٣	٢١	١٧	١٧	اللحوم الحمراء
٢٦	٥٨	١٥	١٣	٨	٨	الدواجن
٥٤	٢٤	١٣	١٢	٦	٦	الأسماك
٨	٦٠	٥	٥	٤	٢	البيض
٢١	٩٦٣	٢٠٤	٢٠٢	١٣٤	١٣٤	الألبان ومنتجاتها

المصدر : محسوبة من بيانات وزارة الزراعة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء  
بمصر ومأخوذة من مؤتمر أزمة الغذاء فى أفريقيا - لندن، ١٩٧٨ (S.Nour).

فغذاء المواطن المصرى يتميز بزيادة نصيبه من الحبوب على حساب استهلاك  
الأغذية الأخرى -متوسط نصيب الفرد المثرى من القمح ودقيق أعلى من ٢٠٠ كيلو  
جرام، وهو ما يزيد على نصيب المواطن فى الدول الغنية والذي لا يتجاوز ٥٠ كجم  
وبعبارة أوضح فإن الفرد فى مصر يستهلك ثلاثة أمثال ما يستهلكه الأوروبى من الخبز

وحدة أمثال نصيب الأمريكي، ويرجع ذلك لعادات غذائية علاوة على أنه أرخص الأغذية المتاحة حيث تدعمه الحكومة بما يعادل ٨٠٠ مليون جنيه مصرى (١٩٦٨). كما وأنه يعتبر مادة مألوفة تشعّر الفرد بالشبع، فهو الغذاء الأساسى لعامة الشعب وخاصة لذوى الدخل الدنيا.

وفى حقيقة الأمر فمن الإنصاف القول بأن جزءاً كبيراً من الدقيق يستهلك كأعلاف للحيوانات والطيور.

ومن ناحية أخرى فإن الاستهلاك فى مصر من الأغذية الكربوهيدراتية الأخرى وهى البطاطس والأرز ٢٥ ٪ من الكميات الموصى بها ويرجع ذلك أيضاً إلى عادات غذائية كما أن البطاطس تستهلك كنوع من الخضروات.

أما البقوليات وخاصة الفول الذى يشكل مع الخبز الوجبة الأساسية للمواطن المصرى نجد أن نصيب الفرد منها أعلى من تلك الكميات الموصى بها.

كما أن استهلاك الفرد فى مصر من الخضر يزيد استهلاكه من الفاكهة المرتفعة الأسعار، وأن من العادات الغذائية شرب الشاي بعد تناول وجبة الغذاء أو العشاء بدلاً من الفاكهة مرتفعة السعر، وذلك ساعد على زيادة استهلاك السكر، فيتضح ارتفاع استهلاك الفرد من السكر فهو حوالى ٣٠ كيلو جرام فى السنة وهو ما يزيد على استهلاك الفرد فى كل الدول باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التى يستهلك فيها المواطن ضعف ما يستهلكه المواطن المصرى.

ويرجع ارتفاع استهلاك السكر إلى التوسع فى صناعة المياه الغازية التى يصل إنتاجها فى العام الواحد إلى أكثر من ١٢ مليون (١٩٨٩) مع التوسع فى إنتاج العصائر والمربات وظهور العديد من مصانع الحلوى.

ومن نتائج الدراسات المختلفة يلاحظ الانخفاض الكبير فى نصيب الفرد من الزيوت والأغذية الحيوانية بصفة عامة - ويرجع ذلك إلى قلة الناتج من هذه الأغذية وبالتالى ارتفاع أسعارها وعدم مقدرة الغالبية العظمى من المواطنين على الحصول عليها.

### **متوسط نصيب الفرد من العناصر الغذائية :** **الطاقة :**

تدل الإحصائيات المختلفة المصرية والعالمية، على أن هناك زيادة مستمرة فى

نصيب الفرد من الطاقة منذ ثورة ١٩٥٢ وكانت الزيادة أعلى ما يمكن خلال أعوام ٧٣ - ١٩٧٦ حيث وصلت إلى حوالى ١٥٠٪ من الكميات الموصى بها (RDA) ويرجع ذلك إلى ارتفاع الدخول خلال هذه الفترة نتيجة للانفتاح الاقتصادى للبلاد (جدول ١-١٠).

وبطبيعة الحال فيجب ألا يقل أو يزيد نصيب الفرد من الطاقة عن أكثر من ١٥ ٪ من الكميات الموصى بها وإلا أدى ذلك إلى أضرار صحية كثيرة. ويعتمد الفرد بدرجة كبيرة فى سد احتياجاته من الطاقة إلى الأغذية النباتية (جدول ١-٤)، فالحبوب وحدها تمد بحوالى ٧١٪ من الطاقة، وتصل هذه النسبة إلى ٥٥٪ فقط فى معظم الدول المتقدمة وحوالى ٧٧٪ فى الدول النامية، أما نصيبه من الطاقة حيوانية المصدر فتمثل ٦,٥ ٪ من الطاقة الكلية والتى تبلغ أكثر من ٣٥ ٪ فى الولايات المتحدة الأمريكية.

### البروتين :

المتوسط اليومى لنصيب الفرد من البروتين فى مصر عالى نسبياً ويصل لحوالى ١٠٦ (جدول ١-١٠)، معظمها من الحبوب والبقول، ومنها حوالى ١٥ جرام فقط من مصادر غذائية حيوانية أى نسبة بنسبة ١٤٪ من البروتين الكلى، وبالمقارنة بغذاء الفرد فى الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن البروتين الحيوانى يمثل أكثر من ٤٠٪ من البروتين الكلى.

### الدهون :

المتوسط اليومى لنصيب الفرد من الدهون حوالى ٦٤ جرام (جدول ١-١٠) ٧٥٪ منها نباتية المصدر، ٢٥٪ حيوانية المصدر وهذه الكمية تمثل حوالى ١٥٪ من الطاقة الكلية وهى تتساوى أو تقل قليلاً عن معظم الدول النامية والنسبة الموصى بها تتراوح ما بين ٢٥ - ٣٠٪.

### الكربوهيدرات :

تمثل الكربوهيدرات أكثر من ٧٠٪ من مصادر الطاقة الكلية -وهى أعلى كثيراً عن الكميات الموصى بها- والتى تتراوح بين ٥٠ - ٦٠٪ فقط.

جدول (١٠-١) متوسط نصيب الفرد اليومى من الطاقة والبروتين والدهون  
والكربوهيدرات ومصادرها الغذائية عام ١٩٨١

الغذاء	الطاقة		بروتين		دهون		كربوهيدرات	
	حارارى	%	جم	%	جم	%	جم	%
أغذية نباتية	٣٥٢٥	٩٣,٥	٩١,١	٨٥,٩	٤٧,٩	٧٤,٨	٦٨٣,٠	٩٨,٦
حبوب	٢٦٧٠	٧٠,٨	٧٨,٠	٧٣,٦	١٦,٠	٢٥,٠	٥٥٤,٠	٧٩,٩
أرز وبطاطس	٥١	١,٤	١,٢	١,١	-	-	١١,٦	١,٧
بقوليات	٨٦	٢,٣	٥,٠	٤,٧	٢,١	٣,٣	١١,٨	١,٧
خضروات	٨٢	٢,٢	٥,٠	٤,٧	٠,٦	٠,٩	١٤,٢	٢,٠
فاكهة	١٠١	٢,٧	١,٧	١,٦	١,٢	١,٩	٢٠,٩	٣,٠
سكر	٢٨٣	٧,٥	٠,٢	٠,٢	-	-	٧٠,٥	١٠,٢
زيت	٢٥٢	٦,٧	-	-	٢٨,٠	٤٣,٧	-	-
أغذية حيوانية	٢٤٧	٦,٥	١٤,٩	١٤,١	١٦,١	٢٥,٢	١٠,٠	١,٤
لحوم	٤٥	١,٢	٤,٠	٣,٨	٢,٩	٤,٥	٠,٥	٠,١
دواجن	١٩	٠,٥	١,٨	١,٧	١,٣	٢,٠	-	-
أسماك	١٠	٠,٢	١,٠	٠,٩	٠,٦	٠,٩	-	-
بيض	٨	٠,٢	٠,٦	٠,٥	٠,٥	٠,٨	-	-
ألبان ومنتجاتها	١٦٥	٤,٤	٧,٥	٧,٢	١٠,٨	١٦,٩	٩,٥	١,٤
الإجمالي	٣٧٧٢	١٠٠,٢	١٠٦	١٠٠,٠	٦٤,٠	١٠٠,٠	٦٩٣,٠	١٠٠,٠

المصدر : S. Nour (1987)

### وظائف الغذاء للجسم : Functions of Food

لا تقتصر فوائد الغذاء على نمو وبناء وتحديد أنسجة الجسم، أى الجوانب الفسيولوجية physiological بل له جوانب أخرى اجتماعية social ونفسية psychological لا يمكن إغفالها.

### الوظائف الفسيولوجية physiological Functions :

- ١- الغذاء يمد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية لتوليد الطاقة اللازمة لأداء الوظائف الحيوية بالجسم. وهذا الاحتياج يجب أن يوفر للجسم قبل أى احتياج آخر. وتعتبر الكربوهيدرات مصدراً اقتصادياً للطاقة، يليها الدهون، ثم البروتين.
- ٢- يمد الجسم بالمواد اللازمة لبناء الجسم وصيانتته مثل البروتين والماء والأملاح المعدنية.

٣- يمد الجسم بما يلزمه من مواد لتنظيم العمليات وصيانة الجسم، ويدخل فى هذه المجموعة الفيتامينات والأملاح المعدنية والماء والأحماض الدهنية الأساسية والبروتين.

### الوظائف الاجتماعية Social Functions :

تعتبر حفلات الغداء أو العشاء التى تقام للأفراد والجماعات من وسائل توطيد العلاقات الاجتماعية وزيادة أواصر الصداقة بين الناس، ووسائل التعارف بين الناس والشعوب. وتقام المآدب والحفلات للزوار والسياسيين ورجال الأعمال حين يقومون بزيارة مدناً مختلفة، أو بلاداً أجنبية وينهون أعمالهم، وهذا ما يعرف بغداء العمل أو عشاء العمل business lunch or supper. كما تقام حفلات الشاى أو العشاء فى الكليات والمعاهد كوسيلة للتعارف بين أسرة الكلية أو المعهد وزيادة الترابط.

### الوظائف النفسية Psychological Functions :

يقوم الغذاء -إلى جانب تغذية الجانب الجسدى- بإرضاء بعض الجوانب العاطفية، ويعتبر الغذاء أحد -إن لم يكن أهم- مسببات السعادة للإنسان. فالفرد يشعر بلذة أثناء تناوله الطعام خصوصاً إذا كان شهياً. إن الغذاء يلبي حاجات الإنسان البيولوجية، أى أنه مهم لحياة الإنسان ومعيشته، كما أن الشبع يشعر الإنسان بالأمان. والمعروف أن عدم تلبية الحاجة يؤدى بالإنسان إلى التوتر.

إن الإنسان الشبعان يكون قادراً على الحركة والنشاط وأداء أعماله البيولوجية، وهذا يؤدى إلى استقرار حالته المزاجية وشعوره بالسعادة، أما الجوع فيولد لدى الفرد الشعور باليأس والخمول، وعدم القدرة على الحركة وأداء متطلباته وأعماله، فيشعر بالإحباط، وللغذاء تأثير فى صرورة الهرمونات الموجودة فى الجسم.

إن الإنسان الجائع يتصف بالعصبية والقلق والتوتر، وذلك لأن الجوع يقلل أو يمنع إفراز هرمون الإنسولين، ويعمل هذا على إفراز الهرمونات المضادة للإنسولين، مثل هرمون الإنفيرين الذى تؤدى زيادته فى الدم إلى توتر الإنسان وزيادة حساسيته وسرعة وسهولة إثارتة.

كلنا يعلم جيداً أن نجاح الإنسان فى حياته الدراسية والعملية يبعث فيه الشعور بالغيطة والانبساط والسرور، وفى ذلك يلعب الغذاء دوراً مهماً، وذلك لأن الغذاء يمد المخ بمتطلباته الغذائية ليقوم بوظائفه المختلفة من تفكير وتحصيل وتذكر

والقدرة على حل المشكلات والإبداع، وغيرها من الوظائف المختلفة، وذلك لأن الغذاء يكون الموصلات العصبية neurotransmitters المختلفة اللازمة، فيستطيع الفرد أن يتعلم ويحقق طموحاته وإنجازاته في الحياة بمعنى كامل وتكيف سوى.

ومن جهة أخرى، فإن مادة serotonin تستخدم لتهدي الإنسان حتى في حالة الهياج، وما هذه المادة إلا موصّل عصبى تنج من الحامض الأمينى الأساسى tryptophan.

علامة على ما سبق، فإن وجود الغذاء على مائدة المفاوضات والمناقشات يقلل من حدة التفاوض والنقاش. كما أن الغذاء يلعب دوراً مهماً للإنسان في غريته؛ فعندما يكون الفرد في بلد أجنبي ويتناول طعاماً تعود عليه في وطنه، فإنه يشعر بالراحة النفسية إلى جانب الفائدة الجسمية. كما أن الفرد عندما يسافر إلى بلد أجنبي فإنه يشعر في بادئ الأمر بمعاناة نفسية، ولكن تزول هذه الحالة بعد أن يتلاءم مع العادات الغذائية السائدة.

### تركيب جسم الإنسان : Composition of Human Body

ويتّركب جسم الإنسان من العناصر الغذائية التي يتناولها في غذائه وينى منها جسمه "You are what you eat". وهذه المكونات عضوية ومعدنية، هى عناصر أساسية essential تمثل المواد العضوية منها ٩٥-٩٦٪ من وزن الجسم، والباقي مراد معدنية. وتتكون المواد العضوية من عناصر الأكسجين، والكربون، والهيدروجين، والنيتروجين. وبالنسبة للمواد المعدنية فتشمل :

أ - عناصر كبيرة macro elements، وتشمل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والكبريت والكلور والمغنسيوم.

ب- عناصر صغيرة micro elements، وعادة تقدر هذه المواد بالملمج / كجم من وزن الجسم، وتشمل الحديد واليود والنحاس والزنك والمنجنيز والكوبلت والموليبدنيوم والسليينيم والكروم والفلور.

ويوضح جدول (١-١١) النسبة المئوية لعدد ذرات العناصر الكيميائية الموجودة في جسم الإنسان كما أشار إليها Stroev (١٩٨٩) :

جدول (١-١١) العناصر الكيميائية الرئيسية فى جسم الإنسان

العنصر	%	العنصر	%	العنصر	%
H	٦٠,٣	Na	٠,٧٣	K	٠,٠٣٦
O	٢٥,٥	Ca	٠,٢٢٦	Cl	٠,٠٣٢
C	١٠,٥	P	٠,١٣٤	Si	٠,٠٠٠١ >
N	٢,٤٢	S	٠,١٣٢	Al	٠,٠٠٠١ >

يلاحظ أن أربعة عناصر هى الهيدروجين والأكسجين والكربون والنيتروجين تكون ذراتها حوالى ٩٩ % من مجموع الذرات atoms فى جسم الإنسان ويصل عدد عناصر الجدول الدورى للعناصر الموجودة فى جسم الغنسان ٧٠ عنصر، ويمكن تقسيم هذه العناصر إلى أربعة أقسام حسب نسبة وجودها فى الجسم، وتشمل المجموعة الأولى العناصر الموجودة بالنسبة الأكبر macrobiogenic، وهى العناصر الرئيسية وتضم الأكسجين، الكربون، النيتروجين، الهيدروجين، الكالسيوم، الفوسفور. المجموعة الثانية وتشمل العناصر الأقل وجودًا oligobiogenic ويتراوح نسبة وجودها بين ٠,١ - ١,٠ وتشمل البوتاسيوم، الصوديوم، الكلور، الكبريت، المغنسيوم والحديد.

المجموعة الثالثة وتشمل المجموعة الأصغر microbiogenic التى لا يزيد نسبة وجودها فى الجسم عن ٠,٠١ % وتضم الزنك، المنجنيز، الكوبلت، النحاس، الفلور، البروم واليود، وقد أظهرت أنها تقوم بوظائف حيوية للجسم.


أما المجموعة الرابعة وتوجد بنسب ضئيلة فى جسم الإنسان ultra microbiogenic وتضم باقى العناصر التى لا تزيد نسبة وجودها بين  $10^{-4}$  -  $10^{-1}$ ، وقد ثبت أن ١٢ منها تقوم بوظائف للجسم وهى البورون، الليثيوم، الألومنيوم، السليكون، ستانم، كادميوم، رصاص، سيلينيوم، تانيم، فانوم، كروميوم، والنيكل، ويوجد نسبة ضئيلة تتراوح بين  $10^{-4}$  -  $10^{-12}$  بها سيزيوم، جاليوم، انديوم، تاليوم، جيرانيوم، اتيمنى، بسمث، ذهب، زئبق، كما يوجد عناصر أخرى خاملة inert، وأيضًا عناصر أخرى مشعة مثل الراديوم، واليورانيوم وهذه نسبتها لا تزيد عن ذرة واحدة فى الخلية، وقد تزيد نسب هذه العناصر وتتراكم فى الجسم نتيجة تلوث البيئة. وتشترك العناصر الكيميائية السابقة الذكر فى تكوين العناصر الغذائية المكونة لجسم الإنسان (جدول ١ - ١٢) وهى الماء والبروتين والدهون والعناصر المعدنية

والكربوهيدرات والفيتامينات، وتختلف هذه العناصر، وخصوصاً نسبة الماء والدهن حسب السن والحالة الصحية والمرضية ونشاط الفرد.

جدول (١-١٢) تركيب جسم الإنسان من العناصر الغذائية

العنصر	%
ماء	٦٥ - ٥٥
بروتين	١٧ - ١٥
دهن	٢٠ - ١٣
رماد	٥,٥ - ٣,٥
كربوهيدرات	١,٥ - ٠,٧٠

وتوجد الفيتامينات بجسم الإنسان إلا أنها توجد بنسبة ضئيلة جداً. ومع تقدم العمر تقل نسبة الماء وتزيد باقى العناصر (شكل ١-٣).



changes in body composition from the infant on the left to the adult on the right. \*

\* المصدر : Ensminger وآخرون (١٩٩٥).

شكل (١-٣) تغير تركيب الجسم حسب العمر



كما يتغير تركيب الجسم أيضاً حسب الحالة التغذوية حيث تزيد نسبة الدهن فى حالة زيادة البدانة، بينما تقل فى حالة نقص الوزن أو النحافة.

ويعتبر الغذاء هو المصدر الرئيسى للإنسان فى الحصول على معظم العناصر الغذائية اللازمة له للنمو وصيانة أنسجته وتجديدها، والوقاية من الأمراض.

وقد يحتوى الغذاء الواحد على عدد محدود من العناصر الغذائية، أو قد يمد الجسم بعدد كبير منها. ولا يمكن لأى طعام واحد أن يمد الجسم بكل العناصر الغذائية بالكميات والنسب اللازمة للمحافظة على الصحة العامة. وعموماً إذا احتوت الوجبة ككل على جميع العناصر الغذائية الضرورية، يمكن للخلايا وأعضاء الجسم المختلفة تخليق آلاف من المواد الضرورية للتفاعلات الميتابوليزمية فى الجسم.

ولا يمكن استعمال الغذاء بصورته الأصلية بواسطة الخلايا. ولكن لابد من تحويله إلى حالة يسهل للجسم الاستفادة منه. ويتم ذلك بواسطة سلسلة من العمليات تبدأ بالهضم خلال الجهاز الهضمى حيث تنطلق العناصر الغذائية فى صورة حرة تمتص، ثم تنتقل من خلال الغشاء المخاطى لجدار الأمعاء إلى تيار الدم، حيث تنقل لأنسجة الجسم المختلفة لاستعمالها للعديد من الأغراض الفسيولوجية والميتابوليزم. ويعمل الجسم على منع أى تراكم للعناصر الغذائية أو نواتجها الميتابولية أو زيادة تركيزها فى بعض الأجزاء لدرجة تصل إلى المستوى السام للجسم، أو فى سوائل الجسم، ويتم ذلك عن طريق تنظيم عملية الامتصاص والإخراج والتخلص من العناصر الزائدة عن حاجة الجسم عن طريق إفرازات المرارة والبراز والبول والعرق.

والعناصر الغذائية التى يحتاجها الإنسان تشمل الكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية والماء، وتعتبر الكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات هى العناصر الغذائية المولدة للطاقة *nutrients producing energy*.



الباب الثانى

# الكربوهيدرات

CARBOHYDRATES



## الكربوهيدرات CARBOHYDRATES

### مقدمة:

يستمد الناس معظم العناصر الغذائية من الأغذية الكربوهيدراتية، وهي سهلة الزراعة ورخيصة، فإنتاج الفدان من الأغذية التي تمد الجسم بالطاقة أعلى من أى مصدر آخر للطاقة كما أن الأغذية الكربوهيدراتية طعمها مقبول ويمكن تخزينها لمدة طويلة دون حدوث تلف فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد الحارة من فساد اللحم بسرعة. وتعتبر الكربوهيدرات المصدر الرئيسى للطاقة اللازمة للإنسان فى جميع أنحاء العالم ممثلة فى القمح والذرة والأرز والشعير والبطاطس.. إلخ، ويمكن للنبات أن يكون الكربوهيدرات أثناء عملية التمثيل الضوئى photosynthesis وهى سلسلة من التفاعلات الكيميائية التى تتطلب وجود الكلورفيل النباتى والطاقة من الشمس لتكوين الكربوهيدرات من ثانى أكسيد الكربون الجوى والماء الأرضى. ومن خلال النبات يمكن للإنسان أن يحصل على احتياجه من الكربوهيدرات حيث أنه لا يمكن للإنسان أن يكون الكربوهيدرات من عناصرها.

### تكوين الكربوهيدرات:

تتكون الكربوهيدرات من كربون وأيدروجين وأكسجين، ويوجد العنصران الأخيران بنسبة وجودهما فى المثال ورمزها العام  $C_n H_{2n} O_n$  والكربوهيدرات عبارة عن الدهيدات Aldehydes أو كيتونات Ketones عديدة الهيدروكسيل، وهذه هى التى تنتج عند تحليل الكربوهيدرات مائياً أو هى عبارة عن مشتقات الدهيدية أو كيتونية للكحولات عديدة الهيدروكسيل. وترجع كلمة كربوهيدرات إلى أن ذرات الكربون محاطة بالعناصر المكونة للماء أى "Carbon hydrates"

### أقسام الكربوهيدرات :

وتنقسم الكربوهيدرات إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

- ١- سكريات أحادية Monosaccharides
- ٢- سكريات أوليحية Oligosaccharides
- ٣- عديدات السكريات Polysaccharides

## أولاً: سكريات أحادية Monsaccharides :

ويطلق على السكريات الأحادية اسم الكربوهيدرات البسيطة أو السكريات البسيطة ولا تتحلل إلى حالة أبسط منها من الكربوهيدرات وتتكون من ثلاثة إلى ستة ذرات من كربون.

والسكريات البسيطة إما ألدهيات (ألدوزات Aldoses) أو كيتونات (كيتوزات ketoses) ويمكن تقسيمها حسب وجود مجموعة الألدهيد أو الكيتون كما يمكن تقسيمها حسب عدد ذرات الكربون إلى تريوزات Trioses وتتراوزات Tetroses وتنتوزات Pentoses وهكسوزات Hexose (جدول ٢-١). وتتكون مركبات التريوز والتتراوز نتيجة تحليل الجلوكوز. ومن أمثلة السكريات الأحادية :


جدول (٢-١) السكريات الأحادية

Classification	Aldoses	Ketoses
Trioses (C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub> )	Glyceraldehyde	Dihydroxyacetone
Tetroses (C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>4</sub> )	Erythrose	Erythrulose
	Threose	
Pentoses (C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> )	Xylose	Xylulose
	Ribose	Ribulose
	Arabinose	
Hexoses (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub> )	Glucose (dextrose)	Fructose (levulose)
	Galactose	
Heptoses (C <sub>7</sub> H <sub>14</sub> O <sub>7</sub> )	Mannose	Sorbose
		Sedoheptulose


### البنتوزات Pentoses :

وتتكون في الخلية بسهولة ومن أمثلتها سكر الريبوز. وتدخل هذه السكريات في عمليات الميتابوليزم في الخلية.


ويتحول الريبوز ribose إلى deoxyribose بإحلال الأيدروجين محل مجموعة الهيدروكسيل على ذرة الكربون الثانية. وتدخل هذه السكريات في تكوين الحامض النووي Ribonucleic acid (RNA) وكذا الحامض النووي Deoxyribonucleic acid (DNA) كما يدخل ribose في تكوين نكليوتيدات أخرى nucleotides مثل (ATP) nicotine adenine dinucleotide phosphate (NAD) و adenosine triphosphate (NADP) كما يتحول الريبوز إلى كحول الريبيتول ribitol ويدخل في تكوين فيتامين الريبوفلافين (شكل ٢-١) كما يدخل الريبوز في تكوين لبعض الجليكوبروتينات.




D-Xylose



D-Ribose



2-Deoxy-D-ribose



Ribitol

### شكل (٢-١) السكريات الخماسية (البتورات)

#### المسكوزات Hexoses:

وتعتبر المسكوزات من أكثر السكريات الأحادية وجودًا في غذاء الإنسان ومن أمثلتها الجلوكوز Glucose والجالاكتوز Galactose والمانوز Mannose والفركتوز Fructose شكل (٢-٢) والثلاثة الأولى مسكوزات ألدهيدية aldohexoses أما الفركتوز فهو يتبع المسكوزات الكيتونية Ketohexoses.




$\beta$ -D-Glucose



$\beta$ -D-Galactose



$\beta$ -D-Mannose



$\beta$ -D-Fructose

### شكل (٢-٢) السكريات السداسية (المسكوزات)

يعتبر الجلوكوز مركب هام فى بناء وهدم الكربوهيدرات، كما أنه الصورة التى تدخل بها الكربوهيدرات من سوائى الجسم إلى الخلية، وتعتمد خلايا الأنسجة العصبية وعدسة العين Lenses على الجلوكوز كمصدر للطاقة، ولكن فى حالة الجوع أو حالات تحليل دهون الجسم يعتمد المخ على الأجسام الكيتونية كمصدر للطاقة والجلوكوز هو الصورة التى تنتهى إليها السكريات العديدة بعد هضمها، ويوجد الجلوكوز فى الفواكه وقصب السكر والبنجر وعسل النحل والمولاس.

ويوجد الجلوكوز فى دم الإنسان حيث يمثل للجسم مصدرًا سريعًا للطاقة اللازمة للإنسان وقد اكتشف وجوده فى الدم بواسطة Schmidt وآخرون ١٨٤٤، ويصل مستوى الجلوكوز الطبيعى فى الإنسان من ٧٠ إلى ١٠٠ ملليجرام/ ١٠٠ مل دم، ويرتفع هذا الرقم إلى ١٢٠ - ١٣٠ ملليجرام/ ١٠٠ مل بعد تناول الكربوهيدرات فى الغذاء وعادة يعود مستوى السكر للوضع الطبيعى بعد (١,٥ - ٢) ساعة، وللجسم القدرة على تنظيم هذا المستوى من الجلوكوز فى الدم بالرغم من استعمال الجلوكوز بكثرة بواسطة أنسجة الجسم المختلفة وسيأتى ذكر كيفية التنظيم فى أبواب تالية.

ويعتبر الفركتوز أكثر السكريات حلالة ويعرف باسم سكر الفواكه Fruit Sugar ويوجد فى الفواكه وعسل النحل والمولاس ورحيق الأزهار، ويتكون داخل جسم الإنسان نتيجة هضم السكر، أما الجالاكتوز فلا يوجد حرًا فى الطبيعة كما هو الحال فى الجلوكوز والفركتوز ويدخل فى تكوين سكر اللبن، ويمكن للجسم أن يحول الفركتوز (فى الكبد أو الأمعاء) والجالاكتوز (فى الكبد) إلى جلوكوز، ولا يعتبر توز مصدرًا أساسيًا للطاقة اللازمة للخلية، ولكن يدخل فى تكوين بعض هيكليدات Mucoids سيرم الدم، وكذا فى تكوين الجليكوبروتينات glycoproteins والجليكوليبيدات glycolipids.

#### مشتقات السكريات الأحادية:

تدخل مشتقات السكريات الأحادية فى تكوين العديد من المركبات والإفرازات داخل الخلية. توجد مشتقات عدة للسكريات الأحادية:



- السكريات المفسفرة phosphorylated sugars وهى الصورة النشطة للسكريات مثل جلوكوز -٦- فوسفات وهو مركب مهم فى ميتابوليزم الكربوهيدرات.

- السكريات الأمينية amino sugars وفيها تحل مجموعة أمينية محل مجموعة هيدروكسيل مثل جلوكوزامين glucosamine وجالاکتوزامين galactosamine ومانوزامين mannosamine وهى سكريات دعامية فيوجد الجلوکوزامين والجالاکتوزامين فى الغضاريف بجسم الإنسان كما يوجد الجلوکوزامين فى حامض هيالورونيك وفى مادة الهيارين لتجلط الدم Blood clot وفى الكيتين Chitin فى الغلاف الخارجى للحشرات والقشريات كما يوجد الجالاکتوزامين فى الكوندروتين chondroitin. كما أن بعض المضادات الحيوية antibiotics مثل erythromycin وcarbomycin تحتوى على سكريات أمينية وهذه السكريات الأمينية تدخل بصفة عامة فى بناء السكريات المعقدة complex sugars بجسم الإنسان.

- أستيل سكريات أمينية acetyl amino sugar وفيها تحل مجموعة أستيلية محل ذرة نترجين من المجموعة الأمينية على السكر الأمينى glucoseamine وهو مركب يدخل فى البناء.

- حامض يورونيك uronic acid وفيها تتأكسد مجموعة كحول أولى Primary alcohol group إلى مجموعة كربوكسيلية carboxyl group مثل حامض جلوكيرونيك glucuronic acid ويستعمله الجسم للتخلص من بعض المواد السامة.

- حامض جليكونيك glyconic acid وفيه تتأكسد مجموعة الألدهيد إلى مجموعة كربوكسيلية.

- سكر كحولى sugar alcohol وفيه تختزل مجموعة الألدهيد أو الكيتون إلى مجموعة كحولية alcohol group مثل الجلوسيتول glucitol (سريتول Sorbitol).

ويوضح شكل (٢-٣) أمثلة لبعض مشتقات السكريات الأحادية وتركيبها الكيميائى.




$\beta$ -D-Glucose-6-phosphate

Amino sugars



$\beta$ -D-Glucosamine

Acetyl amino sugars




*N*-Acetyl- $\beta$ -D-glucosamine.

Uronic acids




$\beta$ -D-Glucuronic acid

Glyconic acids



D-Gluconic acid  
(glyconic acid)

Sugar alcohols



D-Glucitol  
(sorbitol)

شكل (٢-٣) مشتقات السكريات الأحادية


## ثانيًا: سكريات أوليجية Oligosaccharides :

تتكون السكريات الأوليجية من ٢- ١٠ وحدات من السكريات البسيطة متصلة مع بعض من خلال المجاميع الهيدروكسيلية لكل جزئ سكر فى رابطة جليكوسيدية glycosidic linkage مع فقد جزئ من الماء. وغالبًا تكون الرابطة ١-٤ أو ١-٦ أى يتم الاتصال بين المجموعة الهيدروكسيلية على ذرة الكربون الأولى من جزئ السكر والمجموعة الهيدروكسيلية على ذرة الكربون الرابعة أو السادسة من جزئ السكر الآخر. وأكثر هذه المجموعة انتشارًا هى السكريات الثنائية disaccharides وتوجد السكريات الأوليجية حرة فى سرائل الجسم أو متحدة مع البروتين مكونة جليكوبروتينات فى جدار الخلية وقد تعمل كعلامة للتعريف بالخلايا وسهولة ارتباط المركبات بين الخلايا cell recognition identifies (stroev ١٩٨٩).

تتكون السكريات الثنائية من وحدتين من السكريات الأحادية ومن أمثلتها السكروز واللاكتوز والمالتوز (شكل ٢-٤) وهى أكثر السكريات الثنائية شيوعًا ويتكون السكروز من جلوكوز وفركتوز، أما اللاكتوز فيتكون من جلوكوز وجاللاكتوز، بينما يتكون المالتوز من وحدتين من الجلوكوز ويمكن تحليل السكريات الثنائية مائيًا إلى مكوناتها.

ومصدر السكروز هو قصب السكر والبنجر، كما يوجد فى المولاس وعسل النحل، ويعرف اللاكتوز بسكر اللبن ويوجد فقط فى لبن الثدييات، ولبن الإنسان بنسبة ٦,٨٪ بينما فى لبن البقرة بنسبة ٤,٩٪.

والمالتوز هو سكر الشعير، ويوجد فى الحبوب أثناء إنباتها ويتكون فى جسم الإنسان كخطوة وسطية فى هضم النشا.



### شكل (٢-٤) السكريات الثنائية

ويستفيد الجسم من السكريات الثنائية بعد تحليلها إلى سكريات أحادية داخل الجسم. وبالنسبة لسكر اللاكتوز فإنه يتكون من خلايا متخصصة في الغدد الثديية كما أنه يتكون خلال فترة الرضاعة فقط.

### ثالثاً: عديدات السكريات Polysaccharides :

تعتبر عديدات السكريات كربوهيدرات معقدة تحتوي على أكثر من ٢٠٠٠ وحدة من السكريات الأحادية مرتبة في سلاسل إما مستقيمة أو متفرعة. ووحدات السكريات الأحادية قد تكون متشابهة أو مختلفة، فإذا كانت الوحدات متشابهة تسمى عديدات السكريات المتجانسة Homopolysaccharides أما إذا كانت الوحدات مختلفة فتسمى عديدات السكريات غير المتجانسة Heteropolysaccharides ومن عديدات السكريات المتجانسة النشا والجليكوجين والدكستريين والسيليلوز، ومن عديدات السكريات غير المتجانسة حامض هيبالورونيك Hyaluronic acid وكوندريتين سلفات Chondrioton sulfate والهيبارين.

وتختلف عديدات السكريات في درجة ذوبانها وتأيئها في الماء وما تحمله من شحنات، فالنشا والجليكوجين المكونة من جلوكوز فقط تكون في الماء حبيبات صغيرة micelles تحمل شحنات سالبة حيث أن مجاميع الهيدروكسيل تظهر خصائص الحامض الضعيف الذي يتحلل بسرعة (Stroev ١٩٨٩).

أما عديدات السكريات التى تحتوى على حامض uronic تظهر خصائص الحاض القوى وتذوب فى الماء وتحمل شحنة سالبة أقوى من تلك التى على النشا أو الجليكوجين.

وتكون عديدات السكريات مع الماء محاليل غروية لزجة مكونة جل gelation وخصوصاً عديدات السكريات الحامضية.

وتكون عديدات السكريات إما داخل الخلايا مثل الجليكوجين مخزنة لحين الاستخدام أو خارج الخلية مثل حامض هيالورنيك أو كوندريين سلفات،


## ١- عديدات السكريات المتجانسة:

- النشا: Starch ويتكون من وحدات الجلوكوز (أشكال ٢-٦، ٧) وهو الصورة التى تحتزن فيها الكربوهيدرات فى البذور وبعض جذور النبات، ويوجد النشا فى صورة حبيبات تختلف فى الشكل والحجم باختلاف النباتات وعادة يحتوى النشا على نوعين من عديدات السكريات، يتكون النوع الأول من سلاسل غير متفرعة من الجلوكوز ويسمى الأميلوز Amylose وترتبط وحدات الجلوكوز برابطة الفاجلوكسيدية بين ذرتى الكربون (١-٤) وعادة يوجد بنسبة ١٥ - ٢٠٪ من النشا ويكون لوناً أزرقاً مع اليود. أما النوع الثانى فيتكون من سلاسل متفرعة من الجلوكوز ويسمى الأميلوبكتين Amylopectin، وفيه ترتبط وحدات الجلوكوز بروابط ألفا جلوكوسيدية (١-٤) وعند التفرع رابطة (١-٦) ويكون لوناً (بنى محمر) مع اليود، ويوجد بنسبة ٨٠ - ٨٥٪ من النشا، وهناك بعض الحبوب التى تحتوى على نشا الأميلوبكتين فقط وتسمى الحبوب الشمعية Waxy grains والنشا لا يذوب فى الماء ولكن بالحرارة يمكن أن يكون محلول من النشا قد يصبح بالتبريد جيلى gelly.


وعند امتصاص حبيبات النشا للماء وانتفاخها نتيجة لتسخين النشا فى الماء يغلف المحلول وتعرف هذه بعملية الجلتنة Gelatinization.

ويتحلل النشا داخل الجسم نتيجة عملية الهضم إلى دكستريين ثم إلى مالتوز ثم إلى جلوكوز.


ونتيجة لإختلاف النشا الموجود فى النباتات المختلفة وفى الصفات الفيزيائية والكيميائية يفضل تحديد نوعه فيقال نشا الذرة أو نشا الأرز أو نشا البطاطس وهكذا. وللنشا أهمية اقتصادية كبيرة فى تغذية الإنسان والحيوان. وفى الصناعات المتنوعة حيث يستخدم فى صناعة المنسوجات وفى صناعة الورق وفى الطب ومستحضرات التجميل وفى الصناعات الغذائية.



شكل (٢-٦) النشا  
(سلاسل الاميلوز والاميلوبكتين)



شكل (٢-٥) النشا  
(وحدات من الجلوكوز)



Structure of starch A: Amylose, showing helical coil structure B: Amylopectin showing 1 → 6 branch point

شكل (٢-٧) النشا


أ- سلاسل الأميلوز ملفوفة فى شكل حلزوني  
ب- سلاسل الأميلوبكتين المتفرعة

- الجليكوجين glycogen: ويطلق عليه النشا الحيوانى وأول من توصل إلى وجوده Claude Bernard سنة ١٨٠٦ الذى اكتشف العلاقة بين جليكوجين الكبد ومستوى الجلوكوز فى الدم، ثم أثبت Volt أن السكريات الأحادية تتحول إلى جليكوجين فى الكبد، وكمية الجليكوجين فى الجسم بسيطة حوالى ٣٧٠ جم يوجد منها حوالى ١٠٨ جم فى الكبد Liver glycogen وحوالى ٢٤٥ فى العضلات Muscle glycogen ويستعمل لد العضلات بالطاقة اللازمة لانقباضها والباقي حوالى ١٧ جم فى سائل الجسم.

وعادة يتكون الجليكوجين فى الكبد عند زيادة مستوى الجلوكوز فى الدم عن المستوى الطبيعى بينما يتحول جليكوجين الكبد إلى جلوكوز عندما ينخفض مستوى الجلوكوز فى الدم.

والجليكوجين يتكون من ٦٠٠٠ إلى ٣٠٠٠٠ وحدات جلوكوز فى سلاسل متفرعة وهو قابل الذوبان فى الماء.

والجليكوجين يشابه الأميلوبكتين فى التركيب إلا أنه أكثر تفرعاً منه ويصل طول السلسلة ١٠ - ١٤. وحدة جلوكوز بمتوسط ٣-٤ وحدات سكر بين أماكن التفريع ويختلف متوسط حجم جزئ الجليكوجين حسب مصدره وحسب حالة الفرد ويصل متوسط الوزن الجزئى لجليكوجين العضلات إلى ١٠<sup>٦</sup> أما جزئى جليكوجين الكبد فهو أكبر إذ يصل الجزئى إلى ٥ × ١٠<sup>٦</sup>. وعموماً فإن جزئى الجليكوجين يتغير فى الفرد نظراً لإضافة أو إزالة وحدات جلوكوز باستمرار (شكل ٢-٨) ويلاحظ أن جزئى الجليكوجين يحمل مجموعة مختزلة واحدة فى وسط الجزئى "R" وتوجد سلاسل غير متفرعة "D" وسلاسل متفرعة "F".



The glycogen molecule. A: General structure. B: Enlargement of structure at a branch point. The numbers in A refer to equivalent stages in the growth of the macromolecule. R, primary glucose residue, which is the only glucose residue in the structure shown that contains a free reducing group on C<sub>1</sub>. The branching is more variable than shown, the ratio of 1 → 4 to 1 → 6 bonds being from 10 to 18.


## شكل (٢-٨) تفرع جزئ الجليكوجين

**-الدكسترين:** ويوجد بكثرة في البذور أثناء الإنبات، ويوجد في جسم الإنسان كخطوة وسطية أثناء هضم النشا. كما يوجد بكثرة في الأغذية والحبوب عند تعرضها للحرارة الجافة نتيجة تحول النشا على السطح إلى دكسترين. وهو أكثر ذوباناً من النشا في الماء ولكن قوة الرابطة بين الجزيئات أقل فلا يعطى قوامه غليظاً مثل النشا.

**-السليولوز Celluloses:** يوجد السليولوز في جدار الخلايا النباتية فهو يعطى صلابة للنبات، وحيث أنه المكون الأساسي في جدار الخلايا النباتية ولذا فهو أكثر المواد انتشاراً في النبات ويتكون جزئ السليولوز من عدد كبير من وحدات الجلوكوز



مرتبطة بروابط بتاجلو كوسيديه (١-٤) وهى الرابطة التى لا يمكن للإنسان تحليلها لغياب الإنزيم اللازم، ولهذا لا يعتبر السليولوز مصدرًا لطاقة الفرد. عادة يشار إليه فى وجهه الفرد بالألياف Fibers (شكل ٢-٩).



شكل (٢-٩) السليولوز (وحدات من الجلوكوز)

وتوجد سلاسل السليولوز متجاورة ومتلاصقة بطريقة عكسية مما يسمح بوجود روابط هيدروجينية وهذا يعطى قوة ومتانة علاوة على جعل السلاسل مرتبة فى صورة لوفيات ذات صفات بلورية فى بعض أحرفها.

وإذا كان يشار إلى السليولوز فى وجهه الفرد بالألياف Fibers إلا أن Trowell وآخرون "١٩٧٦" Southgate (١٩٧٦) أشاروا بأن ألياف الغذاء تحتوى على مواد أخرى مع السليولوز حيث تتكون ألياف الوجبة الغذائية من مواد كربوهيدراتية عبارة عن سكريات عديدة غير نشوية non-starchy و مواد أخرى غير كربوهيدراتية ومركبات عضوية وكلها غير قابلة للهضم بواسطة إنزيمات الجهاز الهضمى للإنسان. وحسب تقسيم Selvendran<sup>(١)</sup> (١٩٨٥) فإن إلياف الغذاء تتكون من أربعة مجموعات حسب تركيبها الكيميائى هى:

١- سكريات عديدة: سليولوز وهيموسليولوز وبكتين.

٢- جليكوبروتين glycoprotein.

٣- لجنين Legnin وفينولات عديدة Polyphenolics واسترفينولات Phenolic esters.

٤- مركبات ليبيدية Lipid complexes شموع Waxes وكيوتين Cutin وسوبرين Suberin.

<sup>(١)</sup> in Spallholtz, 1989.

ومن جهة أخرى تذكر Spallhoz (١٩٨٩) أن الألياف الموجودة فى غذاء الإنسان تتكون من أربعة مجموعات رئيسية هى:

١- سليولوز Cellulose وهو جليكوسيدات لعديدات سكريات متجانسة ذات رابطة بتا (١-٤) glycosides B-(1-4) homopolyglycan. والسليولوز غير قابل للهضم بواسطة الإنسان ويمتص الماء وقابل للتخمر بدرجة متوسطة- وهو يساعد فى حركة الغذاء يزيد من حجم البراز ولذا يسهل فى عملية الإخراج- ويتحد السليولوز مع أحماض الصفراء bile acide ويزيد من إخراج نواتج ميتابوليزم الكولسترول ولذا فهو يخفض من كولسترول الدم.

٢- هيمسليولوز Hemicellulose وهو سلاسل من عديدات سكريات غير متجانسة ذات رابطة بتا (١-٤) وأساساً يتكون من زيلوز Zylouse ومانوز mannose وجالاکتوسيد galactoside كما يوجد سلاسل جانبية تتكون من سكر أرابينوز arabinose وحامض جلوكتيورونيك glucuronic. والهيمسليولوز يمكن أن يتخمر بدرجة متوسطة ويساعد فى الهضم ويمكن أن يتحد بدرجة خفيفة مع المعادن.

٣- البكتين Pectin وهو عديدات سكريات غير متجانسة Heteropolysaccharide ذات رابطة بتا (١-٤) ويتكون أساساً من وحدات حامض يورونيك Uronic- حامض جالاکتيورونيك galactouronic acid وسلاسل جانبية تتكون من ميثيل حامض يورونيك methyl uronic acid. ويمكن للبكتين أن يكون حل gel فى وجود الحرارة ومحلول حامض مخفف وسكر.

والبكتين مادة قابضة يفيد فى علاج الإسهال antidiarrhetic وحيث أن البكتين قابل للذوبان ويكون محاليل لزجة وهذه تخفض من درجة امتصاص الدهون والسكريات فى جسم الإنسان.

ويمكن للبكتين أن يخفض من كولسترول الدم ويساعد فى إخراج الستيرويدات steroids. ويعتبر البكتين من العوامل التى تقلل وتحمى من الإصابة بأمراض القلب ومرض السكر Diabetes والسرطان وخصوصاً سرطان القولون (Carper ١٩٨٧).

ويوجد البكتين بكثرة فى الخضروات والفواكه.

٤- **لجنين Legnin**: وهو مادة غير كربوهيدراتية تكون الجزء الخشن فى النبات وهو مواد فينولية ومضادة للتأكسد Antioxidant وهى غير قابلة للهضم أو التخمير. أو لأى تفاعل كيمائى. ويمكن أن يتحد مع أحماض الصفراء *bile acids* وبعض الكاتيونات Cations ويزيد من حجم البراز.

وتختلف نسبة هذه المواد فى جدار الخلية ويوضح جدول (٢-٢) تركيب جدار الخلية و(٢-٣) نسبة الألياف فى بعض الأغذية.

جدول (٢-٢) تركيب جدار الخلية فى بعض الأغذية على أساس وزن جاف

الأغذية	سليولوز %	هيموسليولوز	بكتين %	جليكوجين %	لجنين ومواد فينولية
حبوب	٣	٨٠	-	١٢	٥
منتجات حبوب	٣٥	٤٥	-	٥	١٥
خضروات	٤٠	٣٠	١٥	١٠	٥
فواكه	٣٥	١٠	٣٠	٥	٢٠

جدول (٢-٣) النسبة المئوية لألياف الغذاء فى بعض الأغذية

الأغذية	على أساس وزن جاف %	الأغذية	على أساس وزن رطب %
دقيق كامل	١٠,٣	بطاطس	١,٨
دقيق أبيض	٣,٢	تفاح	١,٨
خبز كامل	٩,٩	جزر	٢,٢
ردة	٤٥,٠	كرنب	٢,٢
شعير	٧,١		
دقيق الشوفان	١٣,٥		
كورن فلاكس	٠,٧		
بسلة	١١,٦		

وتقسم الألياف بصفة عامة حسب قابليتها للذوبان فى الماء إلى قسمين، بالنسبة للقسم الأول وهو لا يذوب فى الماء البارد أو الساخن مثل السيليلوز والهمى-سيليلوز، وتتميز بأنها خشنة تحتاج إلى مضغ ولها تأثير ملين كما أنها تساعد على حركة الغذاء داخل القناة الهضمية ولذا فهي تمنع أو تقلل من حدوث حالات الإمساك ومن أمثلتها الأغلفة الخارجية للحبوب والدقيق الكامل ومنتجاته. كما توجد فى بعض الفواكه مثل الفراولة والخضروات مثل البسلة. أما القسم الثانى هو القابل للذوبان فى الماء مثل البكتين والصمغ وهذه تقلل من درجة الإصابة بمعرض السكر وأمراض القلب حيث أنها تخفض من درجة امتصاص السكريات والدهون كما تعمل على خفض كولسترول الدم، وكذا فهي تقلل من درجة الإصابة فى بعض حالات السرطان مثل سرطان القولون وضغط الدم (Carper ١٩٨٧).

### أهمية الألياف فى غذاء الإنسان:

#### Fiber importance in human nutrition :

زاد الاهتمام بألياف الغذاء كوقاية من العديد من الأمراض فى الوقت الحالى وخصوصاً بعد نشرات الجراح الإنجليزى Dennis Burkrt خلال السبعينيات من القرن العشرين وقد اهتم بها أيضاً المتخصصون فى التغذية والطب نظراً لدورها فى حماية الفرد من العديد من الأمراض أو تقليل الإصابة منها مثل أمراض القولون المختلفة من إمساك constipation، الزائدة الدودية appendicitis، القرحة ulcers، سرطان cancer. كما أنه يمكن أن تحمى الفرد من بعض أمراض الميثابوليزم مثل السمنة obesity، مرض السكر heart diseases، ارتفاع الضغط hypertension حصوة المرارة gallstones، تسوس الأسنان dental caries.

وقد يرجع ذلك إلى حجمها وكميتها bulk أو إلى قدرتها على امتصاص الماء، أو اتحادهما بأحماض الصفراء أو سهولة الإخراج أو خفض نسبة المواد المسببة لحدوث طفرة mutation أو مواد سرطانية carcinogenic فى البراز. بالإضافة إلى ذلك فإن الألياف تزيد من شعور الفرد بالشبع satiety وإلى خفض نسبة الكثافة الحرارية caloric density وهذا يساعد أيضاً فى خفض الوزن.

## ٢- عديدات السكريات غير المتجانسة Heteropolysaccharides :

### أولاً: بروتيوجليكان Proteoglycan :

وهى التى كانت تعرف باسم ميكروسكريات عديدة mucopolysaccharides واسمها مشتق من الكلمة اللاتينية mucus والتى تتميز باللزوجة. والبروتيوجليكان مواد لزجة وترجع إليها لزوجة إفرازات الجسم المخاطية. وهى عبارة عن عديدات سكريات غير متجانسة متحدة مع بروتين وتصل نسبة الكربوهيدرات فى الجزئ إلى ٩٥ ٪، وتحتوى على سكريات أمينية وحامض يورونيك، وهى مرتبطة ببعض الأنسجة مثل الكولاجين، والإلستين كما توجد فى العظام. وهى توجد فى كل نسيج من أنسجة الجسم خصوصاً الأغشية الخارجية للخلية ويتحد معها مكونة نسيجاً دعامياً يتحد بعضها مع الكولاجين والبعض الآخر مع الإلستين. كما يتحد بعضها مع بعض البروتينات سريعة الالتصاق Adhesive مثل بروتين فيبرونكتين Fibronectin واللامين Laminin وهذا يعمل على التصاق الخلايا بالأغشية الخارجية.

والسكريات الموجودة فى البروتيوجليكان عديدة الانيونات Polyanions ولذا فإن البروتيوجليكان تتحد مع الكاتيونات Carions مثل الصوديوم Na والبوتاسيوم k وهذه الخاصية تجذب الماء بواسطة الضغط الأسموزى مسببة إنتفاخها. كما أن البروتيوجليكانات يمكنها أن تكون جل gel حتى فى تركيزات منخفضة. هذه الخاصية مع طبيعة السلاسل الجانبية للسكريات الموجودة بها فإنها تكون ما يشبه بالمصفاه ولذا فهى تحدد وصول الجزيئات الكبيرة Macromolecules إلى أغشية الخلية الداخلية ولكن تسمح للجزيئات الصغيرة بالنفاذ الحر Free diffusion (Murry وآخرون ١٩٩٣).

### ومن مركبات البروتيوجليكان:

- حامض هيالورنيك Hyaluronic ويحتوى على جلوكوزامين glucoseamine وحامض جلوكيورونيك glucuronic acid ومخاليها لرجة، لذا فهى تساعد فى تزييب المفاصل فى جسم الإنسان، وهى عبارة عن سلسلة، وتوجد فى

شكل شبكه ولذا فهي تمنع الميكروبات من دخول أى جزء أو جسم وإذا تخللت الرابطة الجليكوسيدية فإن الشبكة تتحلل وهذا يمكن الميكروبات أن تدخل بين الخلايا ويتراكم الماء الخارجى extracellular الذى يحجز بواسطة باقى الشبكة الذى لم يتحلل. وعادة يحتوى الميكروب على إنزيم Hyaluronidase ويفرز فى المسافات بين الخلايا ويزيد من نفاذ الماء بين الخلايا.

ويوجد حامض هيالورونيك فى الجلد وفى الجسم الزجاجى للعين وفى الحبل السرى للجنين، الغضاريف، وفى السوائل اللزجة للمفاصل كما سبق وعادة يوجد هذا الحامض مرتبطاً مع البروتين وتختلف نسبة هذا البروتين من ٢٪ فى سوائل المفاصل إلى ٢٠ - ٣٠٪ فى الجلد.

- كوندريتين سلفات Chondroitin Sulfate وهى مركبات حامض الكبريتيك مع السكريات العديدة وهى مركبات لزجة تتميز بقدرتها على الإتحاد بالماء وهى مثل حامض هيالورونيك وتوجد فى الأنسجة الضامة ومنها كوندريتين سلفات A Chondroitin Sulfate A ويوجد فى قرنية العين cornea وفى الغضاريف cartilage وكوندريتين سلفات B Chondroitin Sulfate B ويوجد فى الأورطى والأوعية الدموية وصمامات القلب والقصبه الهوائية، والغضاريف، ونسيج العظام.

- درماتان سلفات Dermatan sulfate ويوجد فى الأورطى ويتميز بأنه له خاصية منع تجلط الدم وتركيبه يشابه تركيب كوندريتين سلفات.

- كيراتان سلفات Keratan sulfate ويوجد فى العين ويكون مع مركب كوندريتين سلفات مادة قرنية العين وتتوقف درجة الشفافية transparency على هذه المواد وهى تحتوى على جلوكوز أمين وجلالاكتور أمين وأحماض أمينية ويبدو أن كراتان سلفات مرتبطة مع مركبات الدم ويتحلل بمعظم الانزيمات إلى تحلله وعندما تزال مجموعة السلفات فإن مركب الكراتان يتحد مع الأجسام المضادة.

- هيبارين Heparin وهيباران سلفان Heparan sulfate وهى المواد المانعة لتجلط الدم وتحتوى على جلوكوز أمين وتوجد فى الكبد وبعض الأنسجة وهى لا تدخل فى تركيب المواد الموجودة خارج الخلية وهى تتكون وتفرز بواسطة بعض خلايا النسيج الضام وعندما تتحلل هذه الخلايا فتخرج هذه المواد إلى خارج الخلايا

والأوعية الدموية، ويرتبط الهيبارين مع البروتين، ويعمل الهيبارين مع مركبات الجليكوبروتين في الدم على منع تجلط الدم. أما عمل الهيبارين مع إنزيم lipoprotein lipase هو تحليل دهون الدم إلى كيلوميكرون Chylomicrons، وهذا يؤثر على محتوى الدم من الدهون.

#### ثانيًا: جليكوليبيدات Glycolipids:

الجليكوليبيدات عبارة عن ليبيدات محتوية على كربوهيدرات وتوجد في الخلية العصبية وهي مهمة لنقل النبضات العصبية والكهرية ومنها:

#### - سربوسيدات Cerebrosides:

كان أول إستخراجها من المخيخ cerebrum ومنها استحدث اسمها وهي مركبات دهنية محتوية على سكر أحادي عادة يكون جالاكتوز أو نادرًا جلوكوز كما تحتوى على أحماض دهنية منها cerebronic، nervonic وتوجد في الجهاز العصبى للإنسان في المخ وغمد الأعصاب وبعض الأنسجة الأخرى.

- سلفوليبيدات Sulpholipids وهي مشتقات سربوسيدات الكبريتية- وتضاف مجموعة السلفات إلى مجموعة الهسيدروكسيل الثالثة من الجالاكتوز. وهي حامضية وتتحد بسهولة مع الكاتيونات Cations وهي تقوم بنقل الكاتيونات عبر جدار الخلية العصبية والألياف. ولذا فهذه المواد مهمة للنشاط الكهربى للجهاز العصبى.

- جانجليوسيدات Gangliosides: وهي مركبات دهنية ومحتوية على أوليجو سكريات مكونة من جالاكتوز أو جلوكوز وهي مرتبطة بالسربوسيدات وتوجد فى الأنسجة العصبية وفى الطحال Spleen وكرات الدم الحمراء وفى جدر بعض الخلايا وقد يكون لها دور فى انتقال الأيونات.

#### ثالثًا: جليكوبروتينات Glycoproteins :

وهي بروتينات محتوية على كربوهيدرات بنسبة أقل من ٤٪ وقد تصل نسبة البروتين فى هذه المركبات إلى ٨٠ - ٩٠٪. وإن كانت نسبة الكربوهيدرات منخفضة إلا أنها تعمل كعلامة للتعرف على البروتين والاتصال به Recognition بواسطة مستقبل على مركبات أخرى أو على سطح الخلية.

وعادة توجد الجليكوبويدات، خارج الخلية معلقة فى السوائل. وتوجد بكثرة فى الدم.

وتقوم الجليكوبروتينات بعدة وظائف مختلفة فى الجسم مثل نقل المواد غير المحبة للماء hydrophobic وأيضاً نقل أيونات المعادن مثل Ceruloplasmin لنقل النحاس، transferrin لنقل الحديد. كما أن Prothrombin و Fibrinogen من بروتينات تجلط الدم كما تدخل هذه البروتينات فى تكوين مناعة الجسم مثل بروتين Immunoglobulins.

كما تتضمن الجليكوبروتينات مجموعة من الإنزيمات مثل Cholinesterase و ribonuclease ومجموعة من الهرمونات مثل gonadotropins و corticotropins. وتعطى الجليكوبروتينات الموجودة على سطح الخلية صفات متخصصة specificity عند نقطة اتصال الخلايا وهذه الصفات المتخصصة تكسب الأنسجة تمايزاً بعضها عن بعض (tissue differentiation).

وللجليكوبروتينات دور فى تكوين الأجسام المضادة التى يتحدد نوعها بواسطة تركيب سلاسل عديدات السكريات.

ومن السكريات العديدة الأخرى التى توجد فى الأغذية:

- الإنيولين Inulin ويتكون من ٤٠ وحدة من الفركتوز ووحدة واحدة من الجلوكوز وتوجد فى بعض النباتات مثل الخرشوف Artichokes والداليا Dalia وهذه المادة يستعملها الأطباء الآن فى بعض الاختبارات الكلوية.

- البكتين pectin وتوجد هذه المادة فى الفواكه والنباتات وتتحول إلى جيلي فى وجود الحرارة ومحلل حامض مخفف وسكر. وتوجد فى الفواكه والخضروات ولها دور فى تقليل والحماية من البدانة ومرض السكر وأمراض القلب والسرطان كما سبق.

- سكريات الأعشاب البحرية seaweed polysccharides مثل الآجار agar (ويحتوى على جالاكتوز) الذى يستعمله البكتريولوجيون كما يستعمله اليابانيون فى الغذاء ونظراً لأنها تكون جيلي لذا تضيفه معامل تصنيع الأغذية إلى صناعاتها.

- كيتين Chitin يكون الغلاف الخارجى للحشرات والقشريات كما يوجد فى عيش الغراب mushrooms وبعض الفطريات الأخرى.



## وظيفة الكربوهيدرات:

تعتبر الكربوهيدرات - كما سبق ذكره - المصدر الرئيسى الاقتصادى للطاقة فى غذاء الإنسان فى العالم، إذ تمد الفرد بأكثر من ٧٠٪ من الطاقة اللازمة له، ويعطى الجرام الواحد من الكربوهيدرات ٤ سعرات عند احتراقه فى جسم الإنسان، كما يقوم الجليكوجين بإمداد الجسم بالطاقة، وفى حالة نقص الأغذية التى تمد الجسم بالطاقة فى الغذاء عن اللازم فيقوم الإنسان باستخدام الجليكوجين المخزن فى الكبد كمصدر سريع للطاقة.

وللكربوهيدرات دور فى ميثابوليزم الدهون فهى تعمل على اكتمال احتراقها فى جسم الإنسان، وتكون ثانى أكسيد الكربون وبخار الماء، مع انبلاق الطاقة، أما فى حالة وجود كمية غير كافية من الكربوهيدرات، فلا يتم احتراق الدهون وتتكون نواتج وسطية حامضية التأثير مثل الكيتونات كالأستون مما يودى إلى ارتفاع حموضة الدم، وتسمى هذه الحالة Ketosis وهذه الظاهرة تصاحب مرض السكر Diabetes Mellitus كما تظهر فى حالة الجوع الشديد حينما يحترق دهن الجسم نفسه. وإذا أرتفعت كثيراً تسمى acidosis كما سيأتى ذكره.

وتوفر الكربوهيدرات البروتين للقيام بوظيفة البناء بدلاً من استعمال البروتين فى توليد الطاقة لأن البروتين مصدر غير اقتصادى للطاقة فى الجسم، ويستعمل البروتين فى توليد الطاقة عند نقص الكربوهيدرات فى الغذاء، ذلك لأن احتياج الفرد للطاقة يجب أن يسد أولاً كما سبق ذكره، علاوة على ذلك فإن استعمال البروتين لتوليد الطاقة يودى إلى تكوين مركبات نيتروجينية بجانب الطاقة وبخار الماء وثانى أكسيد الكربون. وهذه المركبات النتروجينية يجب التخلص منها عن طريق الكلى، بعكس الكربوهيدرات فإن احتراقها يودى إلى تكوين بخار الماء وثانى أكسيد كربون بجانب الطاقة، مما يسهل التخلص منها عن طريق الرئتين.

وللكربوهيدرات دور فى تنشيط حركة القناة الهضمية مثل السليولوز ويعمل

كمادة مائلة ولا يعتبر السليلوز مصدرًا للطاقة في غذاء الإنسان كما سبق الإشارة إليه حيث أنه ينقص جسم الإنسان الإنزيمات اللازمة لتحليل السليلوز وللسليلوز القدرة على امتصاص الماء. وهذا يساعد على حركة الغذاء داخل القناة الهضمية. علاوة على أن للسليلوز تأثير على هضم وامتصاص الغذاء مما يعمل على تنظيم انطلاق الطاقة. وعلى هذا فالأغذية الغنية في محتواها من السليلوز تعمل على تحسين مستوى جلوكوز الدم عند مرضى السكر (إيزيس نوار وآخرون ١٩٩٦) علاوة على ذلك فإن الأغذية الغنية بالألياف تعمل على خفض كولسترول الدم (Carper ١٩٨٧) وتقى الجسم من الأمراض المختلفة كالسكر، وأمراض القلب والسرطان كما سبق ذكره.

وجود السليلوز في الغذاء يتطلب زيادة مضغ الطعام حيث أن السليلوز يزيد من صلابة الأغذية وخصوصًا الطازجة ومعاملة الغذاء بالحرارة تقل هذه الصلابة مع زيادة اللزوجة مما يعمل على التصاق الغذاء وزيادة الحاجة لمضغه وتعمل عملية مضغ الغذاء على زيادة إفراز اللعاب الذي يعمل على تنظيف الأسنان واللثة كما يساعد على بلع الغذاء كما أن المضغ يزيد من شعور الفرد بالشبع.

عندما تذوب بعض الكربوهيدرات في الماء مثل البكتين فإنه تكون محاليل لزجة هذه تشجع حركة الغذاء داخل الأمعاء. كما أظهرت الدراسات على الحيوان (Stroev ١٩٨٥) أن هذه المواد الداخلة في تكوين ألياف الغذاء والتي تسبب لزوجة الوسط مثل البكتين لها تأثير واضح على الدهون الموجودة في الدم والكبد وخصوصًا على الكولسترول كما سبق ذكره والشكل (٢-٩) يوضح وظائف الكربوهيدرات.



شكل (٩-٢) وظائف الكربوهيدرات

وتعمل الكربوهيدرات كمصدر للطاقة بالنسبة للكائنات الدقيقة في الأمعاء وهذه الكائنات تكون فيتامينات مثل بعض فيتامينات "B"، كذلك فإن للكربوهيدرات وظيفة دعامية حيث تدخل في تركيب الأجزاء الغضروفية والأنسجة الضامة مثل الجلوكوزامين والجالاكتوزامين، كما تعمل الكربوهيدرات مثل حامض glucuronic على تخليص الجسم من بعض السموم وتحولها إلى صورة غير ضارة ويسهل التخلص منها، وهذا الحامض أيضًا يساعد على تنظيم ميثابوليزم بعض الهرمونات ويحمي الجسم من زيادة بعض الهرمونات.

يعمل وجود الجليكوجين فى الكبد على زيادة قدرته على مقاومة المواد الضارة أكثر من الكبد الخالى من الجليكوجين نتيجة الجوع أو المرض كما تدخل الكربوهيدرات (جلوكوزامين) فى تكوين مادة الهيبارين وهى المادة المانعة لتجلط الدم ويعتمد الجهاز العصبى على الجلوكوز فى توليد الطاقة اللازمة لاستمرار عمل هذا الجهاز.

وتدخل الكربوهيدرات فى تكوين جدار الخلية -جليكو كاليس glycocalyse بنسبة ٥% فى صورة جليكوبروتينات وجليكوليبيدات ويتجه الجزء الكربوهيدرات إلى خارج الخلية كما فى شكل (٢-١٠).

كما يوجد طبقة من بروتيو جليكان Proteoglycan مرتبطة ارتباطاً ضعيفاً على سطح الخلية فى طبقة glycocalyse وهذه تقوم بعدة وظائف منها أنها تحمل شحنة سالبة وعلى هذا فىكون سطح الخلية مشحوناً بشحنة سالبة فتتنافر منها المركبات الأخرى السالبة.


- تتصل طبقة glycocalyse للخلية. عمليتها فى الخلايا المجاورة وهذا يعمل على اتصال الخلايا معاً.

- تفرم بعض الكربوهيدرات بالعمل كمواد مستقبلية ترتبط بالهرمونات مثل الأنسولين وهذا يثير أنشطة الخلية ويحفز الإنزيمات.

- تدخل بعض هذه الكربوهيدرات فى تفاعلات المناعة حيث يوجد فى الدم

مركبات من عديدات السكر مثل ليسوزيم (Lysozyme) (mucoytic polysaccharide)

وهو يهاجم البكتريا ويسبب تلفها (Murry وآخرون ١٩٩٣)



The fluid mosaic model of membrane structure. The membrane consists of a bimolecular lipid layer with proteins inserted and bound to the cytoplasmic surface. Integral membrane proteins are firmly embedded in the lipid layers. Some of these proteins completely span the bilayer and are called transmembrane proteins, while others are embedded in without the outer or inner leaflet of the lipid bilayer. Loosely bound to the outer or inner surface of the membrane are the peripheral proteins. Many of the proteins and lipids have externally exposed oligosaccharide chains.

شكل (١٠-٢)  
تركيب جدار الخلية

علارة على ما سبق فإن لبعض الكربوهيدرات طعم حلو ولذا فإن السكر مادة أساسية فى عمل الحلوى وبعض المخبوزات كما أنها تكون مواد ذات رائحة ونكهة وطعم مميزين.

ويمكن تلخيص وظائف الكربوهيدرات فى ستة أقسام كما يلى:

- مولدة للطاقة Energetic من الكربوهيدرات المخزنة وهى الجليكوجين.  
- دعامية Supportive وتشمل المركبات الدعامية مثل كوندريتين سلفات فى أنسجة العظام والسليلوز فى النبات.

- وقائية Protective وهى وظيفة عديدات السكريات غير المتجانسة الحامضية مخاطية لدرجة وهى مواد تشحيم Lubricating بيولوجية على سطح الخلايا والأوعية الدموية والقناة الهضمية وغيرها من الأجهزة وكذلك المادة المخاطية فى الأنف والقصبة الهوائية وبين المفاصل وذلك لحمايتها من أى تلف ميكانيكى كما أنها تحمى الأجهزة الداخلية من أى احتكاك.

- بنائية Colligative أو Structural مثل عديدات السكريات غير المتجانسة حيث تدخل فى بناء بعض المواد خارج الخلايا كما أنها تعمل كمادة لاصقة أسمىمية مثل حامض هيالورونيك.

- تنظيمية. تنظيم الاسموزيه والأيونات Hydroosmotic anion- regulating مثل عديدات السكريات غير المتجانسة الحامضية مثل حامض هيالورونيك فهى محبة للماء بدرجة مرتفعة وتحمل شحنات سالبة يمكنها الاحتفاظ بكمية كبيرة من الماء الموجود خارج الخلية وأيضاً بالكاتيونات ولذا فهى تنظم الضغط الأسموزى خارج الخلية وهذا يمنع تراكم الماء خارج الخلية.

- عوامل مرافقة Cofactor مثل الهيبارين وهيبارات سلفات التى تظهر نشاطها كمساعد إنزيم. وهذه تتحد مع البروتين لتكون مركبات نشطة. ولهذا فإن الهيبارين يمنع أو يقلل تجلط الدم، (antilipemic) عن طريق تشجيع تحللها.

### **مصادر الكربوهيدرات فى غذاء الإنسان:**

تعتبر السكريات والحبوب والبقول والفواكه المجففة من المصادر الغنية بالكربوهيدرات ومن الأغذية المصنعة والغنية بالكربوهيدرات المكرونة والربى والجليلى

والخبز والكعك واللبن المجفف أما الفواكه والخضروات الطازجة ففيها كميات بسيطة من الكربوهيدرات باستثناء البطاطس والبطاطا والموز واليخ (جدول ٢-٤).  
ويعتبر البيض والسلك والدواجن واللحم والجبن واللبن الطازج من الأغذية الفقيرة بالكربوهيدرات أما الدهون الحيوانية والنباتية فلا يوجد بها كربوهيدرات.  
وبالنسبة للألياف فتعتبر الردة والحبوب الكاملة ومنتجاتها والخضروات والفواكه الطازجة من أحسن مصادر الألياف (جدول ٢-٥).

### جدول (٢-٤) النسبة المئوية للكربوهيدرات فى بعض الأغذية

الأغذية	نسبة الكربوهيدرات
السكر	٩١٪ - ١٠٠٪
العسل - والزبد المستخلص من الفول السودانى والبسكويت	٨١٪ - ٩٠٪
المربى والجيلى والفواكه المجففة	٧١٪ - ٨٠٪
الخبز والكعك والخبز الأبيض	٦١٪ - ٧٠٪
شرائح البطاطس المحمرة والخبز الكامل (من الدقيق الكامل).	٥١٪ - ٦٠٪
البطاطا	٤١٪ - ٥٠٪
الموز والمكرونة والأرز.	٣١٪ - ٤٠٪
الذرة والعب والبازلاء.	٢١٪ - ٣٠٪
الكبد البقرى والزبد والبيض واللبن.	١١٪ - ٢٠٪
البرتقال والبطيخ والجزر والطماطم.	صفر - ١٠٪
اللحم والدواجن والزيت والسالمون.	صفر٪

جدول ( ٢-٥ ) محتوى بعض الأغذية من الألياف<sup>(١)</sup>

الألياف بالجرام	الوزن بالجرام	الحجم	الفاكهة
٢,٥٥	١٤١	متوسط	تفاح
٢,٥٥	١٠٠	واحدة	موز
٠,٥٣	١٢٠	نصف فنجان	جريب فروت
٣,٦٤	١٠٠	واحد متوسط	جوافه (محفوفة)
٠,٢٩	١٠٠	نصف فنجان	يوسفي - برتقال محفوظ
٢,٢٨	١٠٠	واحدة متوسطة	خوخ
١,١٢	٨٧	نصف متوسطة	كمثرى
٢,١٢	١٠٠	عشر وحدات	فراولة
			<b>خضروات ورقية</b>
٢,٠	٧٠	نصف فنجان	كرنب
١,١٣	٦٣	نصف فنجان	كرنيت
٠,٨٤	٥٥	نصف فنجان	خص
٢,١٠	١٠٠	واحدة	بصل
			يقول
٦,١٨	٨٥	ثلث فنجان	فول
٥,٦٦	٧٣	نصف فنجان	بسلة
			<b>خضروات جذرية</b>
١,١٨	٧٥	نصف فنجان	جزر
			بطاطس
٣,٥١	١٠٠	واحدة	شرائح
٠,٦٤	٢٠	عشر قطع	شيسى محمر
٠,٦٣	٦٨	نصف فنجان	فلفل (ناضج)
١,٤٠	١٠٠	واحدة صغيرة	طماطم
			<b>خبز</b>
٠,٦٣	٢٣	شريحة واحدة	أبيض
١,٧٩	٣٥	شريحة واحدة	عبر كامل
			<b>حبوب الإفطار</b>
١١,٢٠	٤٢	٤/٣ فنجان	ردة كاملة
٢,٠٩	١٩	٣/٤ فنجان	كورن فليكس

(١) Clara (١٩٨٤).



## الحالة الغذائية للكربوهيدرات حول العالم:

تعتمد الدول النامية على الكربوهيدرات فى إمداد الجسم بحوالى ٧٨٪ أو أكثر من الطاقة بينما تصل هذه النسبة إلى حوالى ٥٧٪ فقط فى الدول النامية. ونلاحظ أن معظم مصادر الكربوهيدرات فى البلاد الزراعية عبارة عن المواد النشوية المستمدة من الحبوب، أما فى البلاد الصناعية فالسكر يسهم بجزء كبير فى وجبات الفرد، ففي الولايات المتحدة الأمريكية كان متوسط نصيب الفرد ٢٥٨ رطلاً من الحبوب و٥٣ رطلاً من السكر والحلوى سنة ١٨٨٩ وتغير الحالة فى النصف الثانى من القرن العشرين فانخفض نصيب الفرد من الحبوب أصبح ١٤٦ رطلاً وزاد نصيب الفرد من السكر فأصبح ١١٥ رطلاً وقد حدث نفس التغير فى المملكة المتحدة (بريطانيا) وإذا حل السكر محل النشا فى غذاء الإنسان فإنه يغير من مستوى الليبيدات فى الدم وقد يؤدى ذلك إلى رفع نسبة الإصابة بمرض القلب Atherosclerosis ومرض السكر diabetes وزيادة نسبة تسوس الأسنان.

ويقول Brown, Pike (١٩٨٤) أن زيادة نسبة ارتفاع مرض السكر بين الهنود المقيمين فى جنوب أفريقيا يرجع إلى زيادة استهلاكهم للسكر عن الهنود المقيمين فى الهند.

## الكميات المقررة من الكربوهيدرات:

لا تعرف الكميات المقررة من الكربوهيدرات لسد حاجة جسم الإنسان، ولكن بالنسبة للشخص العادى أن يتناول ٥٠ - ٦٠٪ من الطاقة المستمدة من المواد الكربوهيدراتية على ألا يزيد مقدار ما يتناوله من السكريات البسيطة عن ١٠٪ من الطاقة الكلية.

زيادة كمية المواد الكربوهيدراتية فى الغذاء عن حاجة الجسم تؤدى إلى تحويلها إلى دهون تخزن فى الجسم مما يؤدى إلى السمنة كذلك فإن تناول كميات كبيرة من السكر يؤدى إلى عسر الهضم واضطرابات فى الجهاز الهضمى كما أن زيادة كميات السكر فى الغذاء تسبب فى إحداث نقص فى بعض العناصر الغذائية الأخرى، مثل فيتامين B<sub>1</sub> اللازم لإتمام عمليات ميتابوليزم الكربوهيدرات.

أما إذا نقصت المواد الكربوهيدراتية فى الغذاء فيضطرب الجسم إلى استهلاك الدهون لتوليد الطاقة بدلاً منها، مما يؤدي إلى اضطرابات خطيرة. حيث أن الجلوكوز هو المصدر الرئيسى للجهاز العصبى والمخ وإلا يصاب الفرد بغيوبة السكر (Coma) كذلك قد يؤدي نقص المواد الكربوهيدراتية فى الغذاء إلى استهلاك البروتينات لتوليد الطاقة خاصة الأحماض الأمينية مما يؤدي إلى حرمان الجسم من بناء وتجديد أنسجته وخلاياه والتي هى الوظيفة الأساسية للبروتينات.

علاوة على أنه لا يتم أكسدة الدهون مما يؤدي إلى تكوين الأجسام الكيتونية بكميات غير طبيعية وهى أجسام تؤدي إلى زيادة حموضة الدم وقد تسبب الوفاة كما سبق ذكره.

ويعتبر نقص الكربوهيدرات فى الغذاء نادراً ما يحدث. فقد يحدث فى المجموعات أو أثناء المرض وخاصة عند الإصابة بالحميات حيث يزداد احتياج الجسم من الطاقة.

وعموماً يجب ألا تقل نسبة الطاقة المتولدة من المواد الكربوهيدراتية فى الغذاء اليومي للفرد عن ٢٠٪ من الطاقة الكلية.

الباب الثالث

# الليبيدات

Lipids



# الليبيدات

## مقدمة :

يطلق مصطلح الليبيدات على الدهون fats والزيت oils وهى استرات أحماض دهنية، والزيت هى الدهون السائلة فى درجة الحرارة العادية... والزيت إما قابلة للهضم وتستعمل للتغذية مثل زيت الزيتون... أما الزيت المعدنية فهى غير قابلة للهضم مثل زيت البارافين، وهناك الدهون والزيت المرئية التى يمكن قياسها مثل الزبدة والزيت، كما أنه توجد دهون غير مرئية وهى تنتشر فى الأغذية، ويصعب قياس الكمية الكلية للدهون فى الوجبات بدون التحليل الكيميائى لهذه الأطعمة.

والدهون الموجودة فى جسم الإنسان إما مخزنة فى أنسجة تخزين الدهون أو داخلة فى التركيب البنائى لخلايا الجسم، ولإزالة هذا التقسيم موجوداً إلى الآن.

وتوجد الليبيدات فى كثير من الأغذية المعروفة، ويرجع استعمال الدهون فى التغذية إلى عصور ما قبل التاريخ. والليبيدات منتشرة فى الطبيعة وتمتاز بعدم قابليتها للذوبان فى الماء، بينما تنوب فى الإثير والكلوروفورم والبنزين.

وتتكون الليبيدات من كربون وإيدروجين وأكسجين، ويحتوى بعضها على فوسفور ونيتروجين، ونسبة الكربون والهيدروجين إلى الأكسجين فى الدهون أعلى منها فى الكربوهيدرات. فمثلاً دهن اللحم المسمى تريستارين Tristearin به ١١٠ ذرة هيدروجين و ٦ ذرات من أكسجين. بينما نسبة نفس العناصر السابقة فى جزئى الكربوهيدرات هى ١ : ٢ : ١ ولذا عند احتراق الدهون، فإنها تحتاج إلى أكسجين خارجى أكثر لتتحد مع كل ذرات الهيدروجين والأكسجين، فتنتطلق كمية أكبر من الحرارة، وعلى هذا فإن احتراق جرام واحد من الدهون يعطى ٩ سعرات.

## أقسام الليبيدات :

وتنقسم الليبيدات حسب تركيبها الكيميائى - كما قسمها بلور Bloor - إلى ثلاثة أقسام تشمل الليبيدات البسيطة، والليبيدات المركبة، والليبيدات المشتقة.

## الليبيدات البسيطة Simple Lipids :


وهى استرات أحماض دهنية مع كحول، وتشمل:

أ- الدهون Neutral Fats      ب- الشموع Waxes      ج- ديول ليبيدات

## أ - الدهون Neutral fats :

وتشمل الدهون والزيوت Fats & Oils وهى استرات أحماض دهنية مع جليسرول، وتسمى جلسريدات Glycerides (شكل ٣-١) ويتحد ثلاث أحماض دهنية متشابهة أو مختلفة مع الجليسرول مكوناً جلسريد ثلاثى Triglyceride، وتوجد الجلسريدات ثلاثية فى الدم بمعدل ١٤٢ ملليجرام / ١٠٠ مل دم.

أما الجلسريدات الثنائية فهى التى يتحد فيها حامضان دهنيان مع الجليسرول وتعمل هذه الجلسريدات مع أيونات الكالسيوم ومركب فوسفاتيدل سيرين (سيأتى ذكره) على تحفيز إنزيم Protein C Kinase الذى يعمل على فسفرة عدد من بروتينات الخلية.



### شكل (٣-١) الجليسرول والجلسريدات

والجلسريدات الثلاثية أكثر الليبيدات انتشاراً فى جسم الإنسان، وخصوصاً فى أنسجة تخزين الدهون Adipot tissues وتحت الجلد وحول الأعضاء الداخلية، وتطلق كلمة دهون على كل من الدهون الصلبة مثل دهون الحيوان والزبدة، وكذا

الدهون السائلة أى الزيوت. وتختلف الدهون فى الأنواع المختلفة وفى النوع الواحد، تختلف فى تركيبها فى أنسجة الجسم المختلفة، وعادة تختلف صفات الدهون باختلاف الأحماض الدهنية المتحدة مع الجلسرول من حيث طول السلسلة الهيدروكربونية للدهون ومن حيث درجة التشبع degree of saturation وتحتوى الدهون على نسبة أعلى من الأحماض الدهنية المشبعة Saturated fatty acids ونسبة أقل من الأحماض الدهنية غير المشبعة unsaturated fatty acids.


وتوجد الزيوت فى النباتات، وحيث أن الزيوت بها روابط غير مشبعة، فالتوقع أنها سريعة التزنخ، ولكن يوجد بالزيوت مضادات للأكسدة antioxidants مثل فيتامين E التى تؤخر من أكسدة هذه الروابط.

### ب - الشموع Waxes :

وهى إسترات أحماض دهنية مع كحول ذى وزن جزيئى عالٍ، وتضم إسترات ستيرولات Sterols مثل إسترات الكولسترول Cholesterol مع الأحماض الدهنية كما تضم إسترات غير ستيروالية Nonsterols مثل إسترات فيتامين (A) وفيتامين (D).

### ج - ديول الليبيدات البسيطة Simple diol lipids :

وهى إسترات أحماض دهنية مع كحول قاعدى ثنائى المجموعة الكحولية. ويوجد أنواع مختلفة من ديول الليبيدات منها ديول ليبيدات أحادية الأسيل monoacyldiols وديول ليبيدات ثنائية الأسيل diacyldiols وفيها يرتبط حامض دهنى بالكحول إما برابطة إيثير ether bond (أ) أو بواسطة إستر ester bond (ب) كما فى شكل (٢-٣).




شكل (٢-٣) ديول الليبيدات

وقد عزل خليط من ديول الليبيدات بكميات ضئيلة من الأنسجة الحيوانية والنباتية. وقد لوحظ أن نسبة الليبيدات في هذه المركبات تزيد عند زيادة النشاط الوظيفي functional activity للكائن الحى مثلاً فى مرحلة تجديد الخلية cell regeneration وفى النبات أثناء نضج البذور.

### الليبيدات المركبة Compound Lipids :

وهى إسترات أحماض دهنية مع كحولات ومواد أخرى تشمل :

١- فوسفوليبيدات Phospholipids (شكل ٣-٣) وهى تلى الجلسريدات من حيث الانتشار فى جسم الإنسان وتتميز بوجود جزئى أرثوفوسفات Orthophosphate وغالباً تحتوى على قاعدة نيتروجينية.



### شكل (٣-٣) الفوسفوليبيدات

وتوجد أنواع كثيرة منها معظمها فى أنسجة الجسم والدم، ونسبه بسيطة توجد فى أنسجة تخزين الدهن، والفوسفوليبيدات تدخل فى بناء جدار الخلايا ولها دور هام فى نقل الدهون فى جسم الإنسان، وتوجد فى بلازما الدم بمعدل ٢١٥ ملليجرام / ١٠٠ مل، وهى إسترات أحماض دهنية مع كحول إما جلسرول glycerol أو سفنجوسين sphingosine (يتميز بوجود N) أو ديول diol.

### ومن الفوسفوليبيدات :

phosphatidic acid	* حامض الفوسفاتيدك
phosphatidyl glycerol	* فوسفاتيدل جلسرول
phosphatidylcholine	* فوسفاتيدل كولين




* فوسفاتيدل إيثانولامين	phosphatidyl ethanolamine
* فوسفاتيدل إينوسيتول	phosphatidyl inositol
* فوسفاتيدل سيرين	phosphatidyl serine
* لايسو فوسفوليبيدات	lysophospholipids
* بلازمالوجين	plasmalogens
* سفنجومايلين	Sphingomyelins

وتحتوى هذه الفوسفوليبيدات على جلسرول ويطلق عليها الفوسفوجلسريدات باستثناء السفنجومايلين الذى يحتوى على سفنجوسين، كما يمكن اعتبارها مشتقات حامض الفوسفاتيديك.

#### - حامض فوسفاتيديك Phosphatidic acid :

وهو مركب هام فى تخليق وميتابولزم الفوسفوجلسريدات، ولكن يوجد بكميات ضئيلة فى الأنسجة (شكل ٣-٤) .




شكل (٣-٤) حامض الفوسفاتيديك Phosphatidic acid

#### - فوسفاتيدل إيثانولامين Phosphatidyl ethanolamine :

(سفالين) (Cephalin)

يوجد فى جدر الخلايا ويمثل ٢٠٪ من ليبيدات الجدار، كما يوجد فى كل الخلايا والأنسجة ويدخل فى تكوين ليوبروتينات الدم (شكل ٣-٥) .




شكل (٣-٥) فوسفاتيدل إيثانولامين Phosphatidylethanolamine

### - فوسفاتيدل كولين Phosphatidylcholine :

(Lecithin) (لستين)

وهو من أكثر الفوسفوليبيدات انتشاراً في جدر الخلايا، وتحتوى على حوالى ٥٠٪ من ليبيدات جدر الخلايا، وهو مصدر هام كمجموعة الميثيل  $\text{CH}_3$  فى جسم الإنسان. والكولين من المركبات المهمة فى نقل النبضات العصبية، وهو مهم لتقليل الجذب السطحي للسوائل وعدم تجمعها وهذا مهم وخصوصاً فى الرئة. وغياب هذه الفوسفوليبيدات فى الطفل المتسرر تؤدى إلى متاعب تنفسية. وتدخل هذه الفوسفوليبيدات فى تكوين ليبوبروتينات الدم (شكل ٣-٦).




شكل (٣-٦) فوسفاتيدل كولين Phosphatidylcholine

### - فوسفاتيدل سيرين Phosphatidylserine :

ويوجد فى أنسجة الجسم ويحتوى على الحامض الأمينى سيرين Serine (شكل ٣-٧). كما ظهر أن أحد هذه الأحماض الأمينية tyrosine، threonine أو hydroxyproline محل serine.

ويعمل هذا المركب مع جلسريد ثنائى وأيونات الكالسيوم على تحفيز Proterin Kinase C الذى يقوم بفسفرة عدد من بروتينات الخلية.




### شكل (٧-٣) فوسفاتيدل سيرين Phosphatidylserine

#### - فوسفاتيدل إينوسيتول Phosphatidylinositol :

وهو موجود فى أنسجة الجسم (شكل ٨-٣) ويوجد منه ثلاث أنواع: النوع الأول به مجموعة فوسفات واحدة monophosphates متصلة بالإينوسيتول، والثانى به أكثر من مجموعة فوسفات polyphosphates متصلة بالإينوسيتول. ويقوم فوسفاتيدل إينوسيتول ثلاثى الفوسفات بتنظيم أيونات الكالسيوم فى عصارة الخلية. أما النوع الثالث: إينوسيتول المركب به مركبات أخرى إما أحماض أمينية أو سكريات أحادية متصلة بالإينوسيتول.


وتوجد هذه الفوسفوليبيدات فى المخ ولها دور هام فى نشاط المخ. ويعتبر فول الصويا من المصادر الغنية بهذه المواد، وكذلك بذور عباد الشمس، وبعض المكسرات.



### شكل (٨-٣) فوسفاتيدل إينوسيتول Phosphatidylinositol

#### - البلازمالوجينات Plasmalogens :


توجد فى أنسجة الجسم وتكون حوالى ٢٠٪ من مجموع الفوسفوليبيدات، كما تكون حوالى ١٠٪ من فوسفوليبيدات المخ والعضلات وفى نخاع العظام. (شكل ٩-٣).



شكل (٩-٣) البلازمالوجين Plasmalogens

### - كاردوليبيين Cardioliipin :


استخرج من قلب الحيوانات لأول مرة، ولهذا استمد اسمه من الكلمة اليونانية kardia وتعنى قلب، و lipos وتعنى دهن. ويوجد cardioliipin فى العديد من الأنسجة ويكون حوالى ٥,٢٪ من ليبيدات الخلية وهو مركب الفوسفوليبيدات الأساسى الموجود فى جدار الميتوكوندريا mitochondria (شكل ٣-١٠)



شكل (٣-١٠) كاردوليبيين Cardioliipin

### - لايسوفوسفوليبيدات Lysophospholipids :

وهو عبارة عن فوسفوجلسرول يحتوى على مجموعة أسيل acyl واحدة (شكل ٣-١١) وهو مهم فى الميتابوليزم وفى التحويل بين الفوسفوليبيدات.




شكل (٣-١١) Lysoleothin

## - ديول فوسفاتيد Diol phosphatides :

وهو مشتق من كحولات ذات قاعدتين dibase تكون مجموعة هيدروكسيل استر مع حامض دهني، والثانية تتصل بمجموعة فوسفات قد تكون من الكولين. وهذه الفوسفوليبيدات يمكن أن تتصل بجدار الخلية محدثة فيه بعض تغيرات لها تأثير في خفض الجذب السطحي للسوائل، ويلاحظ أنه إذا وجدت بكميات كبيرة قد تؤدي إلى تحلل كرات الدم الحمراء.

## - سفنجومييلين Sphingomyelins :

يوجد بكميات كبيرة في المخ والأنسجة العصبية وغمد الأعصاب. ويتكون من حامض دهني وحامض فوسفوريك وكولين وكحول أميني-سفنجوسين، ولا يحتوي على جلسرول (شكل ٣-١٢). واتحاد سفنجومييلين مع الحامض الدهني يكون سيراميد ceramide. ويعمل سفنجومييلين كعازل كهربائي في غمد الأعصاب.




شكل (٣-١٢) سفنجومييلين A Sphingomyelin

## ٢- جليكوليبيدات Glycolipids :

وهي ليبيدات محتوية على كربوهيدرات كما سبق، ومنتشرة في أنسجة الجسم وخصوصاً في الجهاز العصبي. وهي توجد في الطبقة الخارجية لجدار البلازما ليكون طبقة الكربوهيدرات الموجودة على السطح، ومنها :

## أ - سبروسيدات Cerebrosides :

تحتوى على جزء كاربوهيدرات (جالاكتوز أو جلوكوز) وحامض دهنى ذى وزن جزيئى عالى - سفنجول Sphingol (سفنجوسين Sphingosine)، (شكل ٣-١٣) وتوجد عادة فى المخ، كما يوجد فى أنسجة أخرى.



شكل (٣-١٣) سبروسيد


## ب - جانجليوسيدات Gangliosides :

وهى مرتبطة بالسبروسيدات Cerebrosides وتوجد فى الأنسجة العصبية وفى خلايا قشرة المخ، كما توجد فى الطحال spleen وفى كرات الدم الحمراء وفى جدار بعض الخلايا، وقد يكون لها دور فى انتقال الأيونات.

وهى تحتوى على كحول سفنجوسين Sphingosine وحامض دهنى طويل السلسلة وأوليغوسكريات تتكون من هسكوز (جالاكتوز أو جلوكوز) وحامض نيرامينيك neuraminic acid وهو حامض أمينى عديد الايدروكسيل.

## ج - جليكو سفنجوليبيدات Glycosphingolipids :

وهى من الجليكو ليبيدات المنتشرة فى الخلية وتحتوى على سيراميد ceramide وسكر واحد أو اثنين وأبسط هذه المركبات galactosylceramide (شكل ٣-١٤) و glucosylceramide. ويوجد المركب الأول فى المخ والأنسجة العصبية ويحتوى على حامض دهنى  $\text{C}_{24}$  (cerebronic acid) كما يمكن أن يتحول إلى sulfogalactosyl ceramide (sulfatide) ويوجد بنسبة كبيرة فى المييلين myelin ويعمل كعازل كهربى فى غمد الأعصاب.



**Structure of galactosylceramide (galactocerebroside, R=H),  
and sulfogalactosylceramide (a sulfatide, R=SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>)**

شكل (٣-١٤) جالاكتوسيل سيراميد

### ٣- مركبات الليبيد - بروتين Lipid-Protein :

ويوجد منها فى جسم الإنسان :

**- الليبيوبروتينات Lipoprotein :** وهى ليبيدات متحدة مع بروتين، وتكون الليبيدات من جلسريدات ثلاثية وكولسترول وفوسفوليبيدات. أما البروتين فهو جلوبولين.

ومن هذه المركبات :

**- الليبيوبروتينات الثقيلة High-density lipoprotein (HDL)** وهى

ذات كثافة عالية وتحتوى على ألفا جلوبولين بنسبة حوالى ٥٠٪ وتسمى ألفا ليبوبروتين كما تحتوى على نسبة منخفضة من الليبيدات من ٦-١٠٪ ومعظمها من الكولسترول والفوسفوليبيدات.

**- الليبيوبروتينات الخفيفة Low-Density Lipoprotein (LDL)**

وتحتوى على بتاليوبروتين بنسبة تتراوح بين ٧-٢١٪، أما نسبة الدهون فتصل إلى ٥٠٪ وتحتوى على كولسترول وفوسفوليبيدات وجليسريدات ثلاثية.

### **- الليبوبروتينات الخفيفة جدًا (VLDL) Very Low-Density**

Lipoprotein وتحتوى على نسبة كبيرة من الليبيدات معظمها عبارة عن جلسريدات ثلاثية وبها كوليسترول وفوسفوليبيدات ونسبة من البروتين أقل من ٥٪.

ويضيف Guyton وHall (١٩٩٦) مجموعة أخرى من الليبوبروتينات ذات كثافة متوسطة بين الليبوبروتينات الخفيفة والخفيفة جدًا، وسميت:


### **- الليبوبروتينات الوسطى (IDL) Intermediate-Density**

Lipoprotein أى أنها تقع بين الليبوبروتينات الخفيفة جدًا والليبوبروتينات الخفيفة. وبمقارنتها بالليبوبروتينات الخفيفة جدًا نجد أن بها نسبة أعلى من الكوليسترول والفوسفوليبيدات ونسبة أقل من الجلسريدات الثلاثية.

وتوجد الجلسريدات الثلاثية واستر الكوليسترول فى وسط مركب الليبوبروتين، وهذه مركبات غير متآينة ولا تحمل شحنات، أما فى الطبقة الخارجية فيوجد الفوسفوليبيدات والكوليسترول والبروتين وهى تحيط الطبقة الداخلية وتحمل شحنات سالبة على سطح مركب الليبوبروتين، وهذا يساعد أن يكون المركب ذائبًا فى بلازما الدم (Stroev ١٩٨٩).

ويوضح شكل (٣-١٥) تركيب الليبوبروتينات الخفيفة LDL كما أوضحها Guyton وHall (١٩٩٦) ويوجد بها aprotein B-100 ويوجد هذا البروتين أيضًا فى VLDL، IDL.





### شكل (٣-١٥) تركيب الليبوبروتينات الخفيفة

أما الليبوبروتينات الثقيلة فإنها تحتوي على Apoprotein A-I أو Apoprotein AII بدلاً من Apoprotein B-100 الموجود في الليبوبروتينات الخفيفة. وتنتقل دهون الدم، ومنها الكوليسترول، بواسطة الليبوبروتينات. وتشير Carper (١٩٨٧) إلى أن الكوليسترول المنتقل مع الليبوبروتينات الخفيفة يترسب على جدر الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى صلابة الجدر وضيق الأوعية وانسدادها. أما الليبوبروتينات الثقيلة، فإنها تحمل الكوليسترول من الدم وتنقله إلى الكبد حيث يتم هدمه، وهذا يقلل من فرص إصابة الفرد بمرض القلب. وتزيد نسبة الليبوبروتينات الثقيلة عند النساء عن الرجال، حيث تصل إلى ٥٥ ملجم/ ١٠٠ مل دم، ٤٥ ملجم/ ١٠٠ مل دم، على التوالي في المتوسط، ويتغير هذا المستوى حسب السن والعوامل الوراثية.

وتعمل الليبوبروتينات الثقيلة على حماية جدران الأوعية الدموية NIH (Consensus ١٩٩٣). وتعمل الليبوبروتينات الخفيفة جدًا والخفيفة والوسط على تنظيم مستوى الكوليسترول في الأنسجة وفي الكبد (Hall and Guyton ١٩٩٦) كما سيأتي ذكره.

#### **- البروتوليبيدات Proteolipids :**

وهي مركبات تحتوى على بروتينات تصل نسبتها إلى ٦٥ - ٨٥٪ ودهون. وتوجد البروتينات إلى داخل المركب، أما الليبيدات فتوجد إلى الخارج ولذا فإن هذا المركب يذوب في المذيبات العضوية. والبروتوليبيدات مركبات بنائية أى تدخل فى بناء جدار الخلية كما توجد فى غمد الأعصاب وتكسبها نشاطاً فسيولوجياً كما توجد فى جدر خلايا بعض الأعضاء مثل القلب والكلى والرئة والعضلات.

#### **- الليبيدات المشتقة Derived Lipids :**

وهي المواد الناتجة من الليبيدات بعد تحليلها، وتشمل الأحماض الدهنية والمواد الهيدروكربونية والجلسرول والكحولات والستروولات والسترويدات.

#### **- الأحماض الدهنية :**

وتتكون الأحماض الدهنية من كربون وإيدروجين وأكسجين فى سلسلة هيدروكربونية تختلف فى الطول باختلاف الأحماض، كما يوجد بعض الأحماض الدهنية الحلقية وبعض الأحماض المختوية على مجاميع هيدروكسيلية.

والأحماض الدهنية قابلة للذوبان فى المذيبات العضوية بدرجة أكبر من قابليتها للذوبان فى الماء، ويحتوى الحامض الدهنى فى أحد أطرافه على مجموعة كربوكسيلية Carboxyl group وهى قابلة للذوبان فى الماء، أما الطرف الآخر فهو هيدروكربونى الذى يذوب فى المذيبات العضوية، وتتوقف درجة ذوبان الحامض الدهنى على طوله، فكلما زاد طول الحامض كلما قلت درجة ذوبانه فى الماء، والعكس صحيح.

#### **أقسام الأحماض الدهنية :**

وتنقسم الأحماض الدهنية من حيث درجة التشبع إلى أحماض دهنية مشبعة saturated وأحماض دهنية غير مشبعة unsaturated بها رابطة واحدة غير مشبعة monounsaturated وأحماض دهنية غير مشبعة بها أكثر من رابطة غير مشبعة

polyunsaturated. وتبنى الأحماض الدهنية المشبعة من حامض الأسيتيك acetic acid الذى يعتبر أقصر الأحماض الدهنية. ويوضح جدول (١-٣) الأحماض الدهنية المشبعة، و جدول (٢-٣) بعض الأحماض الدهنية غير المشبعة.

جدول (١-٣) الأحماض الدهنية المشبعة

الحامض الدهنى	Fatty acid	طول السلسلة	عدد ذرات الكربون	الرمز	بعض المصادر
حامض الأسيتيك	Acetic	قصير	٢	$\text{CH}_3\text{COOH}$	الحقل، وكمركب وسط فى عمليات الميتابوليزم
حامض بيوتريك	Butyric	قصير	٤	$\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}$	الزبدة
حامض كابريك	Caproic	قصير	٦	$\text{C}_5\text{H}_{11}\text{COOH}$	الزبدة
حامض كابريك	Caprylic	قصير	٨	$\text{C}_7\text{H}_{13}\text{COOH}$	جوز الهند وبكميات صغيرة فى الزبدة
حامض كابريك	Capric	قصير	١٠	$\text{C}_9\text{H}_{19}\text{COOH}$	فى دهون نباتية وبكميات صغيرة فى الزبدة
حامض لوريك	Lauric	قصير	١٢	$\text{C}_{11}\text{H}_{23}\text{COOH}$	فى دهون نباتية وجوز الهند والقرفة
حامض مرستيك	Myristic	طويل	١٤	$\text{C}_{13}\text{H}_{27}\text{COOH}$	جوزة الطيب والشمع والقرفة
حامض بالميتيك	Palmitic	طويل	١٦	$\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$	فى دهون نباتية وحيوانية
حامض ستيريك	Stearic	طويل	١٨	$\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$	فى دهون نباتية وحيوانية
حامض أراكيديك	Arachidic	طويل	٢٠	$\text{C}_{19}\text{H}_{39}\text{COOH}$	زيت الفول السودانى
حامض بهينيك	Behenic	طويل	٢٢	$\text{C}_{21}\text{H}_{41}\text{COOH}$	البفور
حامض لينوسيريك	Lignoceric	طويل	٢٤	$\text{C}_{33}\text{H}_{47}\text{COOH}$	سيريوسيدات وزيت فول السودانى




ويشير Murry وآخرون (١٩٩٣) أن حامض فورميك Formic يمكن أن يكون من ضمن الأحماض الدهنية المشبعة ويستخدم أثناء الميثابوليزم فى نقل وحدة مكونة من ذرة كربون واحدة عند إضافة أو حذف هذه الوحدة من بعض المركبات. ويوجد أحماض دهنية ذات سلاسل طويلة موجودة فى الشموع، كما استخلصت بكميات ضئيلة من أحماض دهنية متفرعة من بعض الأنسجة.


والأحماض الدهنية عديدة الروابط غير المشبعة تعرف بالأحماض الدهنية الأساسية Essential Fatty Acids وهى الأحماض: arachidonic, linolenic, linoleic التى لا يمكن للجسم أن يكونها، ولذا لابد من وجودها فى الغذاء. ويعتقد أن حامض arachidonic غير أساسى حيث يمكن للجسم أن يكونه من حامض Linoleic. وكان يعتقد البعض قبل ذلك أن حامض linoleic هو الحامض الدهنى الأساسى فقط. وترجع معرفة أهمية هذا الحامض إلى Burr & Burr (١٩٢٩) حيث لاحظ أن هذا الحامض يشفى أو يمنع حدوث بعض الأمراض والزوائد الجلدية فى الفئران التى تناولت غذاءً خالياً من الدهون. وقد وضع Weise (١٩٥٨) مقررات غذائية لهذا الحامض للأطفال الرضع. والأحماض الدهنية الأساسية مهمة لنمو المخ وتطوره ونقصها قد يسبب بعض الاضطرابات العصبية (Petridou وآخرون، ١٩٩٨).

### نظائر الأحماض الدهنية غير المشبعة (أيزوميرات) :

ويوجد تشابه هندسى geometric isomers للأحماض الدهنية غير المشبعة الروابط، وعلى هذا فإن حامض أوليك يكون له تركيبات متناظرة (Cis-trans isomers) ويلاحظ أن التركيب cis هو الوضع الشائع (شكل ٣-١٦) الموجود فى الطبيعة.



trans



cis




**Trans form**  
(Elaidic Acid)



**Cis form**  
(Oleic Acid)

### شكل (٣-١٦) أيزوميرات حامض الأوليك

وللأحماض الدهنية غير المشبعة دور في خفض ليوبروتيينات الدم إذا كانت (cis) أما في حالة (trans) فإنها تفقد هذه الخاصية كما سيأتي ذكره. وتظهر الأحماض الدهنية غير المشبعة في الطبيعة منحنية بزوايا ١٢٠° عند الرابطة غير المشبعة، وعلى هذا فإن حامض oleic يأخذ شكل (L) أما حامض elaidic فيبقى مستقيماً كما هو عند الرابطة غير المشبعة (شكل ٣-١٧).



Geometric isomerism of Δ<sup>9</sup>, 18:1 fatty acids (oleic and elaidic acids).

### شكل (٣-١٧) أيزوميرات حامض الأوليك


حامض الأوليك

\* المصدر Murry وآخرون (١٩٩٣)

أما فى حالة وجود عدد من الروابط غير المشبعة فإن الحامض يظهر فى عدد من الأشكال. فمثلاً حامض arachidonic ذو الأربع روابط غير مشبعة يأخذ شكل U. وهذا الالتواء مهم نظراً لوجوده فى جدار الخلية أو فى الجزيئات المعقدة مثل الفوسفوليبيدات.

وتوجد الروابط أحادية عدم التشبع مثل حامض الأوليك oleic عند ذرة الكربون ٩ (w-9) أى n-9. كما توجد الروابط غير المشبعة فى الأحماض الدهنية الأساسية عند ذرة الكربون ٦ w-6 أى (n-6) أو ذرة الكربون ٣ (w-3) أى (n-3) وذلك من الطرف الميثيلى methyl أى يوجد ثلاث عائلات من الأحماض الدهنية.

وتشير الدراسات التى أجرتها اللجنة المشتركة من WHO & FAO (١٩٨٠) أن الإنسان لا يمكن أن يضيف أو يكون رابطة غير مشبعة فى المسافة بين الطرف الميثيلى والرابطة غير المشبعة الأولى، ولكنه يمكن الإضافة من الناحية الأخرى بين الطرف الكربوكسيلي carboxyl والرابطة غير المشبعة (شكل ٣-١٨)؛ أى أنه يوجد قسمين من الأحماض الدهنية الأساسية اللازمة للجسم وبناء الخلايا والمركبات المختلفة هما (n-6) أو w<sub>6</sub> و (n-3) أو w<sub>3</sub> ويمكن للجسم أن يزيد طول السلسلة كما سبق.



شكل (٣-١٨) تركيب تفصيلى لبعض الأحماض الدهنية

## أسماء الأحماض الدهنية العادية والمصنفة :

وعادة يستخدم للأحماض الدهنية الأسماء العادية common names أو المعدلة modified (والتي وضعت بواسطة IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry). فمثلاً حمض Palmitic  $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOH}$  يطلق عليه hexadecanoic acid وحمض Oleic  $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$  يطلق عليه octadecenoic acid. ويوضح جدول (٣-٣) الأسماء العادية والمعدلة للأحماض الدهنية المختلفة، وعدد ذرات الكربون والروابط غير المشبعة ومواضعه، سواء من مجموعة الكربوكسيل ( $-\text{COOH}$ ) أو مجموعة الميثيل ( $-\text{CH}_3$ ).

جدول (٣-٣) أسماء الأحماض الدهنية وعدد ذرات الحمض والروابط غير المشبعة ومواضعها

الاسم الشائع Common name	Synonym <sup>1</sup>	الاسم التصنيفي	Abbreviation <sup>2</sup>	الرمز
capric	decanoic		10 : 0	
lauric	dodecanoic		12 : 0	
myristic	tetradecanoic		14 : 0	
palmitic	hexadecanoic		16 : 0	
stearic	octadecanoic		18 : 0	
oleic	9-octadecenoic		18 : 1, n-9	
arachidic	eicosanoic		20 : 0	
gadoleic	11-eicosenoic		20 : 1, n-9	
behenic	docosanoic		22 : 0	
erucic	13-docosenoic		22 : 1, n-9	
brassicic	trans-13-docosenoic		trans 22 : 1, n-9	
catoleic	11-docosenoic		22 : 1, n-11	
lignoceric	tetracosanoic		24 : 0	
nervonic	15-tetracosanoic		24 : 1, n-9	
linoleic	9, 12-octadecadienoic		18 : 2, n-6	
$\gamma$ -linolenic	6,9,12-octadecatrienoic		18 : 3, n-6	
$\alpha$ -linolenic	9,12,15-octadecatrienoic		18 : 3, n-3	
dihomo- $\gamma$ -linolenic	8,11,14-eicosatrienoic		20 : 3, n-6	
	5,8,11-eicosatrienoic		20 : 3, n-9	
arachidonic	5,8,11,14-eicosatetraenoic		20 : 4, n-6	
	5,8,11,14,17-eicosapentaenoic		20 : 5, n-3	
	7,10,13,16-docosatetraenoic		22 : 4, n-6	
derivatives	4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic		22 : 6, n-6	
	7,10,13,16,19-docosapentaenoic		22 : 5, n-3	
	4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic		22 : 6, n-3	

١- موضع الرابطة غير المشبعة من الطرف الكربوكسيلي.

٢- اختصار تركيب الحمض المعنى باستخدام عدد ذرات الكربون وموضع الرابطة غير المشبعة من الطرف الليلي

وعندها؛ أى أن حمض palmitic هو 16.0 ، و linoleic هو 18 : 2, n-6

ويلاحظ أن نهاية الأحماض الدهنية المشبعة "anoic" وغير المشبعة "enoic".



## تصنيف الأحماض الدهنية غير المشبعة

تصنف الأحماض الدهنية غير المشبعة حسب طول السلسلة وعدد ومكان الروابط غير المشبعة.

\* أحماض دهنية وحيدة عديمة التشبع (monoenoic) monounsaturated.

\* أحماض دهنية عديدة عدم التشبع (polyenoic) polyunsaturated.

وتشمل هذه أحماض دهنية بها رابطتين غير مشبعتين dienoic، ثلاث روابط غير مشبعة trienoic، أربع روابط غير مشبعة tetraenoic، خمس روابط غير مشبعة pentaenoic، ست روابط غير مشبعة hexaenoic. ويوضح جدول (٣-٤) أسماء بعض الأحماض التي تتبع كل قسم ومصادرها.

ويشتق من حامض لينولييك Linoleic 18: 2 w-6 وحامض لينولينيك Linolenic 18: 3 w-3 العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة.

ويلاحظ أن معظم، إن لم يكن كل، الأحماض الدهنية عديدة عدم التشبع مشتقة من حامضي Linoleic أو Linolenic وتسمى مشتقات derivatives الأحماض الدهنية (جدول ٣-٥).

جدول (٣-٤) تركيب بعض الأحماض الدهنية غير المشبعة ومصادرها

المصادر	الرمز	عائلة الحامض الدعنى	اسم الحامض التصنيفى	اسم الحامض الشائع Common name
Monoenoic أحماض ذات رابطة واحدة مزدوجة				
كل الدهون	16:1:9	w7	cis-9-Hexadecenoic	Palmitoleic
فى العديد من الدهون مثل زيت الزيتون	18:1:9	w9	cis-9-Octadecenoic	Oleic
الدهون المهدرجة	18:1:9	w9	trans-9-Octadecenoic	Elaidic
زيت اللفت والمستردة	22:1:13	w9	cis-13-Docosenoic	Erucic
السريروسيدات	24:1:15	w9	cis-15-Tetracosenoic	Nervonic
Dienoic أحماض ذات رابطتين مزدوجتين				
الذرة، الفول السوداني، بذرة القططن، فول الصويا وزيت نباتية أخرى	18:2:9,12	w6	all - cis 9, 12 Octadecadienoic	linoleic
Trienoic أحماض ذات ثلاث روابط مزدوجة				
بعض النباتات ويوجد بنسبة ضئيلة فى الأنسجة الحيوانية	18:3:6:9,12	w6	-all-cis-6,9,12 Octadecatrienoic	γ-linolenic
كثيراً ما يوجد مع حامض linoleic وخصوصاً فى زيت الكتان	18:3:9,12,15	w3	-all-cis-9,12,15 Octadecatrienoic	α-linolenic
Tetraenoic أحماض ذات أربع روابط مزدوجة				
يوجد كثيراً مع linolenic وخصوصاً فى زيت الفول السوداني كما يوجد فى الفوسفوليبيدات	20:4:5,8,11,14	w6	-all-cis-5,8,11,14 Eicosatetraenoic	Arachidonic
Pentaenoic أحماض ذات خمس روابط مزدوجة				
زيت السمك مثل زيت كبد الحوت	20:5:5,8,11,14,17	w3	-all-cis-5,8,11,14,17 Eicosapentaenoic	Timnodonic
زيت السمك، فوسفوليبيدات المخ	22:5:7,10,13,16,19	w3	-all-cis-7,10,13,16,19 Docosapentaenoic	Clupanodonic
Hexaenoic أحماض ذات ستة روابط مزدوجة				
زيت السمك وفوسفوليبيدات المخ	22:5:4,7,10,13,16,19	w3	-all-cis-4,7,10,13,16,19 Docosahexaenoic	Cervonic



جدول (٥)

مشتقات الأحماض الدهنية عديدة عدم التشبع

مشتقات حامض لينولينيك	مشتقات حامض لينولييك
<b>Linolenic</b> $\alpha C_{18}:3 w3$ حامض لينولينيك ↓ $C_{18}:4 w3$ $C_{20}:4 w3$ ↓ $C_{20}:5 w3$ حامض إيكوزاينتانونيك <b>Eicosapentaenoic acid</b> ↓ $C_{22}:5 w3$ <b>Docosapentaenoic acid</b> ↓ حامض دو كوزاهكسائينويك $C_{22}:6 w3$ <b>Docosahexaenoic acid</b>	<b>Linoleic</b> $C_{18}:2 w6$ حامض لينولييك <b>Linoleic</b> ↓ $C_{18}:3 w6$ حامض لينولينيك ↓ <b><math>\gamma</math>Linlenic acid</b> ↓ $C_{20}:4 w6$ حامض أراكيدونيك <b>arachidonic acid</b> ↓ $22:4 w6$ ↓ $C_{22}:5 w6$ <b>Docosapentaenoic acid</b>

بالإضافة إلى ذلك فإن حامض الأراكيدونيك arachidonic يتحول إلى مواد شبيهة بالبروستاجلاندين في تركيبها تسمى أيزوبروستين isoprostane (شكل ١٩-٣) ويتم ذلك في تفاعل إنزيمي عند تعرض الفرد لضغوط مختلفة (Marrow وآخرون ١٩٩٣).

وهذا يفسر الكثير من جوانب الحالات والأمراض التي يتم فيها تأكسد حامض arachidonic أكسدة بيروكسيدية peroxidation.




شكل (٣-١٩) تركيب prostaglandin (١)

و isoprostane (٢)

: Eicosanoids الايكوزانويدات

وتسمى مشتقات الأحماض الدهنية غير المشبعة الايكوزانويدات eicosanoids وتشمل البروستانويدات prostanoids وليكوتراينات Leukotrienes، وتشمل البروستانويدات بدورها (شكل ٣-٢٠): البروستاجلاندينات PG Prostaglandins وبروستاسيكلين prostacyclins (PGI) وثرومبوكسين thromboxane (TX) ويستخدم المصطلح برستاجلاندين prostaglandin ليشير إلى كل prostanoids. (Murry وآخرون ١٩٩٣).




شكل (٣-٢٠) مشتقات ايكوزانويدات


### Eicosanoids Derivatives

ويرجع اكتشاف هذه المركبات إلى Lieber Rursrok عام ١٩٣٠، وأيضاً إلى von Eulex عام ١٩٣٥. حيث لاحظوا أن إضافة السائل المنوي سبب انقباض العضلات غير الإرادية smooth muscle وترصلوا إلى المادة المسببة لهذا النشاط الفسيولوجي، وأطلقوا عليه البروستاجلاندين، ثم عرف تركيبها ١٩٦٢ بواسطة Bergström وزملائه. وفي عام ١٩٦٤ عرف أنها تتكون من الأحماض الدهنية الأساسية طويلة السلسلة.

وتُخلق البروستاجلاندين من الأحماض الدهنية غير المشبعة الطويلة  $C_{20}$  باغناء أو استدارة لذرة الكربون عند المنتصف لعمل تركيب حلقي. ويوجد أنواع مختلفة من البروستاجلاندينات تحمل عدداً مختلفاً من الروابط غير المشبعة على السلسلة الجانبية وهي  $PG_1$ ،  $PG_2$ ،  $PG_3$  وتكون أو تُخلق على التوالي من eicosatrienoic acid، eicosatetraenoic acid و eicosapentaenoic acid، ولكل مركب مركبات فرعية حسب وجود نوع ومكان المجاميع التي تحمل الأكسجين وعدد الروابط غير المشبعة في الحلقة. فمثلاً من البروستاجلاندين (PG) يوجد أنواع كثيرة ولذا يضاف A أو B، C، E، F، G، H إلى المركب ليصبح مثلاً  $PGA$ . هكذا، وفي كل مجموعة يوجد مجموعة مختلفة، ولذا تضاف أرقام مثل  $PGE_1$  وكذلك وضع الحلقة وOH في الفراغ ولذا يضاف  $\alpha$  أو ميثا مثل  $PGF \alpha$  (شكل ٣ - ٢١).




† prostaglandin E<sub>1</sub>  
(PGE<sub>1</sub>)




Prostaglandin E<sub>2</sub> (PGE<sub>2</sub>)


†† Prostaglandin E<sub>2</sub> (A622)




† prostaglandin E<sub>3</sub>  
(PGE<sub>3</sub>)



† leukotriene A  
(LTA)



† thromboxane A<sub>2</sub>  
(TXA<sub>2</sub>)



prostaglandin  
(PGI<sub>2</sub>)

شكل (٣-٢١) تركيب الايكوزانويدات ومشتقاتها

\* المصدر Spallholz (١٩٨٩).

\*\* المصدر Murry et al (١٩٩٣).

ومن المركبات الأخرى للبروستاجلاندين PG فمنها عائلة PGE وهى التى تحمل مجموعة كيتو Keto على ذرة الكربون رقم ١٠ من الحلقة، أما عائلة PGF فتحمل مجموعة هيدروكسيلية على ذرة الكربون رقم ١٠ أى نفس ذرة الكربون. أما مركبات الثرمبوكان thromboxanes فقد اكتشفت فى الصفائح الدموية وتوجد ذرة أكسجين فى الحلقة (oxane ring). وبإضافة ذرة أكسجين أخرى تنتج سلسلة مركبات prostacyclenes (شكل ٣-٢٠)، (شكل ٣-٢١). وبالنسبة للليكوتراين Leukotrienes فهى تتكون بتأثير إنزيم Lipoxigenase وليس عن طريق الالتواء كما سبق. وقد اكتشفت أولاً فى كرات الدم البيضاء leukocytes.

### - المواد الهيدروكربونية Hydrocarbons :

تشمل المواد الهيدروكربونية وهى مركبات خالية من المجموعة الكحولية، مثل الكاروتينويدات Carotenoides والسكوالين Squalene ومن الكاروتينويدات: ألفاكاروتين، بتاكاروتين، جاماكاروتين، وليكوبين lycopene. ويعتبر السكوالين خطوة وسطية فى تكوين الكولسترول، ويوجد فى زيوت بعض الأسماك shark، كما أنه يمنع تجلط الدم (Robinson, Simopotous ١٩٩٩).

وتلعب الكاروتينويدات دوراً فى وقاية الجسم من بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان وأمراض القلب (Stahl وآخرون ١٩٩٦)، فكما يذكر Oshima وآخرون (١٩٩٦) أن البتاكاروتين والليكوبين الموجودين فى أنسجة الجسم وبلازما الدم يعتبران من العوامل التى تلتهم scavenge الأصول الحرة free radicals. كما أن الكاروتينويدات تعمل على تنشيط الاتصال بين كل خلية والأخرى. كما أشارت Giovannelli وآخرون (١٩٩٩) أنه يزداد التأثير الحيوى لليكوبين فى الطماطم إذا اكتمل نضجها بعد جمعها من الحقل. كما أن بتاكاروتين هو أقوى مولد لفيتامين A المهم للإبصار كما سيأتى ذكره.

### - الستيرويدات والكحولات والستيروولات Steroids, Alcohols & Sterols :


الستيرويدات مركبات حلقة وبعضها له مجموعة كحولية حرة تسمى الستيروولات، وهى تسلك سلوك الكحولات.

ومن الستيرويدات: الهرمونات الجنسية وأحماض الصفراء، وفيتامين D، ومن الكحولات ذات السلسلة المستقيمة كحول ستيل  $C_6$  cetyl وستاريل  $C_{18}$  stearyl كما توجد كحولات بها حلقة بتا أيرونون B-ionone وتتضمن فيتامين A (وسنناقش الفيتامينات فيما بعد).

الستيروولات عبارة عن كحولات. وتسمى الستيروولات من أصل حيواني zoosterols، والستيروولات من أصل نباتي phytosterols.


ومن الستيروولات الإرجوستيرون ergosterol (شكل ٣-٢٢) والكلوسترون cholesterol (شكل ٣-٢٣).

ويوجد الإرجوستيرون في الأنسجة النباتية وفي الخميرة، وهي مولدة لفيتامين D، وتأثير أشعة الشمس فوق البنفسجية تتحول إلى فيتامين D كما سيأتى ذكره.



### شكل (٣-٢٢) الإرجسترون

والكلوسترون أكثر الستيروولات انتشاراً في الأنسجة الحيوانية، حيث يوجد في الدم، ويلعب دوراً كبيراً في نقل الأحماض الدهنية في جسم الإنسان ويوجد بكثرة في البيض.



### شكل (٣-٢٣) الكلوسترون



ويتراوح مستوى كولسترول الدم فى الإنسان من ١٠٧ - ٣٠٢ ملجم/ ١٠٠ مل دم. وقد وضع المتخصصون (Carper ١٩٨٧) حدًا أعلى لمستوى كولسترول الدم للفرد فى الأعمار المختلفة (جدول ٣-٦) فإذا تعداها يكون معرضًا لمخاطر الإصابة بأمراض القلب.

جدول (٣-٦) الحد الأعلى لمستوى الكولسترول  
ومدى التعرض للإصابة بأمراض القلب للأعمار المختلفة

العمر بالسنوات	درجة التعرض للإصابة بمرض القلب	
	متوسطة ملجم / ١٠٠ مل دم	مرتفعة ملجم / ١٠٠ مل دم
١٩-٢٠	أعلى من ١٧٠	أعلى من ١٨٥
٢٩-٣٠	أعلى من ٢٠٠	أعلى من ٢٢٠
٣٩-٤٠	أعلى من ٢٢٠	أعلى من ٢٤٠
٤٠ فأكثر	أعلى من ٢٤٠	أعلى من ٢٦٠

كما أشارت Carper (١٩٨٧) إلى أن تقدير النسبة بين مقدار الكولسترول المتحد مع الليبوبروتينات الثقيلة إلى الكولسترول الكلى هو من أحسن المؤشرات التى يمكن عن طريقها معرفة مدى التعرض للإصابة بمرض القلب، وتحسب من قسمة مستوى الكولسترول الكلى على مقدار الليبوبروتينات الثقيلة فى الدم، فإذا كان مستوى الكولسترول ٢٠٠ ملجم / ١٠٠ مل دم، ومقدار الليبوبروتينات الثقيلة ٤٥ ملجم / ١٠٠ مل دم، فإن النسبة تعادل  $\frac{200}{45} = 4,4$ ، وكلما انخفض الرقم كلما كانت فرصة التعرض للإصابة أقل، وإذا زاد الرقم على ٤,٧ فإن هذا إنذار بأن يعمل الفرد على تخفيضه.

وقد وجد أن متوسط هذه النسبة عند الرجال المصابين بمرض القلب تتراوح بين ٤,٤ - ٦,١ بينما يتراوح متوسط هذه النسبة عند النساء المصابات بين ٤,٦ - ٦,٤،

كما وجد أن أحسن نسبة، وهى عند الأفراد النباتيين، تعادل ٢,٨.

## هدرجة الزيوت والدهون Hydrogenation of fats & oils :

تتميز الزيوت باحتوائها على نسبة من الأحماض الدهنية غير المشبعة أكثر من الدهن، وعلى هذا فيمكن تحويل الزيوت السائلة إلى دهون صلبة؛ أى رفع درجة انصهار الدهن، كما يمكن زيادة درجة صلابة الدهن اللينة soft fats وذلك بإضافة أيديروجين إلى الرابطة غير المشبعة على درجة حرارة مرتفعة، واستعمال عامل مساعد catalyst مثل النيكل، وتسمى هذه العملية بعملية الهدرجة Hydrogenation، وعادة تتم العملية إما بإجراء هدرجة جزئية partial hydrogenation وفيها تصل درجة انصهار الدهن إلى (٣٥ - ٤٨°) أو تتم عملية الهدرجة تمامًا على نصف كمية الزيت ثم تخلط بالكمية الباقية من الزيت لإنتاج دهون ذات درجة الانصهار المطلوبة. أى أن هذه العملية تؤدي إلى تحويل الأحماض الدهنية غير المشبعة إلى أحماض دهنية مشبعة، أى أننا نفقد بعض الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل linoleic كما نفقد بعض العناصر الغذائية ذات الروابط غير المشبعة مثل فيتامين A. كما تتحول العديد من الروابط غير المشبعة من الوضع cis إلى نظيره من الوضع trans. ويلاحظ أن تناول هذه الزيوت يؤدي إلى ارتفاع الليبوبروتينات الخفيفة الضارة وخفض الليبوبروتينات الثقيلة المفيدة (Katan و Mensink ١٩٩٠). كما ترفع من الجلوسريدات الثلاثية (Louheranta وآخرون ١٩٩٩). كما تحل هذه الأحماض في جدار الخلية مما يغير من الميتابوليزم وأيضًا تؤثر على الإنزيمات اللازمة لإنتاج الايكوزانويدات eicosanoids وهى المواد اللازمة للعديد من العمليات الفسيولوجية كما سبق (Simopolous و Robinson ١٩٩٩).

## معاملة الدهون بالحرارة :

عند معالجة الدهون والزيوت بالحرارة المباشرة، مثل عمليات القلى والتحمير، فإن الدهون تتحلل إلى جلسرول وأحماض دهنية، ويتحول الجلسرول إلى مادة أكرولين acrolin وتتحول بعض الأحماض الدهنية إلى مركبات قصيرة، وهذه المواد تسبب تهيجًا للأغشية الطلائية للأنف والحلق والعين، وأيضًا للجهاز التنفسي، كما أن هذه المواد تساعد على حدوث القرحة وبعض حالات السرطان؛ ولذا ينصح بآلا يُستخدم الزيت في القلى أو التحمير لمدة تزيد عن ٦-٩ ساعات، وبعد كل مرة لا بد من ترشيحه وحفظه في مكان بارد.

## أقسام الدهون حسب محتواها من الأحماض الدهنية :

تنقسم الدهون حسب درجة تشبع الأحماض الدهنية إلى ثلاثة أقسام (Carper

١٩٨٧) هي :

١- **دهون مشبعة Saturated** : ومعظمها دهون صلبة على درجة حرارة الغرفة. وتصل فيها نسبة الأحماض الدهنية المشبعة إلى ٣٣٪ فأكثر. ومن دهون هذه المجموعة دهن اللحم البقري ودهن لحم الغنم والزبدة والجبن الكاملة الدسم وزيت جبر الهند وزيت النخيل.

٢- **دهون وحيدة عدم التشبع Monounsaturated** : وهي دهون سائلة أو نصف صلبة soft على درجة حرارة الغرفة، وتحتوى هذه الدهون على أحماض دهنية وحيدة عدم التشبع. ومن أمثلتها زيت الزيتون وزيت الفول السوداني وزيت كانولا.

٣- **دهون عديدة عدم التشبع Polyunsaturated** : وهي دهون سائلة أو نصف صلبة soft على درجة حرارة الغرفة، وتحتوى على دهون مشبعة، نسبتها لا تزيد عن ١٥٪، ومنها زيت الذرة، وزيت السمسم، وزيت عباد الشمس، وزيت السمك، والمارجرين. ويظهر تصنيف الدهون والزيوت حسب نوعية محتواها من الأحماض الدهنية جدول (٣-٧)، وحسب محتواها من أحماض دهنية w3, w6 (جدول ٣-٨).

## تقسيم الأغذية حسب محتواها من الدهون :

ويلاحظ عند تقدير نسبة الدهون فى الأغذية أنه من الخطأ تقدير نسبة الدهون على أساس وزن الغذاء؛ لأن بعض الأغذية مثل اللبن الكامل يحتوى على نسبة عالية من الماء، وهو فى نفس الوقت مرتفع فى محتواه من الدهن. ولسهولة الحكم على الأغذية والرجبات فإنه يمكن اعتبار :

## ١- الأغذية المنخفضة فى محتواها من الدهن Low-fat foods :

هى الأغذية المحتوية أقل من ٣٠٪ من السعرات مستمدة من الدهن أو أقل من ٥ جم دهن فى الكمية المقدمة لغذاء الفرد serving.

- الأغذية المتوسطة فى محتواها من الدهن Moderate-fat foods :

هى الأغذية المحتوية على ٣٠ - ٥٠٪ من السعرات مستمدة من الدس  
أو من ٦-١٠ جم دهن فى الكمية المقدمة لغذاء الفرد.

- الأغذية المرتفعة فى محتواها من الدهن High-fat foods :

هى الأغذية المحتوية على أكثر من ٥٠٪ من السعرات مستمدة من الدهن  
أو أكثر من ١٠ جم دهن فى الكمية المقدمة لغذاء الفرد.

جدول (٣-٧) تصنيف الدهون والزيوت

حسب نوعية محتواها من الأحماض الدهنية

دهون عديدة عدم التشبع	دهون وحيدة عدم التشبع	دهون مشبعة
زيت الذرة	زيت الزيتون	الزبد
زيت الفرطم	زيت الكانولا*	دهن الحيران
زيت عباد الشمس	زيت الأفوكادو	زيت جوز الهند
زيت فول السودانى		زبد الكاكاو
زيت بذرة القطن		زيت النخيل
زيت الكانولا*		
زيت فول الصويا		
زيت السمك		
زيت الكتان		
زيت عين الجمل		
زيت ورد الربيع (primerose)		
زيت السمسم		

\* زيت غنى فى الأحماض الدهنية وحيدة عدم التشبع.

المصدر : Simopolous و Robinson (١٩٩٩).

جدول (٣-٨) توزيع الزيوت حسب محتواها

من أحماض دهنية من عائلتي w-3, w-6

عائلة w-3	عائلة w-6
زيت السمك	زيت الذرة
زيت الكتان	زيت القرطم
زيت كانولا	زيت بذرة عباد الشمس
زيت عين الجمل	زيت بذرة القطن
زيت فول الصويا*	زيت فول الصويا*
	زيت فول السوداني
	زيت السمسم
	زيت ورد الربيع

\* زيت فول الصويا يحتوى على أحماض دهنية w6 أعلى من محتوى الزيوت الغنية فى الأحماض الدهنية w3 ولذا فهو يتبع المجموعتين.

المصدر : Simopolous و Robinson ١٩٩٩.

**وجود الأحماض الدهنية فى الكائنات الحية النباتية والحيوانية:**

تختلف الكائنات النباتية والحيوانية فى محتواها من الأحماض الدهنية، وعموماً الكائنات الحية، نباتية أو حيوانية، التى تعيش فى المياه العذبة تحتوى على نسبة عالية من الأحماض الدهنية ( $C_{22}$ ,  $C_{20}$ ,  $C_{18}$ ,  $C_{16}$ ) (جدول ٣-٩).

أما الكائنات البحرية، فهى غنية بالأحماض غير المشبعة ( $C_{22}$ ,  $C_{20}$ ) وتشير Carper (١٩٨٧) إلى أن الأسماك البحرية غنية بالأحماض الدهنية عديم التشبع، والتى يطلق عليها Omega-3 fatty acids والتى تكون من ٥-٤٠٪ من دهون هذه الأسماك، خصوصاً حامضى eicosapentaenoic (EPA) و docosahexaenoic (DHA).

جدول (٣-٩) النسبة المئوية للأحماض الدهنية في بعض الأغذية\*

الأحماض الدهنية						الأغذية
غير المشبعة		المشبعة				
C <sub>18:2</sub>	C <sub>18:1</sub>	C <sub>18</sub>	C <sub>16</sub>	C <sub>14</sub>	C <sub>4-12</sub>	
٤	٣٣	١١	٢٦	٨	١١	لبن
٩	٥٣	٨	٢	آثار	-	بيض
٣	-	آثار	١٢	٨٠	-	سمك
٢٥	-	آثار	٩	٦	-	زيت كبد الحوت
١٥	٦٥	٢	١٦	١	-	زيت زيتون
٥٦	٣٠	٢	٨	-	-	زيت ذرة
٣٧	٤١	٢	١٧	١	-	زيت بذرة القطن
٤١	٤٥	٤	٨	-	-	زيت سمسم
٥	٥٣	٥	٣٥	٢	-	زيت فول الصويا


\* منظمة الصحة العالمية / ومنظمة الأغذية والزراعة (١٩٩٧).

وحمض EPA وDHA من العوامل الفعالة في حماية القلب من الإصابة بأي حالة مرضية، ويوجدان في جميع الأسماك البحرية، وتزيد كميتهما بزيادة نسبة الدهون في السمك (جدول ٣-١٠) و(شكل ٣-٢٤) وتشير Carper (١٩٨٧) إلى أن كمية بسيطة من دهن هذا السمك تفيد القلب والجهاز الدوري، حيث وجد في Netherlands أن تناول الأسماك مرة أو مرتين أسبوعياً يقي الفرد من الإصابة بأمراض القلب.

جدول (٣-١٠) محتوى بعض الدهون من الأحماض الدهنية

جم/ ١٠٠ جم دهن

المنتجات الحيوانية والنباتية			الأحماض الدهنية المشبعة			الأحماض الدهنية غير المشبعة	
			القيمة الكلية	بالتيك	ستياريك	القيمة الكلية	أوليك لينولييك
منتجات حيوانية							
لحوم			٤٨	٢٨	١٩	٤٧	٤٤
بقرى			٦٦	٣٤	٢٨	٣٠	٢٤
جاموسى			٥٦	٢٩	٢٥	٤٠	٣١
خروف			٣٨	٢٨	٤	٥٨	٣٥
أرانب							
دهن لبن جاموسى			٦٢	٢٩	١٥	٣٣	٢٦
بقرى			٥٥	٢٥	١٢	٣٩	٣٣
إنسان			٤٦	٢٢	٧	٤٨	٣٤
دواجن			٢٢	٢٤	٧	٦٤	٣٨
دجاج			٢٩	٢٣	٦	٦٧	٤٣
رومى			٣٧	٢٥	٧	٦١	٤٤
بيض دجاج			١٥	١٢	٢	٧٩	٢٦
سالمون			٢٥	١٨	٣	٧٠	٢٦
تونة							
دهون مستخرجة			٥٥	٢٥	١٢	٣٩	٣٣
زبدة			١٥	١٢	١	٨١	٢٥
زيت كبد الحوت							
منتجات نباتية							
الحبوب ومنتجاتها			١٧	١٢	٢	٧٤	٢٩
أرز			١٢	٧	٥	٨١	٣٧
ذرة رفيعة			١٤	١٠	٤	٧٦	٣١
دقيق كامل							
الفواكه والخضروات			٩	٤	٢	٨٧	٥٠
حمص			١١	٩	٢	٨٤	٧٦
زيتون			٢٠	١١	٧	٧٥	١٦
فول الصويا			٢٦	١١	٦	٧٠	٤٥
فول سودانى							
زيوت مستخرجة			١٠	٨	٢	٨٤	٢٨
زيت ذرة			٢٦	٢١	٣	٧٠	٥٧
مارجرين			١١	٩	٢	٨٤	٧٦
زيت زيتون			٤٣	٢٧	١٢	٥٣	٤١
زيوت مجمدة							



شكل (٣-٢٤) محتوى الدهون والزيوت من الأحماض الدهنية

المصدر Robinson و Simopolous ١٩٩٩.



وقد يرجع التأثير الوقائي لتناول السمك أو زيت السمك إلى تأثيره على آليات تخثر الدم. ويكثر في الحيوانات البرية والثدييات حامض الأوليك والبالتيك، حيث يكونان من ٢٠ إلى ٢٥٪ من الأحماض الدهنية المكونة للدهن المحتزن في الأنسجة، وإلى ذلك يرجع صلابه هذه الدهون. وفي الحيوانات المجتزة يحل حامض الستاريك محل حامض الأوليك، ويحتوى دهن اللبن على أحماض دهنية قصيرة (C<sub>4</sub> إلى C<sub>12</sub>).

وتتميز دهون النبات بأن درجة التفاوت فيها أقل منه فى حالة دهون الحيوانات، ويكثر فى دهون النبات أحماض الأوليك والبالتيك واللينولييك linoleic، يلي ذلك اللينولينيك linolenic ويتميز زيت الزيتون باحتوائه على حامض الأوليك بنسبة كبيرة.

### مصادر الليبيدات :

يمكن الحصول على الزيوت مثل زيت الزيتون وزيت الذرة وزيت بذرة القطن، وتعتبر الزبدة من الأغذية الغنية، كما أن الفول السوداني واللحم وصفار البيض والجب من الأغذية الغنية بها، أما الخضروات والفواكه ففيها نسبة بسيطة من الدهن باستثناء الزيتون وجوز الهند، وكذلك السكريات خالية تماماً من الدهن (جدول ٣-١١).

أما الكوليسترول فيوجد فى الدهون الحيوانية، ويتنشر فى جميع خلايا وسوائل الجسم، وخصوصاً الأنسجة العصبية ومصادر الكوليسترول بالنسبة للإنسان خارجية من الغذاء، وغالباً من الأغذية الحيوانية مثل البيض واللبن والزبدة واللحم، ومصادر داخلية أى يبنى داخل الإنسان خصوصاً فى الكبد. (جدول ٣-١٢).

جدول (٣-١١) نسبة الدهون فى بعض الأغذية

النسبة المئوية للدهن والزيوت	الأغذية
٩١ - ١٠٠	الزيوت والدهون النباتية
٨١ - ٩٠	مارجرين - زبدة
٧١ - ٨٠	مايونيز
٦١ - ٧٠	المكسرات
٥١ - ٦٠	الشيكلاتة
٤١ - ٥٠	زبدة الفول السوداني
٣١ - ٤٠	جبين - صفار البيض - جوز الهند - لحم
٢١ - ٣٠	زيتون - كيك
١١ - ٢٠	(لبن - سالون - آيس كريم)
صفر - ١٠	(عيش - دجاج - كبد)
صفر	سكر وشربات

جدول (٣-١٢) محتوى بعض الأغذية من الكولسترول

الأغذية	مليجرام : ١٠٠ جم غذاء
لحم	٧٠
زبدة	٢٥٠
جبنة شيدر	١٠٠
جبنة قريش	١٥
دجاج	٦٠
بيضة كاملة	٥٥٠
بياض البيض	صفر
صفار البيض	١٥٠٠
سمك	٧٠
كلى الحيوان	٣٧٥
قلب الحيوان	٤٥
كبد	٣٠٠
لحم الخروف	٧٠
دهون نباتية	صفر
لبن كامل	١١
لبن مخفف	٨٥
لبن فوز	٣
جمبرى	١٢٥
لحم بتلو	٩٠
مخ بقرى	١٥٣٠ - ١٩٥٢

**مصادر الأحماض الدهنية :**

توضح الجداول السابقة [٣ - (١٠، ٧)] وشكل (٣-٢٤) مصادر الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة.

**وظائف الليبيدات Functions of Lipids :**

**والأحماض الدهنية Fatty acids and :**

**الدهون :**

تعتبر الدهون مصدراً مركزاً للطاقة اللازمة للجسم، فالجرام الواحد الدهون يعطى عند احتراقه فى الجسم تسعة كالورى، كما أن الدهون الموجودة فى

الجسم تصبح مصدرًا للطاقة المخزونة لإمداد الإنسان بما يحتاجه من الطاقة عند اللزوم، ولذا فإن وجود الدهون فى غذاء الإنسان يهيئ للبروتين الفرصة للقيام بوظيفته الأصلية، وهى بناء وتجديد أنسجة الجسم.

وللدهون فائدة عظيمة فى المحافظة على بعض أعضاء الجسم فى مكانها وحمايتها من الصدمات الخارجية وذلك لأن الدهون تحيط بها فتخفف من أثر هذه الصدمات. كما أن وجودها على شكل طبقة تحت الجلد، يساعد على تقليل الفاقد من الحرارة فى الجو البارد وتحتوى هذه الطبقة أيضًا على مولد لفيتامين D الذى يتحول بواسطة أشعة الشمس فوق البنفسجية إلى فيتامين D، بل إن الدهون تحمل الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهون مثل فيتامينات K,E,D,A كما أنها تقلل الفاقد من حاجة الجسم إلى فيتامينات B<sub>1</sub> وهو المعروف باسم الثيامين وهو ما سيأتى ذكره فيما بعد.

وتدخل الليبيدات فى تركيب المخ حيث تشكل ٦٠٪ من وزنه. ويؤثر تركيبها الكيميائى على تراكيب الخلايا المخية وعلى تكوين الزوائد والوصلات العصبية التى تحدد الذكاء والقدرة على التعلم وقوة الذاكرة والانتباه والتركيز وكذلك الجاناب الوجدانى والمزاجى للشخص (Carper ٢٠٠١) كما تدخل الدهون فى تكوين الناقلات العصبية neurotransmitters المهمة لعمل الجهاز العصبى المسيطر على جميع أجهزة الجسم ووظائفها.

### **بعض وظائف الأحماض الدهنية غير المشبعة :**

الدهون مصدر من مصادر الأحماض الدهنية الأساسية اللازمة للجسم، والتى لا يمكن للفرد أن يكونها بالكمية اللازمة للجسم... وهذه الأحماض الدهنية الأساسية تؤدى وظائف عدة بالنسبة للجسم.

وقد سبق ذكر أن هذه الأحماض الأساسية هى لينولييك linoleic لينولينك linolenic وأراكيدونيك arachidonic أما حامض الأوليك oleic ذر الرابطة الواحدة غير المشبعة فهو حامض غير أساسى ويمكن للأنسجة أن تقوم بتكوينه، كما يعتقد البعض أن حامض arachidonic غير أساسى أيضًا؛ ذلك لأنه يقتصر وجوده على الأنسجة الحيوانية كما أن الجسم الإنسانى يستطيع تحويل حامض linoleic إلى حامض arachidonic.

واهتم العلماء منذ القرن العشرين بالأحماض الدهنية، فقد لوحظ أنه عند غياب الأحماض الدهنية الأساسية في غذاء الفئران النامية أن نموها يقف بعد فترة من ١٠-١٢ أسبوعاً، وأن حالات إكزيما على الجلد والأقدام قد ظهرت، كما ظهرت حراشيف على الذيل، بل إن نقص هذه الأحماض الأساسية يؤدي إلى عقم ذكور الفئران وإجهاض الإناث أو ولادة حيوانات ميتة، بينما لوحظ أن إضافة هذه الأحماض أو زيت بذرة القطن قد أدى إلى عدم ظهور الأوعية الشعرية الضعيفة في جلد الفئران، كما ظهرت أعراض نقص الأحماض الدهنية الأساسية على الكلاب.

ويبدو أن الأحماض الأساسية لازمة لسلامة جدر هذه الأوعية الدموية. كما أن نقص هذه الأحماض الدهنية الأساسية يزيد من درجة نفاذية الجلد، وهذا قد يدل على أهمية هذه الأحماض الدهنية في تركيب جدار الخلية.

وبالرغم من ذلك فلم يكن معروفاً إلى أى مدى يمكن تطبيق نتائج التجارب على الحيوانات فى تغذية الإنسان، ولكن أظهرت تجارب Hansen وآخرين ١٩٥٨ أن تغذية الأطفال على لبن فرز أدى إلى ظهور حالة إكزيما، وقد أمكن علاج هذه الحالة بإضافة الأحماض الدهنية الأساسية إلى غذائهم، وعموماً فإن Hansen وآخرين قد أثبتوا احتياج الأطفال إلى الأحماض الدهنية الأساسية.

وبالنسبة للبالغين، فإن تجارب Hansen أثبتت ظهور حالة إكزيما فى غياب الأحماض الدهنية الأساسية، ولو أنه سابقاً قام Brown وآخرون (١٩٣٨) بتجربة على إنسان بالغ تغذى على وجبة خالية من الدهون لمدة ٦ شهور، فلم تظهر عليه أى أعراض نقص الدهون، ولكنهم لاحظوا أن مستوى حامضى arachidonic, linolenic قد انخفض فى الدم.

وتوجد الأحماض الدهنية الأساسية فى الجسم متحدة مع الكوليسترول فى صورة استر الكوليسترول، كما تدخل فى تركيب جزيء الفوسفوليبيدات التى تعمل على نقل دهون الدم. وتعمل الأحماض الدهنية الأساسية على إطالة المدة اللازمة لتجلط الدم وزيادة قدرته على تحليل الفيبرين.

وقد أظهر Peifer Holman (١٩٥٩) أن الأحماض الدهنية الأساسية لازمة للاستفادة من الطاقة الناتجة من الدهون، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يعتقد أن الأحماض

الدهنية الأساسية لازمة لزيادة كفاءة حركة وتمثيل الكولسترول. كما أظهر Alfin Slater وآخرون (١٩٥٤) أن غياب الدهون فى الوجبة يؤدى إلى تراكم كميات كبيرة من الكولسترول، فى كبد الفئران إذا قورنت بفئران تناولت وجبة بها ١٢,٥ ٪ دهن، وهذا يحدث بالرغم من أن كولسترول الدم ينخفض مستواه فى حالة غياب الدهون فى غذاء الحيوان عنه فى حالة التغذية بالوجبة الطبيعية. وأظهر Johnson عام ١٩٥٣ و Levin وآخرون عام ١٩٥٧ أن غياب الأحماض الدهنية الأساسية يسبب تكوين ميتوكوندريا mitochondria غير طبيعية منخفضة فى كفاءة الفسفرة phosphorylation.

ويعتقد أن الأحماض الدهنية الأساسية لها علاقة بمعرض تصلب الشرايين artherosclerosis حيث إنها مرتبطة بميتابوليزم الكولسترول، فأشار Fitzgerald & Man (١٩٥٨) إلى أن وجود الأحماض الدهنية المشبعة فى غذاء الحيوان والإنسان أدى إلى ارتفاع مستوى الكولسترول فى الدم، نتيجة لتكوين استر كولسترول غير قابل للذوبان فى الماء، مما يعمل على زيادة فرصة ترسبه على جدر الأوعية الدموية، فى حين أن الأحماض الدهنية غير المشبعة أدى إلى انخفاض مستوى كولسترول الدم نتيجة لتكوين استر كولسترول قابل للذوبان فى الماء، مما يقلل من فرصة ترسبه على جدر الأوعية الدموية. وتشير Carper (١٩٨٧) إلى أن الأحماض الدهنية الأساسية عندما تخفض من مستوى الكولسترول فإنها تعمل على خفض مستوى الليبوبروتينات الثقيلة لحد ما، أما الأحماض الدهنية ذات الرابطة الواحدة غير المشبعة مثل الموجودة فى زيت الزيتون فإنها تعمل على خفض كولسترول الدم لحد ما، دون أن تؤثر على الليبوبروتينات الثقيلة، وأكد ذلك Denke و Grundy (١٩٩٠).

وهذا يظهر أهمية تناول الزيوت المختوية على أحماض دهنية أحادية عدم التشبع فى الغذاء، حيث لا تقل أهميتها فى الجسم عن الأحماض الدهنية الأساسية لكن باستثناء زيت الفول السودانى.

ومن جهة أخرى فقد ظهر فى بعض الدراسات على أشخاص أصحاء أن الأحماض الدهنية عديدة عدم الروابط المشبعة من عائلة w-3 عملت على تخفيض الجلوسريدات الثلاثية دون أن تؤثر على الكولسترول أو الليبوبروتينات الخفيفة (Schinckel ١٩٩٢).

وتعمل الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة فى دهون الأغشية دوراً هاماً فى المحافظة على خاصية السيولة وهى لازمة لحوية الخلية وقيامها بوظائفها البيولوجية. كما ترتبط الأحماض الدهنية الأساسية طويلة السلسلة بتكوين سيراميدات (Ceramides) الأسيل وهذه تشكل نسيجاً بين الخلايا يساعد فى المحافظة على حاجز النفاذية فى بشرة الجلد.

إن نقص الأحماض الدهنية الأساسية يضر بالجسم، فقد وجد أن نقص حامض linoleic يؤدي إلى إصابة الجلد بالإكزيما واضطراب فى السلوك وتأخر التئام الجروح وتأخر النمو وعقم الذكور والإجهاض للإناث والإصابة بالنقرس ومتاعب فى القلب والجهاز الدورى والكبد والكلى، وزيادة إفراز العرق مع الشعور بالعطش وجفاف الجلد. ويشير Hansen (١٩٩٤) أن نقص هذا الحامض يؤدي إلى نقص تكوين مادة سيراميد اللينولييك o-linoleoyl ceramide فى جلد الإنسان وقد يكون لهذا المركب دور فى تنظيم فقد الماء عن طريق الجلد أى تنظيم نفاذية الجلد للماء.

كما يساهم حامض linoleic فى تنظيم نقل العناصر الغذائية عبر جدار الخلية وعدم التصاق المواد وتجمعها، كما يساهم فى سرعة زوال الشعور بالتعب. أما نقص حامض linoleic acid فيؤدي إلى تأخر النمو وضعف النظر وتأخر القدرة على التعلم وعدم توافق عمل العضلات ورعشة فى الأذرع والأرجل واضطراب فى السلوك.

وقد أظهرت دراسات Erasmus (١٩٩٥) أن بعض أعراض مرضية تستجيب لتناول linolenic acid ويمكن علاجها وهى ارتفاع الجلوسريدات الثلاثية فى الدم، ارتفاع ضغط الدم، التصاق الصفائح الدموية، التهاب الأنسجة، الأدمى، جفاف الجلد، وفشل النمو العقلى وانخفاض سرعة الميتابوليزم وتأثر جهاز المناعة. وتذكر منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة (١٩٩٧) أن تأثير تناول السمك أو زيت السمك الوقائى يرجع إلى تأثيره على آليات تجلط الدم.

وبالنسبة لدور الأحماض الدهنية عديدة عدم الروابط غير المشبعة من عائلة w-3 فإنها تؤدي دوراً فى المناعة حيث أنها تساعد فى التخلص من خلايا T غير المبرجة فى جهاز المناعة وهى خلايا ضارة تلتف أى خلايا تهاجمها، والمعروف أن خلايا T الطبيعية المبرجة هى أهم جزء فى جهاز المناعة حيث إنها متخصصة فى مهاجمة


الأهداف الضارة، كما أن الأحماض الأساسية تعمل على خفض تكوين بروتين معين معروف باسم Interleukin-I وزيادة إنتاج هذا البروتين مرتبطة بأمراض كثيرة خطيرة منها أمراض القلب والسكر والحساسية وفقدان الذاكرة (Robinson و Simopolous ١٩٩٩).

وتشير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (١٩٩٧) أن الأحماض الدهنية من عائلة w-3 أيضًا لها تأثير على التعبير الجيني ذى الشفرة الخاصة بالإنزيمات المشاركة فى التمثيل الغذائى للدهون وكذلك فى التعبير الجينى الذى يشترك فى تنظيم نمو الخلايا. أى أن هذه الأحماض تشترك مع مجموعة بروتينات النواة المستقبلية والمرتبطة مع عامل الوراثة DNA وتؤدى إلى تغيير فى نسخ الجينات المنظمة. كما أن هذه الأحماض الأساسية من عائلة w-3 تؤثر على إنتاج بروتينات السيكونونات من interleukins التى تنتجها وتطلقها خلايا تشارك فى تنظيم جهاز المناعة. وقد يتم ذلك من خلال تأثيرها على mRNA أى أن عملها يسبق ترجمة الشفرة الوراثية.

وبالنسبة للجهاز العصبى فإن الأحماض الدهنية الأساسية لازمة للنمو الطبيعى ونمو المخ وتطوره. ويعتبر حامض دوكوزاهكسانويك (DHA) Docosahexaenoic أساسياً لبناء أغشية المخ بصورة طبيعية وهو أيضاً مهم لبناء الروصلات العصبية synapses وفى المستقبلات العصبية، ويقوم حامض إيكوزابتانويك (EPA) Eicosapentaenoic بنفس الوظائف كما يمكن للجسم أن يحوله إلى (DHA). وأيضاً حامض arachidonic مهم لتطور مخ الجنين إلا أن زيادته عن الحد اللازم قد يكون له آثار سلبية (Bourrel ١٩٨٩).

وبالنسبة للأحماض الدهنية وحيدة عدم التشبع فهى تدخل فى المحافظة على سلامة غشية خلايا المخ نظراً لما تحتويه مصادرها من مضادات التأكسد التى تلتهم الأصول الحرة الضارة وهذا يساعد فى الوقاية من ضعف الذاكرة وتدهور القدرات المعرفية.

والأحماض الدهنية الأساسية هى كما سبق مولدات البرستاغلاندينات prostaglandins (شكل ٣-٢٥) التى لها العديد من الوظائف بالنسبة لجسم الإنسان.



شكل (٢٥-٣) مصادر الأحماض الدهنية w<sub>3</sub>, w<sub>6</sub> وتكوين الإيكوزانويدات  
من حامضى eicosapentaenoic, arachidonic



وللبروستاجلاندينات prostaglandins فوائد فسيولوجية وفاركولوجية عديدة وتتكون كاستجابة لأي ضغط ميكانيكي كيميائي، مناعى، أو التهاب... وهى إن كانت تنتج بكميات صغيرة إلا أنها سريعة التأثير، وتظهر نواتج هدمها فى البول.

وتذكر Spallholz (١٩٨٩) أنها مواد غير هرمونية وهى قد تعدل من استجابة الهرمونات. وكان Hansen وآخرون (١٩٨٨) قد ذكروا سابقاً أنها تعمل عمل الهرمونات فى تعديل بعض وظائف الخلية ويمكن أن يطلق عليها مشابهات الهرمونات (Stroev ١٩٨٩) وأنها لازمة لعمل العضلات غير الإرادية.

وتعتبر البروستاجلاندينات prostaglandins والليكوترينات leukotrienes الموجودة فى السوائل الخارجية للخلية هى جزء من الجهاز الدفاعى للجسم؛ حيث إنها تتكون فى حالات الالتهاب الناتج من وجود بكتيريا أو ميكروب... كما أنها تحفز الخلايا الملتزمة macrophages وكرات الدم البيضاء leukocytes كى تحدث تفاعلاً للبكتيريا (Hansen ١٩٩٤).

بالإضافة إلى ذلك فإن prostaglandines تعمل على تنظيم مستوى دهون الدم لأن عمل هذا يضاد تأثير هرمونات الابنفرين ونورابنفرين التى تقرم بتحليل الدهون والتى ينتج عن ذلك ارتفاع دهن الدم.

كما أن prostaglandins وأيضاً الأحماض الدهنية طويلة السلسلة من عائلة w-3 مثل حامضى DHA وEPA لازمة لسلامة جدر الأوعية الدموية والأعصاب والجلد، كما أنها تعمل على خفض كولسترول الدم والجلسريدات الثلاثية وخفض تجمع الصفائح الدموية وإطالة الفترة اللازمة لتجلط الدم وخصوصاً prostaglandin من سلسلة E<sub>3</sub> كما تعمل prostacyclins على منع تجمع الصفائح الدموية (Petridov) وآخرون (١٩٩٤).


### **التأثيرات المتباينة لمركبات الايكوزانويدات Eicosanoids :**

تقزم مركبات eicosanoids بوظائف عدة فى الجسم إلا أن لمركباتها تأثيرات متضادة ومتباينة حتى ولو كانت تتبع عائلة واحدة، كما هو الحال فى تأثيرها على خلايا العضلات غير الإرادية وتجمع وتكس الدم أو فى تأثيرها على خواص الأوعية الدموية من ناحية خاصية النفاذية أو الانقباض (منظمة الصحة العالمية/ منظمة الأغذية

والزراعة ١٩٩٧). فمثلاً مركب  $TXA_2$  بسبب انقباض الأوعية الدموية وما يتبعه من ارتفاع ضغط الدم فإن مركب  $PGE_2$  يسبب انبساط الأوعية الدموية، كما أن مركب  $PGE$  يمنع إفراز العصارات الهاضمة في حين  $PGF$  يثير إفراز هذه العصارات ويشير Stroev (١٩٨٩) أنه قد يرجع ذلك إلى أنه يوجد على بعض خلايا معينة مستقبلات ترتبط بالبروستاجلاندينات، ومن خلال ذلك يمكن أن تؤثر هذه المركبات على نشاط الإنزيمات، وفي حالات أخرى قد تقوم هي بوظيفة الهرمونات. أو قد يرجع ذلك إلى التنافس بين  $w-3$  و  $w-6$  على إنزيمى  $cyclooxygenase$  و  $lipooxygenase$  (Simopolous و Robinson ١٩٩٩)، كما يتضح من الشكل (٣-٢٦).

يظهر من الشكل أن الإنزيمين يؤثران على حامضى  $arachidonic$  و  $(EPA)$   $eicosapentaenoic$  فعند تأثير إنزيم  $cyclooxygenase$  على حامض  $arachidonic$  يتيح مركبات تسبب التهابات وخصوصاً مركب  $PGE_2$  فى حين تأثير نفس الإنزيم على  $EPA$  ينتج مركبات تضاد هذا الفعل وخصوصاً  $PGE_3$ . وعند تأثير إنزيم  $Lipooxygenase$  على حامض  $arachidonic$  فإنه ينتج  $LTB_4$  وهذه المادة تعمل فى حالة دخول مادة غريبة فى جسم الإنسان مثل ميكروب أو بكتيريا وغيرها على ورود كرات الدم البيضاء إلى مكان الالتهاب لتدمير الميكروب والتهامه مستخدمة الأصول الحرة  $free radicals$  وتستمر هذه العملية إلى أن تنفجر كرات الدم البيضاء وتخرج بقايا الخلايا ويتكون صديد كما يظهر فى الشكل.

## Essential Fatty Acids and Inflammation



شكل (٣-٢٦) المواد الناتجة من تأثير إنزيمي cyclooxygenase و lipooxygenase

على الأحماض الدهنية w6, w3

المصدر : Robinson و Simopolous ١٩٩٩ .

ولكن، عند بعض الناس يزيد ورود كرات الدم أكثر من اللازم وقد تتراكم على مكان الالتهاب وينتج عدد كبير من الأصول الحرة، وهذا يؤدي إلى التهاب الأنسجة السليمة، وكما يقال :

Healthy tissue gets damaged by friendly fire.

أو قد تبقى كرات الدم البيضاء نشطة وهذا يسبب التهاباً مزمنًا.

بينما ينتج من تأثير نفس الإنزيم على EPA مركب و LTB<sub>4</sub> وهذا يقلل أو يضاد التأثير الناتج من LTB<sub>4</sub> عن طريق تقليل ورود كرات الدم البيضاء.

### الأحماض الدهنية المشبعة :

تؤدي الأحماض الدهنية المشبعة عدة وظائف للجسم فهي تقوم بتوليد الطاقة... كما أنها تدخل في تركيب بعض المواد اللازمة للجسم.

فمثلاً يتحد حامض stearic أو palmitic أو myristic مع البروتين من خلال إضافة مجموعة أسيل acyl إلى حامض glycine في رابطة أميدية amide أو إلى حامض cysteine في رابطة ثيوإستر thioester وتسمى هذه العملية N-acylation of protein.

وهذه العملية تعمل على تثبيت هذا البروتين في أماكن معينة في جدار الخلية لتأدية وظائف معينة حسب الحاجة. كما أن هذه العملية تعمل على تحديد مكان البروتين recognition لتسهيل تفاعله مع بروتين آخر فيما يعرف بتفاعل بروتين-بروتين Protein - protein interaction (McLaughlin و Peitzsch ١٩٩٣).

يشير Muszbec و Laposata (١٩٩٣) أن حامض myristic وُجد مرتبطاً مع البروتين في رابطة أميدية أثناء عملية تخليق البروتين، كما وُجد أن حامض palmitic مرتبط برابطة ثيوإستر thioester مع البروتين.

### بعض وظائف الكوليسترول :

يدخل الكوليسترول في تكوين :

- حامض الكولييك cholic acid وهو الذي يكون أحماض الصفراء اللازمة لهضمة وامتصاص الدهون.

- بناء هرمون adrenocortical hormones في غدة الأدرينال.

- بناء الهرمونات الجنسية الأنثوية *estrogene* و *progesterone*.
- بناء الهرمونات الجنسية الذكورية *testosterone*.
- يدخل فى مع غيره من المواد فى بناء طبقة الجلد الخارجية *corneum* ولذا فإن الجلد لا ينفذ المواد الذائبة فى الماء ويمنع تبخير الماء من الجسم ولا يتأثر الجلد بالمواد الكيميائية.
- يكون مع الفوسفوليبيدات مواد بنائية، وخصوصاً فى بناء جدار الخلايا، وتتميز هذه المركبات بدورة حياة *turnover* بطيئة قد تصل إلى شهور أو سنين. ولهذا فهما يعملان على حماية كثير من الخلايا - وخصوصاً خلايا المخ - من التلف.

### بعض وظائف الفوسفوليبيدات :

- ١- تعتبر من العوامل الهامة لنقل وحركة الدهون، وخصوصاً الكولسترول، ونقصها يؤدي إلى تراكم الدهون مما يسبب اضراراً كبيرة للجسم.
  - ٢- السفالين وهو من الفوسفوليبيدات مهم لتحفيز تجلط الدم عند اللزوم.
  - ٣- يعمل السفنجومايلين *sphingomyelin* كعازل حول الألياف العصبية.
  - ٤- مصدر لمجموعة الفوسفات *phosphate* اللازمة لتكوين العديد من المركبات.
  - ٥- بناء جدار الخلايا.
- وبصفة عامة يمكن إدماج وظائف الليبيدات فيما يلى :

### ١- مولدة للطاقة *energetic* :

الدهون مصدر مركز للطاقة حيث إنه عند حرق الليبيدات داخل الجسم تتولد طاقة بمعدل ٩ كالورى / ١ جم وغالباً يقوم بهذه الوظيفة الجلسريدات الثلاثية والأحماض الدهنية الحرة.

### ٢- بنائية *structural* :

تدخل الليبيدات فى بناء جدار الخلية مثل الفوسفوليبيدات، الكولسترول، إستركولسترول.

### ٣- ناقلة *transporting* :

تقوم الليبيدات بنقل الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهون كما تقوم بنقل الكاتيونات عبر جدار الخلية.

#### ٤ - عازلة للكهرباء : electric isolating

تعمل الليبيدات كعازل كهربى فى غمد الأعصاب مثل سفنجوميلين sphingomyelin وجليكوسفنجوليبيد glycosphingolipid.

#### ٥ - استحلاب : emulsifyin

تعمل بعض الدهون كمستحلب قوى يقلل من قوة الجذب السطحي فى الأمعاء ولذا تساعد فى هضم الدهون مثل أحماض الصفراء.

#### ٦ - ميكانيكية : mechanical

تقوم الدهون بحماية الأعضاء الداخلية من التلف والتهتك عند التعرض لآى صدمة مثل الجلوسريادات الثلاثية.

#### ٧ - عازل للحرارة : heat insulation

تقوم الدهون الموجودة تحت الجلد بالاحتفاظ بحرارة الجسم مثل الجلوسريديات الثلاثية.

#### ٨ - مذيبة : dissolving

تقوم بعض المواد مثل أحماض الصفراء التى تقوم تحت الظروف الفسيولوجية بإذابة الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهون فى الأمعاء.

#### ٩ - هرمونى : hormonal

تكون الليبيدات هرمونات الستيرودية steroid hormones التى تقوم بالعديد من الوظائف الفسيولوجية تنظيم الميثابوليزم وأيضاً النمو والتطور داخل الخلية. ويعتبر الكولسترول هو مولد الهرمونات الستيرودية.

كما أن البروستاجلاندينات prostaglandins وهى أشباه هرمونات التى تخلق بكميات صغيرة عند الحاجة إليها لتأدية وظيفتها البيولوجية المطلوب فى مكان تخليقها.

#### ١٠ - مولدة لبعض الفيتامينات :

فالكاروتينويدات وخصوصاً بيتاكاروتين هو مولد لفيتامين A.

#### المقررات اليومية للدهون : Recommended Allowances for fats

لا تشير الجداول إلى المقررات اليومية التى يتناولها الفرد فى اليوم، وتوصى



ويوصى بأن تكون نسبة حامضى Linoleic إلى Linolenic هى من ١٠-٥ : ١  
فى الوجبة الغذائية (Erasmus ١٩٩٥).

وقد أشار Wood وآخرون (١٩٨٧) أن النسب غير المناسبة من  $w_3:w_6$  تغير  
من طبيعة جدار الخلية ونشاط الإنزيمات وأن ارتفاع نسبة حامض اللينولييك linoleic  
( $w_6:2:18$ ) فى أنسجة التخزين يكون مرتبطاً بالتعرض لمرض القلب.

كما أن نقص الأحماض الدهنية الأساسية  $w_6$  يمنع تحويل حامض linoleic  
إلى حامض arachidonic وبذا يصبح هذا الحامض غير متاح للنمو (Kinsella  
١٩٩٥) وعند نقصه فى إناث الفئران أنتجت فئراناً ذات نشاط حركى زائد  
(Raygada و Hilakeve ١٩٩٨).


أما نقص  $w_6$  بالنسبة إلى  $w_3$  فأدى إلى صغر حجم مخ الفئران ورأسها  
بالنسبة لجسمها (Huang وآخرون ١٩٩٢) وبالنسبة لزيادة  $w_6$  فتسببت بإصابة  
الفئران بالعدوانية (Hilakivi وآخرون ١٩٩٦) أما نقص  $w_6$  فجعل الفئران أكثر  
عرضة للتأثر بسموم البيئة وسموم الغذاء (منظمة الصحة العالمية / منظمة الأغذية  
والزراعة ١٩٩٧)، أما زيادة  $w_3$  مع نقص حامض arachidonic أثر على قدرة  
الفئران على التعلم (Lucas ١٩٩٧).

### تغذية الدهون حول العالم :

تختلف كمية الدهون فى غذاء الإنسان، ففي الدول المتقدمة توجد الدهون بما  
يعادل ٢٨ - ٣٧٪ من السعرات الكلية، أما فى بعض الدول النامية فإن نسبة الدهون  
١٨-٢٥٪. والدهون موجودة فى غذاء كل الناس، ولا تخلو أى وجبة من استعمال  
الدهون.

وقد تغير نمط استهلاك الدهون منذ فجر التاريخ حسب نوعية الغذاء المتاح،  
فقد حدثت تغيرات كبيرة منذ عصور ما قبل التاريخ عندما كان الإنسان يعتمد على  
صيد الطيور والحيوانات البرية مروراً بعصر الزراعة حتى الدخول فى عصر الصناعة  
(شكل ٣-٢٨).





شكل (٣-٢٨) تغير استهلاك الدهون منذ فجر التاريخ

\* المصدر : Robinson و Simopolous (١٩٩٩)

يوضح الشكل انخفاض استهلاك الدهون من المصادر الطبيعية وزيادة استهلاك الدهون المشبعة والأحماض الدهنية من عائلة w-6 وزيادة استهلاك الزيوت غير المشبعة المنافرة (trans) واستهلاك كمية بسيطة من عائلة w-3 تقل عن احتياج الفرد (Jonas ١٩٩٧) وكما سبق فإن هذا النمط من التغذية له آثاره السلبية على صحة الإنسان.

### متوسط استهلاك الدهون في العالم :

يوضح جدول (٣-١٣) متوسط نصيب الفرد من الدهون حول العالم بين

عامي ١٩٩٠ / ١٩٦١

جدول (٣-١٣) متوسط نصيب الفرد من الدهون ونسبة الطاقة المستمدة  
وفق المجموعات الاقتصادية\*

البلد	الدهون جم / فرد / يوم		التغير %	معدل الطاقة المستمدة من الدهون %	
	١٩٦١	١٩٩٠		١٩٦١	١٩٩٠
البلدان النامية	٢٨	٥٠	٧٨	١٣	١٨
أفريقيا	٣٨	٤٧	١٣	١٦	١٨
الشرق الأقصى	٢٢	٥	١٠٥	١١	١٦
الشرق الأوسط	٤٦	٧٢	٥٦	١٩	٢٢
أمريكا اللاتينية	٥١	٧٥	٤٧	٢٠	٢٥
البلدان المتقدمة	٩٣	١٢٨	٣٨	٢٨	٣٤
روسيا	٦٩	١٠٧	٥٥	٢٠	٢٨
إسبانيا	١٢٥	١٣٨	١٠	٣٦	٣٦
أوروبا	١٠٤	١٤٣	٣٧	٣٢	٣٧
أمريكا	١٢٤	١٥١	٢٢	٣٧	٣٧


\* المصدر FAO Agrostat PC 1993

ويتضح من الجدول أن معدل الاستهلاك قد زاد في الدول النامية بين عامي ١٩٦١ - ١٩٩٠ بنسبة ٧٨٪ في حين كانت الزيادة في الدول المتقدمة تعادل ٣٨٪. وهي تغيرات متباينة؛ فبعد أن كان نصيب الفرد في إفريقيا عام ١٩٦١ يفوق مثيله في الشرق الأقصى، حدث العكس عام ١٩٩٠. كما أن معدل الزيادة كان ضئيلاً في بعض البلدان مثل إسبانيا وأفريقيا.

أما نصيب الفرد من الدهون النباتية والحيوانية في بعض دول العالم حسب الدخل (شكل ٣-٢٩) يتضح من الشكل أن هناك زيادة مضطردة في البلاد التي يتراوح الدخل فيها بين ١٥٠ دولار و ٣٥٠ دولار. أما في البلاد التي يتراوح دخل الفرد السنوي فيها بين ٣٥٠ و ٧٠٠٠ دولار فوجد ازدياد حاد في إجمالي الدهن المستهلك بينما لم يطرأ أى تغيير في البلاد التي يقل الدخل فيها عن ٧٠٠٠ دولار.



أنه ارتفع عند نهاية القرن. وهذا يعكس التغير فى نوعية الأحماض الدهنية المستهلكة، الذى ينعكس بدوره على صحة الفرد ومدى إصابته بالأمراض المختلفة.



شكل (٣-٣) تغير استهلاك الدهون فى الولايات المتحدة

خلال القرن العشرين

المصدر : Robinson و Simopolous (١٩٩٩).

الباب الرابع  
**البروتينات**  
PROTEINS



## البروتينات

### PROTEINS

كلمة البروتين معناها الذى يأتى أولاً، وأول من أطلق هذا المصطلح هو Gerardus Nulder (١٨٠٢ - ١٨٨٢) وهو كيميائى داغركى، لأنه كان يعتقد أنه ليس هناك نقاش فى أن البروتين يدخل فى المركبات العضوية المعروفة. وقد حاول الكيميائيون الأوائل دراسة طبيعة المواد الحيوانية والنباتية بتقطير العينات المختلفة وقد أدى هذا إلى عمل جهاز الهضم البخارى Steam-digestor بواسطة Denis Papin (١٦٤٧ - ١٧١٢) الفيزيقي الفرنسى الذى وضع الأسس لدراسة البروتين، وصمم أجهزة لتنعيم العظام لاستخراج الجيلاتين... وقد استرعت المواد الجيلاتينية المستخرجة من العظام واللحوم، انتباه العلماء واعتبروها من المواد الحيوانية الحقيقية، وأطلقوا عليها اصطلاح مواد زلالية albuminous لتشير إلى المواد الحيوانية. وكان Mulder أول من ذكر أن المواد الزلالية تحتوى فى تركيبها البنائى على وحدة عامة أطلق عليها البروتين.

وجاءت بعد ذلك الكثير من الدراسات التى قام بها علماء فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين مما أدى إلى معرفة الكثير عن البروتين كما أدى إلى فهم طبيعته فى جسم الإنسان، بل لقد أمكن تكوينها.

ويوجد البروتين فى جسم الإنسان بنسبة ١٩٪ تقريباً وهى تلى نسبة الماء فى الجسم، ويوجد حوالى ٤٥٪ من بروتين الجسم فى العضلات muscles وحوالى ١٨٪ فى الهيكل العظمى skeleton، بينما يوجد فى الجلد بنسبة ١٠٪ وفى أنسجة التخزين adipose tissue بنسبة ٤٪ (جدول ٤-١).

جدول (٤-١) توزيع البروتين فى جسم الإنسان  
لفرد طوله ١٦٨ سم ووزنه ٥٣,٨ كجم


جسم	
١٠٠٠٦	البروتين الكلى (ن $\times ٦,٢٥$ )
٤٦٨٠	العضلات الإرادية
١٨٦٤	الهيكال العظمى
٩٢٤	الجلد
٤٦١	أنسجة التخزين
٧٥٠	هيموجلوبين
٢٥٠	ألبومين

وهذه البيانات مفيدة، ولكنها تكون أكثر فائدة إذا عرفت نسبة التجديد اليومى للخلايا بالجسم وكذا العوامل التى تقوم بدور فى هذا التجديد.

### تركيب البروتينات Composition of Proteins :


تتركب البروتينات من كربون (٥١-٥٥٪) وهيدروجين (٦-٧٪) وأكسجين (٢١-٢٣٪) ونيتروجين (١٥-١٨٪)، وقد يوجد كبريت (٣-٥،٢٪) وفوسفور وحديد ويود وكوبلت، ويعتبر النيتروجين من العناصر المميزة للبروتين حيث إنه لا يوجد فى الكربوهيدرات أو الدهون، بينما يوجد فى البروتين فى المتوسط بنسبة ١٦٪. وتوجد أنواع كثيرة من البروتين فى الطبيعة، وتختلف البروتينات سواء فى النبات أو الحيوان من نسيج إلى نسيج، كما تختلف الأنسجة المماثلة فى الأنواع المختلفة، والوزن الجزيئى للبروتين كبير يتراوح بين ٥٠٠٠، ٥٠٠٠٠٠، بعض البروتينات فى حالتها الطبيعية تذوب فى الماء وبعضها لا يذوب، ووحدة تركيب البروتين هى الأحماض الأمينية التى تتميز بوجود مجموعة كربوكسيلية  $\text{COOH}$  (Carboxyl group) ذات الخواص الحامضية ومجموعة أمينية  $\text{NH}_2$  (Amino group) بخواصها القاعدية، وتوجد المجموعتان على نفس ذرة الكربون. والتركيب الأساسى للحامض الأمينى هو (شكل ٤-١).





#### شكل (١-٤) التركيب الأساسى للحامض الأميني

حيث تمثل R الجزء الباقي من الحامض، ويوجد حوالى ٢٠ حامض أميني فى المركبات العضوية، وترتبط الأحماض الأمينية معاً فى جزئى البروتين برابطة بيبتيديّة (شكل ٢-٤).



#### شكل (٢-٤) الرابطة البيبتيديّة

حيث ترتبط المجموعة الأمينية من حامض أميني بالمجموعة الكربوكسيلية فى حامض آخر مع استبعاد جزئى ماء، وعند اتصال أى حامضين أمينيين بالرابطة البيبتيديّة فإنهما يكونان جزءاً من سلسلة بيبتيديّة peptide chain ويمكن أن يوجد الحامض الأميني بأى كمية وفى أى مكان من السلسلة البيبتيديّة، وهذه الأحماض الأمينية، رغم أن عددها ٢٠، إلا أنها تكون عدداً كبيراً لا يحصى من البروتينات المتنوعة الحيوانية والنباتية.

#### بناء البروتين Protein Structure :

تختلف البروتينات من حيث محتواها من الأحماض الأمينية كما تختلف فى كيفية بناء البروتين structure وتنظيم organization السلاسل البيبتيديّة. ويلاحظ أن خصائص البروتين ونشاطه الحيوى biological activity يعتمد على تركيب الأحماض الأمينية وتتابعها وتنظيم السلاسل البيبتيديّة. وقد أظهرت الدراسات أن بناء جزئى البروتين وتنظيمه له أربعة مستويات :

## ١- البناء الأولي Primary structure :

يقصد بالبناء الأولي دراسة الأحماض الأمينية الموجودة في الجزيء وكيفية تتبعها في السلسلة الببتيدية (شكل ٤-٣).

ويلاحظ أن تتابع الأحماض الأمينية قد يكون عاملاً مهماً في وظيفة البروتين ففي بعض الأمراض الوراثية مثل الأنيميا المنجلية Sickle cell anemia فإن ظهورها يرجع إلى استبدال أحد الأحماض الأمينية وراثياً في الهيموجلوبين وهذه الأنيميا تعمل على تحليل الدم وكرات الدم الحمراء وانسداد الأوعية الدموية وتجلط الدم.

## ٢- التركيب الثانوي Secondary structure :

ويقصد بالتركيب الثانوي هو شكل السلسلة الببتيدية حيث تلتف folds في صورة حلزونية ويثبت وضع السلسلة بواسطة روابط هيدروجينية (شكل ٤-٣ب).

## ٣- التركيب الثالثي Tertiary structure :


يشير هذا المستوى من البناء لدراسة كيفية التفاف السلسلة في تكوين قريب من الكروي أو البيضاوي (شكل ٤-٣ ج) مثل البروتينات الكروية globular أو في شكل قضبان rods مثل البروتينات الليفية fibrous.

وكذا يهتم بدراسة العلاقة بين مواضع الأحماض الأمينية في السلسلة ويثبت هذا الوضع بواسطة روابط هيدروجينية أو روابط ثنائية الكبريت disulfide.

## ٤- التركيب الرابعي Quaternary structure :

يرجع التركيب الرابعي في البروتين حالة احتوائه على اثنين أو أكثر من السلاسل الببتيدية وتثبت السلاسل بواسطة روابط هيدروجينية أو كهربية electrostatic أو ملحية salt bonds (شكل ٤-٣ د) وهذه البروتينات يطلق عليها اسم أوليجومر Oligomers، وكل سلسلة ببتيدية من هذا البروتين يطلق عليها بروتومر protomer، أو مونومر monomer. ومن أمثلة هذه البروتينات hemoglobin، والببسين pepsin.

وتلعب هذه الأوليجومرات دوراً هاماً ومنظماً في الخلية لأن كل بروتومر يمكنه أن يغير من شكله الخارجى وتنظيمه، وذلك حسب الظروف المحيطة مما ينتج عنه تغيير في خصائص الأوليجومر.



### شكل (٣-٤) التركيب البنائى للبروتين

#### أقسام البروتينات : Classification of Proteins

وقد قسم Kleiner & Orten (١٩٦٢) البروتينات إلى :

١- بروتينات بسيطة Simple Proteins

٢- بروتينات مركبة Compound Proteins

٣- بروتينات مشتقة Derived proteins

#### ١- البروتينات البسيطة :

وهى البروتينات التى تتكون من أحماض أمينية أو مشتقاتها، ومن أمثلتها:

- **البيومينات Albumins** : وهى بروتينات تذوب فى الماء وتتخثر coagulate بالحرارة، ويمكن ترسيبها بواسطة محلول الملح المركز. ومن أمثلتها لأكسالبيومين

Lactalbumin والبيرومين السرم Serum albumin. ويحمل البروتين شحنات سالبة وهو بروتين حامضى ودرجة التعادل الكهربى عند pH ٤,٧ نظراً لاحتوائه على حامض glutamic بنسبة كبيرة. وله خاصية امتصاص adsorption عالية للمجاميع القطبية وغير القطبية ولذا فهو ينقل العديد من المركبات كما أنه ينظم نقل السوائل من وإلى الخلية.

- **الجلوبيولينات Globulins**: وهى بروتينات تذوب فى المحاليل المخففة للأحماض والقلويات ولكنها لا تذوب فى الماء النقى أو المحاليل المركزة أو متوسطة التركيز للأملاح. وتتخثر بالحرارة، ومن أمثلتها جلوبيولين السرم. وهو من البروتينات المتعادلة، ودرجة التعادل الكهربى عند pH ٦ - ٧,٣. وله أنواع الفاجلوبيولين وبتاجلوبيولين التى تكون لبيوبروتينات الدم كما سبق. أما النوع الثالث فهو جاما جلوبيولين وهو مادة الأجسام المضادة antibodies.

- **الجلوتلينات Glutelins**: وهى بروتينات تذوب فى الأحماض أو القلويات المخففة ولكنها لا تذوب فى المحاليل المتعادلة وتتخثر بالحرارة. ومن أمثلتها جلوتين القمح glutenin هوردين hordenin الشعير وأرزنين oryzinin الأرز، ولكنها لا تذوب فى الكحول المطلق والماء.

- **البرولامينات Prolamines**: وهى بروتينات تذوب فى كحول تركيزه ٧٠-٨٠٪ ولكنها لا تذوب فى الكحول المطلق والماء والمحاليل المتعادلة، وهى غنية فى الأرجنين مثل هردين الشعير، زاین zein الذرة وجلالدين القمح gliadin ويتميز القمح بتكوين الجلوتين gluten وهو مكون من نوعين من البروتين هما الجلايدين والجلوتينين نتيجة العجن.

- **البيومينويدات albiominoids (Scleroproteins)**: وهى أساساً بروتينات مثل البروتينات البسيطة ولكنها لا تذوب فى المحاليل المتعادلة والأحماض والقلويات المخففة، ومن أمثلتها البروتينات فى الأنسجة الدعامية مثل الكيراتين keratin فى الشعر، الكولاجين Collagen وفيرين fibrin الجلطة الدموية والإلستين elasin فى جدر الأوعية الدموية. والكولاجين هو البروتين الأساسى فى الأنسجة الضامة ويمتوى على نسبة عالية من الأحماض الأمينية glycine و proline و hydroxy proline.

- **المستونات Histones** : وهى بروتينات تذوب فى الماء وفى المحاليل المخففة ولا تذوب فى محاليل الأمونيا المخففة، وتتخثر بالحرارة، ويغلب عليها فى تركيبها الأحماض القاعدية فهى غنية فى الحامض الأمينى lysine والأرجنين arginine. ودرجة التعادل الكهربى عند pH 9,5 - 12. وهو يرتبط مع DNA بنسبة 1 : 1 برابطة كهربية حيث يحمل المستون شحنة موجبة بينما يحمل DNA شحنة سالبة. ويوجد فى الكروماتين وهى تكوين النيكليوبروتين nucleoprotein وفى الريبوزومات ribosomes فى سيتوبلازم الخلية. وهو يدخل فى تكوين النيكليوسومات nucleosomes وهى وحدات تكوين الكروماتين chromatin. وهو يحافظ على ثبات تركيب DNA وله وظيفة تنظيمية يتدخله فى الشفرة المنقولة من DNA إلى RNA.

- **البروتامينات Protamines** : وهى ببتيدات عديدة تذوب فى الماء ومحلولة الأمونيوم ولا تتخثر بالحرارة ويغلب عليها فى تركيبها الأحماض الأمينية القاعدية وخصوصاً الأرجنين arginine الذى يكون 80٪ وتحمل شحنة سالبة وتوجد غالباً فى الخلايا وترتبط مع DNA ويمكن أن يحل محل المستونات فى بعض الخلايا التى لا تنقسم لأن ليس له وظيفة تنظيم DNA. وهو يحمل أسماء مختلفة حسب مصدره: Salmin من السلمون، bruttin من trout، clupin من herring، و scombrine من الماكاريل.

## ٢- البروتينات المركبة Compound Proteins (Proteids) :

وهى البروتينات التى يتحد معها مواد غير بروتينية prosthetic group ومنها:

- **نكليوبروتينات Nucleoproteins** : وهى بروتينات متحدة مع أحماض نووية nucleic acids مثل اتحاد (histone مع DNA) مثل nucleohistone وتوجد فى بعض الغدد والنواة والكروموسومات.

- **الجليكوبروتينات Glycoproteins** والبروتيوجليكانات Proteoglycans وهى بروتينات متحدة مع كربوهيدرات كما سبق.

- الفوسفوبروتينات Phosphoproteins وهى بروتينات يتحد معها مركبات بها فوسفور مثل كازين اللبن.
- الكروموبروتينات Chromoprotein: وهى بروتينات متحد معها مجموعة كروموفورية chromophoric group مثل الهيموجلوبين وسيتوكروم والفلافوبروتين.
- الليبوبروتينات Lipoproteins وهى الليبيدات متحد معها بروتينات كما سبق ذكره.
- البرتوليبيدات Proteolipids وهى بروتينات متحدة مع لبيدات وتوجد فى النخاع myelin كما سبق.
- الميتالوبروتينات Metalloproteins وهى البروتينات المتحد معها معادن مثل النحاس (سرولوبلازمين (Ceroplasmin) أو حديد (سيدروفيلين (Siderophilin).

### ٣ - البروتينات المشتقة Derived Proteins :

وهى المركبات التى تنتج من تحليل البروتينات مثل البروتوزات Proteoses، الببتونات Peptones والبيبتيدات، وهى سلاسل بيبتيدية تحتوى على اثنين وأكثر من الأحماض الأمينية.

#### البيبتيدات Peptides :

تحتوى البيبتيدات على اثنين أو أكثر من الأحماض الأمينية، وإذا احتوت على أكثر من عشرة أحماض أمينية فيطلق عليها عديدات البيبتيدات Polypeptides وعادة للسلسلة البيبتيدية طرفان يحتوى أحدهما على المجموعة الكربوكسيلية ويكتب على اليمين والطرف الآخر يحتوى المجموعة الأمينية ويكتب على اليسار. وحتى وقت قريب لم يعرف عن هذه البيبتيدات إلا القليل، وقد وجد أنها تؤدى فوائد عدة للجسم إلا أن لبعضها آثار ضارة. ومن البيبتيدات :

- ١ - كارنوسين Carnosine وهى سلسلة بيبتيدية ثنائية تحتوى على B-alanine وتوجد فى العضلات.
- ٢ - أنسرين anserine وهى سلسلة بيبتيدية ثنائية عبارة عن Carnosine يضاف له مجموعة ميثيل methyl وتوجد فى العضلات.

٣- جلوتاثيون Glutathione وهى سلسلة بيتتيدية ثلاثة تحتوى على الأحماض الأمينية glutamic acid و cystiene و glycine وتستخدم فى عمليات التأكسد والاختزال. كما أنها لازمة لفعل هرمون الأنسولين وبعض الإنزيمات.

٤- أكسيتوسين Oxytocin وهو أحد هرمونات الغدة النخامية وله دور فى انقباض عضلات الرحم وحركته وكذا فى إفراز اللبن. و Vasopressin وهو من هرمونات الغدة النخامية أيضاً وهو يؤثر فى درجة نفاذية الأنابيب والأوعية للمياه بالجسم وخصوصاً فى حالة الجفاف حيث يلجأ للجسم للاحتفاظ بالماء.

٥- بعض المضادات الحيوية antibiotics مثل: penicillin وهو مشتق من D-Valine أو Tyrocidine D-Cysteine و gramicidin.

### الأحماض الأمينية : Amino Acids

الأحماض الأمينية هى وحدة بناء البروتين، ويعرف منها حوالى ٢٠-٢٢ حامض أمينى أهمها:

Lysine	لايسين	Alanine	الالانين
Methionine	ميثايونين	Arginine	أرجنين
Phenylalanine	فينيل الانين	Aspartic acid	حامض الاسبرتيك
Proline	برولين	Cysteine	سستين
Serine	سيرين	Glutamic acid	حامض الجلوتاميك
Threonine	ثريونين	Glycine	جليسين
Tryptophan	تريوفان	Histidine	هستيدين
Tyrosine	تيروسين	Hydroxy proline	هيدروكسى برولين
Valine	فالين	Isoleucine	أيسولوسين
		Leucine	لوسين

### أقسام الأحماض الأمينية :

تنقسم الأحماض الأمينية حسب دخولها فى تركيب البروتين وتركيبها وخصائصها، وتحولها إلى كربوهيدرات أو دخول داخل الجسم (الميتابوليزم)، وقدرة الجسم على تكرينها.

**أولاً : تقسيم الأحماض الأمينية حسب دخولها فى تركيب البروتين :**  
تنقسم إلى قسمين :

- ١- أحماض بروتوجينية proteogenic وهى التى تدخل فى تركيب البروتين.
  - ٢- أحماض غير بروتوجينية non-proteogenic وهى التى لا تدخل فى تركيب البروتين ولكن تدخل فى تكوين مركبات نيتروجينية غير بروتينية.
- بالإضافة إلى ذلك فيوجد أحماض أمينية قليلة الوجود مثل هيدروكسي بروبيلين OH-proline وهيدروكسي ليسين OH-Lysine وحامض الستريك الأميني amino citric acid. كما يوجد أحماض أخرى لا تدخل فى تركيب البروتين ولكن توجد حرة فى الخلية وهى عبارة عن نواتج ميثابوليزم metabolites مثل أورثئين ornithine وسترولين citrulline وهى مركبات وسطية لتكوين الحامض الأميني الأرجنين arginine كما تدخل فى تكوين دورة اليوريا urea cycle وأيضاً حامض جاما بيوتريك γaminobutyric يوجد حرّاً ويعمل كناقل عصبي.

وحامض بتا ألانين B-alanine ويوجد فى حامض بنتوثينيك pantothenic acid المعروف الآن باسم فيتامين B الذى يعمل كمراقف إنزيم للعديد من التفاعلات. كما يدخل هذا الحامض فى تكوين سلاسل ببتيدية ثنائية تدخل فى تركيب العضلات مثل الكارنوسين. بعض الأحماض الأمينية التى لا تدخل فى تركيب البروتين موجودة فى النبات ولكنها تعتبر سامة بالنسبة للإنسان مثل B-canavanine و-cyanoalanine.

**ثانياً : تقسيم الأحماض الأمينية حسب تركيبها وخصائصها :**

تنقسم الأحماض الأمينية حسب شكل الهيكل الكربونى إلى أحماض ذات سلسلة مستقيمة وأخرى حلقة... كما فى شكل (٤-٢).




كما تنقسم حسب عدد المجموع الحامضية والقاعدية بها وذلك إلى أحماض متعادلة، وأحماض حامضية، وأخرى قاعدية (شكل ٤-٢).









جدول (٤-٢) تقسيم الأحماض الأمينية

Common Name	Chemical Name	Formula	
		Empirical	Structural

Neutral Amino Acids - Monoamino-monocarboxylic Amino Acids.

Aliphatic			
Glycine	Aminoacetic acid	$C_2H_5O_2N$	$NH_2CH_2.COOH$
Alanine	$\alpha$ -Aminopropionic acid	$C_3H_7O_2N$	$CH_3.CHNH_2.COOH$
Serine	$\beta$ -Hydroxy- $\alpha$ -aminopropionic acid	$C_3H_7O_3N$	$CH_2OH.CHNH_2.COOH$
Threonine	$\beta$ -Hydroxy- $\alpha$ -aminobutyric acid	$C_4H_9O_3N$	$CH_3.CHOH.CHNH_2.COOH$
Valine	$\alpha$ -Aminoisovaleric acid	$C_6H_{11}O_2N$	$\begin{array}{c} H_3C \\ \diagdown \\ CH.CNH_2.COOH \\ \diagup \\ H_3C \end{array}$
Leucine	$\alpha$ -Aminoisocaproic acid	$C_6H_{13}O_2N$	$\begin{array}{c} H_3C \\ \diagdown \\ CH.CH_2.CHNH_2.COOH \\ \diagup \\ H_3C \end{array}$
Isoleucine	$\beta$ -Methyl- $\alpha$ -aminovaleric acid	$C_6H_{13}O_2N$	$\begin{array}{c} CH_3.CH_2.CH.CNH_2.COOH \\   \\ CH_3 \end{array}$
Aromatic			
Phenyl-alanine	$\beta$ -Phenyl- $\alpha$ -aminopropionic acid	$C_9H_{11}O_2N$	 $CH_2.CNH_2.COOH$
Tyrosine	$\beta$ -Parahydroxyphenyl- $\alpha$ -aminopropionic acid	$C_9H_{11}O_3N$	 $CH_2.CNH_2.COOH$
Sulfur-containing			
Cystine*	Di-( $\beta$ -thio- $\alpha$ -aminopropionic acid)	$C_6H_{12}O_4N_2S_2$	$\begin{array}{c} CH_2CHNH_2.COOH \\   \\ S \\   \\ S \\   \\ CH_2CHNH_2.COOH \end{array}$ <p style="text-align: center;">Cystine</p> $\begin{array}{ccc} & 2H & \\ & \longleftrightarrow & \\ & 2 & \\ & SH & \end{array}$ <p style="text-align: center;">Cysteine</p>
Methionine	$\gamma$ -Methylthiol- $\alpha$ -amino-n-butyric acid	$C_5H_{11}O_2NS$	$CH_3.S.CH_2.CH_2.CNH_2.COOH$
Iodine-containing			
Iodogorgoic acid	3, 5-Diiodotyrosine	$C_9H_9O_3NI_2$	 $CH_2.CNH_2.COOH$

تابع جدول (٤-٢) تقسيم الأحماض الأمينية


Common Name	Chemical Name	Formula	
		Empirical	Structural
Triiodo-thyronine	$\alpha$ -[3, 5-Diiodo-4-(3'-iodo-4'-hydroxyphenoxy)phenyl-alanine]	$C_{15}H_{12}O_4NI_3$	
Thyroxin*	$\alpha$ -[3, 5-Diiodo-4-(3', 5'-diiodo-4'-hydroxyphenoxy)phenyl-alanine]	$C_{15}H_{11}O_4NI_4$	
<b>Heterocyclic</b>			
Tryptophan	$\beta$ , 3-Indol- $\alpha$ -amino-propionic acid	$C_{11}H_{12}O_2N_2$	
Proline	$\alpha$ -Pyrrolidine-carboxylic acid	$C_5H_9O_2N$	
Hydroxy-proline†	$\gamma$ -Hydroxy- $\alpha$ -pyrrolidinecarboxylic acid	$C_5H_9O_3N$	
Histidine	$\beta$ , 4-Imidazolyl- $\alpha$ -aminopropionic acid	$C_6H_8O_2N_3$	

**Acid Amino Acids - Monoamino-dicarboxylic Amino Acids.**


Aspartic acid	$\alpha$ -Aminosuccinic acid	$C_4H_7O_4N$	$HOOC.CH_2.CH(NH_2).COOH$
Glutamic acid	$\alpha$ -Aminoglutaric acid	$C_5H_9O_4N$	$HOOC.CH_2.CH_2.CH(NH_2).COOH$

تابع جدول (٤-٢) تقسيم الأحماض الأمينية

These amino acids also occur in proteins as the mono amides, asparagine and glutamine.



Asparagine



Glutamine

Basic Amino Acids - Diamino-monocarboxylic Amino Acids.


The first three are the hexone bases, each containing six carbon atoms.

Arginine	$\delta$ -Guanidyl- $\alpha$ -aminovaleric acid	$\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_4$	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N} \cdot \text{C} \cdot \text{NH} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CHNH}_2 \cdot \text{COOH} \\ \parallel \\ \text{NH} \end{array}$
Lysine	$\alpha, \epsilon$ -Diamino-caproic acid	$\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_2$	$\text{H}_2\text{NCH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CHNH}_2 \cdot \text{COOH}$
Hydroxy-lysine	$\alpha, \epsilon$ -Diamino-5-hydroxycaproic acid	$\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_3\text{N}_2$	$\text{H}_2\text{NCH}_2 \cdot \text{CHOH} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CHNH}_2 \cdot \text{COOH}$
Ornithine <sup>u</sup>	$\alpha, \delta$ -Diaminovaleric acid	$\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}_2\text{N}_2$	$\text{H}_2\text{NCH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CHNH}_2 \cdot \text{COOH}$
Citrulline <sup>u</sup>	$\delta$ -Carbamido- $\alpha$ -aminovaleric acid	$\text{C}_6\text{H}_{13}\text{O}_3\text{N}_3$	$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \diagup \\ \text{O} = \text{C} \\ \diagdown \\ \text{NH} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CHNH}_2 \cdot \text{COOH} \end{array}$


amphoteric electrolytes أمفوتيرية البكتروليتات  
نظراً لما تحمله من مجاميع حامضية وقاعدية كما سبق.

### المجاميع الحامضية Acidic groups :

carboxylic groups المجموعة الكربوكسيلية ١-



٢- المجموعة الأمينية التي تحمل بروتون protonated  $\alpha$ -amino group




المجاميع القاعدية Basic groups :


١- المجموعة الكربوكسيلية التي فقدت  $\text{H}^+$




٢- المجموعة الأمينية  $\alpha$ -amino group



ويوجد الحامض الأميني في المحلول في ثلاث صور (شكلى ٤-٤، ٥).



شكل (٤-٤) صور وجود الحامض الأميني في المحلول



**ثالثاً : تقسيم الأحماض الأمينية حسب تحويلها في الجسم إلى**

**كربوهيدرات أو دهون داخل الجسم (الميتابوليزم) :**

تنقسم الأحماض الأمينية حسب الميتابوليزم إلى :

١- أحماض أمينية جليكوجينية glycogenic وهى التى تعطى كربوهيدرات جلوكوز

جليكوجين وهى الأحماض : glycine, alanine, serine, threonine, valine, glutamic, aspartic, histidine, arginine, methionine, proline, hydroxyproline, cysteine.

٢- أحماض أمينية كيتوجينية ketogenic وأيضاً جليكوجينية هى : isoleucine, lysine, phenylalanine, tyrosine.

٣- أحماض كيتوجينية فقط هى : leucine.

**رابعاً : تقسيم الأحماض الأمينية حسب قدرة الجسم على تكوينها :**

تنقسم الأحماض الأمينية حسب قدرة الجسم على تكوينها حسب احتياجه

منها إلى: أحماض أمينية أساسية essential، أحماض أمينية نصف أساسية semi-essential وأحماض أمينية غير أساسية non-essential.

**الأحماض الأمينية الأساسية Essential Amino Acids :**

ظهر فى سنة ١٩٣٨ اتجاه جديد لتقدير القيمة التغذوية للبروتين، فقد كان

يجرى تغذية الفئران على البروتين المختبر كما كان يتبعها Osborn Mendel (سنة

١٩١١ - سنة ١٩٢٤) وذلك بعد أن عرف حوالى ٩ أحماض أمينية فى الفترة

(١٩٢٤ - ١٩٣٨) وأمكن عزلهم وكان William Rose فى جامعة Illinois

بالولايات المتحدة الأمريكية أول من أجرى تجاربه المشهورة على فئران Albino Rats

لدراسة القيمة التغذوية لكل حامض أميني على تحدة، حيث كان يدرس فى كل تجربة

أثر غياب أحد الأحماض الأمينية على نمو الفئران، وقد لاحظ أن نمو الفئران كان يتعثر عند غياب بعض الأحماض الأمينية، وإن كان غياب البعض الآخر لا يؤثر على النمو، ولذا فقد عرف أنه لا بد من وجود بعض الأحماض الأمينية في الغذاء وهو ما أطلق عليه اسم الأحماض الأينية الأساسية.

والأحماض الأينية الأساسية هي التي لا يمكن للجسم أن يكونها بالسرعة والكمية اللازمين لسد حاجة الجسم، ويلاحظ أن الإنسان إذا تناول كمية من الأحماض الأينية أكثر من احتياجه للبناء أو التجديد أو الصيانة، فإن هذا الجزء الزائد لا يخزن للاستفادة منه فيما بعد بل أنه إما أن يدخل في عمليات الميثابوليزم أو يخرج من الإنسان خارج الجسم كما ظهر من تجارب Brain & Stammers (١٩٥١) على الإنسان.

والأحماض الأينية الأساسية للشخص البالغ هي:

Tryptophan, Threonine, Phenylalanine, Methionine, Leucine, Isoleucine, Valine, Lysine.

أما للأطفال فإنهم بالإضافة إلى ماسبق يحتاجون إلى Histidine وأحياناً قد يكون Arginine أساسياً بالنسبة للأطفال، ولكن أظهرت تجارب (Holt ١٩٦١) أن Arginine حامض أميني غير أساسي بالنسبة للأطفال.

**الأحماض الأينية نصف الأساسية Semi-essential :**

يعتبر كل من Tyrosine و Cysteine أحماضاً أمينية نصف أساسية، حيث أنه لا يمكن للفرد تكويتها ولكن يمكن للجسم أن يقوم بتحويل الحامض الأميني Phenylalanine إلى Tyrosine وكذلك بالنسبة إلى Cysteine حيث يمكن للجسم أن يكونه من الحامض الأميني Methionine ويمكن أن يحل Tyrosine محل مقرررات Phenylalanine بنسبة ٥٠٪، وكذلك Cysteine يمكنه أن يحل محل Methionine بنسبة ٣٠٪.

ويشير Stroev (١٩٨٩) أن في بعض حالات يصبح arginine و histidine حامضين نصف أساسيين، حيث إنه في بعض الحالات لا يكون الإنسان كميات كافية منهما، ولذا ينبغي أن يحصل الإنسان على جزء منهما عن طريق الغذاء.

ولقيام الأحماض الأمينية بوظيفة البناء لابد من وجود كل الأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية معاً في وقت واحد وبالكميات اللازمة في مكان تخليق البروتين فإذا كانت كمية الأحماض الأمينية غير الأساسية غير كافية، فعلى الجسم أن يقوم بتكوينها أثناء عمليات الميثابوليزم.. أى أن تكوين البروتين لا يتوقف فقط على كمية الأحماض الأمينية الأساسية الموجودة بالغذاء، بل يتوقف أيضاً على السرعة التي يكوّن بها الجسم الأحماض الأمينية غير الأساسية.

### الأحماض الأمينية غير الأساسية Non-essential Amino Acids :

لا ينبغي أن يضلّلنا مصطلح، غير أساسى فنظن أنه يقلل من أهمية الأحماض الأمينية غير الأساسية ذلك لأن معناه فقط هو أن الجسم يمكنه أن يكوّنها حسب احتياجه، حيث يستطيع الجسم أن يحصل على الهيكل الكربونى Carbon Skeleton لهذه الأحماض الأمينية من النواتج الوسيطة لميثابوليزم الكربوهيدرات والدهون، ثم إضافة المجموعة الأمينية والتي يكون مصدرها إما الأمونيا أو حامض أمينى آخر (Forst ١٩٥٩)، وقد ظهر من تجارب التغذية على أمونيا بها  $N^{15}$  أن الأحماض الأمينية الأساسية يمكن أن تشترك في عملية تبادل الجاميع الأمينية Transamination باستثناء اللايسين والثريونين (Schoenheimer ١٩٤٦).

وعلى هذا يمكن تقسيم الأحماض الأمينية إلى ثلاثة أقسام: أحماض أمينية يجب وجودها جاهزة في الغذاء وهى Lysine وThreonine، وأحماض أمينية لابد من وجودها في الغذاء أو وجود الهيكل الكربونى ويمكن للجسم إضافة المجموعة الأمينية مثل باقى الأحماض الأساسية، أما القسم الثالث فهو الأحماض الأمينية غير الأساسية وهذه يمكن للجسم تكوينها أثناء عمليات الميثابوليزم.

وقد ثبت أن الجسم يمكن أن يكون هذه الأحماض الأمينية غير الأساسية، وذلك بعد إجراء تجارب تغذية كانت وجباتها تحتوى على سكر أو حامض Acetic بهما كربون مشع  $C^{14}$  أو ثانى أكسيد كربون  $O_2^{14}$ ، وقد وجد أن  $C^{14}$  من السكر أو حامض Acetic أو  $O_2^{14}$  قد ظهرت في الهيكل الكربونى للأحماض الأمينية غير الأساسية في اللبن وبروتينات الجسم والكبد، ولم تظهر في الهيكل الكربونى للأحماض الأمينية الأساسية (Black وآخرون سنة ١٩٥٢) و(Steale ١٩٥٢).

أى أن الفرق بين الأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية هو فى عدم مقدرة الجسم على تكوين الهيكل الكربونى للأحماض الأساسية. والهيكل الكربونى للأحماض غير الأساسية الذى يستعمله الفرد فى تكوين هذه الأحماض هو عادة مقابلات الكيتو Keto-analog فمثلا حامض البيروفيك Pyruvic يتحول إلى الحامض الأمينى ألانين alanine.

والأحماض الأمينية غير الأساسية تكون حوالى ٤٠٪ من أنسجة الجسم البروتينية ووجودها فى الغذاء توفر الأحماض الأمينية الأساسية للقيام بوظائفها فالأحماض الأمينية غير الأساسية تمد الجسم بالنيروجين اللازم لعمل مركبات نيروجينية فى الجسم، وقد أظهرت التجارب أن التغذية على الأحماض الأمينية الأساسية فقط أدى إلى أن سرعة النمو كانت أبطأ عنه فى حالة التغذية على كل من الأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية معاً، وأصبح الاهتمام الآن أن تكون هناك نسبة بين الأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية فى الغذاء.

### خصائص البروتين :

تتوقف خصائص البروتين حسب طبيعة تركيب البروتين الثانى وحسب تنظيم محتواه من الأحماض الأمينية التى تؤثر فى خصائصه الطبيعية والكيميائية.

### أولاً: خصائص البروتين حسب طبيعة التركيب الثانوى :

تختلف البروتينات حسب طبيعتها تبعاً لتركيبها الثانوى إلى بروتينات ليفية Fibrous (Sclero proteins) وبروتينات كروية Globular.

### البروتينات الليفية Fibrous proteins :

وتتكون من سلسلة بيبتيديدة ملفوفة حيث ترتبط الأحماض الأمينية برابطة بيبتيديدة، وتوجد هذه البروتينات فى الأنسجة الواقية والأنسجة الدعامية مثل الجلد والشعر والريش والحراشيف. وهذه البروتينات لا تذوب فى الماء ويصعب هضمها، وهى مهمة فى التصنيع فمثلاً يمكن استخراج بعض المركبات النيروجينية منها مثل الجيلاتين ومن أمثلتها كراتين keratin الشعر والكولاجين فى الأنسجة الضامة وميوسين myosin العضلات والفيبرين fibrin فى الجلطة الدموية والالستين elastin فى الأوعية الدموية.



## البروتينات الكروية Globular proteins :

وتوجد هذه البروتينات فى سوائل الخلايا حيث توجد فى محلول إما حقيقى أو غروى ومن أنواعها كازنوجين اللبن casinogen والبيومين البيض albumin ومن ناحية التغذية فإن هذه البروتينات تحتوى على نسبة كبيرة من الأحماض الأمينية الأساسية.

## ثانياً : خصائص البروتين الطبيعية والكيميائية :

تتوقف خصائص البروتين الطبيعية والكيميائية على محتواها من الأحماض الأمينية وتنظيمها منها :

### ١- الخاصية الأنفوتيرية Amphoteric Property :

وهى خاصية مميزة للبروتين نظراً لمحتواها من أحماض أمينية حامضية وقاعدية التى تحتوى على المجموعة الأمينية والمجموعة الكربوكسيلية التى توجد على سطح البروتين. وترجع الخاصية الحامضية إلى وجود أحماض glutamic, aspartic بينما ترجع خاصية القاعدية إلى أحماض lysine, arginine, histidine. أما مجموعة SH لحامض Cysteine والمجموعة phenolic لحامض tyrosine فهى ضعيفة التأثير. وتتوقف شحنة البروتين على درجة تأين المجموع الحامضية التى تحمل شحنة سالبة والمجموع القاعدية التى تحمل شحنة موجبة. وعندما يتساوى عدد الشحنات السالبة والموجبة يكون الفرق بين الشحنات يساوى صفر، وهى نقطة التعادل الكهربى iso electric point ودرجة pH فى البروتينات المتعادلة تساوى (7) وفى البروتينات الحامضية تساوى ( $7 >$ ) وفى البروتينات القاعدية تساوى ( $7 <$ ).

متوسط نقطة التعادل الكهربى فى الخلية حول  $pH = 7.0$ ، ولذا ففى المحاليل الفسيولوجية ( $pH = 7.0 - 7.4$ ). ويحمل البروتين شحنة سالبة. وعندما يحمل البروتين شحنة سالبة داخل الخلية فإن الحموضة تتعادل بواسطة الكاتيونات catione غير العضوية.

### ٢- الخاصية الرغوية والاسموزية Colloidal and Osmotic Property :

يتسم سلوك البروتين فى السوائل بعدة مظاهر منها : محاليل البروتين فى الماء ثابتة ومتزنة، لا تتخثر ولا تحتاج لى مثبت بعكس المحاليل الرغوية. وهى محاليل

متجانسة لدرجة أنه يمكن أن يقال إنها محاليل حقيقية (Stroev ١٩٨٩). إلا أن ارتفاع الوزن الجزيئي للبروتين يكسب المحاليل بعض خصائص المحاليل الغروية منها :  
- خصائص ضوئية optical فالحاليل لها بريق opalescence ويمكنها أن تنشر scatter الضوء المرئي.

- انخفاض حركة جزيئات البروتين في السوائل، وهذه تتوقف على شكل البروتين أكثر من وزنه الجزيئي. فحركة البروتينات الكروية globular في السوائل أسرع من حركة البروتينات الليفية fibrous. وتعتبر حركة البروتين داخل الخلية من الأمور الهامة المحددة في وظائف الخلية، فمثلاً إذا اختفت هذه الحركة في أى مكان في الخلية وخصوصاً عند تخليق البروتين فإن هذا يؤدي إلى تكتل البروتين مما يعوق هذه الوظيفة.

- الخاصية الاسموزية osmotic property : لاتنفذ جزيئات البروتين عبر الجدر شبه المنفذ semi permeable نظراً لكبر كتلتها وهذه الظاهرة تولد الاسموزية osmosis والضغط الاسموزي osmotic pressure. ويتوقف الضغط الاسموزي لمحاليل البروتين المخففة على درجة تركيز البروتين في وجود الجدر شبه المنفذ. ولهذا فإن الضغط الاسموزي المتولد يتوقف على تركيز البروتين داخل وخارج الخلية. وانتفاخ swelling البروتين ينتج ضغطاً اسموزياً يطلق عليها oncotic.

- لزوجة محاليل البروتين viscosity :

يسبب البروتين -مثل غيره من الجزيئات الكبيرة- لزوجة المحاليل، وتزيد درجة اللزوجة بزيادة تركيز البروتين. وتتوقف درجة اللزوجة على شكل الجزيء ولهذا فالبروتينات الليفية تسبب لزوجة المحاليل أعلى من البروتينات الكروية. وتقل اللزوجة بارتفاع درجة الحرارة. وتأثر اللزوجة كثيراً بالإلكتروليتات، كما أن وجود بعض الأملاح غير العضوية مثل أملاح الكالسيوم تزيد من اللزوجة. وعندما تزيد درجة اللزوجة فإن المحلول يتحول إلى الحالة الجيلاتينية.

- القابلية لتكوين جل Gelation :

تداخل جزيئات البروتين الكبيرة مكونة ما يشبه شبكة تحتجز داخلها الماء وهذا التركيب يسمى بالجل. وتكوين البروتينات اللاقية للجل أسرع من البروتينات

الكروية نظراً لشكل البروتين الذى يشبه القضيب، وهذا يساعد على تكوين أماكن اتصال بين الجزيئات.

وهذه الظاهرة مهمة لوظائف الخلية. فمثلاً الكولاجين وهو البروتين الموجود فى العظام والأربطة والغضاريف والجلد ... يتميز بالمرونة واللينة التى ترجع إلى هذه الخاصية التى تقل بتقدم العمر أو نتيجة ترسب أى أملاح. وأيضاً بروتين الاكثومايسين octomycin الموجود فى العضلات يساعد العضلة على الانقباض نتيجة لهذه الخاصية أيضاً.

### ٣ - تأدرت البروتين Hydration of protein :

إن البروتينات محبة للماء hydrophilic وعند وجود البروتين فى الماء فإن الجزيئات تنتفخ ثم تنفذ فى المحلول، وفى أثناء ذلك فإن جزيئات الماء تنفذ إلى داخل جزيئات البروتين وتتحد مع المجموع القطبية polar. ونتيجة لذلك تصبح عديدة السلاسل البيبتيدية أقل تماسكاً وقد تنفصل بعض جزيئات البروتين. ولكن هذا لا ينطبق على جميع البروتينات مثل الكولاجين.

وترتبط بعض جزيئات الماء مع السلسلة البيبتيدية بواسطة روابط هيدروجينية hydrogen bonds كما ترتبط جزيئات الماء مع السلاسل البيبتيدية التى لا تحتوى على مجموع قطبية polar كما فى الكولاجين. هذا الارتباط بالماء يسبب ابتعاد السلاسل عن بعضها إلا أن الروابط الهيدروجينية تمنع تمام انفصال جزيئات البروتين، لذا لا يذوب البروتين فى المحاليل. وفى حالة الكولاجين فإن التسخين يسبب انفصال بعض ألياف الكولاجين نتيجة تفكك الروابط بين الألياف وتذوب فى المحلول وتودى إلى تكوين جل gelation وتتأثر درجة ذوبان البروتين بعدة عوامل:

- محتوى البروتين من أحماض أمينية بها مجموع قطبية التى تؤثر على درجة الذوبان أكثر من الأحماض التى لا تحتوى على مجموع قطبية والبروتينات الكروية globular مثل الألبومين albumin فإنها أكثر ذوباناً فى الماء عن البروتينات الليفية fibrous مثل الكيراتين keratin.

- وجود شحنات على جزئى البروتين وطبقة ماء التأدرت المحيطة بالجزء، وهذه تسبب ثبات المحاليل ومنع تجمع جزيئات البروتين فى المحلول.

ولكن أحياناً عندما تحمل جزيئات البروتين عدداً كبيراً من الجوامع المتعارضة (anions و cations) فإنه يحدث ظاهرة متناقضة حيث أن هذه الزيادة تكون أماكن اتصال ملحية فيما يعرف بالكبارى الملحية salt bridges وهذه تعمل على تجمع البروتين وترسبه. وتتمنع هذه الظاهرة عند وجود أملاح متعادلة neutral salts بنسب بسيطة حيث أنها تعمل على إذابة البروتين فى الماء. لأن هذه الأملاح تتحد مع الشحنات المتعارضة على مجاميع البروتين؛ القطبية وتمنع اتصالها ببعض. ولكن لو زادت نسبة هذه الأملاح فإنها تعمل على ترسيب البروتين. كما أن حدوث أى تغير فى درجة حموضة الوسط pH فإنها تغير من ثبات محلول البروتين كما سبق. وكما أن درجة الحرارة تغير من ثبات محلول البروتين إلا أنه لا يوجد علاقة ثابتة فبعض البروتينات ترفع قابليتها للذوبان فى الماء أو المحاليل مثل الجلوبيولين globulin والبيسين pepsin وبعضها تقل درجة الذوبان بارتفاع درجة الحرارة مثل الهيموجلوبين hemoglobin.

#### ٤ - الدنترة Denaturation :

الدنترة هى إحداث تغير فى طبيعة جزيء البروتين، ويمكن إحداثها بواسطة الكحولات والأحماض والقلويات وأملاح معدنية ثقيلة، وأيضاً بواسطة الحرارة المعتدلة والتأكسد والأشعة فوق البنفسجية، وفيها يحدث تغير فى التركيب الفراغى لجزيء البروتين يودى إلى فقد الخصائص الطبيعية، وقد يبقى التركيب الكيميائى بدون تغير. والدنترة تغير غير عكسى، أى لا يمكن إرجاع البروتين مرة أخرى لحالته الطبيعية إلا فى حالات قليلة. ونتيجة عملية الدنترة يحدث انفراج لسلسلة البروتين ويصبح البروتين أسهل هضماً ويفقد خاصية الذوبان نظراً لظهور الجوامع الكارهة للماء hydrophobic، بعض البروتينات لا تتأثر بالحرارة، مثل تريسن Trypsin والكيموتريسين Chymotrypsin وبعض بروتينات جدر الخلية (Stroev ١٩٨٩).

#### ٥ - التخثر Coagulation :

وفيها يتحول البروتين بواسطة الحرارة العالية إلى حالة أكثر صلابة عنه فى حالة الدنترة، ويصبح البروتين أكثر هضماً، ويمكن أن يحدث التخثر الجزئى ميكانيكياً كما فى حالة ضرب بياض البيض وتكوين رغوة foam. والتخثر غير عكسى.

وتتخثر كثير من البروتينات عند تعرضها للحرارة العالية مثل حرارة الطهي وتغير صفات البروتين وتفقد خصائصها ووظائفها الإنزيمية والهرمونية ولا يمكن إرجاع هذه التغيرات إلى وضعها الأصلي.

### وظائف البروتين Functions of Protein (١):

يقوم البروتين بوظائف عديدة ومتنوعة في الجسم، إذ لا يقتصر دور البروتين على بناء الأنسجة فقط، بل يتعدى ذلك إلى القيام بأعمال الصيانة والمقاومة، كما يدخل في تركيب الإنزيمات والهرمونات والأجسام المضادة، كما يؤدي دوره في تنظيم بعض العمليات الحيوية بالجسم ويساعد على توليد الطاقة، فالبروتين له دور بنائي ووقائي وعلاجي بل وحيوي في أي جسم من الأجسام، ولذا فإنه يعتبر من الضروري أن يتوفر للجسم ما يحتاجه من البروتين حتى تتوفر للجسم كل عوامل الصحة وتستمر كل الأجهزة في أداء وظائفها بكفاءة تامة.

### - بناء أنسجة الجسم وصيانتها Body-Building & Maintenance Substance

يوجد البروتين في كل خلية من خلايا الجسم، ولكن تختلف طبيعته ووظيفته في خلايا الأنسجة المختلفة، فهو يقوم بوظائف دعامية supportive وبنائية structural، فمثلاً بروتين العضلات يساعد على تمدها وحفظ السوائل اللازمة ل تماسكها، بالرغم من أن العضلات تحتوي على ٧٥٪ على الأقل ماء. وبروتين الأنسجة الدعامية يميل إلى الصلابة ولا يذوب في الماء كوقاء خارجي للجسم، كما أن البروتين يساعد على مرونة Elasticity الأوعية الدموية اللازمة لحفظ ضغط الدم طبيعياً وبروتين الكولاجين يكون الشبكة التي ترسب فيها المعادن لتكوين أنسجة العظام والأسنان.

- يدخل البروتين في بناء الميتوكوندريا mitochondria وفي بناء جدر الخلايا.
- يكون البروتين الفيبرينوجين fibrinogen في سیرم الدم، فهو الذي يكون البناء الشبكي اللازم لتكوين الجلطة الدموية وإيقاف النزيف (Hemostatic function).

Nawar, (1975) (in Arabic), Astrov (1989), Gyton & Hall (1996).

- البروتين يخلص الجسم من المواد الضارة والسامة (detoxifying) نظراً لوجود  
المجاميع الوظيفية التي يمكنها أن تتحد مع المعادن الثقيلة وغيرها من المواد الضارة  
مثل بروتين البيومين albumin .

- يدخل البروتين كعامل مساعد في إتمام بعض الوظائف الوراثية cogenetic function  
عن طريق المساعدة في بناء الأحماض النووية nucleic acids عن طريق إنزيم  
DNA-polymerase كما يساعد في نقل التعليمات الوراثية من DNA إلى RNA  
عن طريق إنزيم DNA-dependent RNA polymerase .

- يعمل البروتين كمستقبل receptor على سطح جدر الخلايا لاستقبال مواد منظمة  
معينة regulators مثل مستقبل هرمون الجلوكاجن glucagon الموجود على سطح  
جدر خلايا الكبد.

- يعمل البروتين على تحويل الطاقة من صورة لأخرى energy converting مثل  
تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية، وذلك من خلال بناء إنزيم ATPase الذى  
يساعد في تكوين ATP الذى يدخل في تحويل الطاقة من صورة لأخرى.

- يعمل البروتين على الاستفادة من الطاقة الكيميائية لاستخدامها فى انقباض  
العضلات ميكانيكياً (mechano-chemical) مثل بروتين العضلات ميوسين  
myocin (ألياف العضلات الثابتة) وأكتين actin (ألياف العضلات المتحركة).

- بناء فرق جهد كهربى- أسموزى electro-osmotic عبر جدار خلية لإتمام بعض  
الوظائف ويتم ذلك بواسطة نشاط إنزيم  $Na^+ ATPase$  وإنزيم  $Ka^+ ATPase$  .  
- بناء الإنزيمات اللازمة لهضم الغذاء والإنزيمات التى تدخل فى عمليات الأكسدة  
والاختزال، وفى تخليق وهدم مركبات.

- بناء الأجسام المضادة جاما جلوبولين  $\gamma$ -globulin وللبروتين القدرة على تكوين  
antigen-antibody complex .

- يدخل البروتين فى بناء المخ وفى أداء وظائفه المختلفة وفى التعلم والتذكر من خلال  
نقل المثبرات العصبية وحمل الناقلات العصبية neurotransmitters من خلية عصبية  
لأخرى وتنظيم زمن فتح وغلق قنوات نقل الأيونات علاوة على توليد العديد من  
الناقلات العصبية.

- بناء الهرمونات مثل الإنسولين Insulin والثيروكسين Thyroxine والأدرينالين Adrenalin وهرمون الغدة فوق الدرقية Parathyroid gland وبعض هرمونات الغدة النخامية Pituitary gland.

ويتكون هرمون الثيروكسين من وحدتين من الحامض الأميني ثيوسين tyrosine مع اليود، وفاز Sanger ١٩٥٩ بجائزة نوبل عندما درس تتابع الأحماض الأمينية في الإنسولين، وتوصل إلى أن الهرمون الذي يتم تكوينه في البنكرياس يتكون من ٥١ حامضاً أمينياً في قسمين، أحدهما به ٢١ حامضاً، والآخر ٣٠ حامضاً.

### - بناء مركبات نيتروجينية غير بروتينية مثل :

\* قواعد البيورينات purines والبريميدينات pyrimidines اللازمة لبناء العديد من المركبات مثل DNA و RNA.

\* بناء مرافقات الإنزيمات اللازمة لإتمام العديد من التفاعلات مثل NADP, NAD.

\* الكارنتين carnitine من حامض methionine, lysine وهو ينقل الأحماض الدهنية إلى الميتوكوندريا لتوليد الطاقة.

\* الكرياتين creatine اللازم بعد تحوله إلى كرياتين فوسفات إلى إعادة بناء ATP من ADP لمد العضلات بما يلزمها من طاقة.

### - البروتين مادة منظمة للجسم Body Regulating Substance :

يدخل البروتين في تنظيم كثير من العمليات الحيوية في الجسم مثل حركة السوائل movement of fluids والكثير من التفاعلات بالجسم.

### \* حركة السوائل :

يلعب البروتين دوراً كبيراً في تنظيم حركة السوائل من وإلى الخلية، ومن وإلى الدم وتلعب بروتينات سيرم الدم - خصوصاً الألبومين albumin دوراً كبيراً في المحافظة على الضغط الأسموزي.

ويعتبر انخفاض تركيز بروتينات سيرم الدم أحد العوامل التي تسبب تراكم الماء في الأنسجة Edema وحيث أن السوائل تنتقل من التركيز الأقل إلى التركيز الأكثر، فإن المحافظة على الأسموزية يساعد الجسم على أنه يحافظ على التركيب الطبيعي للدم وسوائل الجسم.

## - صيانة التفاعلات الحيوية بالأنسجة:

### Maintenance of Normal Reactions in The Tissues :

يرجى بالجسم وسائل كثيرة للحفاظ على توازن الحموضة والقلوية بالجسم ويعتبر البروتين من العوامل المهمة للمحافظة على درجة حموضة الدم الخفيفة التي تميل قليلاً إلى القلوية وذلك بواسطة الفعل التنظيمي للبروتين فى بلازما الدم (Allison ١٩٥٣) وتميز بروتينات سيرم الدم مثل غيرها من البروتينات بالخاصية الامفوتيرية Amphoteric كما سبق. يمكنها أن تتحد الأحماض والقواعد، فمثلاً يلعب البروتين دور الحامض على درجات حموضة الدم pH العالية، ويتحد مع أى كاتيون Cation وخصوصاً الصوديوم وأيضاً يحمل هيموجلوبين الدم غاز ثنائي أكسيد الكربون وينقله إلى الرئتين للتخلص منه، وإذا لم يتخلص الفرد من ثنائي أكسيد الكربون فإنه يذوب فى الماء مكوناً حامض الكربونيك.

يدخل الإنسولين فى تنظيم عمليات ميتابوليزم الكربوهيدرات والبروتين والدهون.

كما يساهم البروتين فى التنظيم الجينى gene-regulatory حيث أن بعض البروتينات تساهم فى تنظيم ونقل التعليمات الوراثية مثل histones.

### - نقل العناصر الغذائية Transport :

يمكن للبروتين أن يتحد مع العناصر الغذائية وينقلها داخل الجسم بين الأنسجة أو إلى داخل الخلية مثل اتحاده مع الدهن ليكون ليبوبروتينات التى تنتقل فى الدم كما أن البروتين يتحد مع الحديد الممتص ويكون ترانسفيرين الذى يسهل حركة الحديد. وبروتين transacortin الذى ينقل هرمون corticosteroids، و myoglobin ينقل الأكسجين فى أنسجة العضلات.

### - البروتين مصدر للطاقة Energetic :

يمكن للفرد أن يستعمل البروتين لتوليد الطاقة فى الجسم كما سبق ذكره ويتوقف استعمال الفرد لهذا حسب كمية الكربوهيدرات والدهون الموجودة بالغذاء، وكذا يتوقف على الكمية الكلية للبروتين فى الغذاء، وفى حالة انخفاض كمية الكربوهيدرات والدهون فى الغذاء فإن الفرد يستعمل البروتين فى توليد الطاقة،



والجرام الواحد من البروتين يعطى عند احتراقه فى الجسم 4 كالورى، ولكن يلاحظ أن استعمال البروتين لتوليد طاقة يعتبر غير اقتصادى علاوة على أنه إجهاد للجسم من أجل التخلص من نواتج هذه العملية كما سبق.

### **وظائف بعض الأحماض الأمينية:**

تقوم الأحماض الأمينية بوظيفة البناء والصيانة، إلا أن بعضها يتميز بوظائف خاصة بالإضافة إلى البناء والصيانة ونوضح ذلك فيما يلى:

#### **- الجليسين Glycine :**

يدخل هذا الحامض الأمينى فى تركيب الهيموجلوبين والكرياتين Creatine وأحماض الصفراء Bile acids كما يدخل فى تركيب السلسلة البيثيدية الثلاثية جلوتاثيون Glutathione كما سبق ذكره والتى تتكون من حامض glycine و glutamic و cysteine، وتدخل هذه السلسلة البيثيدية فى عمليات التأكسد والاختزال فى الجسم. كما تعتبر مادة ممانعة للتأكسد antioxidant التى تحمى الجسم من العديد من الأضرار.

ويستعمل الجليسين أيضاً فى مساعدة الجسم على التخلص من بعض السموم التى تدخل الجسم عن طريق الفم، فمثلاً حامض البنزويك Benzoic acid يتحد مع الجليسين ويكون حامض هيبوريك Hippuric acid فى الكبد، ثم يتخلص منها الفرد فى البول.

ويعتبر من الناقلات العصبية transmitter الذى يفرز فى بعض الحالات فى الوصلات العصبية للتأثير على مستقبلات بروتين لمنع نقل أيونات عبر الوصلات القطبية synapse وذلك بفتح بوابات channels نقل هذه الأيونات عند اللزوم.

#### **- حامض جلوتاميك Glutamic acid :**

يلعب glutamic acid دوراً هاماً فى عمليات الميتابوليزم بالجسم وله أهميته فى صناعة الأغذية. ويدخل فى تركيب بعض البروتينات مثل الألبومين السيرم. كما يتكون منه داخل الجسم الحامض الأمينى جلوتامين glutamine وهو عامل مهم فى التخلص من المركبات النتروجينية لأن بقاها فى الدم يضر بالجسم. وهو من الموصلات العصبية التى تثير نقل الأيونات عبر الوصلات العصبية.

كما يكون حامض جاما يتركب  $\gamma$ -butric (GABA) وهو ناقل عصبى يتكون فى الرصلات العصبية كما يوجد فى المخ.

#### - الميثاينونين والسيستين والسستين Methionine, Cysteine & Cystine :

يعتبر methionine مصدرًا أساسيًا للكثيرت فى الجسم ويوجد الكثيرت فى الدم وفى هرمون الإنسولين. ويدخل cysteine فى تركيب السلسلة الببتيديّة جلوتاثيون glutathione وفى تركيب الإنسولين. ويدخل methionine فى بناء العديد من المركبات مثل كرياتين creatine والكارتين carnitine. كما أن methionine مصدر لمجموعة الميثيل methyl التى تدخل فى العديد من المركبات مثل الفوسفوليبيدات التى تلعب دورًا هامًا فى حركة الدهون كما تدخل فى تركيب الخلية.

#### - اللايسين Lysine :

يدخل lysine فى تركيب العضلات وبعض البروتينات مثل histone كما يدخل فى تركيب الكارتين carnitine.

#### - الفينيل ألانين والتيروسين Phenylalanine & Tyrosine :

يدخل حامض phenylalanine و tyrosine فى تكوين هرمون الابنفيرين ونورالابنفيرين ويقومان بالعديد من الوظائف منها تنظيم مستوى جلوكوز الدم. كما يدخلان فى قرنية العين وفى تكوين ناقلات عصبية catecholamine ومنها dopamine الموجودة فى الرصلات العصبية وفى الجهاز العصبى المركزى hypothalamus وفى جهاز ليمبيك limbic المسئول عن العديد من وظائف المخ منها المتعلقة بعمل العضلات وعضلة القلب وأيضًا الوظائف المتعلقة بالسلوك والعواطف. ويعتبر dopamine من الموصلات العصبية التى تمنع نقل بعض أيونات عبر الرصلة العصبية.

#### - التربتوفان tryptophan :

يمكن للجسم أن يحوله إلى أحد فيتامينات مجموعة "B" المعروفة باسم niacin بنسبة ٦٠ : ١، كما يستعمل فى تكوين مادة حماسى هيدروكسى تربتامين 5-Hydroxy tryptamine (5-HT) وهى مادة فسيولوجية موجودة فى كثير من أنسجة الجسم وفى خلايا الغشاء المخاطى وفى صفائح الدم وعند احتياج الجسم

لتكوين جلطة دموية Blood-clot فإن الصفائح الدموية تتكسر وتخرج مادة (5-HT) التي تمنع حدوث النزيف، وقد يكون ذلك عن طريق تأثيرها الذي يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية المجاورة.

كما يتحول التريوفان إلى مادة Serotonin وهو موصل عصبي لازم للمخ لأداء وظائفه. وهو من الموصلات العصبية الذي يمنع نقل تأثير الألم في الحبل الشوكي، كما أن له تأثير في تنظيم وتعديل المزاج mood كما يقوم بحفز الفرد للراحة والنوم.

#### **هستيدين Histidine :**

يتحول إلى مادة الهستامين Histamine، وهذه المادة توجد في كثير من الأنسجة كما توجد في القناة الهضمية، وهذه تشجع إفراز حامض الهيدروكلوريك في المعدة، وإذا وصلت هذه المادة إلى الجلد فإنها تسبب الحساسية.

#### **- البرولين والهيدروكسين بروتين Proline & Hydrxy proline :**

وتوجد بنسبة عالية في الكولاجين والأنسجة الضامة.

#### **- الأرجنين Arginine :**

وهو يدخل في دورة اليوريا Urea Cycle التي تساعد الجسم في التخلص من المواد النتروجينية من الدم لتخرج عن طريق البول.

#### **القيمة التغذوية للبروتينات The Nutritive Value of Protein :**

تختلف القيمة التغذوية للبروتين حسب محتواه من الأحماض الأمينية، وقد ظهر ذلك من تجارب (Osborne & Mendel ١٩١٥) حيث قاموا بتغذية فئران albino rats بالبروتين المختبر كمصدر الأساسي للبروتين، وقد ظهر أن بعض البروتينات مثلاً جلايدين القمح لا يمكنها إحداث النمو للحيوانات النامية حيث توقف نموها، وأن بعض البروتينات مثل زين الذرة لا تحدث النمو ولا الديانة بل أن بعض الفئران قد بدأت تفقد وزنها.

وعند إضافة الحامض الأميني لايسين إلى جلايدين القمح، لوحظ أن نمو الحيوانات قد بدأ وبإضافة الحامض الأميني tryptophan إلى زين الذرة فقط لوحظ أن ذلك قد ساعد على بداية الصيانة في الحيوانات، وعند إضافة lysine و tryptophan، تمكنت الفئران من النمو.

وبناء على ذلك فقد أمكن تقسيم البروتينات إلى :

### ١- بروتينات عالية القيمة الغذائية High Nutritive :

وهي التي يمكنها إحداث النمو والصيانة عندما تكون المصدر الوحيد للبروتين مثل كل البروتينات الحيوانية: السمك، اللحم، البيض، الدواجن (أما الجيلاتين بروتين حيواني ناقص حيث ينقصه الحامض الأميني تربتوفان) وبعض البروتينات النباتية مثل البقول والحبوب والمكسرات مثل جلوتين القمح وجلوتين الذرة.

### ٢- بروتينات منخفضة القيمة الغذائية Low Nutritive Value :

وهي غير القادرة على إحداث النمو أو الصيانة عندما تكون المصدر الوحيد للبروتين مثل زاین الذرة والجلاتين.

٣- وهناك بعض البروتينات التي لا يمكنها أن تحدث النمو، ولكن يمكنها إحداث الصيانة إذا كانت المصدر الوحيد للبروتين مثل جلايدين القمح وهوردين الشعير. والتقسيم السابق يمكن اعتباره تقسيمًا صناعيًا حيث أن تغذية الفرد على كمية بسيطة من بروتين عالي القيمة الحيوية، فإن ما ينتج عنها لا يختلف عما يحدث نتيجة التغذية على بروتين منخفض القيمة الحيوية.

### تقدير القيمة الغذائية للبروتين Evaluation of Protein Quality :

كانت هناك محاولات كثيرة خلال منتصف القرن العشرين لقياس القيمة الغذائية للبروتين ومخاليط البروتين في غذاء الإنسان، وقد صممت كثير من التجارب التي تقيس القيمة الغذائية للبروتين كمحاولات لحل بعض المشكلات الخاصة في هذا المجال، فهناك اختلاف في القيمة الغذائية للبروتينات التي تحتوي على محتوى متشابه من الأحماض الأمينية وكذلك اختلاف في قيمة البروتين لأمينات مختلفة مأخوذة من نفس البروتين، ويمكن قياس القيمة الغذائية للبروتين إما بطرق حيوية أو كيميائية. وتتميز الطرق الحيوية بأنها دقيقة حيث أنها تعطي نتائج أقرب إلى الواقع نظرًا لإجرائها على كائنات حية. وتكاليفها منخفضة نسبيًا وسهلة الإجراء ولا تحتاج عند تنفيذها إلى مؤهلات عليا كما أنه يمكن عن طريق استخدام الحيوان للتأكد من خلو الغذاء من أي مادة ضارة أو سامة قبل استخدامها في غذاء الإنسان. إلا أن تصميم التجارب هو الذي يحتاج إلى مؤهل خاص وخبرة وتحتاج لوقت طويل نسبيًا حتى يمكن الحصول على نتائج.

أما بالنسبة للطرق الكيميائية فإنها تتميز بأنها سريعة ويفضل استخدامها قبل الطرق الحيوية حيث تستعمل نتائجها في تصميم التجارب إلا أنها باهظة التكاليف وتحتاج إلى خبرة وتأهيل عالي كما أن النتائج قد تكون مختلفة عن الواقع نظراً لأن تحليل الغذاء في المعمل يختلف عن تحليل الغذاء داخل الجسم.

### **دورة النيتروجين في جسم الإنسان :**


إن دراسة القيمة التغذوية للبروتين تعنى دراسة قدرة البروتين على إحداث النمو والصيانة، أى تقدير كمية البروتين المحتجز داخل الجسم وهذا يتطلب تقدير البروتين المتناول.

عندما يتناول الفرد بروتين الغذاء فإنه يمر بعملية الهضم (كما سيأتى ذكره)، أما الجزء غير المهضوم فإنه يخرج خارج الجسم مع البراز بينما يمتص الجزء المهضوم ليستخدمه في البناء والصيانة، كما أن الجزء الممتص الذى لم يستخدم فى البناء والصيانة فإنه يخرج مع البول.

وعادة تتبع طريقة Kjeldahl لتقدير البروتين عن طريق النيتروجين وحسب ما سبق بأن الفرق بين نيتروجين الغذاء والنيتروجين الموجود فى البراز Fecal Nitrogen يمثل النيتروجين الممتص، والفرق بين النيتروجين الممتص والنيتروجين الخارج فى البول يمثل النيتروجين المحتجز فى الجسم.

ولكن يلاحظ أن النيتروجين الخارج من البراز ليس كله مصدره الغذاء، فهناك مصادر داخل الجسم لنيتروجين البراز مثل نيتروجين العصارات الهاضمة غير الممتصة وكذا نيتروجين الغشاء المخاطى المبطن للأمعاء Mitchell & Bertl (١٩٥٦) وهذا النيتروجين الذى يخرج مع البراز يعرف باسم نيتروجين البراز المتأبولى Metabolic fecal nitrogen وبالنسبة للنيتروجين فى البول، فليس مصدره الغذاء فقط، بل أن له مصادر داخلية فى الجسم مثل النيتروجين الناتج من الأنسجة الداخلية للجسم نتيجة تجديدها، ويخرج هذا النيتروجين فى البول ويسمى نيتروجين البول المتأبولى Urinary metabolic nitrogen ولتقدير النيتروجين الخارج فى البراز والبول ويكون مصدره الغذاء، يعطى الفرد غذاء خال من النيتروجين Nitrogen - Free diet

لمدة كافية، ثم يقدر النيتروجين في البراز والبول الذي هو بالتأكيد مصدره الجسم، ومنه يمكن تقدير النيتروجين الخارج في البراز والبول ومصدره الغذاء ويوضح شكل (٤-٥) دورة النيتروجين في جسم الإنسان.



شكل (٤-٥) دورة النيتروجين في جسم الإنسان

## الطرق الحيوية Biological methods لتقدير القيمة التغذوية للبروتين<sup>١</sup> :

إن وظيفة البروتين هو مد الفرد بالأحماض الأمينية اللازمة التي تفسى باحتياجاته لتخليق أنسجة البروتين للنمو والصيانة، ولبناء المركبات النيروجينية اللازمة، وللمقابلة احتياجات الميتابوليزم الأخرى. وتعتبر القيمة التغذوية للبروتين مؤشراً عن مدى قدرة البروتين لمقابلة احتياجات الإنسان. وقد اشتغل باحثون كثيرون لوضع طرق لقياس القيمة التغذوية للبروتين منهم Boas-Fixen (١٩٣٥) و Allison (١٩٥٥) و Albanese (١٩٥٩).

وكان Wilcock و Hopkins (١٩٠٦) هما أول من اكتشف أن تغذية الفيران على بروتين الذرة زاین (Zein) كالمصدر الوحيد للبروتين أدت إلى انخفاض وزن الفيران ثم موتها، وأن إضافة الحامض الأميني tryptophan أدت إلى خفض نسبة الوفيات إلا أنها لم تحسن النمو. تلى ذلك دراسات بواسطة Mendel و Osborne (١٩١٢ و ١٩١٤)، Rose (١٩٣٨) الذين اكتشفوا طبيعة الأحماض الأمينية.

وبعد توصل Rose ومساعديه إلى معرفة وتحديد الأحماض الأمينية الأساسية للفيران أصبحت تجارب قياس القيمة التغذوية للبروتين بالطرق الحيوية متاحة.

ويمكن قياس القيمة التغذوية للبروتين باتباع الطرق الحيوية، ولو أنه يفضل إجراء التجارب على الإنسان سواء أكان طفلاً أو بالغاً إلا أن التجارب المبدئية تجرى على حيوانات نامية أو بالغة حسب الغرض من التجربة، وتصمم الوجبات الغذائية التي تقدم للحيوان على أن يكون بروتين الغذاء هو المصدر الوحيد للبروتين، وأن تحتوى الوجبات على جميع العناصر الغذائية الأخرى اللازمة للحيوان من ناحية الكم ومن ناحية النوعية أو كيف يلى ذلك دراسة قدرة البروتين على إحداث النمو والصيانة حسب الغرض من التجربة، ولا زالت هذه الطرق فى حاجة إلى المزيد من الدراسة حيث أنه لم يتم الاتفاق بعد على أحسن الطرق لقياس القيمة التغذوية للبروتين.

---

<sup>١</sup> NAS, NRC, (1963), RAO et al, (1964) Nawar, (1975), Ensminger et al (1995).

## طرق تقدير القيمة التغذوية للبروتين بناءً على :

- النمو وتغير وزن الجسم Growth and Body weight change
- التوازن النيتروجيني Nitrogen Balance
- محتوى الجسم من النيتروجين Body Nitrogen
- تجديد محتوى ومركبات الكبد والدم Regeneration of liver & blood constituents
- مستوى الأحماض الأمينية في البلازما Plasma Amino Acids
- مستوى الكبريت والنيتروجين في البول Urinary sulfur & Nitrogen levels

## أولاً : الطرق المبنية على النمو وتغير الوزن

Growth and Body Weight Change :

### ١- نسبة كفاءة البروتين (PER) Protein Efficiency Ratio :

وهي من الطرق التي تعتبر سهلة في إجرائها، وتستخدم على نطاق واسع وهي عبارة عن إيجاد قيمة الزيادة في وزن الحيوان النامي موضع التجربة ثم نقسم هذه الزيادة على عدد جرامات البروتين التي تناولها أى:

الزيادة في وزن الحيوان بالجرام: وتختلف سرعة نمو الحيوان باختلاف وزن البروتين المتناول بالجرام.

وباختلاف جنس الحيوان (ذكر أم أنثى) وعمره، وطول مدة التجربة... وعادة تجرى التجربة على ذكور فيران نامية لمدة ٤ أسابيع، وأن يحتوى الغذاء على بروتين بنسبة من ٩-١٠٪.

وهناك بعض الاعتراضات على استعمال هذه الطريقة، حيث أن كفاءة البروتين تختلف باختلاف نسبة البروتين في الغذاء، وبالإضافة إلى ذلك فإن الزيادة في وزن الحيوان لا ترجع إلى تكوين أنسجة بروتينية فقط، بل هناك زيادة في الوزن نتيجة تكوين دهون... إلخ وحيث أن كفاءة البروتين تختلف باختلاف مستوى البروتين في الغذاء، فإن درجة كفاءة البروتين التي تم الحصول عليها من الظروف المقننة للتجربة السابقة الذكر، لا تساعد على معرفة جودة البروتين عند تقديمه كغذاء للأطفال، كما



أن هذه الطريقة لا تأخذ في الاعتبار البروتين اللازم للصيانة، مع ملاحظة أن البروتين المتناو، يستخدم أولاً في صيانة الجسم، المتبقى هو الذى يستعمل في النمو (Nat Acad. Sci) (١٩٦٣).

وعند قياس كفاءة البروتين على الأطفال فإنه يتبع قياس الزيادة في الطول والوزن باستخدام المنحنى القياسى للأطفال والأوزان المناسبة، ولكن يؤخذ في الاعتبار أن هذه الطريقة لا توضح التغير في أجزاء الجسم المختلفة خصوصاً بالنسبة للدهن والماء (Kagan وآخرون ١٩٥٥)، كما أنه يصعب تقدير النمو الأقصى إلا أن قياس النمو بهذه الطريقة لازال من الطرق الشائعة الاستعمال.

## ٢- صافى احتجاز البروتين (NPR) : Net Protein Retention

استخدمت هذه الطريقة بواسطة Doell و Bender (١٩٥٧) وتأخذ في الاعتبار البروتين المستخدم في الصيانة.

عند استخدام هذه الطريقة تجرى تجربتين على مجموعتين من الحيوانات النامية المتماثلة - تعطى للمجموعة الأولى الغذاء المختبرى على البروتين التجريسي experimental. ويعطى للمجموعة الثانية غذاء خالى من البروتين Protein-Free وتراعى في التجربتين الشروط سابقة الذكر ونفس الخططوات، ويقدر متوسط زيادة الوزن بالجرام في التجربة الأولى، ثم يقدر متوسط النقص بالجرام في وزن الحيوانات في التجربة الثانية.

ويلاحظ أن الحيوانات في التجربة الثانية لم يكن متاحاً لها أى بروتين للنمو فلم يكن هناك أى زيادة، بل لم يكن متاحاً لها أى بروتين للصيانة فنقص وزنها وهذا النقص يعكس أو يعادل قدرة البروتين على الصيانة. ولهذا فإن هذا النقص بالجرام يضاف إلى الزيادة الحادثة في التجربة الأولى كما في المعادلة الآتية:

صافى احتجاز البروتين =

$$\text{صافى احتجاز البروتين} = \frac{\left[ \text{متوسط الزيادة بالجرام في وزن الحيوان في التجربة الأولى} \right] + \left[ \text{متوسط النقص بالجرام في وزن الحيوان في التجربة الثانية} \right]}{\text{كمية البروتين المتناول بالجرام في التجربة الأولى}} = \text{جم/جم بروتين}$$

وهذه الطريقة تعطى نتائج أدق من PER، لأنها تأخذ فى الاعتبار قدرة البروتين على الصيانة بجانب قدرته على النمو.

### ٣ - القيمة الإجمالية للبروتين Gross Protein Value :

تعطى هذه الطريقة مؤشراً عن قيمة البروتين التكميلية supplementary value. وقد كان Heima وآخرون (١٩٣٩) أول من اشتغلوا على هذه الطريقة ثم عدلت بعد ذلك بواسطة Carpenter وآخرون (١٩٥٧) باستخدام الكسايكيت الصغيرة. وتقيس هذه الطريقة قدرة مركز البروتين protein concentration كمدمع لبروتين الحبوب. وتجرى التجربة بتغذية الفئران على غذاء يحتوى على ٨٪ بروتين منخفض فى lysine لمدة أسبوعين كعينة ضابطة control. أما العينة التجريبية experimental فيقدم لها الوجبات السابقة مضافاً إليها ٣٪ بروتين مركز الحبوب. وتعكس الزيادة فى وزن الحيوان قدرة البروتين على إحداث النمو.

ويمكن استخدام هذه الطريقة باستخدام مسحوق بروتين السمك لقياس قدرة هذا البروتين كمدمع لأغذية منخفضة فى حامض lysine أو methionine.

### ٤ - الاستعادة والتعويض Repletion method :

أول من استخدم هذه الطريقة Cannon وآخرون (١٩٤٤) وتقاس قيمة البروتين بقدرته على استعادة نمو الفئران الخفض وزنها كثيراً نتيجة تغذيتها غذاء خالى من البروتين.


وبنى على أساس تغذية فئران نامية على غذاء خالى من البروتين ثم يقدم لها بعد ذلك البروتين أو خليط البروتينات المراد دراستها.

وقد عدل Rao وآخرون (١٩٦٤) هذه الطريقة حيث قاموا بتغذية فئران نامية غذاء خالى من البروتين لمدة عشرة أيام وقد انخفض وزن الحيوان بما يعادل ٢٥٪ ثم قدم لها الغذاء المحتوى على البروتين أو خليط البروتينات المراد دراستها لمدة عشرة. وأشار الباحثون أن نتائج هذه الطريقة تتفق لحد كبير مع نتائج طريقة PER.

### ٥ - مؤشر النمو النيتروجينى Nitrogen growth index :

التخادر الجزء المستقيم من المنحنى الذى يربط بين الزيادة فى وزن الجسم بالنيتروجين المتناول كما فى شكل (٤-٦) ويطلق على هذا الانحدار مؤشر النمو للنيتروجين، وتجرى التجربة على عدد من مجموعات الفئران النامية تغذى كل مجموعة على مستوى معين من البروتين.

إن نسبة كفاءة PER تختلف باختلاف مستوى البروتين المتناول. وتكون الكفاءة منخفضة عندما يكون البروتين المتناول منخفضاً لأن معظمه يعمل على سد حاجة الصيانة. وترتفع نسبة PER بارتفاع المتناول من البروتين حتى تصل إلى حد أقصى بعده فإن PER للبروتين الجيد تقل تدريجياً. أما فى حالة البروتينية المنخفضة القيمة الغذائية فإن PER تظل ثابتة.



شكل (٤-٦) دلائل مبنية على التغير فى وزن الجسم

٦- نسبة الانحدار slope ratio :

وفيهما تتناول الفيران أو الحيوانات النامية الغذاء بحرية ad libitum ويقدر الزيادة فى الوزن ويرسم منحنى يربط بين النمو والمتناول من البروتين ويستخدم انحدار المنحنى slope كمقياس لقيمة البروتين التغذوية.

ثانياً : الطرق المبنية على التوازن النيتروجينى :

Methods Based on Nitrogen Balance :

١- التوازن النيتروجينى Nitrogen Balance :

. يعرف التوازن النيتروجينى بأنه الفرق بين النيتروجين المتناول فى الغذاء ومجموع النيتروجين الخارج فى البول والبراز، فإن كان النيتروجين الداخلى يساوى

النيتروجين الخارج. فإنه يكون هناك ما يطلق عليه: التوازن النيتروجيني المتعادل Equilibrium وهذه الحالة تدل على أن البروتين الموجود في الغذاء يكفى للقيام بأعمال الصيانة أما التوازن النيتروجيني الموجب Positive Nitrogen balance فهو يدل على أن الفرد احتجز النيتروجين في جسمه لبناء أنسجته كما يحدث في حالة النمو أو في حالة الشفاء من بعض الأمراض أما إذا كان النيتروجين الداخلك أقل من النيتروجين الخارج فإنه يكون هناك ما يطلق عليه: التوازن النيتروجيني السالب Negative Nitrogen balance ومعناه أن الفرد يفقد النيتروجين من أنسجته ويقل وزنه، وهذا يدل على أن البروتين غير كاف كمًا ونوعًا (أو بعد الإصابة أو بعد العمليات الجراحية).

وطريقة التوازن النيتروجيني هي الطريقة الأساسية المتبعة لتقدير احتياج الفرد من البروتين، كما تستعمل في كثير من المستشفيات في الخارج لمعرفة هل يفقد الفرد من وزنه أم يزيد نتيجة اتباع وجبات خاصة.

ويلاحظ أنه في بعض الحالات يكون الفرد في حالة توازن نيتروجيني موجب ولكن بعض الأنسجة يزيد فيها النيتروجين أكثر من الأخرى، كما أن حالة التوازن النيتروجيني المتعادل لا توضح على وجه الدقة أن كل نسيج أخذ ما يلزمه من النيتروجين.

وتتميز طريقة التوازن النيتروجيني بأنها سريعة. وهي تقيس النيتروجين المحتجز وليس وزن الجسم الذى عادة يتأثر بكمية الماء أو الدهن في الجسم. ويتأثر التوازن النيتروجيني بنوعية البروتين ومستواه ومحتوى الغذاء من الطاقة. وتتطلب طرق التوازن النيتروجيني تقدير معامل الهضم (كما سبق).

وتجدر الإشارة إلى تعريف معامل الهضم الظاهري ومعامل الهضم الحقيقي.

$$\text{معامل الهضم الظاهري} = \frac{\text{النيتروجين المتناول في الغذاء} - \text{النيتروجين الخارج في البراز}}{\text{النيتروجين المتناول في الغذاء}} \times 100$$

أما معامل الهضم الحقيقي True Coefficient of digestibility فهو يساوى:

النيتروجين المتناول في الغذاء - (النيتروجين الخارج في البراز مطروحاً منه نيتروجين البراز المتبولي)

$$100 \times \frac{\text{النيتروجين المتناول في الغذاء}}{\text{النيتروجين المتناول في الغذاء}}$$

## ٢- القيمة الحيوية (BV) Biological Value :

يعتبر Karl Thomas (١٩٠٩) أول من استعمل هذا التعبير لقياس قدرة البروتين على إحداث الصيانة في الفرد البالغ، إلا أن Mitchell (١٩٤٢) أدخل تغييراً في هذه الطريقة لقياس قدرة البروتين على إحداث النمو والصيانة. أي أن القيمة الحيوية حسب طريقة Mitchell عبارة عن النسبة المئوية للنيتروجين المحتجز retained

$$\text{في الجسم بالنسبة للنيتروجين الممتص أى} \frac{\text{النيتروجين المحتجز}}{\text{النيتروجين الممتص}} \times 100$$

لحساب القيمة الحيوية حسب فكرة Mitchell فإنها تساوى:

$$100 \times \frac{\left[ \text{نيتروجين البراز مطروحاً منه} \right] - \left[ \text{نيتروجين البول مطروحاً منه} \right]}{\left[ \text{نيتروجين البراز المتناول} \right] - \left[ \text{نيتروجين البول المتناول} \right]}$$

وبلاحظ أن طريقة القيمة الحيوية (BV) لا تأخذ في الاعتبار النيتروجين المفقود أثناء الهضم ونتيجة عدم اكتمال عملية الامتصاص.

## ٣- صافي استخدام البروتين: (NPU) Net Protein Utilization :

وهي تمثل النسبة المئوية للبروتين المحتجز من النيتروجين المتناول في الغذاء:

$$100 \times \frac{\text{النيتروجين المحتجز}}{\text{النيتروجين المتناول في الغذاء}} \text{ أى تساوى}$$

$$100 \times \frac{\left[ \text{نيتروجين البراز مطروحاً منه} \right] - \left[ \text{نيتروجين البول مطروحاً منه} \right]}{\left[ \text{نيتروجين البراز المتناول} \right] - \left[ \text{نيتروجين البول المتناول} \right]}$$

النيتروجين المتناول من الغذاء

وبهذه الطريقة تقاس قيمة البروتين الحيوية ومعامل الهضم لأنها تأخذ في الاعتبار النيتروجين المفقود أثناء الهضم ونتيجة عدم اكتمال عملية الامتصاص أي أنها ناتج عن القيمة الحيوية (BV) ومعامل الهضم Coefficient of digestibility ويمكن تقديرها أيضاً من القيمة الحيوية BV × معامل الهضم.

ويوضح الجدول (٤-٣) مدى تقارب قيم صافى استخدام البروتين (NPU) على الأطفال وعلى الفيران النامية.

جدول (٤-٣) قيم صافى استخدام البروتين على الأطفال والفيران النامية

قيم صافى استخدام البروتين	بعض البروتين	
	الأطفال	الفيران النامية
١٠٠	٨٧	البيض
١٠٠	٩٥ ، ٨٥	لبن الإنسان
٨٠	٨١ ، ٧٩	لبن البقر
٥٤	٥٤ ، ٥٣	دقيق السمسم
٤٧	٥٧ ، ٥٣ ، ٥٢	دقيق الفول السوداني
٥٩	٥١ ، ٤٧	دقيق بذرة القطن

وعند تقدير صافى استخدام البروتين يجب أن تكون كمية الطاقة المتولدة عن الغذاء مناسبة للفرد حتى لا يقل مقدرة البروتين الغذائية وإذا أجريت تحت ظروف مقننه تسمى صافى استخدام البروتين المقننه NPU st، وعندما تكون نسبة البروتين فى الوجبة المقدمة للفرد مساوية للمستوى اللازم للصيانة أو اقل قليلاً فإن قيمة البروتين تسمى صافى استخدام البروتين الفعلى أو الإجرائى (Operative NPU (NPU op.

وقد استخدم Albanese وآخرون (سنة ١٩٥٦) المعادلة التالية لمقابلة الاختلاف فى وزن الجسم عند تقدير مدى الاستفادة من البروتين:

$$ب = \frac{و \times ن}{١٠٠٠}$$

حيث ب = مقدار الاستفادة من البروتين

و = مقدار التغير فى وزن الجسم بالجرام فى اليوم

ن = مقدار النيتروجين المحتجز فى الجسم ملليجرام / كجم

$$\text{ويمكن تعيين الاستفادة ب ر} = \frac{١ ب}{٢ ب}$$

حيث ب ١ = مقدار الاستفادة من البروتين المختبر، ب ٢ = مقدار الاستفادة

من بروتين اللبن المجفف.

واستعمال هذه الطريقة يعادل بين التفاوت فى وزن الجسم وبين قيمة النيتروجين المحتجز فى الأطفال، وهذا التفاوت يرجع إلى نقل سوائل الجسم من مكان إلى آخر بالجسم (Albanese وآخرون ١٩٤٧).

والزيادة فى الأنسجة النيتروجينية يمكن ارجاعها إلى نوعية الأحماض الأمينية المكونة للبروتين المختبر..

#### ٤ - تقييم بروتين الوجبة من حيث الكمية والنوعية باستخدام صافى البروتين :

لتقدير كمية ونوعية البروتين فى الوجبة فى معادلة واحدة استخدم Millel و Platt (١٩٥٩) المصطلح:

صافى استخدام البروتين الكلى للوجبة (NDPV) Net dietary Protein Value

وذلك بضرب:

كمية البروتين × صافى استخدام البروتين على النحو التالى:

صافى استخدام البروتين الكلى للوجبة = النيتروجين المتناول × ٦,٢٥ ×

صافى استخدام البروتين الفعلى (NPU<sub>OP</sub>).

#### ٥ - تقدير كمية البروتين بالنسبة للسعرات الكلية فى الوجبة عن طريق صافى استخدام NPU الفعلى :

كثيراً ما يسهل استعمال كمية السعرات المستمدة من البروتين فى الوجبة لتقدير كمية البروتين بالنسبة لسعرات الكلية فى الوجبة (Plett سنة ١٩٦١) وتسمى النسبة المثوية لصافى سعرات البروتين.


والنسبة المثوية لصافى سعرات البروتين Net Protein Calories :

$$\frac{\text{سعرات البروتين} \times ١٠٠}{\text{سعرات الوجبة الكلية}} \times \text{صافى استخدام البروتين الفعلى}$$

#### ٦ - مؤشر التوازن النيتروجينى The Nitrogen Balance Index :

يمكن تقدير قيمة البروتين الغذائية بإيجاد الارتباط بين التوازن النيتروجينى وبين النيتروجين المتناول فى الغذاء، ويمثل هذه العلاقة خط منحنى Curvelinear والجزء الأسفل من المنحنى مستقيم Linear كما فى شكل (٤-٧) وانحدار المستقيم الذى

يربط التوازن النيتروجيني بالنيتروجين الممتص يمثل القيمة الحيوية (BV) للبروتين أى نسبة النيتروجين المحتجز بالجسم من النيتروجين الممتص، وإذا استعمل النيتروجين المتناول بدلاً من النيتروجين الممتص، فإن القيمة تمثل صاف استخدام البروتين (NPU).



#### شكل (٤-٧) دلائل مبنية على التغير فى نيتروجين الجسم

ومؤشر التوازن النيتروجيني يختلف باختلاف محتوى البروتين من الأحماض الأمينية حسب متطلبات الجسم من البروتين اللازم للصيانة والنمو والحالة الفسيولوجية للجسم.

ومؤشر التوازن النيتروجيني للنيتروجين الممتص يحسب من المعادلة التالية:

$$ك = \frac{ب - أ}{ب}$$

ب = التوازن النيتروجيني

أ = النيتروجين الممتص

ب = النيتروجين الخارج أثناء فترة تناول غذاء خالى من البروتين

ك = انحدار الخط الذى يمثل مؤشر التوازن النيتروجيني للنيتروجين الممتص.



## ٧- إحلال البيض Egg Replacement :

أول من استخدم هذه الطريقة Murlin (١٩٣٨). وتبنى هذه الطريقة على أساس مقارنة التوازن النيتروجيني لمجموعتين من الأفراد عند تناولهم كميات متساوية من النيتروجين المستمد من الغذاء المختبر في المجموعة الأولى، ومن البيض في المجموعة الثانية. والمعروف أن القيمة الحيوية للبيض = ١٠٠ بناء على أن البروتين كله يمتص ولا يوجد فقد في البول. وقد وضع Mitchell (١٩٤٤) معادلة لحساب قيمة إحلال البيض replacement value في الفئران من المعادلة التالية :

$$\text{قيمة إحلال البيض} = ١٠٠ - \frac{\text{ب} - \text{ب}^٢}{\text{ل}} \times ١٠٠$$

حيث :

ب<sub>١</sub> = التوازن النيتروجيني للفأر الذي تغذى على البروتين المرجعى.

ب<sub>٢</sub> = التوازن النيتروجيني للفأر الذي تغذى من البروتين المختبر.

يلاحظ أن كمية الغذاء في ب<sub>١</sub> هى نفس كمية الغذاء التى تناولها الفار فى

ب<sub>٢</sub>.

ل = متوسط كمية N المتناول.

وقد استخدمها Mitchell لدراسة أثر التصنيع على الغذاء.

## ثالثاً : محتوى الجسم من النيتروجين

### Content of Body Nitrogen:

#### ١- نسبة احتجاز النيتروجين Nitrogen Retention :

كان McCollum و Simmond (١٩٢٩) أول من استخدم هذه الطريقة وفيها يقدر محتوى نيتروجين جسم الفئران عند ابتداء التجربة وعند نهاية التجربة بعد تغذيتها البروتين المراد تقدير قيمته، مع وجود عينة ضابطة. وتقدير نسبة احتجاز النيتروجين من المعادلة :

$$\% \text{ احتجاز النيتروجين} = \frac{\text{الزيادة فى نيتروجين الجسم بالجرام} \times ١٠٠}{\text{المتناول من النيتروجين بالجرام}}$$

#### ٢- طريقة Mitchell :

وضع Mitchell (١٩٢٢) طريقة أخرى لقياس صافى استخدام البروتين أو

النيتروجين في الفيران وهي بتغذية مجموعتين من الفيران، الأولى على البروتين المختبر بنسبة ١٠٪ بروتين، والثانية على غذاء خالي من البروتين، وذلك لمدة عشرة أيام. ثم تذبح الفيران ويقدر النيتروجين في الجثث بعد تجفيفها باستخدام جهاز كلداهل Kjeldahl وتستخدم المعادلة التالية :

$$\left[ \begin{array}{c} \text{نيتروجين المتناول بواسطة الفيران} \\ \text{التي تغذت على الغذاء الخالي} \\ \text{من البروتين} \end{array} \right] + \left[ \begin{array}{c} \text{نيتروجين الجسم} \\ \text{في حالة الغذاء} \\ \text{الخالي من البروتين} \end{array} \right] - \left[ \begin{array}{c} \text{نيتروجين الجسم} \\ \text{في حالة الغذاء} \\ \text{التجريبى} \end{array} \right]$$

النيتروجين المتناول بواسطة الفيران على الغذاء التجريبى

ثم وضع Bender و Miller (١٩٥٣) معادلة يمكن بواسطتها حساب النيتروجين من محتوى الماء في جسم الفأر وهى :

$$Y = 0.024X + 2.92$$

حيث

Y = نسبة النيتروجين إلى الماء

X = عمر الحيوان باليوم

وأشاروا أن النسبة بين النيتروجين إلى الماء ثابتة في العمر المعين.

وتتطلب هذه الطريقة تساوى مجموعات الفيران في الوزن.

### ٣ - استعادة نيتروجين الجسم Nitrogen Repletion :

وضع Humphrey و Cannon وآخرون (١٩٤٤) أسس هذه الطريقة وعدلها

Rao وآخرون (١٩٦٤). وذلك بتقدير كمية النيتروجين المحتجز أثناء فترة الاستعادة

أو التعويض، وهذا يعكس القيمة التغذوية للبروتين حسب المعادلة :

$$\text{القيمة التغذوية للبروتين} = \frac{\text{النيتروجين المحتجز أثناء فترة التعويض}}{100} \times \text{النيتروجين المتناول}$$

ويتم تغذية الفيران النامية ٤٠-٥٠ جم وعمرها ٢٨ يوم، ويتم خفض

نيتروجين جسمها بتغذيتها على غذاء خالي من البروتين لمدة ١٠ أيام ثم تغذى بالغذاء

المختبر لمدة ١٠ أيام، ثم تقدر القيمة التغذوية للبروتين من المعادلة :

القيمة التغذوية للبروتين =

$$100 \times \frac{\left[ \text{نيروجين الجسم فى} \right] - \left[ \text{الجموعه التجريبية} \right]}{\left[ \text{تغذت على غذاء خالى من البروتين} \right]}$$

النيروجين المستهلك بواسطة الجموعه التجريبية

ويشير Rao وآخرون أنه يمكن استخدام هذه الطريقة لتقدير قيمة البروتين فى حالة معالجة مرض كواشير كور حيث يعطى الطفل بروتين بنسبة ١٥٪ فى الوجبة أى (٤,٥ ج بروتين / ١١٠ - ١٢٠ كالورى).

### رابعاً : تعويض وتجديد مكونات الدم والكبد :

#### Regeneration of liver & blood constituents :

تتوقف هذه الطرق على تجديد وتعويض مكونات الكبد والدم كمؤشر على قيمة البروتين التغذوية وقدرته على أداء بعض الوظائف الفسيولوجية.

#### الكبد :

##### ١- بروتين الكبد :

تعويض وتجديد بروتين الكبد: وضع Kosterlitz و Campbell (١٩٤٨) كيفية تقدير قيمة البروتين التغذوية على أساس قدرته على إعادة بناء بروتين السيتوبلازم المتغير labile فى خلايا كبد فيران بالغة بعد تغذيتها على غذاء خالى من البروتين والذى يؤدى إلى فقد معظم سيتوبلازم الخلية خلال يومين. وأن قدرة البروتين المتناول على إعادة بناء السيتوبلازم تتوقف على قيمة البروتين المختبر التغذوية. وتتلخص الطريقة فى تغذية فيران بالغة متوسط وزنها ٢٠٠ جم على غذاء خالى من البروتين لمدة ٤٨ ساعة، ثم تغذى بالغذاء المختبر على البروتين المختبر بنسبة ١٠٪ لمدة ٤ أيام. ثم تجرى الاختبارات اللازمة بتقدير المركبات النيتروجينية فى الكبد.

وقام Henry وآخرون (١٩٦١) بإدخال بعض تعديلات حتى يمكن استخدامها على الفيران النامية حيث جعل فترة التغذية على غذاء خالى من البروتين لمدة ٥ أيام وفترة التغذية على البروتين المختبر لمدة ١٠ أيام. واعتبر الزيادة فى بروتين

الكبد/ ١٠٠ جم من وزن الجسم عند بداية التغذية على البروتين هو مؤشر القيمة التغذوية للبروتين. وقد أشاروا أن استخدام الكازين كبروتين مرجعي reference هو الأنسب لأن استجابة الفيران تعكس كمية البروتين المتناول حيث كانت الاستجابة خطية linear بعكس بروتين البيض حيث كانت الاستجابة غير خطية non-linear. وأشاروا أن نتائج هذه الطريقة تتفق لحد كبير مع تجارب النمو. ويؤخذ على هذه الطريقة أن الاستجابة قد لا تعكس حالة البروتينات المتغيرة الأخرى في الكبد. كما أن هذه التجربة تحتاج إلى تجانس الفيران بدرجة كبيرة.

## ٢- إنزيمات الكبد :

كما يمكن استخدام إعادة بناء وتجديد إنزيمات الكبد كمؤشر على قيمة البروتين التغذوية كما أشار إليها Wainio وآخرون (١٩٥٣) بناء على ما ذكره Williams و Elevehjem (١٩٥٠) حيث وجدوا أن إنزيم Xanthine oxidase في الكبد حساس جداً لنوعية وكمية البروتين المتناول. ولهذا فإن إعادة بناء وتجديد هذا الإنزيم يستخدم كمؤشر على قيمة البروتين التغذوية. وأشار Litwack وآخرون (١٩٥٣) أن قيمة نشاط إنزيم Xanthine oxidase هي في حالة تغذية على الكازين تعادل ٥,٠، وفي حالة جلايدين القمح تعادل ٢,٠، جلايدين + lysine تعادل ٣,٢.

## الدم :

كان Kurr وآخرون (١٩١٨) أول من اكتشفوا أن الغذاء يؤثر على بروتينات الدم من حيث انخفاضها وتعويضها. وقد توصل Whipple وآخرون (١٩٤٧) أن القدرة على استعادة بروتينات الدم تختلف باختلاف البروتينات. أجريت بصده العديد من الدراسات بناء على هذه النتائج.

## ١- إعادة بناء وتجديد بروتينات البلازما :

استخدم Whipple وزملاؤه حيوانات وسحبوا بروتينات من دمها (plasmapheresis) ثم غذيت بالبروتين المختبر ووجدوا أن الحيوانات لم تستعيد بناء بروتينات الدم إلا في حالة وصولها إلى حالة توازن نتروجيني موجب. ووضع Melnick وآخرون (١٩٥٦) المعادلة التالية :

كمية بروتين البلازما التي سحبت من الحيوان في أسبوع

كمية بروتين البلازما التي أعاد الحيوان بناءها

بعد تغذيته على غذاء خالى من البروتين

### الزيادة في كمية البروتين المتناول

\* أشار Seely (١٩٤٥) أنه يمكن خفض بروتينات الدم عن طريق تغذية الفيران غذاء خالى من البروتين، ثم تغذيتها بالغذاء المحتوى على البروتين المختبر لمدة ٥ أيام حتى الوصول إلى توازن تثيروجينى موجب وبعد هذه الفترة يتم تغذية الفيران ثانياً بالغذاء الخالى من البروتين حتى الوصول إلى الحالة الأولى وهى غياب أو انخفاض بروتينات الدم. وترسم منحنيات ويطلق على مساحة المنطقة الواقعة تحت المنحنى التى توضح العلاقة بين كمية البروتينات المتكونة مع الزمن "مساحة الاستعادة أو التجديد" (repletion area) وقد أشار Weech وGottsch (١٩٣٨) أنه يمكن استخدام هذه الطريقة مع الكلاب لإعادة تجديد أو تعويض البيرمين والبلازما.

### ٢- إعادة وتعويض بروتينات البلازما والهيموجلوبين :

استخدم Whipple وMadden إعادة بناء وتعويض بروتينات البلازما والهيموجلوبين كمؤشر على القيمة التغذوية للبروتين فى تجارب على الكلاب تعرضت لنزيف وتم تغذيتها خلال هذه الفترة بغذاء منخفض فى البروتين أو خالى منه ولكن محتوية على نسبة جيدة من الحديد إلى أن وصلت كمية بروتينات البلازما إلى ٤-٥ جم والهيموجلوبين إلى ٦-٨ جم، ثم غذيت بالبروتين المختبر. وحسبت القيمة التغذوية للبروتين كما يلى:

البروتين الذى تم تعويضه

البروتين المتناول

= القيمة التغذوية للبروتين

ولوحظ أن نقص أى حامض أمينى يقلل من قدرة بروتين الغذاء على تعويض أو إعادة بناء بروتينات البلازما و/ أو الهيموجلوبين وهذا النقص يختلف من حامض أمينى لآخر. ولكن وجد فى الفيران أن نقص أى حامض أمينى يقلل من قدرة البروتين على إعادة بناء بروتينات البلازما باستثناء arginine.

### ٣ - إعادة بناء الهيموجلوبين :

استخدم Damodaran و Vijayaraghavan (١٩٤٣) فيران وزنها ٩٠ - ٩٥ جم مصابة بالأنيميا بعد حقنها بمادة phenylhydrazine. وغذيت بأغذية يمتزج كل غذاء على بروتين مختلف لمدة أسبوع أو اثنين ودراسة قدرة البروتين على إعادة بناء الهيموجلوبين، كمؤشر على قيمة البروتين التغذوية كما يلي :

الزيادة في الهيموجلوبين	الزيادة في عدد كرات الدم الحمراء
مستوى الهيموجلوبين عند ابتداء التجربة	عدد كرات الدم الحمراء عند ابتداء التجربة

### خامساً : بعض محتويات البلازما والبول :

#### Some Plasma and Urinary Constituents :

#### ١- الأحماض الأمينية في البلازما Plasma amino acids :

يتأثر مستوى الأحماض الأمينية في الدم بطبيعة نط الأحماض الأمينية المتناولة في الغذاء. في حالة تناول بروتين Zein وهو بروتين ذو نط غير متوازن وينقصه lysine و tryptophan فيحدث انخفاض في الأحماض الأمينية الحرة متبوعاً بارتفاع الأحماض الأمينية لعدد منها باستثناء lysine و tryptophan (Almquist ١٩٥٤).

وذكر Elvehjem و Denton (١٩٥٤) أنه يمكن اعتبار مستوى الأحماض الأمينية في الدم مؤشراً لقيمة البروتين التغذوية، لأن تركيز الأحماض الأمينية في البلازما وخصوصاً الوريد البابي يرتفع بسرعة بعد تناول الغذاء المحتوي على بروتين وأن مستوى الأحماض الأمينية في البلازما يعكس مستوى الأحماض الأمينية في الغذاء (Hause ١٩٥٨).

#### ٢- نسب الأحماض الأمينية Plasma Amino Acid Ratio (PAA) :

ومن جهة أخرى فقد وجد Longenecker و Hause (١٩٦١) في تجارب على الإنسان والحيوان البالغين أن التغير في مستوى الأحماض الأمينية في الوريد البابي بعد تناول البروتين عقب فترة صيام ارتباطاً ارتباطاً ضعيفاً مع محتوى البروتين من الأحماض الأمينية.

وأضافا أن تركيز الأحماض الأمينية الممتصة في بلازما الدم يتوقف على تركيز

الأحماض الأمينية فى البروتين وكذلك على سرعة امتصاص كل حامض أمينى، لأن هذه السرعة تتناسب مع احتياج الفرد لهذا الحامض. وعلى هذا الأساس بعد إجراء تجارب عديدة على الحيوان حسبت النسب بين الأحماض الأمينية PAA كما يلى :

$$\text{نسب الأحماض الأمينية} = \frac{1 - \text{ب}}{\text{ر}} \times 100$$

حيث :

أ = تركيز الأحماض الأمينية الأساسية فى البلازما بعد ١٨ ساعة صيام (ملجم/١٠٠ مل)

ب = مستوى الأحماض الأمينية لخمس عينات دم سحبت على مدى خمس ساعات وكانت الفقرة بين المرة والأخرى تعادل ساعة (ملجم / ١٠٠ مل).

ر = الاحتياج من كل حامض أمينى (جم/ ١٦ جم N). وكانت أقل نسبة تشير إلى الحامض الأمينى الحدى الأول ويليها كان الحامض الأمينى الثانى.

وهنا يشير Morrison وآخرون (١٩٦٠)، أن نسبة الأحماض lysine, threonine الحرة فى بلازما الدم تعتبر مؤشراً عن مدى كفاية lysine فى الغذاء. ويذكر Arroyave وآخرون (١٩٦١) أن زيادة الأحماض الأمينية فى بلازما الدم بعد تناول وجبة بروتين مقننة standard تتأثر بدرجة جودة البروتين الذى كان يتناوله الفرد قبل التجربة. وهذا يوضح أنه لابد من تقنين الوجبة التى يتناولها الفرد قبل إجراء هذه التجربة.

### ٣- مستوى الكبريت والنيتروجين فى البول :

#### Urinary Sulfur and Nitrogen Levels :

أظهرت العديد من الدراسات أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود علاقة واضحة بين الأحماض الأمينية فى البول وبين نمط الأحماض الأمينية فى الغذاء رغم أنه قد ظهر هذا الارتباط فى حالة مرض الكواشيوركور Kwashiorkor وهو مرض نقص البروتين الجيد فى الغذاء.

ومن جهة أخرى وجد أن مستوي بعض العناصر والمركبات فى البول مثل الكبريت والنيتروجين يعتبر مؤشراً على جودة البروتين.

ويعتبر تقدير مقدار الكبريت الخارج في البول مؤشر على قيمة البروتين التغذوية كما أشار Naismith و Miller (١٩٥٨) ويمكن الاعتماد عليها أكثر من تقدير نسبة النيتروجين الخارج في البول والمعروف كما سبق أن الأحماض الأمينية methionine و cysteine هما مصدر الكبريت لجسم الإنسان. ولهذا يفضل استخدام نسبة الكبريت إلى النيتروجين الخارجين في البول كمؤشر على جودة البروتين وكان أول من أشار إلى ذلك Wilson (١٩٣١) حيث وجد أن نسبة وجود هذين العنصرين في الغذاء المتناول متوازية مع نسبتهما في البول. ويعتبر الرقم المتحصل عليه دليلاً على جودة البروتين :

$$\frac{\text{Urinary Sulfur}}{\text{Urinary N}} \quad \frac{\text{مقدار الكبريت في البول}}{\text{مقدار النيتروجين في البول}} \quad \text{دليل جودة البروتين}$$

كما يمكن تقدير نسبة كل من نيتروجين البول أو كبريت البول بالنسبة إلى الكرياتينين creatinine الخارج في البول :

$$\frac{\text{مقدار نيتروجين البول}}{\text{مقدار كرياتينين البول}}$$

أو

$$\frac{\text{مقدار كبريت في البول}}{\text{مقدار كرياتينين البول}}$$

يعتبر تقدير الكرياتينين في البول مؤشراً على كتلة العضلات التي تستمد الطاقة اللازمة لها نتيجة تحويل ATP إلى ADP ولهذا لابد من إعادة تحويل ADP إلى ATP بسرعة مناسبة لتوفير ATP اللازم. ويتم هذا بواسطة كرياتين فوسفات creatine phosphate إذ هو مصدر الفوسفات اللازمة.

ويتكون الكرياتينين من الكرياتين بعد إزالة الماء منه في تفاعل غير عكسي. وتعتبر هذه هي الخطوة الأولى اللازمة لإخراج الكرياتين ولهذا فإن كمية الكرياتينين الخارج في البول ثابتة لمدة ٢٤ ساعة في الفرد الواحد. وعادة ينسب الكرياتينين الخارج في البول إلى طول الجسم أو وزنه للحصول على معامل الكرياتينين



Creatinine coefficient. ولكن يفضل معامل الكرياتينين المنسوب إلى طول الجسم لأنه لا يتأثر بنسبة الدهون المخزنة في الجسم كما أشار إليها لأول مرة Daniel Hejinlan (١٩٢٩)، ويختلف هذا المعامل حسب عوامل مختلفة مثل الجنس والعمر...

ويعتبر تقدير نسبة النتروجين الخارج في البول بالنسبة لكرياتينين البول مؤشراً على كمية quantity البروتين المتناول (NRC - NAS ١٩٦٣).

$$\frac{\text{نيتروجين البول}}{\text{كرياتينين البول}} \quad \text{هو مؤشر كمية البروتين}$$

$$\frac{\text{كبريت البول}}{\text{نيتروجين البول}} \quad \text{هو مؤشر كمية البروتين}$$

$$\therefore \frac{\text{نيتروجين البول}}{\text{كرياتينين البول}} \times \frac{\text{كبريت البول}}{\text{نيتروجين البول}}$$

$$\left[ \frac{\text{Urinary sulfur}}{\text{Creatinine}} \right] = \frac{\text{كبريت البول}}{\text{كرياتينين البول}}$$

هو مؤشر جودة البروتين

### الطرق الكيميائية :

بدأت الطرق الكيميائية لتقدير القيمة التغذوية للبروتين منذ أن تم اكتشاف الأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية، وكان آخر الأحماض الأمينية الأساسية اكتشافاً هي الحامض الأميني Threonine سنة ١٩٣٥.

والطرق الكيميائية طرق سريعة تجري في المعمل وتستعمل نتائجها كثيراً في تصميم الأغذية التجريبية المستعملة في الاختبارات الحيوية لتقدير قيمة البروتين ويلاحظ أنها لا تغني عن الاختبارات الحيوية.

وتعتمد هذه الطريقة على تقدير محتوى البروتينات والأحماض الأمينية الأساسية ميكروبيولوجياً Microbiological ، أو كروماتوجرافياً Chromatographic أو إنزيمياً Enzymic ثم يقارن محتوى البروتينات المختلفة من الأحماض الأمينية بمحتوى بروتين عالى القيمة التغذوية من الأحماض الأمينية مثل بروتين البيض، أو اللبن ويسمى بالبروتين المرجعى Reference Protein ثم يعطى البروتين المختبر درجة تعكس القيمة التغذوية للبروتين (Mitchell & Block)، ومنها :

#### ١- الدرجة الكيميائية Chemical Score :

ولحساب الدرجة الكيميائية لبروتين ما (بروتين مختبر) فإنه يتم تقدير الأحماض الأمينية الأساسية فى كل من البروتين المختبر والبروتين المرجعى ثم تحتسب النسب المثوية لكل حامض أمينى أساسى فى البروتين المختبر بالنسبة لمثيله فى البروتين المرجعى وأقل هذه النسب المتحصل عليها عبارة عن الدرجة الكيميائية ويسمى الحامض الأمينى الموجود بأقل نسبة فى البروتين المختبر بالحامض الأمينى الحدى الأول The first limiting amino acid والحامض الأمينى الذى يليه هو الحامض الأمينى الحدى الثانى The second Limiting amino acid ويوضح الجدول (٤-٤) الحامض الأمينى الحدى لبعض البروتينات ويقارن بين قيمة هذه البروتينات التغذوية المقدرة بكل من الطرق الكيميائية والحيوية.

وصممت منظمة الأغذية والزراعة ١٩٥٧ نموذجاً لبروتين يحتوى على خليط من الأحماض الأمينية الأساسية على أساس الحد الأدنى للاحتياج من الأحماض الأمينية الأساسية للإنسان البالغ، وقد قدر هذا الاحتياج تجريبياً واستعمل هذا النموذج كأساس لتقدير قيمة البروتين أو خليط البروتينات بدلاً من بروتين البيض أو اللبن كبروتين مرجعى ولكن وجد أن بروتين البيض (Swendseid & others ١٩٦٢) وبروتين اللبن (Kilrk & others ١٩٦٢) يفوق هذا البروتين.

وهناك اختلاف إلى حد ما بين ما يتم التوصل إليه من تقدير القيمة التغذوية للبروتين كيميائياً وحيوياً ويرجع الاختلاف إلى أن مقدرة الفرد على تحليل البروتين إلى الأحماض الأمينية أثناء الهضم ليست ١٠٠٪ علاوة على أن تحليل البروتين إلى الأحماض الأمينية معملياً (كيميائياً) قد يؤدى إلى فقد بعض الأحماض الأمينية.

جدول (٤-٤) الحامض الأميني الحدى الأول والدرجة  
الكيميائية وقيمة صافى استخدام البروتين (NPU) لبعض البروتينات

مصدر البروتين	الحامض الأميني الحدى الأول	الدرجة الكيميائية	قيمة صافى استخدام البروتين
البيض	..	١٠٠	١٠٠
لحم البقر	الأحماض الأمينية المحتوية على كبريت	٨٠	٨٠
لبن البقر	الأحماض الأمينية المحتوية على كبريت	٩٠	٨٥
السمك	تربتوفان Tryptophan	٨٥	٨٣
الأرز	لايسين Lysine	٧٥	٦٧
دقيق القمح	لايسين Lysine	٧٥	٦٦
ذرة	تربتوفان Tryptophan	٤٥	٥٦
	لايسين Lysine		
بطاطس	الأحماض الأمينية المحتوية على كبريت	٧٠	٧١
فول	الأحماض الأمينية المحتوية على كبريت	٨٠	٨٧

ولذا تجرى بعض الاحتياطات لتقليل هذا الفاقد. ويلاحظ أن بروتين الغذاء الذى يقدم للإنسان عادة يعامل بالحرارة قبل تناوله مما يؤدي إلى تقليل الاستفادة من بعض الأحماض الأمينية مثل Lysine الموجود فى الحبوب حيث تؤدي الحرارة إلى اتحاد Lysine مع الكربوهيدرات الموجودة فى الحبوب فى تفاعل ميلارد Maillard Reaction مما يؤدي إلى فقد الأحماض الأمينية (Miller ١٩٦٠) ويمكن تقدير Lysine الممكن الاستفادة منه وذلك بالطرق الكيميائية (Carpenter ١٩٦٠) كما سيأتى.

## ٢- الدرجة الكيميائية بطريقة مبسطة :

### Simplified chemical score (SCS) :

وضع هذه الطريقة Morrisson و Campbell بناء على أن هناك علاقة بين نسبة حامض Lysine فى الأغذية ونسبة كفاءة البروتين (PER) للأغذية المنخفضة فى lysine مثل الحبوب. كما أن العديد من أغذية الإنسان منخفضة فى الأحماض الأمينية الكبريتية (methionine و Cysteine) مثل البقول. ولهذا يكفى بتقدير هذه الأحماض الأمينية فى كل من البروتين المختبر والمرجعى McLaughtan وآخرون، كما يلى :

- يقدر محتوى lysine, methionine, cysteine فى الغذاء المختبر وفى البروتين المرجعى وليكن البيض.

- ينسب كل حامض أمينى فى البروتين المختبر على مثيله فى البروتين المرجعى كنسبة مئوية.

## ٣- مؤشر الأحماض الأمينية الأساسية :

### Essential Amino Acid Index (EAAI) :

نظراً لأن بعض البروتينات ينقصها تماماً بعض الأحماض الأمينية مثل بروتين الذرة زاين، والجلاتين كما ظهر من التجارب الحيوية فقد عدل Oser من طريقة تقدير الدرجة الكيميائية بأن يؤخذ فى الاعتبار كل الأحماض الأمينية الأساسية لتقدير القيمة التغذوية للبروتين بدلاً من الاعتماد على حامض أمينى واحد الأكثر نقصاً. وكما هو معروف أنه باستثناء بعض بروتينات بسيطة فإن وجود أى حامض لا يقل عن ١٪ من البروتين.

ويتم الحساب بعد تقدير الأحماض الأمينية الأساسية كما سبق فى البروتين المختبر، وأيضاً فى البروتين المرجعى. ثم يحسب نسبة كل حامض أمينى فى البروتين المختبر على مثيله فى البروتين المرجعى، ويستخرج المتوسط لكل.

ويحسب متوسط النسب فى البروتين المختبر

متوسط النسب فى البروتين المرجعى

وكما أشار Mitchell أن عادة تجمع قيم tyrosine و Phenylalanine معاً Total Aromatic Amino Acids (TAAA) وتجميع قيم methionine و cysteine معاً Total Sulfur-containing Amino Acid (TSAA).

#### ٤ - مؤشر جودة البروتين Protein Quality Index :

لوحظ أن الاحتياج من النيتروجين المستمد من مجموع الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة أقل من الاحتياج الكلى للنيتروجين، ولهذا يفضل استخدام نمط معين من الأحماض الأمينية لكل فئة عمرية.

وعلى هذا فإن القيمة التغذوية للبروتين تتوقف على كمية البروتين التى تمد الفرد باحتياجاته من كل حامض أميني بكمية كافية لمقابلة احتياجاته من النيتروجين كما يلى فى المعادلة :

$$100 \times \frac{\text{الاحتياج من البروتين (N x 6.25) حسب العمر}}{\text{كمية البروتين المختبر لمقابلة احتياج الفرد من الحامض الأميني الأكثر نقصاً أى الحدى الأول بالنسبة للأشخاص فى نفس العمر}}$$

ويوضح جدول (٤-٥) مثال لحساب مؤشر جودة البروتين بالنسبة لطفل عمره ٣-٦ شهور وبالنسبة لشخص بالغ.

جدول (٤-٥) حساب مؤشر جودة بروتين الذرة

أولاً : بالنسبة لطفل عمره ٣-٦ شهور

الأحماض الأمينية	الأحماض الأمينية الموجودة فى ١,٨٥ جم* بروتين مثال ملحوم	الأحماض الأمينية الموجودة فى بروتين الذرة ملحوم/جم	كمية المتناول من بروتين الذرة لمقابلة احتياج الطفل من الحامض الأكثر نقصاً جم/كجم/اليوم
Isoleucine	٦٥	٣٧	١,٧٦
Leucine	١٤٨	١٢٥	١,١٨
Lysine	٩٦	٢٧	٣,٥٥*
TSAA	٥٤	٣٥	١,٥٤
TAAA	١١٦	٨٧	١,٣٣
Threonine	٨١	٣٦	٢,٢٥
Tryptophan	١٥,٧	٦,١	٢,٥٧
Valine	٨٧	٤٨	١,٨١
Histidine	٢٦	٢٧	٠,٩٦
مؤشر جودة البروتين = $\frac{1,85}{3,55} = 52\%$			

\* كمية البروتين التى تحتوى نظرياً على الأحماض الأمينية بالكمية والنوعية التى تفى باحتياجات الطفل.

تابع جدول (٤-٥)

ثانيًا : بالنسبة لشخص بالغ :

كمية المتناول من بروتين الذرة لمقابلة احتياجات الشخص البالغ جم/كجم/اليوم	الأحماض الأمينية المكونة بروتين الذرة ملجم/جم	الأحماض الأمينية الموجودة في ٥٥,٠ جم* من بروتين مثالي ملجم	الأحماض الأمينية
٠,٢٧	٣٧	٩,٩	Isoleucine
٠,١١	١٢٥	١٣,٨	Leucine
٠,٤٥	٢٧	١٢,١	Lysine
٠,٣٨	٣٥	١٣,٢	TSAA
٠,١٦	٨٧	١٣,٨	TAAA
٠,٢٠	٣٦	٧,٢	Threonine
* ٠,٥٨	٦,١	٣,٦	Tryptophan
٠,٢١	٤٨	٩,٩	Valine
$\text{مؤشر جودة البروتين} = \frac{٠,٥٥}{٠,٥٨} = ٩٥\%$			

\* كمية البروتين التي تحتوى نظريًا على الأحماض الأمينية بالكمية والنوعية التي تفي بحاجة الفرد.

وبلاحظ هنا الفرق بين مؤشر جودة بروتين الذرة بالنسبة للطفل وبالنسبة للشخص البالغ.

**٥ - درجة البروتين Protein Score :**

لحساب درجة البروتين من محتواه من الأحماض الأمينية (جدول ٤-٦) :

١ - يحسب إجمالي الأحماض الأمينية الأساسية في البروتين المرجعي.

٢- تحسب نسبة الحامض الأميني بالنسبة لمجموع الأحماض الأمينية الأساسية ويقتصر ذلك على الأحماض الأمينية الأكثر نقصاً في غذاء الإنسان، وهى غالباً lysine، الأحماض الأمينية الكبريتية (cysteine+methionine)، tryptophan.

جدول (٤-٦) حساب درجة البروتين

مثال	البروتين المرجعى ملجم / جم N	البروتين المختبر ملجم / جم N
مجموع الأحماض الأمينية الأساسية =	٣١٢٥	٢٨٥٠
lysine قيمة الحامض الأميني =	٤٠٣	٤٣٥
cysteine + methionine قيمة =	٣٤٦	١٩٦
tryptophan قيمة الحامض الأميني =	١٠٠	٨٦
نسبة lysine / المجموع =	$\frac{٤٠٣}{٣٢١٥} = ١٢,٥\%$	$\frac{٤٣٥}{٢٨٥٠} = ١٥,٢\%$
نسبة الأحماض الكبريتية / المجموع =	$\frac{٣٤٦}{٣٢١٥} = ١٠,٨\%$	$\frac{١٩٦}{٢٨٥٠} = ٦,٩\%$
tryptophan / المجموع =	$\frac{١٠٠}{٣٢١٥} = ٣,١\%$	$\frac{٨٦}{٢٨٥٠} = ٣,٠\%$

نسبة درجة البروتين المختبر : درجة البروتين المرجعى بالنسبة إلى كل حامض:

$$\text{Lysine} \quad ١٥,٢ : ١٢,٥ = ١٠٠\%$$

$$\text{Methionine + Cysteine} \quad ١٠,٨ : ٦,٩ = ٦٣,٩\%$$

$$\text{Tryptophan} \quad ٣,١ : ٣,٠ = ٩٦,٨\%$$

## ٦- تقدير القيمة الغذائية للبروتين من محتواه من الأحماض الأمينية:

تتوقف القيمة الغذائية للبروتين من محتواه من الأحماض الأمينية الأساسية من حيث كميتهما وتغطيتها pattern على افراض أن تغط الأحماض الأمينية الناتجة من تحليل البروتين كيميائياً فى المعمل يشابه تغط الأحماض الأمينية المنطلقة فى الجسم بعد هضم البروتين وامتصاص الأحماض الأمينية.

ويقارن تغط الأحماض الأمينية الناتجة من التحليل الكيميائى للبروتين بنمط الأحماض الأمينية لبروتين مرجعى مثل البيض أو اللبن.

كما يمكن مقارنة هذا النمط بنمط الأحماض الأمينية الذى وضعته منظمة الأغذية والزراعة.

وحتى يسهل المقارنة يفضل تقدير نمط الأحماض الأمينية وذلك باختيار أقل الأحماض الأمينية تواجدًا فى البروتين وتقدر نسبة كل حامض بالنسبة لهذا الحامض وعادة يستخدم tryptophan وتقسم كل الأحماض الأمينية على قيمة tryptophan وبذا تتحول قيمته إلى واحد، وقد اختير هذا الحامض لأنه أقل حامض أمينى يحتاجه الجسم كما أنه يوجد بكميات منخفضة فى معظم الأغذية. وإذا لم يكن محتوى هذا الحامض متاحًا يمكن استخدام حامض threonine بدلاً منه كما فى جدول (٤-٧).

جدول (٤-٧) نمط الأحماض الأمينية لبروتين البيض وال فول السوداني

باستخدام Tryptophan و Threonine كوحدة

نمط الأحماض الأمينية				أحماض أمينية		الأحماض الأمينية
Threonine ١ =		Tryptophan ١ =		جم / ١٦ جم N		
بيض	سودانى	بيض	سودانى	بيض	سودانى	
١,٣	١,٣	٣,٩	٤,٠	٦,٦	٣,٦	Lysine
١,٠	١,٠	٣,٠	٣,٢	٥,٤	٢,٧	[ Methionine + Cystine
١,٠	١,٠	٣,٠	٣,٠	٥,٠	٢,٧	Threonine
٠,٣	٠,٣	١,٠	١,٠	١,٧	٠,٩	Tryptophan

ويسهل مقارنة نمط الأحماض الأمينية.

إن نمط الأحماض الأمينية يؤثر على مدى استفادة الفرد من البروتين، إذ إن عدم توازن imbalance الأحماض الأمينية بجانب أنه يقلل من شهية الفرد فإنه يزيد من احتياج الفرد من الحامض الأمينى الأقل وجودًا فى البروتين. ومن صور عدم التوازن:

#### ١- اختلال التوازن imbalance :

إن اختلال توازن الأحماض الأمينية ولو بسيط فإنه يزيد من احتياج الفرد للأحماض الأمينية الأخرى للمحافظة على سرعة نمو معينة وخصوصاً إذا كانت كمية البروتين المتناولة قليلة.



## ٢- زيادة excess أى من الأحماض الأمينية :

إن أى زيادة من الحامض الأميني له تأثير سلبي على مدى الاستفادة من البروتين، وإن درجة تحمل هذه الزيادة محدود. وقد يسبب الزيادة من الحامض الأميني تأثيراً ضاراً كما ظهر من تجارب الحيوان على العين والجلد والكبد والبنكرياس، مع انخفاض نسبة النمو خصوصاً إذا كان نسبة البروتين فى الغذاء منخفضة. ويمكن تقليل الضرر دون تحسن يذكر فى سرعة النمو الذى ظهر على الأعضاء بإضافة الحامض الأميني الحدى الأول.

## ٣- التأثير المضاد :

وقد يكون لزيادة بعض الأحماض الأمينية تأثير مضاد antagonism على أحماض أمينية أخرى مثل زيادة leucine تقلل من الاستفادة من الأحماض الأمينية المتشابهة فى التركيب مثل isoleucine و valine. كما لوحظ أن زيادة lysine تؤثر على الاستفادة من arginine... ويلاحظ أن حالة التضاد لا تستجيب إذا أضيف الحامض الأميني الحدى الأول. ويمكن التقليل منها إذا انخفض المتناول من الحامض الأميني المتشابهة فى التركيب.

## تقدير الأحماض الأمينية المتاحة

### Determination of Available Amino Acids :

أظهرت تجارب Kuiken و Lyman ١٩٤٨ أن الأحماض الأمينية ليست كلها متاحة بدرجة واحدة من البروتين، وخصوصاً حامض lysine الذى يتأثر بالمعاملات الحرارية للأغذية فى تفاعل maillard، وكذلك حامض methionine، وهذا يؤثر على القيمة التغذوية للبروتين. ولهذا فإنه عند تقدير محتوى الأحماض الأمينية معملياً يفضل أن يتبع بتقدير للأحماض الأمينية المتاحة حتى يكون تقدير القيمة التغذوية للبروتين أدق. ويمكن اتباع ذلك بطرق كيميائية أو إنزيمية، ميكروبيولوجية، حيوانية.

### ١- الطرق الكيميائية Chemical Methods :

وضع Carpenter (١٩٦٠) طريقة تقدير حامض lysine المتاحة باستخدام محلول Sanger Fluordinitrobenzene (F-DNB)، حيث يتحد مع المجموعة الأمينية الحرة لحامض lysine، فيكونا  $\epsilon$ -dinitrophenyl-lysine ( $\epsilon$ -DNP-lysine) الذى ينفصل

بالتحليل ويقدر لونياً colorimetrically. وقد وجد Baliga (١٩٥٩)، وأيضاً وحدث Nawar وآخرون (١٩٧٠) أن نتائج التقدير الكيميائي اتفقت مع التقديرات البيولوجية. ولكن هناك بعض الصعوبات تعترض هذه الطريقة في حالة الأغذية الغنية بالكربوهيدرات إلا أنه يمكن فصل الكربوهيدرات أولاً كروماتوجرافياً ثم يقدر lysine المتاح.

#### ٢- الطرق الإنزيمية Enzymatic methods :

وصف Sheffner (١٩٥٦) وآخرون طريقة تقدير الأحماض الأمينية المتاحة إنزيمياً. وتأخذ في اعتبارها الأحماض الأمينية المتاحة أثناء الهضم، أى الإتاحة الفسيولوجية. وتستخدم هذه الطريقة في عمل دليل index للأحماض الأمينية يجمع نمط الأحماض الأمينية الأساسية المنطلقة أثناء الهضم بواسطة إنزيم الببسين مع نمط باقى الأحماض البروتين حتى يمكن الحصول على دليل كامل يسمى Pepsin Digest-Residue (PDR). وقد وجد أن هناك ارتباط بين PDR ونتائج استخدام صافى استخدام البروتين NPU لمجموعة من البروتينات. وبقسمة دليل الأحماض الأمينية على معامل الهضم للبروتين ينتج القيمة الحيوية (BV) للبروتين. استخدم Mauron و Bujar (١٩٦٣) طريقة هضم اللبن المعامل لتقدير إتاحة lysine, methionine, tryptophan. وكانت النتيجة متفقة مع نتائج تجارب نسبة كفاءة البروتين PER.

#### ٣- الطرق الميكروبيولوجية Microbiological Methods :

تستخدم بعض الكائنات الدقيقة في تقدير إتاحة الأحماض الأمينية، مثل Streptococcus zymogenes NCDC 592 التى استخدمها Ford (١٩٦٢) على أن تقوم الكائنات الدقيقة بتحليل البروتين. وتحتاج الأحماض الأمينية Leucine, methionine, isoleucine, histidine, tryptophan, valine أى تكون هذه الأحماض أساسية بالنسبة للكائن. وقد استخدمت هذه الطريقة بنجاح.

#### ٤- الطرق الحيوانية Animal Essays :

استخدمت هذه الطريقة بواسطة Kuiken و Laymen (١٩٤٨) حيث أجروا تجاربهما باستخدام الفئران وذلك لتقدير إتاحة لعشرة أحماض أمينية فى عدد من الأغذية. وكان أساس هذه التجارب هو تقدير الأحماض الأمينية فى الأغذية وفى البراز مع تقدير نزوح البراز الميثابولى.

واستخدمت هذه الطريقة لتقدير إتاحة حامض lysine و methionine على أساس استعادة وزن فيران غذيت على غذاء خالى من البروتين. كما قدر إتاحة حامض arginine باستخدام استجابة الفيران النامية للنمو وقدّر الحامض الأميني فى الغذاء والبراز.

### القدرة التكميلية للبروتين :

#### The Supplementary Value of Protein :

تختلف القيمة التغذوية لبروتينات الأغذية حسب مدى احتوائها على الأحماض الأمينية الأساسية، وقد وجد أن معظم البروتينات النباتية ينقصها أو يرد بها بنسبة منخفضة واحد أو أكثر من الأحماض الأمينية الأساسية مثل حامض Lysine و Tryptophan و Threonine و Methionine، وعلى هذا فلا يمكنها إحداث النمو المناسب إذا كانت المصدر الوحيد للبروتين فى الغذاء، كما سبق ذكره، وعادة فإن وجبات الإنسان تحتوى على مجموعة مختلفة من الأغذية والتي تختلف فيما تحتويه من الأحماض الأمينية الأساسية مثل الحبوب والبقول، كما أن البروتينات النباتية غالباً ما يؤكل معها بروتينات حيوانية مثل اللحوم أو الأسماك أو اللبن أو البيض... إلخ ومن الواضح أن المحتوى الكلى للأحماض الأمينية فى الوجبة هو الذى يحدد القيمة التغذوية للوجبة وليس محتوى غذاء واحد من الأحماض الأمينية (Jansen ١٩٦٤) أى أن الخليط من البروتينات النباتية مثل الحبوب والبقول تكمل بعضها حيث أن مجموع الأحماض الأمينية الموجودة فى البقول تنتج خليطاً من الأحماض الأمينية ذات قيمة تغذوية أحسن مما لو تناول الفرد الحبوب أو البقول كل على حده، وقد استعمل الإنسان خليط البروتينات النباتية منذ قديم الزمن ولو أنه لم يعرف أهميتها التغذوية إلا فى القرن العشرين، فالصينيون القدماء استعملوا بروتيناً ذا قيمة تغذوية عالية من خليط بروتينات.

وبدراسة جداول محتوى الأغذية من الأحماض الأمينية المختلفة يمكن معرفة امكانيات خلط البروتينات حسب محتواها من الأحماض الأمينية لتكمل بعضها البعض، فمثلاً بروتين الحبوب ينقصه الحامض الأميني Lysine، ويمكن إكمال هذا النقص ببروتين اللبن، كما أن بروتين البقول ينقصه الحامض الأميني Methionine، ويخلط

بروتين الحبوب مع بروتين البقول يمكن تعويض النقص في كل منهما... هذا يوضح أنه ليس من الضروري أن يتناول الفرد بروتيناً حيوانياً مثل السمك أو اللحم واللبن أو البيض للحصول على بروتين عالي القيمة الغذائية للصيانة والنمو، كما أن هذا يوضح أيضاً أن النباتيين Vegetarian لا يعانون من النقص في الأحماض الأمينية.

وعملية خلط البروتينات النباتية لإنتاج بروتين عالي القيمة الغذائية من الأمور الهامة في الدول النامية التي تعاني من نقص البروتين الحيواني مع ملاحظة أن زيادة الإنتاج من الثروة الحيوانية يعتبر من الأمور الكثيرة التكاليف، ولهذا هناك محاولات كثيرة في بلاد العالم لمواجهة نقص البروتين الحيواني وارتفاع أثمانه بإنتاج أنواع مختلفة من الأغذية يحتوي كل منها على خليط من بروتينات رخيصة أما نباتية فقط أو نباتية وحيوانية، ففي جواتيما انتج خليطاً من بروتينات نباتية (Schrimshaw) وآخرون (١٩٦١) ويسمى الخليط Incap ويتكون من ٢٨٪ ذرة، ٢٨٪ ذرة رفيعة، ٣٨٪ مسحوق بذور القطن، ٣٪ حميرة، ٣٪ مسحوق أوراق وقد أظهرت الدراسات المختلفة أنها ذات بروتين عالي القيمة الغذائية بالنسبة للحيوانات النامية وبالنسبة للأطفال وخصوصاً الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وفي الهند أمكن إنتاج عدة خلطات نباتية (Panemangalor) وآخرون (١٩٦٥) وقد أثبت صلاحيتها، كما أمكن إنتاج غذاء سوبرامين (Superamine- Nile Co) (١٩٧٣) في مصر ويتكون من دقيق قمح بنسبة ٢٨٪، وحمض بنسبة ٣٨٪ وعلس بنسبة ١٨٪ ولبن مخفف بنسبة ١٠٪ وسكر بنسبة ٥٪ مع إضافات من فيتامينات ورائحة الموز.

وقد أمكن استخدام السوبرامين في عمل أنواع من الفطائر تفيد البالغين والأطفال بما تحتويه من عناصر تغذية هامة. وقد أجريت دراسة لتقييم غذاء السوبرامين (El.Baghdadi, Nawar) (١٩٧٤) وأخذت عينة من السيدات حديثات الولادة قد أظهرت النتائج أن فطائر السوبرامين أمكنها تحسين حالة الهيموجلوبين في تلك العينة من السيدات بعد ثمانية أيام، كما يظهر في جدول (٤-٨).

جدول (٤-٨) مستوى الهيموجلوبين سيدات حديثات  
الولادة قبل وبعد التغذية على السورامين

الأفراد	مستوى الهيموجلوبين فى أول التجربة	مستوى الهيموجلوبين بعد ٨ أيام
	جم / ١٠٠ مل	جم / ١٠٠ مل
١	٦	٧,٥
٢	١٠	١١,٠
٣	٧,٥	٧,٥
٤	٧,٥	١١,٥
٥	٩,٥	١١,٥
المتوسط	٨ + ١	٩,٦ + ٩,٩

كما أمكن انتاج تسع وجبات مكرنة من مخاليط من بروتينات نباتية وكذا بروتينات نباتية وحيوانية معلبة ومجففة (Masry - El ١٩٧٣) وأظهرت النتائج أنه أمكن استخدامها فى معالجة بعض حالات سوء التغذية فى الأطفال كما يمكن تحسين القيمة التغذوية للبروتين بواسطة إضافة الأحماض الأمينية الناقصة كما ظهر من نتائج التجارب المختلفة (Howe وآخرون ١٩٦٥) و (Daniel وآخرون ١٩٦٦)، على أن تأخذ فى الاعتبار سرعة امتصاص الأحماض الأمينية المضافة وكثرة التكاليف (Harper ١٩٥٨).

وبالإضافة إلى ما سبق يمكن تحسين القيمة التغذوية للبروتين النباتى بالتحسين الوراثى وقد أمكن انتاج صنف الذرة (Mertx & Baies Opaque-2 ١٩٦١) حيث يحتوى على نسبة أعلى من البروتين وكذا الأحماض الأمينية lysine و tryptophan أكثر من الذرة العادى، وقد ثبت صلاحيته على الأطفال (Bressani ١٩٦١) والبالغين (Clark ١٩٦٠)، وكما أمكن انتاج بعض اصناف الذرة الرفيعة المحسنة، وأعطت نتائج طيبة (Nawar وآخرون ١٩٧٠). كذلك إنتاج صنف عالى البروتين من الذرة

وأيضاً من الأرز وكلها أصناف واعدة ذات قيمة تغذوية تقارب قيمة البروتين الحيوانى. كما يمكن استخلاص بروتين الأوراق الخضراء للنباتات إذ أنه ذو قيمة تغذوية عالية ويمكن تحويله إلى بروتين مركز leaf protein concentrate وتعتبر الكائنات وحيدة الخلية من المصادر الجيدة للبروتين single-cell protein مثل الخميرة والبكتيريا والطحالب والفطريات وأكثرها انتشاراً هي الخميرة. ويمكن لهذه الكائنات استخدام مخلفات الصناعة كمصدر للكربون اللازم لنموها، أى أن هذه الكائنات تعتبر مصدراً اقتصادياً لزيادة البروتين، إلا أن هذه الكائنات قد يكون بها مواد ضارة أو سامة للجسم وقد تكسب البروتين الرائحة والطعم الموجودة فى المخلفات، وهذه كلها مشاكل لابد من حلها.

### مصادر البروتين : Protein Sources

البروتين من العناصر التغذوية المنتشرة فى كثير من الأغذية النباتية والحيوانية مثل اللحم والبيض واللبن والسّمك والحبوب والبقول والمكسرات... أما الفواكه والخضروات فهي فقيرة فى محتواها من البروتين، ومن الأغذية التى لا تحتوى على بروتين: السكر والدهون والزيوت.. والجدول (٤-٩) يبين نسبة البروتين الموجود فى الأغذية المختلفة فى صورة جرام / ١٠٠ جم غذاء.

ويقدر البروتين فى الغذاء كيميائياً بواسطة تقدير النيتروجين الكلى بطريقة كلداهل Kjeldahl ثم ضرب الناتج  $\times 6,25$  على أساس أن البروتين يحتوى فى المتوسط على ١٦٪ نيتروجين، ولكن الأغذية تختلف فى محتواها من النيتروجين (٤ - ١٠).

جدول (٤-٩) النسبة المئوية للبروتين في الأغذية

الغذاء	البروتين جم/١٠٠ جم	الغذاء	البروتين جم/١٠٠ جم
فول جاف	٢٥,٠	خبز بلدى	٨,٢
فاصوليا جافة	٢٢,٦	خبز أبيض	٨,٣
عدس جاف	٢٣,٧	قمح	١١,٥
لوز	١٨,٦	أرز	٧,٢
فول سودانى	٢٥,٥	ذرة شامية	٩,٤
دجاج	١٩,٠	تفاح	٠,٣
بيض	١٢,٨	مشمش	٠,٨
سمك	١٩,٠	موز	٠,٣
جبن جاف	٢٧,٠	يلح	٠,٩
جبن طرى	١٦,٠	جزر	١,٠
لبن بقرى	٣,٠	قرنبيط	٢,٤
زبادى	٣,٢	فول أخضر	٥,٢
زبدة	١,٠	خيار	٠,٧
سمن	٠,٢	سبانخ	٢,٨
		طماطم	٠,٨

جدول (٤-١٠) معامل تحويل النيتروجين إلى بروتين فى الأغذية المختلفة

الغذاء	معامل التحويل	الغذاء	معامل التحويل
لبن	٦,٣٨	أرز	٥,٩٥
بيض	٦,٢٥	فول سودانى	٥,٤٦
لحم	٦,٢٥	فول صويا	٥,٧١
ذرة	٦,٢٥	سمسم	٥,٣٠
فول	٦,٢٥	مكسرات	

## المقررات الغذائية اليومية للفرد من البروتين :

### Recommended Dietary allowances / day / individual :

يقوم البروتين فى الوجبة الغذائية بوظيفة البناء والصيانة وهى الوظيفة الأساسية للبروتين (كما سبق ذكره) ونحن نعلم أن احتياج الطفل للبروتين فى مرحلة النمو يفوق احتياج الفرد البالغ، واحتياج الطفل الرضيع للبروتين بالنسبة لكل كجم يصل إلى خمسة أمثال احتياج الفرد البالغ بالنسبة لكل كجم، ويحتاج الفرد البالغ إلى البروتين للصيانة ولتعويض الأنسجة.

وبناء على دراسات متعددة مثل التوازن النيتروجينى وغيرهما أوصت اللجنة المشتركة المكونة FAO/WHO سنة ١٩٧٤، أن الفرد البالغ يحتاج إلى البروتين بمعدل ٠,٥٨، ٠,٥٢ جم/كجم من وزن الجسم الرجل والمرأة على الترتيب وهذا يعتبر مستوى الأمان Safe level على أن يكون البروتين على القيمة التغذوية أى فى صورة لبن أو بيض، وحيث أن وجبات الناس العادية تحتوى على مصادر أخرى هى خليط من البروتين النباتى والحيوانى، فإن القيمة التغذوية لبروتين هذه الوجبات أقل منه فى حالة البيض أو اللبن، وعلى هذا يمكن عمل تصحيح باستعمال المعادلة الآتية:

$$\text{مقررات البروتين اليومية} = \frac{\text{القيمة التغذوية لبروتين البيض}}{\text{مستوى الأمان} \times \text{القيمة التغذوية لبروتين البيض}}$$

القيمة التغذوية لبروتين الغذاء

وعلى أى حال فقد وجد أنه باستعمال مستوى الأمان السابق الذكر، فإن على الفرد الذى وزنه ٦٥ كجم أن يتناول ٣٧ جم بروتين يوميًا، وأن تتناول الأنثى التى وزنها ٥٥ كجم يوميًا ٢٩ جم بروتين، ولا بد أن تكون الوجبة مناسبة من ناحية محتواها من الطاقة ويزيد احتياج الفرد للبروتين فى حالة قيامه بأعمال يدرية شاقة، وكذا الفرد الرياضى كما يزيد الاحتياج فى حالة المرض، وبصفة عامة يوصى بأن يكون  $\frac{2}{3}$  بروتين الغذاء من مصدر نباتى،  $\frac{1}{3}$  من مصدر حيوانى.

أما بخصوص اختيار البروتين للنمو أى الاحتياج إليه أثناء مرحلتى الطفولة والمراهقة فيجب أن يؤخذ فى الاعتبار أن وزن الطفل فى نهاية السنة الأولى ثلاثة أمثال وزنه عند الميلاد أى أن نموه يكون سريعًا ثم يقل حتى مرحلة المراهقة، فمتوسط الزيادة اليومية لكل كجم من وزن الجسم تكون بمعدل ٥-٦ جم أثناء الستة شهور



الأولى من حياة الفرد، ثم ينخفض إلى ٢-٣ جم فى السنة شهور التالية، وفى أثناء السنة الثانية ينخفض إلى ٥-٦-٠،٦ جم وتصل أثناء السنة السادسة إلى ٣،٠ جم، ويستمر على هذا المستوى حتى المراهقة.

وقد أوصت اللجنة أن تكون المقررات اليومية للبروتين فى صورة بروتين لبن أو بيض للطفل أثناء السنة الأولى على النحو التالى:

#### العمر بالشهور جرام / كجم من وزن الجسم

٣	٢،٤٠
٣-٦	٢،٠
٦-٩	١،٨
٩-١١	١،٦

وعندما يصل الطفل إلى سن الرابعة أو الخامسة تقل سرعة النمو ويكون قد تدرج فى غذائه ويصبح غذائه من الأكل العادى للأسرة، مع الاهتمام بأن يشرب اللبن)، وبعد سن الخامسة تقل سرعة النمو، ويمكنه أن يعيش فى حالة جيدة على الغذاء العادى للأسرة ولكن مع الاهتمام بأن يكون الغذاء متنوعاً ويحتوى على خليط من البروتينات.

أما بخصوص السيدات أثناء فترات الإنجاب فإنه فى حالة الحمل يزيد الاحتياج بمعدل ٦ جم يومياً وفى حالة الرضاعة يزيد الاحتياج ١٧ جم يومياً ويجب أن تعطى احتياجاتها من البروتين على صورة لبن أو بيض.

ولتوفير احتياج الفرد من البروتين اليومى فى الغذاء، ينبغى أن تصمم الوجبة على أن تكون نسبة الطاقة المستمدة من البروتين يعادل ١٠-١٢٪ من الطاقة الكلية المرجبة على أن يكون البروتين فى الوجبة الغذائية من مصادر مختلفة حيوانية ونباتية على أن تحتوى الرجات أثناء الطفولة أو الحمل والرضاعة على كمية مناسبة من اللبن.

#### الاحتياجات اليومية من الأحماض الأمينية الأساسية

##### Essential Amino Acid Requirements :

بعد اكتشاف الحامض الأمينى Threonine سنة ١٩٣٥ تمكن المختصون فى

التغذية من وضع المقررات اليومية للإنسان من الأحماض الأمينية الأساسية ويلاحظ أن غياب أحد الأحماض الأمينية الأساسية يؤدي إلى وقف النمو في الطفل وعدم الوصول إلى حالة التوازن النيتروجيني في الشخص البالغ.. والجدول (٤-١١) يبين الاحتياجات اليومية من الأحماض الأمينية اليومية الأساسية.

جدول (٤-١١) المقررات اليومية من الأحماض الأمينية الأساسية<sup>(١)</sup>

مللجم / كجم وزن الجسم

الحامض الأميني	الطفل الرضيع	الطفل ٥-٢ سنة	الصبي ١٠-١٢ سنة	الشخص البالغ
Histidine	٣٤	٢٤,٥	٢٤,٥	-
Isoleucine	١٢٦	٣١	٢٨	١٠
Leucine	١٥٠	٧٣	٤٤	١٤
Lysine	١٠٣	٦٤	٤٤	١٢
Methionine+ Cysteine	٤٥	٢٧	٢٢	١٣
Phenylalanine+ Tyrosine	٩٠	٦٩	٢٢	١٤
Threonine	٨٧	٣٧	٢٨	٧
Tryptophan	٢٢	١٢,٥	٣,٣	٣,٥
Valine	١٠٥	٤٨	٢٥	١٠

ويرتبط نقص تناول البروتين ببعض الحالات المرضية مثل الكوشوركور Kwashiorkor والماراسمس Marasmus كما سيأتي ذكره.

### الحالة التغذوية للبروتين والأحماض الأمينية حول العالم:

تختلف الحالة التغذوية للبروتين في العالم (كما سبق ذكره)، فمعظم بروتين الغذاء في الدول المتقدمة مستمدة من بروتين حيواني بعكس الحال في الدول النامية حيث أن معظم البروتين مستمد من بروتين نباتي، والجدول (٤-١٢، ١٣، ١٤) تبين متوسط نصيب الفرد اليومي من مصادر البروتين في العالم.

<sup>(١)</sup> Holt وآخرون ١٩٩٠.

جدول (٤-١٢) نصيب الفرد من مصادر البروتين في العالم

الدول	جرام / الفرد / اليوم				
	لبن	لحم	بيض	سمك	بروتين
	كلي	حيواني			
الدول المتقدمة	٥٧٣	١٥٢	٣٠	٣٤	٤٤
الدول النامية	٧٩	٣٠	٤	٢٠٤	٩

جدول (٤-١٣) متوسط البروتين المتناول حول دول العالم

جم / الفرد / اليوم

الدولة	البروتين النباتي	البروتين الحيواني	البروتين الكلي
أمريكا الشمالية	٢٧,٥	٧٠,٧	٩٨,٢
أستراليا ونيوزيلاندا	٣١,٠	٦٣,٤	٩٤,٤
الأرجنتين وباراجواي	٣٦,٦	٥٧,٤	٩٤,٠
غرب أوروبا	٣٩,٧	٤٨,٥	٨٨,٢
شرق أوروبا	٥٥,١	٣٥,٨	٩٠,٩
روسيا	٥٦,٥	٣٥,٧	٩٢,٢
اليابان	٤٥,١	٣١,٨	٧٦,٩
أمريكا اللاتينية والكاريبي	٣٥,٢	٢٢,٨	٥٨,٠
الشرق الأوسط	٥٣,٧	١٢,٢	٦٥,٩
أفريقيا	٤٨,٩	١٢,١	٦١,٠
الصين	٤٧,٨	٨,٨	٥٦,٦
جنوب آسيا	٤٢,٥	٦,٣	٤٨,٨

جدول (٤-١) استهلاك الطاقة والبروتين والأحماض الأمينية الأساسية في بعض دول العالم في البرم / فرد (١٩٩٢)<sup>١</sup>

الدول	الطاقة كالوري	البروتين					الأحماض الأمينية الأساسية (ملجم) / جم بروتين						الدول النامية
		الكلبي جم	الجواني %	الحرب %	البقول %	Iso- Leucine	Leu- cine	lysine	SAA <sup>2</sup>	AAA <sup>1</sup>	Thre- onine	Tryp- tophan	
مصر	٣٣٣٥	٧٨,٣	١٤,٩	٦٨,٣	٦,٦	٤٠	٨٢	٤٠	١٧	٨٠	٣٤	١٢	٤٩
الهند	٢٢٩٤	٥٨,١	١٦,٤	٦٢,٧	١١,٧	٤٥	٨٠	٤٩	٣٧	٨٤	٣٧	١٢	٥٢
الفلبين	٢٢٥٥	٥٢,٤	٤٠,٦	٤٦,٢	١,٥	٤٩	٨٠	٥٧	٣٧	٨٠	٣٨	١٢	٥٣
نيجيريا	٢٢٢٤	٤٣,٩	٣٢,٣	٤٥,٨	٣٧,٠	٤٣	٩٣	٤٦	٣٤	٨١	٣٦	١٢	٥٠
ترنس	٣٢٣٢	٩٠,٩	٣٠,٩	٦١,٢	٦,٦	٤٢	٧٣	٤٣	٣٨	٧٨	٣٣	١٢	٤٨
الدول المتقدمة													
اسواتيا	٣٣٧٩	١٠٠,٤	٦٨,٢	١٨,٤	٢,٣	٤٨	٨١	٦٩	٣٨	٨١	٤٣	١٢	٥٤
فرنسا	٣٦٣٢	١٣٦,٩	٦٧,١	٢١,٤	١,٧	٤٨	٨١	٦٧	٣٨	٨١	٤٠	١٢	٥٣
اليابان	٢٨٨٧	٩٧,٦	٥٧,١	٢١,٧	١١,٩	٤٧	٨٠	٦٩	٣٨	٨١	٤١	١٢	٥٣
المملكة المتحدة	٣٦١٧	٩١,٢	٥٧,٣	٢٥,١	٢,٥	٤٧	٧٩	٦٤	٣٨	٨٣	٣٩	١٢	٥٣
الولايات المتحدة	٣٧٣٢	١١٢,٩	٦٥,١	٢١,٨	٢,٨	٤٧	٨٠	٦٧	٣٨	٨٠	٤٠	١٢	٥٣

1: Aromatic Amino Acids

2: Sulfur Containing Amino Acids

الباب الخامس

**الهضم والامتصاص والميتابوليزم**

**Digestion, Absorption and Metabolism**



## الهضم والامتصاص والميتابوليزم Digestion, Absorption and Metabolism

### الهضم :

كان أول من اهتم بدراسة الهضم هو العالم الفرنسى René de Reaum (١٦٨٣-١٧٥٧) الذى وجد أن إفرازات العصير المعدى gastric juice تحول اللحم إلى الحالة السائلة. ثم قام Lazzaro Spallaezani (١٧٢٩ - ١٧٩٩) بدراسة أثر اللعاب على الغذاء. واهتم William Beaumont (١٧٨٥ - ١٨٥٣) بدراسة الهضم، وتوصل إلى حركة المعدة أثناء الهضم، وقد كانت هذه الدراسة أساساً لدراسة عملية الهضم بعد ذلك.

ويتكون الجهاز الهضمى من القناة الهضمية وملحقاتها (شكل ٥-١) والهضم هو العملية التى فيها يتحول الغذاء من حالة معقدة وجزئيات كبيرة لا يمكن أن تمر خلال الغشاء المخاطى المبطن للقناة الهضمية إلى جزئيات أصغر يسهل امتصاصها.

مركبات غنية بالطاقة      هضم      مركبات فقيرة فى الطاقة  
(دهون - كربوهيدرات)      ثانى أكسيد الكربون + ماء

وبعض المركبات العضوية يسهل امتصاصها بدون هضم، مثل السكريات الأحادية والأملاح المعدنية، وتحتاج بعض الأغذية إلى معاملات خاصة حتى تصبح صالحة للأكل ويسهل امتصاصها، فمثلاً لا يمكن تناول الأرز أو الدقيق بمحلاته النيئة. وتتم عملية الهضم فى الجسم بواسطة إنزيمات مختلفة على درجة حرارة الجسم فى مدة ٣ - ٦ ساعات، ويمكن إجراء عملية هضم وتحليل الأغذية فى المعمل، ولكنها تحتاج إلى درجة حرارة خاصة وضغط أعلى من الضغط الجوى مع استعمال محاليل مركزة من أحماض أو قلويات، كما أنها تتم فى مدة طويلة قد تصل إلى ١٢ - ١٨ ساعة حسب نوع الغذاء.





Diagram of the human digestive system.

" م "

شكل (٥-١) الجهاز الهضمي للإنسان



ودراسة عملية الهضم تتلخص فى دراسة تأثير الإنزيمات المختلفة على الغذاء، وتتم عملية الهضم فى القناة الهضمية بين الفم ونهاية الأمعاء الدقيقة، وتساعد معاملة الأغذية بالحرارة على عملية الهضم، حيث تودى إلى تليين السيلولوز وتحليل النشا وتحويل البروتين إلى صورة أسهل هضمًا مع تحسين الطعم والرائحة، مما يودى إلى زيادة إفرازات الجهاز الهضمى. وللهمضم جانبان : جانب آلى أو ميكانيكى، وجانب كيميائى. والجانب الآلى هو المسئول عن التقطيع وخلط وتحريك الغذاء فى الجهاز الهضمى، وهذا يحدث بواسطة عملية المضغ فى الفم وحركة عضلات جدران الجهاز الهضمى الطولية والدائرية (شكل ٥-١ب) فانقباض العضلات الطولية يعمل على حركة الغذاء للأمام، أما العضلات الدائرية فيعمل انقباضها على تعميم الغذاء وخلطه، أما الجانب الكيميائى للهضم فهو المسئول عن تحليل الغذاء كيميائياً بواسطة الإنزيمات المختلفة، ويقوم الإنزيم بوظيفته دون أن يتأثر بهذه العمليات، ودون أن يحتاج إلى حرارة أو ضغط، والإنزيمات الهاضمة مواد بروتينية الأصل تقوم بتحليل المواد الكربوهيدراتية والبروتينية والدهنية وهى متخصصة، بمعنى أن الإنزيمات التى تحلل الكربوهيدرات غير تلك التى تحلل البروتينات أو الدهون، وعادة يشق اسم الإنزيم من اسم المادة التى يقوم بتحليلها، فمثلاً الإنزيمات التى تحلل الكربوهيدرات تسمى كربوهيدريزات Carbohydrases والتى تحلل الليبيدات تسمى ليبيزات lipolytic Lipases والتى تحلل البروتينات تسمى بروتيازات proteolytic Proteases، وفى بعض الأحيان يستعمل اسم مكان إفراز الإنزيم مع اسم الإنزيم مثل ليبيز البنكرياس Pancreatic Lipase.

ولكن هذه المسميات أصبحت لا تفى بالغرض بعد اكتشاف أنه يوجد عدة إنزيمات تعمل وتساعد فى إتمام عدة تفاعلات مختلفة لنفس المركب (Murry وآخرون ١٩٩٣) وأصبح من الصعب التمييز بين الإنزيمات عند الإشارة إليها. ولهذا وضع الاتحاد الكيمياء الحيوية العالمى International Union of Biochemistry (IUB) أساساً لتسمية الإنزيمات: وقسمت الإنزيمات إلى ستة أقسام وخصص لكل قسم رقم- فمثلاً رقم (١) oxireducrase، الثانى transferase والثالث hydrolase والرابع lyase والخامس isomerase والسادس (ligases) synthetase. واسم الازيم يتكون من

شقين: الشق الأول يمثل التفاعل والثاني هو المصطلح المعروف (ase) وأى معلومة مطلوبة لتوضيح التفاعل تكتب بين قوس ووضعت لكل إنزيم رقم كودى يمثل الرقم الأول (القسم) الذى ينتجه الانزيم والرقم الثانى (تحت القسم) والرقم الثالث (تحت القسم) أما الرقم الرابع فهو خاص بكل إنزيم. فمثلا الرقم الكودى ٢٧١١ عبارة عن القسم "٢" يمثل القسم الذى يتبع له الانزيم transferase تحت القسم "٧" يمثل الفرع من القسم transferase or phosphate، تحت القسم "١" يمثل المستقبل an alcohol is the acceptor والرقم الرابع "١" يمثل اسم الانزيم hexokinase.

### الهضم فى الفم :

يبدأ هضم الطعام فى الفم بمضغه لخلطه باللعاب saliva، ويفرز اللعاب من ثلاثة أزواج من الغدد اللعابية salivary glands زوج من كل من غدد تحت الفك وغدد تحت اللسان والغدد النكفية. واللعاب إفراز مخاطى يشتمل على إنزيم أميليز اللعاب salivary amylase أو (التيالين Ptyalin) وهو أول الإنزيمات الهاضمة التى يتعرض لها الغذاء، وإفراز الغدد النكفية إفراز مائى يحتوى على إنزيم الأميليز بنسبة كبيرة. أما غدد تحت اللسان وتحت الفك، إفرازها خليط من الأميليز والمادة المخاطية التى تسمى المخاطين، وتركيبها الأساسى بروتين، ويتم إفراز اللعاب نتيجة لفعل شرطى أو فعل منعكس، والأول يعتمد على القشرة السنجابية للمخ Cerebral cortex ويحدث نتيجة للتعود، مثل إفراز اللعاب عند رؤية الطعام أو شم الرائحة أو سماع صوت إعداد المائدة. أما إفراز اللعاب نتيجة للفعل المنعكس فيعتمد على المراكز العصبية للنخاع المستطيل، وينشأ نتيجة وجود الطعام فى الفم، وتعتمد كمية اللعاب ونوعه، أى إذا كان معظمه مخاطياً أو مائياً أى يحتوى على إنزيم الأميليز بنسبة كبيرة أو صغيرة على نوع المؤثر الذى أدى إلى إفراز اللعاب، وهو نوع الغذاء، فمثلاً عندما يكون الغذاء عبارة عن لحم أو مادة بروتينية فيكون حجم اللعاب قليلاً وبه نسب منخفضة من إنزيم الأميليز ونسبة كبيرة من المخاطين، بعكس الحال إذا كان الطعام مادة نشوية أو سكرية، فتؤدى إلى إفراز كمية أكبر من اللعاب المائى، ويحتوى على نسبة كبيرة من إنزيم الأميليز، أما إذا كان بالفم مادة ملحية أو حامضية فإن الإفراز

يكون مائياً وكميته كبيرة لمعادلة أو تخفيف الحموضة أو القلوية، وبه نسبة بسيطة من الإنزيم، ويحتوى اللعاب على ٩٩,٤ ٪ ماء والباقي مواد صلبة، والوزن النوعى لللعاب من ١,٠٠٢ إلى ١,٠٠٨ درجة حموضة اللعاب pH ٦,٥ إلى ٧ وعادة يفرز الإنسان من ١ إلى ١,٥ لتر يومياً، ولكن أكثر من ٩٠ ٪ من اللعاب يمتص ثانية فى الجسم.

وتأثير اللعاب الهاضم يقتصر على فعل الأميليز فى الكربوهيدرات أثناء مضغ الطعام، حيث يقوم الأميليز بتحليل الكربوهيدرات إلى دكسترين ومالتوز، ويتوقف مقدار التحليل على مدى بقاء الأكل فى الفم، ويستمر فعل اللعاب فى المعدة لمدة ١٠-١٥ دقيقة حيث أن البيئة فى المعدة حامضية تفقد الإنزيم نشاطه.

وبالإضافة إلى التأثير الهاضم لللعاب، فإن اللعاب يساعد على عمليتى البلع وإذابة مواد النكهة فى الطعام وتخفيف الأملاح والأحماض حتى لا يؤثر فى الغشاء المخاطى المبطن للفم، كما يساعد على تنظيم كمية الماء بالجسم، فإذا زاد فقد الماء عن طريق العرق أو البول فإن إفراز اللعاب يقل ويجف الحلق، فتنبه الأعصاب ويشعر الإنسان بالظما فيشرب.

### الهضم فى المعدة :

تمر البلعة الغذائية من الفم عن طريق المريء إلى المعدة حيث تحدث انقباضات دورية تودى فى النهاية إلى الهضم الميكانيكى والكيميائى، وأى مادة أو أى عامل يودى إلى حدوث انقباضات فى المعدة تودى إلى سرعة الهضم الكيميائى، وتتأثر حركة المعدة بعوامل مختلفة منها كمية الغذاء، حيث تزيد حركة المعدة بزيادة الغذاء إلى حد معين، بعدها تقل حركة المعدة ويحدث عسر الهضم، أما زيادة الدهون والخوف والقلق والجهد الفكرى والجسمى فإنها عوامل تودى إلى التقليل من حركة المعدة وانقباضاتها.

ويفرز العصير المعدى gastric juice غدد المعدة gastric glands التى تغطى معظم جدار المعدة الداخلى، ويستمر نتيجة فعل هرمونى، ولكن يكثر الإفراز نتيجة فعل شرطى وفعل منعكس، فيزيد إفراز المعدة عند شم الطعام أو نتيجة وجود الأكل بالمعدة، ويقل عند عدم تناول الطعام، كما أن هناك تأثير كيميائى يودى إلى زيادة الإفراز حيث يعمل وجود اللحوم على زيادة إفراز مادة الجاسترين من غدد موجودة

يجدار المعدة الذى يعمل على تنشيط المعدة، كما أن مادة الهستامين histamine الناتجة عن إزالة المجموعة الكربوكسيلية للحامض الأميني هستيدين تؤدي إلى زيادة الإفراز المعدى. والعصير المعدى سائل أصفر حامضى تصل درجة الحموضة pH فيه ١-٣ ويحتوى على ٩٧٪ - ٩٩٪ ماء والباقي مواد عضوية ومواد صلبة معظمها كلوريد صوديوم. ويفرز الإنسان يومياً فى المتوسط حوالى ٢,٥ لتر، ويلاحظ أن حموضة المعدة تقل نوعاً نتيجة لدخول الغذاء القادم من المرئ أو نتيجة استرجاع كمية من عصير الأمعاء، حيث يعمل على معادلة جزء من حموضة المعدة، ويحتوى العصير على حامض الهيدروكلوريك وإنزيمات هاضمة تشمل إنزيم البيبسينوجين pepsinogen جاستركسين gastricsin وإنزيم ليباز المعدة gastric lipase والرينين renine.

وهناك حالات مرضية تخلو فيها المعدة من حامض الإيدروكلوريك، وتسمى هذه الحالة achlorhydria وتشاهد فى بعض حالات سرطان المعدة وبعض حالات الأنيميا الخبيثة، كما يوجد حالات يكون فيها الإفراز المعدى لحامض الهيدروكلوريك بسيطاً وتسمى hypoacidity كما فى بعض حالات التهابات المعدة والإمساك وحالات الأنيميا، ويلاحظ أنه إذا قلت الحموضة يصبح الوسط مائلاً للقلوية، ويكون هناك فرصة لحدوث تخمرات بالمعدة.

كما يوجد بعض حالات يزيد فيها إفراز المعدة لحامض الهيدروكلوريك، وتسمى هذه الحالة hyperacidity، وتحدث فى بعض حالات قرحة المعدة أو الاثنى عشر وبعض أمراض الصفراء.


### وظيفة حامض الهيدروكلوريك :

يعمل حامض الهيدروكلوريك على تنشيط إنزيم البيبسينوجين إلى حالته النشطة الفعالة البيبسين، ويلاحظ أن إنزيم البيبسين موجود فى المعدة فى صورته الخاملة حتى لا يهضم جدار المعدة فى حالة خلوها من الأكل، وهذا الحامض يجعل الوسط المعدى حامضى، وهو اللازم لعمل إنزيم البيبسين ويهضم البروتينات.

كما أن حامض الهيدروكلوريك له تأثير مطهر حيث يمنع دخول البكتريا، ويعمل على دنثرة الأغذية البروتينية فيسهل هضمها ويزيد هذا الحامض من درجة إذابة أملاح الكالسيوم والحديد، فيزيد من نسبة امتصاص هذه العناصر، وقد يحلل بعض


السكريات الثنائية إلى سكريات أحادية. ووجود هذا الحامض ينشط الاثنى عشر والأمعاء الدقيقة لإفراز هرمون السكريتين secretin الذى ينشط إفراز البنكرياس والكبد. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن حامض الهيدروكلوريك المعدة ينظم فتح وغلق فتحتى الفؤاد والبراب بالمعدة، فعند زيادة الحموضة تقفل فتحة الفؤاد ويفتح البراب، فيمكن للمعدة أن تتخلص من الحموضة الزائدة حتى لا تؤثر على جدار المعدة، مما قد يؤدي إلى حالات مرضية، أما إذا قل الحامض فإن فتحة البراب تقفل وفتحة الفؤاد تفتح، ويساعد هذا على تجميع عصير المعدة فتزيد الحموضة.

هناك نظريات تفسر كيفية إفراز المعدة لحامض الهيدروكلوريك، ومنها نظرية Hollander ونظرية إنزيم carbonic anhydrase، وحسب نظرية Hollander فإنه يوجد فى الدم واللف كلوريدات مثل كلوريد الصوديوم وبفرات buffers مثل بيكربونات الصوديوم وحامض الكربونيك والبروتين، وتتفاعل الكلوريدات مع البفرات فينتج حامض الإيدروكلوريك.




ويذهب حامض الهيدروكلوريك إلى المعدة، أما باقى نواتج التفاعلات فتعود للمعدة.

أما نظرية إنزيم carbonic anhydrase (شكل ٥-٢) الذى يوجد فى ميوكوزا المعدة، وفى كرات الدم الحمراء، ويحتوى هذا الإنزيم على زنك. هذا الإنزيم يشجع على تكوين حامض الكربونيك من ثانى أكسيد الكربون والماء، ويتأين هذا الحامض إلى أيون أيديروجين وأيون بيكربونات.



شكل (٢-٥) كيفية إفراز المعدة لحمض الهيدروكلوريك



### إنزيم الببسينوجين :

ينشط إنزيم الببسينوجين بتحويله إلى الحالة الفعالة الببسين pepsin بواسطة حامض الهيدروكلوريك، كما سبق ذكره، كما أن إنزيم الببسين الفعال يقوم بتنشيط ما تبقى من الببسينوجين، ويقوم الببسين بتحليل البروتين جزئياً إلى بروتيازات proteases وبيبونات peptones ويعمل هذا الإنزيم في وسط حامضي.

البروتين  $\xrightarrow{\text{الببسين}}$  بروتيازات + بيبونات

وعادةً يحلل الببسين الروابط الببتيدية المتكون من الجاميع الكربوكسيلية للأحماض الأروماتية aromatic وهي أحماض tryptophan, phenylalanine, tyrosine وبالنسبة للروابط الببتيدية الأخرى للأحماض الأمينية المستقيمة أو ثنائية المجموعة الكربوكسيلية فإنه يهضمها ببطء، وأنسب رقم pH للببسين هو ١,٥ - ٢,٥.

## انزيم جاستركسين gastricsin :

وأنسب درجة حموضة لهذا الإنزيم هي  $\text{pH} = 3,5$  ونسبة وجوده إلى إنزيم البيسين هي ١ : ٤ وتزيد نسبة انزيم جاستركسين فى حالة قرحة المعدة (Stroev). (١٩٨٩).

ويعمل هذا الإنزيم على تحليل الروابط الببتيدية المتكونة بواسطة الأحماض الأمينية ثنائية المجموعة الكربوكسيلية. إن وجود هذين الأنزيمين البيسين الذى يعمل فى وسط شديد الحموضة و gastricsin فى وسط أقل حموضة يساعد فى التكيف السريع عند تغيير الوجبة. فمثلاً تناول الخضروات أو اللبن يقلل من حموضة المعدة وهذا الوسط الجديد يناسب عمل gastricsin ويعمل هذا الإنزيم مثل إنزيم البيسين على تحويل البروتينات إلى بروتيازات وببتونات.

## إنزيم ليبين المعدة :

لا يعمل هذا الإنزيم فى الوسط الحامضى للمعدة، ولذا فإن الدهون لا تهضم فى المعدة، وقد يقوم هذا الإنزيم بالتحليل الجزئى للدهون.

## رنين :

ويعمل هذا الإنزيم على تفتت اللبن clotting of milk أى تحويله إلى صوره صلبة، وهذا الإنزيم مهم بالنسبة للأطفال الرضع حيث أن هذا الإنزيم يبطئ من خروج اللبن من المعدة، ويعمل هذا الإنزيم فى وجود الكالسيوم على تحويل كازين اللبن إلى باراكيزينات الكالسيوم فيمكن للبيسين أن يحلله، ويعمل هذا الإنزيم عند رقم حموضة  $\text{pH}$  من ٦-٦,٥ ويقال إن هذا الإنزيم قد يكون غير موجود فى البالغين. وتختلف مدة بقاء الغذاء فى المعدة حسب نوع الغذاء، وعادة يترك الغذاء المهضوم المعدة بعد مدة من حوالى ٣-٤ ساعات وتترك الكربوهيدرات المعدة أولاً، ثم تليها البروتينات، وآخرها الدهون.

## الهضم فى الأمعاء الدقيقة :

بعد أن يترك الغذاء المعدة فإنه يكون سائلاً chyme له تأثير حامضى، ثم يدخل الاثنى عشر deodenum حيث تُعادل حموضة الغذاء نتيجة للعصارات فى الاثنى عشر والأمعاء الدقيقة، ويوجد ثلاثة أنواع من العصارات الهاضمة : عصير

البنكرياس pancreatic juice وإفراز الكبد - الصفراء bile وإفراز الأمعاء intestine secretion ويلاحظ أن إفراز كل من البنكرياس والكبد يصب في الاثنى عشر في قناة مشتركة.

### إفراز البنكرياس :

يتم إفراز البنكرياس تحت تأثير عصبى نتيجة التعود على الأكل، وتحت تأثير هرموني، وفي الأغلب نتيجة إفراز هرمون السكرتين secretin الذى يشجع إفراز عصير البنكرياس كما سبق ذكره، ويفرز يوميًا حوالى ٧٠٠ ملليمتر، وهو قاعدى درجة حموضته pH ٧,٥ - ٨,٠، وعصير البنكرياس مائى يحتوى على بعض المواد العضوية وغير العضوية، ويحتوى على إنزيمات، منها: تربسينوجين trypsinogen وكيموتربسينوجين chymotrypsinogen و كربوكسيبتيداز B,A carboxypeptidase و proelastase وأميليز البنكرياس pancreatic amylase وليبز البنكرياس.

وإنزيم تربسينوجين حالة غير نشطة للإنزيم ويتحول إلى الحالة الفعالة بواسطة الانزوكينيز entokinase (وهو من إفراز الأمعاء) إلى تربسين trypsin الذى بدوره ينشط باقى إنزيم التربسينوجين، وكذا ينشط إنزيم الكيموتربسينوجين إلى كيموتربسين و proelastase إلى elastase ويعمل إنزيم التربسين والكيموتربسين على تحليل البروتين والبروتيازات والبيتونات الآتية من المعدة إلى عديدات الببتيدات polypeptides.

ويحلل إنزيم التربسين الروابط الببتيدية المتكونة من المجاميع الكربوكسيلية لحامضى arginine, lysine أما إنزيم الكربوكسيبتيداز فإنه يحلل الروابط الببتيدية للأحماض phenylalanine, tryptophan ويعمل إنزيم elastase على تحليل الروابط الببتيدية للأحماض الأليفاتية وإنزيم A carboxypeptidase ويحتوى على زنك وهو يفضل الأحماض الأمينية من طرف السلسلة الببتيدية المحتوى على مجموعة كربوكسيلية (c.terminal) للأحماض الأليفاتية، و B carboxy peptidase فيعمل أيضًا من C-terminal ولكن للأحماض arginine, lysine.

ويعمل إنزيم أميليز البنكرياس على تحليل النشا الذى لم يتحلل بفعل أميليز اللعاب إلى مالتوز maltose أما إنزيم ليباز البنكرياس فإنه يعمل على تحليل الدهون،



وتعتبر هذه أول خطوة لهضم الدهون، ويتم تحليل الدهون إلى جلسرول وأحماض دهنية، ويمكن الصفراء أن تعمل على تنشيط هذ الإنزيم. كما يوجد بإفراز البنكرياس إنزيمات أخرى مثل كولسترول إستيريز cholesterolesterase حيث يساعد هذا الإنزيم مع أملاح الصفراء على تحويل الكولسترول إلى إستر كولسترول الذى يساعد على امتصاصه من الأمعاء الدقيقة إلى الأجهزة الليمفاوية.


### عصير الصفراء The Bile :

يفرز هذا العصير من الكبد بين الوجبات ويخزن فى الحويصلة المرارية gallbladder المتصلة بالقناة الكبدية hepatic duct وفى أثناء الهضم تنقبض الحويصلة المرارية فتمر الصفراء إلى الاثنى عشر عن طريق القناة الصفراوية البنكرياسية المشتركة، ويفرز الإنسان حوالى ٥٠٠ ملليمتر من الصفراء. ويختلف تركيب الصفراء عنه فى الحويصلة المرارية، حيث أنه يزداد تركيز الصفراء فى الحويصلة المرارية، كما هو مبين فى الجدول (٥-١).

جدول (٥-١) تركيب الصفراء

الصفراء بالكبد %	الصفراء بالحويصلة المرارية %	
٩٧,٠	٨٥,٩٢	ماء
٢,٥٢	١٤,٠٨	مراد صلبة
١,٩٣	٩,١٤	أحماض صفراء
٠,٥٣	٢,٩٨	صبغات الصفراء
٠,٠٦	٠,٢٦	كولسترول
٠,١٤	٠,٣٢	أحماض دهنية ودهون
٠,٨٤	٠,٦٥	أملاح غير عضوية
١,٠١	١,٠٤	الوزن النوعى
٧,٣ - ٧,٠	٧,٧ - ٦,٩	درجة الحموضة

ومن أحماض الصفراء حامض الكولييك cholic acid وحامض دى أكسى كولييك Deoxycholic acid، وأحماض الصفراء هى الناتج النهائى لميتابوليزم الكولسترول وعادة لا توجد هذه الأحماض فى الصورة الحرة، بل تتحد فى الكبد مع الجليسين glycine والتورين taurine (مشتق من السيستين cystine) وبذا تتحول هذه الأحماض إلى صورة قابلة للذوبان فى الماء، وتتحد هذه النواتج مع الصوديوم والبرتاسيوم مكونة أملاح الصفراء وتسمى جليكو كوليئات glycocholates وتوروكوليئات taurocholates، وهذه تعمل كمستحلب قوى Emulsifier للدهون، وتقلل من قوة الجذب السطحي فى الأمعاء، وبذا تساعد فى هضم الدهون؛ أى أن الصفراء مهمة لهضم وامتصاص الدهون، وكذا الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهن : A,D,E,K كما أن الصفراء تعمل على معادلة حموضة المعدة وتنشط فعل إنزيم ليبيز الأمعاء، كما تساعد الجسم على التخلص من كثير من المواد غير اللازمة مثل صبغات الصفراء والأدوية والسموم، مثل النحاس والزنك والزرنيق. بالإضافة إلى ذلك، تساعد على التخلص من الكولسترول، حيث أن الكولسترول الحر لا يذوب فى الماء، ولكن يكون مستحلباً مع أملاح الصفراء، ويلاحظ أن الكولسترول الحر يمكنه تكوين حصوة فى الحويصلة المرارية، إما كوليسترول فقط وهو الأغلب أو كوليسترول مع الكالسيوم. وتأخذ الصفراء لونها من صبغات pigments أهمها بليفردن biliverdin ولونها أخضر، وبليروبين bilirubin ولونها أحمر، وهى مشتقة من مركبات الهيم الذى يدخل فى تركيب هيموجلوبين الكرات الدموية الحمراء، حيث أن عمر الكرة الدموية الحمراء ١٢٠ يوماً، كما سبق ذكره، وعندما تتحلل :



تنزل هذه المواد فى البول أو البراز أى أن صبغات الصفراء وسيلة للتخلص من مركبات الهضم.

## الهضم فى الأمعاء الدقيقة :

### العصير المعوى :

يفرز الإنسان يوميًا حوالى ٣ لتر من العصير المعوى يوميًا، ويحتوى هذا العصير على عدة إنزيمات تهضم البروتين منها أمينوبيبتيدات aminopeptidases التى تعمل على تحليل السلسلة الببتيدية إلى أحماض أمينية من الطرف الذى ينتهى بالجموعة الأمينية N-terminal، وكذا إنزيمات الدايببتيدات dipeptidases التى تعمل على تحليل السلسلة الببتيدية الثنائية dipeptide إلى حامضين أمينيين، ولذا تكون البروتينات قد تم هضمها إلى أحماض أمينية وتنشط هذه الإنزيمات بواسطة الكربلت والمنجنيز وحامض cysteine.

كما يوجد بالعصير المعوى إنزيمات محللة للسكريات مثل إنزيم السكريز sucrase ويحلل السكروز إلى فركتوز + جلوكوز وإنزيم المالتز maltase الذى يحلل المالتوز إلى جزيئين من الجلوكوز وإنزيم اللاكتيز lactase الذى يحلل اللاكتوز إلى جلوكوز + جاللاكتوز.


وإلى هنا يكون قد تم هضم الكربوهيدرات إلى سكريات أحادية، والبروتين إلى أحماض أمينية والدهون إلى جلسرول وأحماض دهنية، أما الغذاء غير المهضوم فيدخل إلى الأمعاء الغليظة، وفى حالة البروتينات المركبة مع كربوهيدرات أو دهون فإنه يفصل هذه المركبات ثم تهضم بواسطة الإنزيمات الخاصة لكل كما سبق.

وتتم عملية هضم الغذاء فى الإنسان بكفاءة إلا أن الأغذية الحيوانية أسهل هضمًا من الأغذية النباتية، وذلك لأن وجود ألياف السليلوز فى النبات يزيد من سرعة حركة الغذاء كما أنها تقلل من مدى تعرض الأغذية للأنزيمات الهاضمة، ويعرف معامل الهضم بأنه النسبة المثوية للغذاء الذى يستفيد منه الجسم، ومعامل الهضم فى المتوسط للبروتين يساوى ٩٢٪ وللدهن ٩٥٪ والكربوهيدرات ٩٨٪.

### الامتصاص :

بعد هضم الغذاء وتحويله إلى صورة سهلة قابلة للذوبان فى الماء تبدأ عملية

الامتصاص فى الأمعاء، وهى المكان الرئيسى الذى يتم فيه ٩٠٪ من عملية الامتصاص، وتزيد مساحة السطح الداخلى للأمعاء، وهو السطح الماص نتيجة لوجود نتوءات فى الغشاء المخاطى البطن للأمعاء والتي تسمى خمائل villi، ويوجد بكل خميلة (شكل ٥-٣) وعاء ليمفاوى منه للقناة الليمفاوية الصدرية ثم إلى الدم، كما يغذى كل خميلة شبكة من الشعيرات الدموية، ويرجع الدم من الخمائل بواسطة أوردة تتجمع فى وريد كبير هو الوريد البابى الذى يذهب إلى الكبد.




شكل (٥-٣) الخمائل بالأمعاء الدقيقة

## امتصاص الماء :

يتمص الماء من المحاليل المخففة بسهولة، أما المحاليل المركزة فيحدث لها تخفيف ويجرى امتصاص الماء في الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة.


## امتصاص الكربوهيدرات :

تتمص الكربوهيدرات في صورة سكريات أحادية (جلوكوز، فركتوز، جالاكتوز) عن طريق الشعيرات الدموية، ومنه إلى الوريد البابي ثم إلى الكبد، وتمتص السكريات بعد عملية الفسفرة phosphorylation (جلوكوز - ٦ فوسفات) وعملية الفسفرة تمد الجسم بالطاقة اللازمة لعملية الامتصاص المنشطة في وجود أيونات الصوديوم  $Na^+$  ثم يزال الفوسفور بواسطة إنزيم الفوسفاتيز القاعدي alkaline phosphatase الموجود في جدر خلايا الخملات، ويتم انتقال الجلوكوز عبر جدار الخلية بواسطة بروتين ناقل به مكانان أحدهما يرتبط بأيون الصوديوم  $Na^+$  اللازم لعملية النقل المنشط والآخر يرتبط به الجلوكوز كما في شكل (٥-٤ أ، ب).



Model of mobile carrier with two sites:  
one specific for substrates and one specific  
for Na<sup>+</sup>. From Crane *et al.* (1968).


P



A postulated mechanism for sodium cotransport  
of glucose. From Guxton (1987).

شكل (٥-٤ أ، ب) امتصاص الجلوكوز  
بواسطة ناقل بروتين في وجود أيونات الصوديوم

ويذكر Crane (١٩٦٨) أن امتصاص الجلوكوز الناتج من تحليل السكر  
 بواسطة إنزيم السكرين sucrase الموجود في جدار الخلية يكون قبل امتصاص الجلوكوز  
 الناتج من جلوكوز -٦- فوسفات بواسطة فعل إنزيم الفوسفاتير القاعدي Alkaline  
 phosphatase الموجود في جدار الخلية أيضاً- وذلك لأن إنزيم السكرين موجود في  
 مكان أقرب إلى البروتين الناقل عن إنزيم الفوسفاتير القاعدي كما في شكل (٥-٥).



Model of apparent spatial order in the outer protein coat of the microvillus membrane deduced from studies of the relative efficiency of intracellular accumulation of glucose originating in  $\alpha$ -glucose-1-phosphate or sucrose. PS = mucopolysaccharide; G = glucose; F = fructose; P<sub>i</sub> = phosphate; Na = sodium ion. From Crane (1968).

شكل (٥-٥) انتقال الجلوكوز الناتج من السكر  
 أو جلوكوز به فوسفات عند جدار الخلية

وتختلف سرعة امتصاص السكريات الأحادية، فإذا اعتبرت سرعة امتصاص الجلوكوز ١٠٠ فإن سرعة امتصاص الجالاكتوز ١١٠، والفركتوز ٤٣، وعادة يمثل الجلوكوز ٨٠ ٪ من الكربوهيدرات الممتصة ويمتص الفركتوز بالانتشار دون الحاجة إلى الصوديوم كما سبق (Gyton Hall, 1996).

### امتصاص الدهون :

يتم امتصاص الدهون عن طريق اللمف في صورة جلسرول وأحماض دهنية، ويمتص الجلسرول بسهولة من الأمعاء لأنه سهل الذوبان في الماء، كما يمكن للجسم أن يمتص جزء من الدهن في صورة جلسريدات أحادية، وبعد امتصاص الجلسرول والأحماض الدهنية فإنها تتجمع وتكون جلسريدات، وتساعد أملاح الصفراء في عملية الامتصاص حيث أنها تكون مستحلبًا مع الدهون، ويكون ذلك في صورة كريات صغيرة تسمى micelles كل واحدة ذات قطر ٣-٦ نانومتر وتكون الأحماض الدهنية والجلسريدات الأحادية بداخل الكمية أما السطح الخارجي فيكون مغلفي بشحنتات سالبة مما يساعد على ذوبانها في سوائل الهضم (كيم chyme).

ويذكر Astroev (١٩٨٩) أنه يمكن امتصاص الأحماض القصيرة حتى طول سلسلة ١٢-١٤ ذرة كربون عن طريق الانتشار أما الأحماض الطويلة أكثر من ١٤ ذرة كربون فإنها تمتص عن طريق أملاح الصفراء. وتمر الدهون في الأمعاء من الأوعية الليمفاوية ثم إلى القناة اليمفاوية الصدرية، ثم إلى الدم.


أما أملاح الصفراء فإنها تذهب للكبد عن طريق الوريد البابي، ويمتص الكولسترول عن طريق اللمف، ويسهل عملية الامتصاص تكوين إستراكول مع أحماض دهنية.

ومن جهة أخرى تتحد الأحماض الدهنية مع الجليسرول أو الجلسريدات الأحادية مكونة جلسريدات ثلاثية وتتجمع في تجمعات aggregates ومعها الكولسترول الممتص والفسفوليبيدات على أن تكون الأطراف القطبية إلى الخارج وهذا يسهل امتزاجها في السوائل. ويتحد معها كميات صغيرة من بروتين (apoprotein B) وهذه الكريات أو التجمعات يطلق عليها كيلوميكرون Chylomicron ثم تنتقل إلى اللمف. ويذكر hall, Gyton (١٩٩٦) أن ٨٠-٩٠ ٪ من الدهون تمتص بهذه الصورة.



## امتصاص البروتينات :

تهضم البروتينات في صورة أحماض أمينية ثم تمتص وتصل عن طريق الأوعية الدموية إلى الوريد البابي، ثم إلى الكبد، وإذا حدث امتصاص ببتيدات فإنها تسبب حساسية، ونظراً لكبر حجم جزيئات الأحماض الأمينية فإنها تنتقل بواسطة الانتشار *facilitated diffusion* بمساعدة بروتين ناقل *carrier protein* كما في شكل (٦-٥) وغالباً فإن امتصاص البروتين امتصاص منشط ويحتاج إلى أيونات  $Na^+$  كما سبق في الجلوكوز.



شكل (٦-٥) انتقال البروتين غير جدار الخلية

ويوجد خمسة أنظمة خاصة لنقل الأحماض الأمينية مخصص واحد لكل مجموعة من الأحماض الأمينية كما يلي: مجموعة الأحماض الأمينية الليفاتية المتعادلة، الأحماض الأمينية الحلقية *cyclic*، الأحماض الأمينية الحامضية، الأحماض الأمينية القاعدية، الحامض الأميني *proline*. ويوجد تنافس بين الأحماض الأمينية للارتباط بالنظام الناقل *transport system* وبعد نقل الأحماض الأمينية إلى داخل الخلية تخرج أيونات الصوديوم.

## المتابوليزم Metabolism :

يشمل المتابوليزم التغيرات التي تطرأ على العناصر الغذائية مسن وقت امتصاصها إلى أن تصبح جزءاً من الجسم أو تخرج خارج الجسم، ويشمل المتابوليزم


بصفة عامة الميتابوليزم الخارجى exogenous أى تحويل أو تغيير للمواد أو المركبات خارج الخلية extracellular وهى فى طريق دخولها أو خروجها من الخلية. أما الميتابوليزم الداخلى intermediary فهو يشمل كل التغيرات التى تتم داخل الخلية وهو يشمل:

أ- عمليات البناء Anabolism : وتتضمن كل العمليات أو التفاعلات الكيميائية التى تدخل فيها العناصر الغذائية لبناء مركبات الجسم المختلفة، مثل بناء الدم، الإنزيمات، الهرمونات، الأنسجة المختلفة، الجليكوجين، وهذا تتمكن الخلية أن تستمر فى الحياة.

ب- عمليات الهدم Catabolism : وتتضمن كل العمليات والتفاعلات الكيميائية التى تهدم فيها الأنسجة والمركبات المختلفة بالجسم، مثل هدم الكربوهيدرات إلى ثانى أكسيد الكربون وبخار ماء، وانطلاق الطاقة.

ودائمًا عمليات الهدم مصحوبة بتوليد الطاقة التى تخزن فى ATP أما البناء فإنه مصحوب باستهلاك الطاقة التى تكون نتيجة تحلل ATP إلى ADP + فوسفات. ولهذا يعتبر ATP حلقات إتصال بين عمليات الهدم والبناء. كما أن بعض المركبات التى تنتج أثناء الهدم تستخدم كبدائل لتكوين مركبات أكبر أثناء عمليات البناء. هذا الطريق الذى يربط بين طريقى الهدم والبناء يسمى amphibolic.

وتحدث عمليات البناء والهدم جنبًا إلى جنب فى كل خلية طوال عمر الإنسان، إلا أن سرعة وحجم كل منهما يختلف باختلاف المرحلة العمرية، كما يوضحها شكل (٧-٥).



شكل (٧-٥) سرعة وحجم عمليات البناء والهدم فى مراحل العمر المختلفة


## ميتابوليزم الكربوهيدرات :

تمر الكربوهيدرات بعد هضمها وامتصاصها بعدة عمليات فى الجسم تنتهى إما بتوليد الطاقة أو بتخزينها فى الجسم حسب احتياجه، إما فى صورة جليكوجين أو فى صورة دهن، ويوضح شكل (٥-٨) خط سير الكربوهيدرات فى جسم الإنسان أثناء عملية الميتابوليزم.

## ميتابوليزم الجلوكوز :

بعد أن يصل السكريات الأحادية إلى الكبد عن طريق الوريد البابى، فإنه يتم تحويل السكريات الأحادية إلى جلوكوز فى الكبد ويستعمل الجلوكوز لتوليد الطاقة حسب احتياج الجسم بعد أن يتم توزيعه إلى جميع الخلايا، أما الزيادة فتخزن إما فى صورة جليكوجين أو فى صورة دهن.

ويلاحظ أن الجهاز العصبى يعتمد على الجلوكوز فى توليد الطاقة اللازمة، ولا يوجد مكان لتخزين الطاقة فى الجهاز العصبى، ولذا فالجهاز العصبى يعتمد على جلوكوز الدم فى توليد الطاقة.



شكل (٨-٥) ميتابوليزم الكربوهيدرات

ويعتبر جليكوجين العضلات موردًا سريعًا للطاقة، ويمكن توليد الطاقة بدون وجود الأكسجين anaerobic وفي هذه الحالة يتكون حامض اللاكتيك وعند وفرة الأكسجين فإن حامض اللاكتيك يتم أكسدته مما يؤدي إلى انطلاق طاقة أكبر ويمكن أن يتسرب جزء من حامض اللاكتيك إلى الدم في حالة عدم وجود الأكسجين ومن الدم إلى الكبد حيث يمكن للكبد أن يحول اللاكتيك إلى جليكوجين، وتعرف هذه بدورة كوري Cori وتوضيحتها فيما يلي :

جليكوجين كبد ← جلوكوز دم ← جليكوز عضلات ← جلوكين عضلات  
حامض لاكتيك الدم ← جليكوجين الكبد

وعند انطلاق الطاقة، فإن الجلوكوز يتحول إلى حامض بيروفيك من خلال عدة عمليات إنزيمية، ويتم انطلاق الطاقة عند دخول جزيء من حامض البيروفيك في دورة حامض الستريك، ويتحول هذا الحامض إلى  $\text{CO}_2$ ،  $\text{H}_2\text{O}$  في وجود الأكسجين، ويتم تحويل الجلوكوز إلى جليكوجين في الكبد أو العضلات، وذلك خلال عدة تفاعلات إنزيمية في وجود أيونات المغنسيوم كعامل مساعد، ويلاحظ أن جليكوجين الكبد هو مصدر جلوكوز الدم في حالة الصيام، ويمكن للكبد تخزين جليكوجين بما يعادل ١٠٪ من وزنه، أما العضلات فيمكنها تخزين ما يعادل ٢٪ من وزنها، ويتضح ذلك من جدول (٥-٢).

جدول (٥-٢) تخزين الكربوهيدرات في فرد عادي وزنه ٧٠ كجم


جليكوجين الكبد	١٠,٠ ٪ = ١٠٨ جم <sup>(١)</sup>
جليكوجين للعضلات	٠,٧ ٪ = ٢٤٥ جم <sup>(٢)</sup>
جلوكوز السوائل الخارجية	٠,١ ٪ = ١٠ جم <sup>(٣)</sup>

(١) وزن الكبد = ١٨٠٠ جم (٢) وزن العضلات = ٣٥ كجم (٣) الحجم الكلى = ١٠ لتر

أي أن نسبة تركيز الجليكوجين في الكبد أعلى منه في العضلات؛ إلا أن العضلات نتيجة لأكبر حجمها أصبحت تستوعب أكبر كمية من الجليكوجين. عند احتياج الفرد للطاقة فإن الجليكوجين يتحول إلى جلوكوز، ويسمى بتحويل الجليكوجين إلى جلوكوز (glycogenolysis) أما تحويل الجلوكوز إلى جليكوجين

يسمى (glycogenesis) وتكوين الجليكوجين من مصادر غير كربوهيدراتية مثل الأحماض الأمينية والجلوسول تسمى gluconeogenesis ويتم معظمها فى الكبد فى حالات الجوع والرياضة والحموضة. أما تحليل الجلوكوز إلى حامض بروفيك تسمى glycolysis.

ويمكن أن يتحلل الجلوكوز بعد تحويله إلى جلوكوز- ٦ فوسفات عن طريق دوره البتوز الفوسفاتى pentose phosphate وهى كفرع من طريقة تحليل الجلوكوز بالطريقة السابقة. وينطلق من هذا التفاعل جزئ من ثانى أكسيد الكربون وأربع ذرات هيدروجين مع تكوين سكر خماس وبعد عدة خطوات يتكون جلوكوز. وعادة تتطلب هذه الدورة على الأقل ٣ جزيئات جلوكوز والنتيجة النهائية كما يلي:



$\text{CO}_2 + ٢ \text{ جلوكوز- ٦ فوسفات} + ٣ \text{ جلوسر الدهيد- ٣ فوسفات} + ٦ \text{ NADPH}_2$   
ويستخدم NADPH فى تخليق الأحماض الدهنية أو الأحماض الأمينية وكذلك للمحافظة على المواد المختزنة دون تأكسد ولحماية جدر الخلايا كما تستخدم هذه الطريقة أيضاً للحصول على السكريات الخماسية اللازمة لتكوين النكليوتيدات nucleotides والأحماض النووية nucleic acids.


وتعتبر gluconeogenesis هامة لجسم الإنسان لأنه عن طريقها يحصل الإنسان على ما يلزمه من الطاقة عند نقص الكربوهيدرات فى الغذاء وذلك خصوصاً لمد الجهاز العصبى وكرات الدم الحمراء بالطاقة اللازمة. وأن غياب هذه العملية خطر جداً على الإنسان- لأنه إذ انخفض مستوى جلوكوز الدم عن حد معين لا يتمكن المخ من أداء وظائفه وقد تحدث غيبوبة ثم الوفاة.

كما أن الجلوكوز أيضاً مصدر للجلوسول والجلوسيدات اللازمة فى أنسجة التخزين. كما أنه مهم للحفاظ على مستوى مناسب من المركبات الوسطية التى تدخل فى دورة حامض الستريك فى مختلف أنسجة الجسم. من المعروف أن الدهون تعتبر مصدراً مهماً مطلوب لسد حاجة الجسم منه. فالجلوكوز هو مصدر الطاقة الوحيد للعضلات تحت الظروف اللاهوائية، كما أنه هو مصدر سكر اللاكتوز فى غدد الثدي.

كما أن عملية gluconeogenesis مهمة لتخلص الأنسجة من بقايا الميتابوليزم. مثل حامض اللاكتيك فى العضلات والكرات الدموية الحمراء، والجلسول الذى يتكون دائماً فى أنسجة التخزين.


### ميتابوليزم الجليكوجين :

يبدأ بناء الجليكوجين بجزء صغير مبدئى من الجليكوجين، ويضاف لأحد فروعه جزيئات من الجلوكوز واحد بعد الآخر حتى يصل طول السلسلة حوالى ١١ جزء جلوكوز ثم ينقل جزء من هذه السلسلة إلى فرع مجاور كما فى شكل (٥ - ٩أ) وعند هدم الجلوكوز فإنه تزال جزيئات الجلوكوز إلى أن يتبقى ٤ جزيئات جلوكوز فى كل فرع ثم ينقل جزء من السلسلة يحتوى على ٣ جزيئات جلوكوز إلى فرع آخر كما فى شكل (٥ - ٩ب) ويتم كل هذه العمليات بواسطة انزيمات خاصة.



The biosynthesis of glycogen. The mechanism of branching as revealed by adding  $^{14}\text{C}$ -labeled glucose to the living animal and examining the liver glycogen at further intervals.

أ (بناء الجليكوجين)



ب (هدم الجليكوجين)

شكل (٩-٥) ميټابوليزم الجليكوجين



## جلوكوز الدم وطرق تنظيمه :


يحتوى الدم على جلوكوز بمستوى من ٨٠-١٠٠ ملليجرام / ١٠٠ مل دم، ولكن يرتفع هذا المستوى بعد تناول الطعام إلى ١٣٠ ملليجرام / ١٠٠ مل، ومن النادر أن يزيد عن ١٧٠ - ١٨٠ ملليجرام / ١٠٠ مل دم، ولكن يعود تركيز السكر إلى المستوى الطبيعى بعد ١,٥ - ٢ ساعة، وعادة يستمر مستوى الجلوكوز ثابتاً بين الوجبات بالرغم من كثرة استعمال الجلوكوز فى الأنسجة، وتنظيم مستوى السكر فى الدم يعتمد على مقدرة الكبد على أن يزيل السكر الزائد الذى يصل إلى الدم من مصادره المختلفة التى تشمل الغذاء (كربوهيدرات - سكريات مهضومة - مصادر غير كربوهيدراتية مثل الجلسرول والأحماض الأمينية - أو جليكوجين الكبد) فجزء من الجلوكوز يتحول إلى جليكوجين وجزء يستعمل فى الطاقة، ولكن الغالبية الكبرى تتحول إلى دهن فى الكبد والأنسجة المختلفة، ويخزن فى أنسجة تخزين الدهن المختلفة كمصدر للطاقة المخزنة، أما بين الوجبات فإن مستوى الجلوكوز فى الدم ينظم أو يحافظ على المستوى المناسب بواسطة جليكوجين الكبد، فعند زيادة جلوكوز الدم عن المستوى الطبيعى، يتحول الجلوكوز إلى جليكوجين كبد، كما يشجع استخدام الجلوكوز لتوليد الطاقة.

وفى حالة انخفاض مستوى جلوكوز الدم يتحول جزء من جليكوجين الكبد إلى جلوكوز الدم، كما أن الكلى لها دور فى تنظيم مستوى الجلوكوز، ولكن إذا زاد مستوى الجلوكوز فى الدم إلى أكثر من ١٧٠ - ١٨٠ ملليجرام / ١٠٠ مل دم، فإن الجلوكوز ينزل فى البول (glycosuria) ويطلق على مستوى الجلوكوز ١٧٠-١٨٠ ملليجرام / ١٠٠ مل دم اسم العتبة الكلوية renal threshold.

وللهرمونات دور كبير فى تنظيم مستوى الجلوكوز فى الدم، ومن هذه الهرمونات:

### الإنسولين insulin :

الإنسولين هو مادة بروتينية تفرزها الخلايا بيتا من جزر لانجرهانس فى البنكرياس (شكل ١٠-٥)، وتعتبر كربوهيدرات الغذاء من العوامل المثيرة لإفراز الإنسولين، وهذا الهرمون يعمل على حفظ مستوى الجلوكوز فى الدم بتشجيع تحويله إلى جليكوجين أو تحويله إلى دهن. كما أنه يمنع تحويل الجليكوجين إلى جلوكوز.



### شكل (٥-١٠) خلايا الفاويتا فى البنكرياس

جلوكوكورتكويدات glucocorticoid :

يفرز هذا الهرمون من نخاع medulla غدة الأدرنال adrenal أو الغدة الكظرية، وهذا الهرمون يشجع تكوين الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية، كما أنه يقلل من دخول الجلوكوز فى الخلية، وبالتالي يقلل من تمثيل الجلوكوز؛ أى أنه يعمل على رفع مستوى الجلوكوز فى الدم.

الابنفيرين والنورابنفيرين nor - epinephrine & epinephrine :

وهما هرمونان من إفراز غدة الأدرنال، ويشجعان على تحليل الجليكوجين إلى جلوكوز، وبالتالي رفع مستوى جلوكوز الدم.

هرمون النمو growth hormone :

ويفرز هذا الهرمون من الغدة النخامية، يعمل على خفض تمثيل الجلوكوز مما يودى إلى رفع مستوى جلوكوز الدم.

الجلوكاجون glucagon :

وهو من إفراز خلايا ألفا من جزر لانجرهانس فى البنكرياس (شكل ٥-١٠)، ويرفع مستوى الجلوكوز فى الدم عن طريق تحويل الجليكوجين إلى جلوكوز.

## الثيروكسين thyroxine :

وهذا الهرمون من إفراز الغدة الدرقية، وقد ظهر أن له علاقة في تغيير مستوى الجلوكوز في الدم، حيث ظهر أن مستوى الجلوكوز يزيد عند المرضى بزيادة نشاط هذه الغدة، ويقل المستوى عند المرضى بانخفاض نشاط هذه الغدة، وفي حالة زيادة نشاط إفراز الغدة يمكن للمرضى أن يستفيدوا من الكربوهيدرات بطريقة طبيعية، أما في حالة انخفاض نشاط الغدة فتقل قدرة الفرد على الاستفادة من الجلوكوز.


وتتحدد قدرة الفرد على الاستفادة من الكربوهيدرات carbohydrate tolerance حسب مستوى الجلوكوز في الدم، وعندما يفقد الجسم قدرته على الاستفادة من الكربوهيدرات يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم عند مستوى العتبة الكلوية وينزل الجلوكوز في البول كما سبق ذكره، وتعرف هذه الحالة بمرض السكر diabetes mellitus وفي هذا المرض تنعدم قدرة الفرد على تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، وهذه قد ترجع إلى عادات الفرد الغذائية أو فشل خلايا بيتا لنجرهانس في البنكرياس نتيجة لسبب وراثي أو لأي سبب آخر يؤثر في إفراز الإنسولين أو نقله أو تأثيره، وقد أشار Williams & Ensinnck (١٩٦٦) إلى أن هناك بعض المواد في وجبة الفرد أو مواد تنتج داخل الجسم نتيجة الميتابوليزم تساعد على إفراز الإنسولين.

ومن بين هذه المواد التي تعمل على زيادة إفراز الإنسولين بدرجات متفاوتة، مادة الجلوكوز والفركتوز، أو بعض الهرمونات مثل glucagon الذي يعمل على رفع مستوى جلوكوز الدم، ويلاحظ أن الإفراط في الأكل قد يعتبر عاملاً مشيراً لزيادة إفراز الإنسولين، فتجهد خلايا بيتا بجزر لانجرهانس ويقل إفرازها للإنسولين، وقد ظهر في بعض التجارب على الحيوانات أن التغيير من وجبة فيها السعرات المستعملة من دهون إلى وجبة فيها السعرات مستعملة من كربوهيدرات أدت إلى إصابة الحيوانات بمرض السكر، ومن جهة أخرى فإن الجوع نفسه يقلل من قدرة الشخص على إفراز الإنسولين، مما يؤثر على مقدرة الفرد على الاستفادة من الكربوهيدرات، فالصوم أو التغذية على دهون أو تعاطي إنسولين خارجي يقلل من إفراز البنكرياس للإنسولين، وقد أمكن علاج حالة السكر بتنظيم تناول الطعام وبالإنسولين في حيوانات التجارب إذا بدأ العلاج قبل تغير خلايا بيتا تغيراً دائماً.

ولتقليل انتشار الإصابة بمرض السكر، يجب محاولة اكتشافه والتعرف على الإصابة في وقت مبكر، كما أنه على الأفراد، وخصوصاً الذين ينتمون إلى عائلات يظهر فيها مرض السكر، أن يتجنبوا السمنة مع القيام بالتمارين الرياضية، فالرياضة تقلل من وزن الجسم وتساعد على الاستفادة من الكربوهيدرات، كما أن كفاءة الإنسولين تزيد، وعلى الفرد المصاب به أن ينظم غذاءه تحت إشراف المختصين وأن يعمل على تقليل السعرات الغذائية خاصة بالنسبة للفرد السمين، وأن ينظم السعرات المستمدة من الكربوهيدرات والبروتين والدهون، وعادة تقلل السعرات المستمدة من الكربوهيدرات فلا تزيد عن ٤٠٪ من السعرات الكلية للوجبة، والسعرات المستمدة من البروتين تكون حوالى ١٥٪ والدهون ٤٥٪ مع ملاحظة ألا يزيد مقدار ما يتناوله الفرد من الكربوهيدرات يومياً عن ٢٤٠-٢٦٠ جم، وألا يقل عن ١٠٠ جم لمنع حالة الحموضة السابقة الذكر، وعادة يتأثر تناول البروتين بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى للفرد، ويتناول الفرد الدهون لاستكمال حاجته من السعرات.

### ميتابوليزم الدهون :

بعد أن يتم هضم الدهون وامتصاصها خلال الأوعية الليمفاوية، فإنها تصل إلى الدم، ولكن يلاحظ أنه بعد امتصاصها، فإنها تتحد ثانياً وتكون دهناً كما سبق (شكل ٥-١١) فى صورة حبيبات صغيرة قطرها ١ ميكرون تسمى كيلوميكرون chylomicron ويتحد جزء من الدهون بحامض الفوسفوريك لتكوين فوسفوليبيدات، وتتحد الليبيدات مع البروتين مكونة ليبوبروتينات مختلفة، وعادة تنقل الليبيدات المختلفة عن طريق الدم إلى الكبد وأجزاء الجسم المختلفة لاستخدامها، إما فى توليد الطاقة أو تخزن فى أنسجة التخزين المختلفة، ويحتوى الكبد على ٥-٧٪ من وزنه دهناً (وزن رطب)، أما فى الحالات المرضية فإن نسبة الدهون فى الكبد قد يصل إلى ٧٠٪ من وزنه، مما يؤدي إلى فشل الكبد فى أداء وظائفه.



شكل (١١-٥) ميتابوليزم الدهن

## ليبيدات الدم :

يتأثر تركيب ليبيدات الدم بنسوع الغذاء، والجدول (٣-٥) يوضح تركيب ليبيدات الدم فى الإنسان، وتوجد حوالى ٨٠٪ من دهون الدم فى صورة جلسريدات ثلاثية واسترات كولسترول وفوسفوليبيدات.

جدول (٣-٥) ليبيدات الدم

التركيب / البيان		مليجرام / سائل
		المدى
		المتوسطة
الليبيدات الكلية	٥٧٠	٨٢٠ - ٣٦٠
الجلسريدات الثلاثية	١٤٢	١٨٠ - ٨٠
فوسفوليبيدات	٢١٥	٢٩٠ - ١٢٣
لسيئين		٢٠٠ - ٥٠
سفالين		١٣٠ - ٥٠
سفنجوميلين		٣٥ - ١٥
الكولسترول الكلى	٢٠٠	٣٢٠ - ١٠٧
كولسترول حر	٥٥	١٠٦ - ٢٦

وتوجد ليبيدات فى الكرات الدموية الحمراء، معظمها كولسترول وفوسفوليبيدات كما توجد فى الكرات الدموية البيضاء إلا أن نسبتها من الليبيدات أعلى منه فى الكرات الدموية الحمراء أو البلازما.

وتوجد ليبيدات الدم عادة متحدة مع البروتين، كما سبق ذكره، مكونة لبيوبروتينات كيلوميكرون، وألفا لبيوبروتين HDL، بتاليوبروتين LDL (جدول ٤-٥)، وتكون البتاليوبروتينات حوالى ٧٥٪ من ليبيدات دم الفرد العادى، ولو أنها تحتوى على ٥٪ من بروتينات البلازما فى صورة بتاجوليولين، أما ألفا لبيوبروتينات فإنها تكون ٣٥٪ من ليبيدات الدم وتحتوى على ٣٪ من بروتينات الدم فى صورة ألفاجوليولين، وتحتوى الألفا لبيوبروتينات على نسبة من الدهن أقل، ونسبة أكثر من

البروتينات بالنسبة لبيتاايوبروتينات، كما يوجد فى الدم الليبوبروتينات الخفيفة جداً (VLDL) والليبوبروتينات المتوسط ILD وهى ين LDL و VLDL كما سبق.

#### جدول (٥-٤) تركيب ليبيدات الدم<sup>(١)</sup>

الليبيوبروتين	بروتين	ليبيدات %	جليسريدات ثلاثية	فوسفو ليبيدات	كولسترول	المجموع
كيلو ميكرون	١	٨٨	٧	٤	٩٩	
الليبيوبروتينات الخفيفة جداً	٨	٥٤	١٦	٢٢	٩٢	
الليبيوبروتينات الخفيفة	٢١	١١	٢٢	٤٦	٧٩	
الليبيوبروتينات الثقيلة	٣٦	٩	١٨	٣٧	٦٤	
أحماض دهنية حرة-اليومين	٩٩	صفر	صفر	صفر	١	

#### ميتابوليزم الكيلوميكرون :

بعد تناول الغذاء المحتوى على نسبة عالية من الدهون فإنه يرتفع الكيلوميكرون فى الدم بعد حوالى ساعة بنسبة ١- ٢٪. ويتغير لون البلازما إلى الأصفر وتصبح عكسه نظراً لكير حجم الكيلوميكرون ولكن نظراً لسرعة دورة الكيلوميكرون فإن الوضع يرجع طبيعياً بعد عدة ساعات قليلة، ويلاحظ أن الكيلوميكرون تنقل دهون الوجبة المتناولة أى الدهون خارجية المنشأ.

وبعد امتصاص الكيلوميكرون فإن تذهب إلى الكبد وأنسجة التخزين وكلاهما يحتويان على كمية كبيرة من إنزيم lipoprotein lipase وهذا يحلل الجلسريدات الثلاثة والفوسفوليبيدات المكونة للكيلوميكرون وتطلق الأحماض الدهنية التى تدخل أنسجة التخزين وخلايا الكبد بسرعة ويعاد تكوين الجلسريدات الثلاثية بواسطة جليسرول يتكون داخل الخلية.

وعادة تستخدم هذه الدهون المخزنة فى توليد الطاقة ولذا فإنها تتحلل إلى أحماض دهنية وجليسرول. ويتأثر تحليل الدهون بواسطة مستوى الجلوكوز فإذا انخفض الجلوكوز يزيد تحليل الدهون وذلك نظراً لحاجة الجسم إلى الطاقة، كما أن انخفاض الجلوكوز يؤدي إلى انخفاض الفاجلسروفوسفات glycerophosphate وهى

<sup>(١)</sup> Olson (١٩٩٨).

لازمة لتكوين الجلiserول اللازم لتكوين الدهون بالإضافة إلى أن أنزيم lipase ينشط بفعل هرمونى فيعمل على تحليل الدهون.

وتتأين الأحماض الدهنية المنطلقة بسرعة وتتحد مع الالبومين albumin البلازما لنقلها. وفى الحالات العادية يتصل ثلاث جزئيات من الأحماض الدهنية مع جزئ من الالبومين ولكن فى بعض الأحيان قد يصل إلى ٣٠ جزئ أحماض دهنية/ جزئ البومين عند الحاجة ومستوى الأحماض الدهنية يصل إلى ١٥ ملجرام/ ١٠٠ مل دم وهذا يعادل ٤٥,٠ جم دهن فى كل الدم وتزيد نسبة الأحماض الدهنية الحرة فى حالة الصيام كما تزيد فى حالة مرض السكر، أو فى حالة القيام بمجهود بينما تناول الغذاء أو أى مصدر آخر للطاقة يقلل من مستوى هذه الدهون فى الدم. بعد إزالة الكيلوميكرون فإن حوالى ٩٥٪ من الدهون الباقية عبارة عن ليبوبروتينات.

### تخزين الدهون فى الجسم : Body fat Depot

توجد الدهون فى جميع خلايا الجسم، والدهون إما أنها تدخل فى بناء الخلية، ويسمى هذا بالجزء الثابت من دهن الجسم، ويتكون من فوسفوليبيدات وكولسترول وقد يوجد سيروبوسيدات، أو تخزن فى أماكن التخزين، ويسمى هذا الجزء المتغير من دهن الجسم، والجزء الثابت من دهن الجسم لا يستخدم فى توليد الطاقة ولا يتأثر لحد كبير بنوع الغذاء أو كميته أو نوع العمل وكمية المجهود الذى يقوم به الإنسان بعكس الجزء المتغير حيث يتأثر بكل هذه العوامل.

تخزن الدهون عادة فى أنسجة التخزين adipose tissue وأيضاً فى الكبد ويستخدم الجسم الدهون المخزنة فى أنسجة التخزين لتوليد الطاقة حسب حاجة الجسم كما أن هذه الدهون تعمل كعازل لمنع فقد الحرارة، يمكن الخلية الدهن أن تخزن كمية من الجلiserيدات الثلاثية تعادل ٨٠ - ٩٠٪ من حجمها.

وعادة تكون الدهون المخزنة فى صورة سائلة ولكن عند تعرض الجلد لجو بارد لمدة طويلة تصل إلى أسابيع فإن الأحماض الدهنية الطويلة إما أن تقصر أو تتحول إلى أحماض غير مشبعة وذلك لخفض درجة ذوبانها ليساعد على سيولة الدهن وهذه الصورة السائلة تساعد فى الإستفاده من الدهون ونقلها من مكان لآخر (Hall, Guyton ١٩٩٦).



ويمكن لخلية الدهن أن تكون جلسريدات ثلاثية من الكربوهيدرات عند زيادة المتناول من الكربوهيدرات ولكن معظم هذا التحريل يتم فى الكبد وتنقل الجلسريدات الثلاثية المتكونة فى الكبد بواسطة الليبوبروتينات الخفيفة جداً (VLDL) إلى أنسجة التخزين، ويلاحظ أن الليبوبروتينات تنقل الدهون التى تتكون داخل الجسم أى داخلية المنشأ.

وتستخدم الجلسريدات الثلاثية المخزنة فى توليد الطاقة وهذا يتطلب تحليل الجلسريدات الثلاثية إلى أحماض دهنية وجليسول ثم تنقل هذه النواتج إلى الأنسجة النشطة لكى تتم أكسدتها لانطلاق الطاقة ويمكن لكل الخلايا باستثناء خلايا الكبد أن تستخدم الأحماض الدهنية والجليكول كمصادر للطاقة.

ويتحول الجليسول فى الأنسجة النشطة بواسطة إنزيمات الخلية إلى جليسرول -٣- فوسفات. ويستكمل عمليات الهدم لانطلاق الطاقة.

وعادة يزن الدهن تحت الجلد Subcutaneous وحول بعض أعضاء الجسم مثل الكلى perirenal كما يوجد فى العضلات intermuscular، ويتأثر هذا الجزء من الدهن بنوع الغذاء والعمر والجنس والتوازن الهرمونى، وهذه الدهون المخزنة فى حالة ديناميكية، حيث أن لها نشاطاً متابولياً يعكس ما كان معروفاً سابقاً، وتتكون من نسبة كبيرة من جلسريدات وهذه تحلل باستمرار إلى أحماض دهنية وجليسول، كما أن هناك تكويناً مستمراً للأحماض الدهنية فى هذه الأنسجة من حامض الاستيك وحامض البيروفيك وحامض اللاكتيك وغيرها، ويتوقف ترسيب الدهون فى أنسجة التخزين أو تحليلها على كمية الطاقة المتولدة من الغذاء فى آخر وجبة، وعلى الاحتياج للطاقة للنشاط ولعمل الأنسجة المختلفة.

وتختلف نسبة الدهون المخزنة فى أنسجة التخزين من ٨ - ١٥ كجم فى الإنسان البالغ، وتصل إلى ١٠ - ٢٠ كجم فى الفتاة البالغة، وتزداد بتقدم العمر، وقد تصل هذه النسبة فى الشخص الهزيل المريض إلى ١ كجم بينما تصل إلى ١٠٠ كجم فى الشخص البدين، كما أن توزيع الدهون فى الجسم يختلف.

### بعض الحالات الشاذة لتخزين الدهن Abnormal Fat Storage :

هناك حالتان شاذتان فى تخزين الدهن معروفتان الآن : الأولى هى زيادة تخزين الدهون الطبيعية بنسبة كبيرة تؤدى إلى السمنة، ومعظم الدهن عبارة عن

جلوسريدات ثلاثية، أما الحالة الأخرى فهي ترسيب الدهون فى بعض الأعضاء مثل الكبد والطحال مما يؤثر على نشاط هذه الأعضاء، ومعظم الدهون هنا عبارة عن كولسترول وفوسفوليبيدات وسربروسيدات.

وعمل الكثيرون إلى إرجاع السمّة إلى تناول السعرات بصورة زائدة عن الاحتياج، مما يؤدى إلى تخزينها فى صورة دهن، والسمّة قد ترجع إلى عدم تنظيم تناول الطعام نتيجة لعدم قيام الهيبوثالاميس فى المخ *hypothalamus* بواجبه أو نتيجة لعوامل نفسية، كما قد ترجع السمّة إلى اضطراب فى ميثابوليزم الكربوهيدرات والدهون، كما أن للوراثة دور فى ذلك.

أما ترسيب الدهون فى الكبد فإما أنه يرجع إلى عوامل فسيولوجية أو باثولوجية، وتنشأ العوامل الفسيولوجية عندما تزيد الحاجة كثيراً إلى حركة الدهون وأكسدتها لتوليد كميات كبيرة من الطاقة، وتنشأ هذه الحالة كثيراً فى الصيام أو الجوع... أما العوامل الباثولوجية فتنشأ نتيجة لعدم مقدرة الكبد على تحريك الدهون خارجها، مما يؤدى إلى ترسيبها فى الكبد، ومن العوامل المهمة فى هذا الشأن هو الكولين *choline* والحامض الأمينى ميثايرين، حيث تساعد كلها على حركة الدهون.


#### خلايا الدهن البنى **Brown Fat cells** :

إن الدهن البنى صورة من صور الدهن المخزن فى الجسم، ولكن بنسبة أقل من الدهن الأبيض ويتكون فى الإنسان خلال مرحلة الجنين (Hull, Dawkins ١٩٦٥)، حول الرقبة والكلية وغدة الادرنال وفى منطقة البطن، ونقل كميته بتقدم العمر وعند الشعور بالبرد.

وخلية الدهن البنى صغيرة الحجم وتحتوى على نسبة عالية من السيترولازم ويوجد الدهن البنى فى صورة كرات صغيرة وتحتوى النواة على نويتين *nucleoli* (شكل ٥-٢١)، ويوجد عدد كبير من وحدات الميتوكوندريا وريبوزومات حرة وحبيبات من الجليوكجين.

ويرجع اللون البنى للدهن إلى لون الدم الذى يرد للخلية بكمية كبيرة وأيضاً إلى احتواء جدار الميتوكوندريا على عدد كبير من السيتركرومات *Cytochromes* الغنية بالحديد.

وروظيفة هذه الخلية هو توليد الحرارة heat production وليس توليد الطاقة energy production عند الشعور بالبرد، ويتم ذلك عن طريق أكسدة الأحماض الدهنية تحت تأثير هرمون النور ايفرين، وتوزع الحرارة إلى جميع أجزاء الجسم بواسطة الدم دون حدوث رعشة ظاهرة (Shivering Hull ١٩٦٦).



Brown adipose cell. LD, lipid droplet; M, mitochondrion; NI, nucleoli.

### شكل (٥-١٢) خلية الدهن البنى

ميتابوليزم الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة :

يتم هدم وأكسدة الأحماض الدهنية فى الميتوكوندريا. وتنقل الأحماض الدهنية بواسطة الكارتين carnitine إلى الميتوكوندريا ثم تنفصل ويبدأ هدم الأحماض الدهنية عن طريق أكسدها على خطوات كل خطوة يفصل فيها جزء من السلسلة

عبارة عن ٢ ذرة كربون فى B-oxidation. ويتكون فى كل خطوة استيل COA الذى يدخل فى دورة حامض الستريك لانطلاق الطاقة.

كما يتم هدم الدهون فى الكبد وخصوصاً عن تحريك كمية كبيرة من الدهون لتوليد الطاقة. وعند تكوين استيل COA. يجمع جزءان منهما مكونا حامض acetoacetic. هذا يحمل فى الدم إلى خلايا أخرى لاستخدامه فى توليد الطاقة. جزء من حامض acetoacetic يتحول إلى حامض بتهيدركس بيوتريك B. hydroxy Butyric وكميات بسيطة من الأستون، وتنتشر هذه المواد فى الدم إلى الأنسجة كما أنها تدخل إلى الخلية حيث يتكون استيل COA ثانياً. ثم تدخل فى دورة حامض الستريك لانطلاق الطاقة.

وجود هذه المواد لا يزيد عادة عن ٣ ملجم/ ١٠٠ مل دم وعندما تزيد نسب حامض acetoacetic، وحامض BOH-butyric والأستون فإنها يطلق عليها ketosis ويطلق على هذه المواد الثلاثة معاً بالأجسام الكيتونية ketone bodies. وتحدث هذه الحالة فى حالة الجوع أو فى حالة الإصابة بمرض السكر أو حتى عند ارتفاع المتناول من الدهون.

وعند عدم كفاية الكربوهيدرات فإن الإنسان يستخدم الدهون المخزنة فى توليد الطاقة ويساعد على تحريك الدهون من أنسجة التخزين هرمونات glucocorticoids و glucagon مع انخفاض insulin وتستخدم هذه الأحماض فى توليد الطاقة مما يؤدي إلى تكوين أجسام كيتونية وتخرج هذه المواد من الكبد إلى الدم. وتزيد نسبة هذه المواد فى الدم أكثر من ٢٠ مرة عن المستوى الطبيعى مؤدياً إلى حموضة عالية acidosis. والأستون المتكون يخرج عن طريق الرئة. هو سريع التبخر وتظهر رائحته فى هواء الزفير. ويعتبر هذا أحد أعراض ketosis

أما من حيث بناء الأحماض فإنها تبنى من استيل COA مع مالونيل Malony COA مع NADPH فيبدأ ذلك بتحويل استيل COA إلى مالونيل COA ثم يضاف استيل COA إلى مالونيل COA مع NADPH وعندما يصل طول السلسلة إلى ١٤ - ١٨ ذرة كربون فإنها تتحد مع جلسرول مكونة جلسريدات ثلاثية- ويتم تخليق الأحماض الدهنية فى وجود انزيمات متخصصة حسب طول السلسلة حتى يتم التحكم فى نوعية الجلسريدات الثلاثية المكونة.

وكما سبق فإنه يمكن للجسم تكوين الأحماض الدهنية المشبعة إما فى الكبد أو الكلى أو بعض الأنسجة الأخرى فى الجسم، داخل الميتوكونديا، أما الأحماض الدهنية غير المشبعة فيمكن للجسم أن يكون الأحماض الدهنية ذات الرابطة الواحدة غير المشبعة، أما الأحماض الدهنية عديدة الروابط غير المشبعة، فلا يمكن للجسم تكوينها، ولو أن James وآخرون سنة (١٩٥٧) ذكروا أنه يمكن للجسم تكوين حامض الأراكيدونيك بدرجة محدودة فى خلايا الدم.

وكما سبق ذكره وكما تشير الدراسات (Hofsten وآخرون ١٩٨٩) أن الجسم يمكن أن يضيف الروابط غير مشبعة إلى الحامض الدهنى غير المشبع من الطرف الكربوكسيلي (شكل ٥-١٣) وذلك بواسطة إنزيمات خاصة *desaturase* ويتتج أحماض دهنية عديدة الروابط غير المشبعة، وعلى هذا إذا كانت الأحماض الدهنية غير المشبعة هى *linolenic*, *linoleic*, *arachidonic* فإن الأحماض الدهنية عديدة الروابط غير المشبعة الناتجة يكون لها نشاط وتأثير الأحماض الدهنية الأصلية، أما بالنسبة للأحماض الدهنية ذات الرابطة الواحدة غير المشبعة مثل *oleic* أو الأحماض الدهنية المشبعة فإن الأحماض الدهنية غير المشبعة والناتجة منها ليس لها نشاط الأحماض الدهنية الأساسية، ويلاحظ أنه ينتج من ميتابوليزم حامض الاربليك (١٨ : ١) *w9* حامض *eicosatrienoic* ٢٠ : ٣ *w9* ويتراكم فى الدهن، ويتم ذلك عند نقص حامض اللينوليك *Linoleic*، ولمنع هذا التراكم ينبغي ألا يقل ما يساهم به حامض *Linoleic* عن ١ ٪ من إجمالى الطاقة، كما أن قياس نسبة حامض

*eicosatrienoic* (٢٠ : ٣ *w9*) أى triene مؤشراً عن المستوى الغذائى للدهون tetraene (٢٠ : ٤ *w6*) *eicatetraenoic* على أن تكون النسبة تعادل ١,٠ + ٠,٨ ولا تزيد عن ٤ وكلما انخفضت كان ذلك أفضل، ولا فرق بين الذكور والإناث فى ذلك.

Diet	Diet	Diet	Diet	Diet
↓	↓	↓	↓	↓
Carbohydrate →	16:0	18:0		
Δ <sup>9</sup> -desaturase →	16:1ω7 palmitoleic	18:1ω9 oleic	18:2ω6 linoleic	18:3ω3 linolenic
	↓	↓	↓	↓
Δ <sup>6</sup> -desaturase →	16:2ω7	18:2ω9	18:3ω6	18:4ω3
	↓	↓	↓	↓
	18:2ω7	20:2ω9	20:3ω6	20:4ω3
	↓	↓	↓	↓
Δ <sup>5</sup> -desaturase →	18:3ω7	20:3ω9 eicosatrienoic	20:4ω6 arachidonic	20:5ω3 eicosapentaenoic
	↓	↓	↓	↓
	20:3ω7	22:3ω9	22:4ω6	22:5ω3
	↓	↓	↓	↓
Δ <sup>4</sup> -desaturase →	20:4ω7	22:4ω9	22:5ω6	22:6ω3 docosahexaenoic

### شكل (٥-١٣) ميتابوليزم الأحماض الدهنية غير المشبعة في الجسم

#### دهون الكبد Liver Lipids :

يعمل الكبد على هدم الدهون لتوليد الطاقة، ولبناء الجلسريدات الثلاثية غالبًا من الكربوهيدرات ولدرجة أقل من البروتين ولتكوين كولسترول وفوسفوليبيدات. تزيد الدهون في الكبد أثناء الجوع حيث تحتوى دهون الكبد على فوسفوليبيدات وكولسترول. ويمكن للكبد أن تضيف روابط غير مشبعة للأحماض الدهنية لدخولها في بناء بعض مكونات الخلية. ويلاحظ أن دهون أنسجة التخزين أكثر تشبعًا عن تلك التي في الكبد.

ويتم في الكبد تحويل الكربوهيدرات الزائدة عن الحاجة إلى جلسريدات ثلاثية تخزن في الجسم لاستعمالها حسب الحاجة. وتعتبر هذه الخطوة مهمة وذلك لأن قدرة خلايا الجسم لتخزين الكربوهيدرات في صورة جليكوجين محدودة لا تتعدى عدة مئات من الجرامات من الجليكوجين تخزن في الكبد والعضلات. ولكن يمكن للجسم أن يخزن عدة كيلوجرامات من الدهن وتعتبر هذه مصدر لطاقة مخزنة للاستعمال بعد ذلك وتعتبر كمية الطاقة المخزنة في صورة دهون أكثر بما يعادل ١٥٠ مرة عن الطاقة المخزنة في صورة جليكوجين. علاوة على أن ١ جم من الدهون يولد طاقة أكثر من ضعف الطاقة المتولدة من ١ جم كربوهيدرات، هذا يساعد الجسم على

تخزين طاقة فى صورة دهن فى وزن أقل من الجسم عنه لو خزنت فى صورة كربوهيدرات وهذا مهم وخصوصاً لوزن الإنسان حتى لا يعوقه زيادة الوزن على الحركة والنشاط.

وهناك حالات يفشل فيها الإنسان عن تحويل الكربوهيدرات إلى دهون وذلك فى حالة غياب الأنسولين أو عدم إتاحتها وذلك لأن غياب الأنسولين يؤدي إلى منع الاستفادة من الجلوكوز كما أن نقص الجلوكوز يؤدي إلى نقص فى تكوين مركب الفاجسلر فوسفات glycerophosphate وهو مهم لتكوين الجلسرول اللازم لتكوين الجلسريدات الثلاثة.

كما يمكن للإنسان تحويل البروتين الزائد عن الحاجة إلى دهون حيث كثير من الأحماض الأمينية يمكنها أن تتحول إلى استيل COA كما سبق.

### تنظيم توليد الطاقة من الجلسريدات الثلاثية :

يفضل الجسم توليد الطاقة من الكربوهيدرات عند وجود كميات كافية منها وذلك لأسباب عديدة منها: أن توليد الطاقة فى الجلوكوز أسرع من الأحماض الدهنية، وجود الجلوكوز بكميات كافية تمنع استخدام الأحماض الدهنية فى توليد الطاقة، يزيد تكوين مركب  $\alpha$ -glycerophosphate اللازم لتكوين الجلسريدات الثلاثية ويحيد تكوينها، إن وجود زيادة من الكربوهيدرات يسرع من تكوين الأحماض الدهنية عن هدمها.

عند نقص الكربوهيدرات فإن تحريك الدهون يزيد من أماكن التخزين لاستخدامها فى توليد الطاقة. علاوة على أن هناك عدد من الهرمونات تنظم استخدام الدهون فى توليد الطاقة منها الانسولين - فنقص الانسولين أو غيابه يقلل من الاستفادة من الجلوكوز وهذا ينشط استخدام الدهون لتوليد الطاقة، هرمونى الابنفيرين والنور ابنفيرين اللذان ينشطان إنزيم lipase الذى يعمل على تحليل الجلسريدات الثلاثية وزيادة مستوى الأحماض الدهنية وفى بعض الحالات يزيد مستوى الأحماض الدهنية بما يزيد من ثمانية أمثال المستوى المعادى، ويزيد استخدام العضلات للأحماض الدهنية فى توليد الطاقة، علاوة على أن بعض الضغوط العصبية تزيد من تحريك الدهون وتحليلها وذلك نتيجة لزيادة إفراز هرمون corticotropin الذى يحفز إفراز glucocorticoid وهذان ينشطان انزيم lipase ويلاحظ أن زيادة إفراز هذين الهرمونين لمدة طويلة كما يحدث فى حالة مرض Cushing disease فإن زيادة تحريك الدهون يؤدي إلى حالة ketosis كما سبق ولهذا يقال أن هذين الهرمونين لهما تأثير كيتونى Ketogenic كما

أن هرمون النمو growth hormone يحفز إنزيم lipase إلا أن تأثيره الكيتوني أقل من corticotropin و glucocorticoid وبالنسبة لهرمون thyroxine فإنه يزيد من نشاط تحريك الدهون نتيجة لزيادة توليد الطاقة وإسراع الميتابوليزم فى الخلايا تحت تأثير هذا الهرمون.

#### ميثابوليزم الفوسفوليبيدات phospholipids :

يوجد العديد من الفوسفوليبيدات فى الجسم كما سبق، وبالرغم من اختلاف تركيبها الكيميائى إلا أن خصائصها الطبيعية متشابهة حيث أنها كلها قابلة للذوبان فى المذيبات الدهنية، وتنقل داخل الجسم بواسطة الليبوبروتينات. وتبنى الفوسفوليبيدات غالباً فى كل خلية وخصوصاً وأنها تدخل فى بناء جدر الخلايا، ويبنى معظمها أى حوالى ٩٠٪ منها فى الكبد وبعضها يتكون فى الأمعاء الدقيقة عند امتصاص الدهون ويتحكم فى تكوينها العوامل التى تحكم ميثابوليزم الدهون وذلك لأن زيادة الجلسريدات الثلاثية الداخلة إلى الكبد تزيد من فرص تكوين الفوسفوليبيدات علاوة على مدى توفر العناصر والمواد الكيميائية الداخلة فى تركيبها.

#### ميثابوليزم الكولسترول cholesterol والليبوبروتينات lipoprotein :

يوجد مصدران للكولسترول فى الجسم- المصدر الخارجى هو الغذاء وهو الذى يمتص ويسمى كولسترول خارجى exogenous والمصدر الثانى هو الكولسترول الذى يكونه الجسم endogenous وهو يفرق المصدر الأول كميأ. ويتكون معظم الكولسترول فى الكبد. وبعض الخلايا يمكنها تكوينه وخصوصاً وأنه يدخل فى بناء جدر الخلايا.

ويعتبر الكولسترول مصدر حامض الكولييك cholic حوالى ٨٠٪ من الكولسترول لهذا الغرض، وهذا الحامض يتكون فى الكبد وهو أساسى فى بناء الصفراء. كما يدخل فى بناء الهرمونات وفى جدر الخلايا والجلد كما سبق. وتوجد بعض العوامل التى تؤثر فى مستوى كولسترول الدم.

زيادة المتناول من الكولسترول يؤدى إلى زيادة مستواه فى البلازما وهذه الزيادة تمنع أو تقلل تكوين الكولسترول الداخلى. وعلى هذا فإن مستوى الكولسترول يتغير بنسبة حوالى ١٥٪ نتيجة تغير فى محتوى الكولسترول فى الأغذية المتناولة. وهذا يختلف باختلاف الأفراد.

تناول الدهون المشبعة يؤدى إلى زيادة مستوى كولسترول الدم بما يعادل ٢٥ - ١٥٪ نتيجة لزيادة ترسيب الدهون فى الكبد وبذا يتوفر استيل COA فى الكبد



لتكوين الكولسترول. ولهذا يفضل بل من المهم تناول وجبات منخفضة فى محتواها من الدهون المشبعة عن تناول وجبات منخفضة فى الكولسترول.

تناول دهون مرتفعة فى محتواها من الأحماض الدهنية غير المشبعة يقلل من تكوين الكولسترول لحد ما. للهرمونات دور حيث أن نقص الأنسولين يزيد من تركيز الكولسترول بينما زيادة الثيروكسين يقلل من تركيز الكولسترول ويرجع هذا إلى تأثير هذه الهرمونات على الإنزيمات الداخلة فى الميتابوليزم.

وتلعب الليبوبروتينات دوراً هاماً فى تنظيم كولسترول أنسجة الجسم وهى اللبيدات الخفيفة جداً VLDL ، الليبوبروتينات الوسط IDL ، الليبوبروتينات الخفيفة LDL (Hall, Guyton ١٩٩٦):

وبالنسبة لليبوبروتينات فتتكون الليبوبروتينات الخفيفة VLDL فى الكبد وهى تحتوى على كميات كبيرة من الجلسريدات الثلاثية بالإضافة إلى كولسترول وفوسفوليبيدات وعندما تمر هذه الليبوبروتينات فى الدم فإن إنزيم lipoprotein lipase الموجود فى جدر الخلايا وخصوصاً أنسجة التخزين يحلل جزء كبير من الجلسريدات الثلاثية الموجودة فى VLDL وينطلق الجلسرول والأحماض الدهنية إما لتخزينها فى صورة دهن أو لتوليد الطاقة ونتيجة لذلك تقل نسبة الجلسريدات الثلاثية فى VLDL وتزيد كثافتها وتحول إلى الليبوبروتينات الوسط IDL والتى يستقبلها السيروتين المستقبل Protein B-100 الموجود فى جدر خلايا الكبد وبذا يدخل فى الكبد حوالى نصف اللبيدات الوسط IDL أما التى تبقى منها فى الدم فيستمر فقدها للجلسريدات الثلاثية نتيجة تحللها بواسطة إنزيم Lipoprotein Lipase وتزيد كثافتها كما تزيد فيها نسبة الكولسترول والفوسفوليبيدات وتحول إلى ليبوبروتينات خفيفة LDL وهى محاطة بشحنات سالبة مما يسهل بقائها ذائبة فى البلازما- كما يوجد بأحد أقطاب IDL البروتين B-100 وهو يساعد هذه الليبوبروتينات الخفيفة على ارتباط بالمستقبلات receptors الموجودة على جدر معظم خلايا الجسم وبواسطة هذا الارتباط يعمل على نقل LDL إلى داخل الخلية ثم تحلل إلى مكوناتها من كولسترول وفوسفوليبيدات التى تدخل فى عملية بناء جدر الخلايا وغيرها من المركبات التى تحتاجها الخلية. كما أنه يمنع تخليق مستقبل LDL جديد وأيضاً كولسترول جديد علامة على أنه ينشط إنزيم Acetyl COA transferase الذى يكون استر كولسترول (Olsin ١٩٩٨).


ولتنظيم مستوى الكولسترول داخل الخلية- فعند زيادة تركيز الكولسترول

فإن إنتاج مستقبلات LDL فى الخلية يقل وهذا يقلل من دخول LDL إلى داخل وبهذا يقل مستوى كولسترول الخلية.

ولتنظيم بناء كولسترول الكبد. فإن خلية الكبد تنظم إنتاج مستقبل LDL كما يدخل فى خلية الكبد أكثر من نصف الليبوبروتينات الوسط ILD، وهاتان الظاهرتان ترفعان مستوى كولسترول الكبد- فمقابل ذلك فإن زيادة الكولسترول تثبط النظام الإنزيمى لإنتاج كولسترول جديد فى الكبد. ولهذا فعندما يقل استخدام الكولسترول فى خلايا الجسم فإن الزيادة تعود للكبد ويتوقف إنتاج الكولسترول وهكذا.

أما الليبوبروتينات الثقيلة HDL فتتكون فى الكبد وقليل منها يتكون فى الأمعاء الدقيقة عند امتصاص الدهون. وتحتوى هذه الليبوبروتينات على واحد من البروتينات الآتية هما apoprotein A-I أو apoprotein A-II على السطح الخارجى لليبوبروتين ويمكنهما الارتباط بمختلف المستقبلات الموجودة فى جدر أنسجة الخلايا بخلاف Apoprotein B الموجود فى الليبوبروتينات الأخرى ويمكن هذه الليبوبروتينات الثقيلة HDL أن تمتص الكولسترول قبل ترسيبه على جدر الأوعية الدموية وتوصيله إلى الكبد لهدمه.

ومن جهة أخرى أشار Olsin (١٩٩٨) أن مولد HDL المحتوى على apoA<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub> وفوسفوليبيدات وكولسترول يتكون فى الكبد وينقل إلى الدم، ويقوم A<sub>1</sub> apo- المساعد لأنزيم acyl Lecithin- Cholesterol transeferase بتنشيط هذا الإنزيم لنقل الأحماض الدهنية من اللسثين إلى الكولسترول ليتكون استر كولسترول وهذا يمكن HDL أن تأخذ شكل كروى وتكون الأقطاب المشحونة إلى الخارج وتعمل HDL على نقل الكولسترول إلى الكبد لهدمه ويوضح (٥ - ١٤) ميتابوليزم الليبوبروتينات.



شكل (٥ - ١٤) ميثابوليزم الليبوبروتينات

1= LPL= lipoprotein lipase.

2= LCAT: lecithin- cholesterol acyl tranferase.

3- HTGL = Hepatic triglyceride lipase.

4= CMRemnat= IDL

يتضح مما سبق كيف تلعب الليبوبروتينات دوراً مهماً في الوقاية من الإصابة

بمرض تصلب الشرايين كما سيأتى:

### ميثابوليزم البروتين:

بعد أن يتحلل البروتين إلى أحماض أمينية أثناء الهضم، وتمتص الأحماض الأمينية هذه وتصل خلال الوريد البابى إلى الكبد (شكل ٥ - ١٥) يبقى جزء من الأحماض الأمينية فى الكبد لسد حاجة هذا العضو، أما الباقي فإنه يوزع بواسطة الدم إلى أنسجة الجسم المختلفة، ويختلف مصير الأحماض الأمينية فى الأنسجة المختلفة حسب حاجة هذه الأنسجة، ففى وجود مصادرة وافرة للطاقة، فإن الأحماض الأمينية تستخدم فى بناء بروتين الأنسجة، الأنزيمات والبيبتيدات العديدة والهرمونات.

Source: Olso, 1998. <sup>١</sup>

## ميتابوليزم الأحماض الأمينية :

متوسط مستوى الأحماض الأمينية فى الدم ٣٥-٦٥ ملجم/ ١٠٠ مل دم يرتفع هذا المستوى بعد تناول الغذاء ولكن الارتفاع يكون بسيطاً لا يتعدى عدة ملجمرات/ ١٠٠ مل دم وذلك لأن هضم البروتين يمتد ٢-٣ ساعة. ولهذا فامتصاص الأحماض الأمينية يكون بسيطاً علاوة على أن الأحماض الأمينية المتصلة تدخل الخلايا فى جميع أجزاء الجسم بسرعة خلال ٥- ١٠ دقائق. إن دورة الأحماض الأمينية سريعة إذ أن بضعة جزئيات من البروتين تنقل من مكان لآخر فى أى جزء من الجسم خلال ساعة فى صورة أحماض أمينية.


بعد دخول الأحماض الأمينية إلى الخلية فإنها تندرج لتكون بيبتيديات ثم بروتين بواسطة RNA الذى يتلقى التعليمات من DNA ولذا فإن مستوى الأحماض الأمينية الحرة فى الخلية يظل منخفضاً وتعتبر الكبد أكثر الأعضاء نشاطاً فى تكوين البروتين.

إن كثيراً من البروتينات يمكنها أن تتحلل بواسطة إنزيمات التحليل الموجود فى الخلية وتنطلق أحماض أمينية إلى الدم باستثناء بروتين كروموزومات الخلية والبروتينات البنائية مثل كولاجين وبروتين العضلات.

يمكن لبعض الأنسجة أن تحتفظ ببعض الأحماض الأمينية مثل الكبد حيث أنها يمكنها أن تحول الأحماض الأمينية من حالة لأخرى- أحياناً يتم هذا فى الكلى وفى ميوكوزا الأمعاء الدقيقة.


ولتكوين بروتين الجسم، يجب أن تكون كل الأحماض الأمينية اللازمة لهذا البروتين موجودة بالكمية النوعية اللازمة معاً فى وقت واحد، وفى حالة غياب أحد الأحماض الأمينية الأساسية أو نقصه فإن الأحماض الأمينية غير المستعملة فى بناء البروتين تستخدم فى أغراض أخرى.

ولكل خلية حد أقصى لوجود البروتين بها وبعد هذا الحد فإن الزيادة من البروتين تهدم وتنطلق الأحماض الأمينية إلى الدم حيث تستخدم فى توليد الطاقة أو التحويل إلى دهون وكربوهيدرات.




شكل (١٥-٥) ميابوليزم البروتين

وعند استخدام الأحماض الأمينية فى أغراض أخرى تستلزم إزالة المجموعة الأمينية deamination عادة فى الكبد والكلية، فتحول المجموعة الأمينية إلى يوريا urea فى الكبد على خطوات (شكل ٥-١٦) وتخرج فى البول عن طريق الكلية، أما الجزء الباقى من الحامض الأمينى فإنه إما أنه يتأكسد لتوليد الطاقة ويتكون ثانى أكسيد كربون وبخار ماء يخرج، أو يتحول إلى كربوهيدرات glyconeogenesis أو دهون ketogenesis، أو يتكون أحماض أمينية غير أساسية. كما فى شكل (٥-١٧).



شكل (٥-١٦) خطوات تكوين اليوريا




Amphibolic intermediates formed from the carbon skeleton of amino acids


## شكل (٥-١٧) تأكسد الهيكل الكربوني

### للأحماض الأمينية لتوليد الطاقة


وفي كثير من الحالات تضاف المجموعة الأمينية إلى حامض ألفا- كيتو amination لتكوين الحامض الأميني المقابل مثل تكوين حامض alanine نتيجة إضافة المجموعة الأمينية إلى حامض pyruvic وهذا الحامض الفاكيتو المقابل- وهذا تفاعل عكسي في وجود فيتامين B<sub>6</sub>.



كما يحدث تبادل الجاميع الأمينية transamination بين الأحماض الأمينية والأحماض الفاكيتو في تفاعلات عكسية في وجود فيتامين B<sub>6</sub> كما يلي:



كما تدخل الأحماض الأمينية فى تفاعلات تبادل الجاميع الأميدية amide group (CONH<sub>2</sub>) transamidation مع المجموعة الكيتونية (C=O) لأى مركب- وأهمية هذا التفاعل أنه يساعد فى التخلص من المواد النتروجينية المتكونة فى المخ لإخراجها عن طريق دورة اليوريا كما سبق وأيضاً تكوين مركبات لازمة للجسم كما يلى:




وفى بعض الحالات تزال المجموعة الكربوكسيلية decarboxylation لتكوين مواد لازمة للجسم مثل هستامين histamine من الحامض الأمينى histidine و 5-OH tryptamine و سروتونين Serotonin من الحامض الأمينى tryptophan وهى تقوم بوظائف هامة للجسم كما سبق .



## بروتينات البلازما :

إن أهم بروتينات البلازما هي البيومين والجلوبيولين والفيبرينوجين وهي تقوم بوظائف هامة كما سبق ويتكون كل من الألبومين والفيبرينوجين ومن ٥٠ - ٨٠٪ من الجلوبيولين في الكبد ويتكون الباقي في أنسجة الليمف Lymphoid وهو جاما جلوبيولين الذى يشكل الأجسام المضادة- يصل معدل تكوين البلازما إلى ٣٠ جم/ اليوم.

وتعمل بروتينات البلازما كمصدر لتكوين أى بروتين فى أى نسيج انخفاض فيه نسبة البروتين. وهنا تعمل بروتينات البلازما على سرعة تعويض هذا النسيج- حيث تتحلل إلى أحماض أمينية وبهذا يمكن أن تعتبر بروتينات البلازما كبروتين متغير Labile ليكون مصدراً للأحماض الأمينية التى يحتاجها بروتين أى نسيج كما فى شكل (١٨ - ٥).



### شكل (١٨ - ٥) تبادل البروتين والأحماض الأمينية بين الأنسجة

وعموماً تقوم بروتينات البلازما بعدة وظائف منها أنها تعتبر كمخزن للبروتين اللازم لميتابوليزم البروتين فى الأنسجة، تكون الجلطة الدموية عند اللزوم بواسطة الفيبرينوجين fibrinogen لإيقاف النزيف يقوم جاما جلوبيولين (αglobulin) بتكوين مناعة الجسم، كما أن الألبومين (albumin) ينظم انتقال السوائل من وإلى الخلية إذ أنه ينظم حجم الدم وبالتالي يتولد ضغط الدم المناسب الذى يساعد على

الامتصاص وهذا يضاد أو يعادل تسرب السوائل من الدم إلى الأنسجة وتعمل بروتينات الدم أيضاً على لزوجة الدم بدرجة مناسبة لتنظيم مرور الدم كما أنه يعدل حموضة الدم كما سبق.

وأيضاً تعمل هذه البروتينات على تنظيم نفاذية جدر الأوعية الدموية لأنها تدخل فى تكوين المادة اللاصقة.

كما أنها تنقل العديد من المركبات مثل الحديد والكالسيوم واليود وفيتامين A، وهرمون الثيروكسين thyroxine وغيرهم.

### مستوى الأحماض الأمينية فى البلازما :

يتغير مستوى الأحماض الأمينية فى البلازما خلال ٢٤ ساعة فيصل أعلى مستوى عند الظهيرة أما أقل مستوى فيكون حوالى الساعة الرابعة صباحاً ويتأثر بمستوى الأحماض الأمينية فى الدم بعدة عوامل:

فيشير Morrison و McLanglan أن تركيز الأحماض الأمينية فى الدم وخصوصاً فى الوريد الباقى تتوقف على محتوى البروتين المتناول من الأحماض الأمينية بناء على ما ظهر من تجارب على الحيوان أن تناول اللحم والكازين أدى إلى رفع الأحماض الأمينية فى الدم وخصوصاً فى الوريد البابى بينما زائى Zein الذرة أدى إلى حفظها، وكان تخفيض الأحماض الأمينية أكثر وضوحاً فى حالة غياب البروتين من الغذاء. وفى تجارب على الفيران وجد Harper, Peters (١٩٨١) أن اختيار الفيران لأغذية مختلفة فى محتواها من البروتين كان يتراوح بين حدود الاحتياج الأعلى والأدنى للبروتين وأن الفيران تتجنب تناول الأغذية المنخفضة جداً أو المرتفعة جداً فى البروتين وكان أقل كمية من البروتين المتناول تمثل الحد الأدنى الذى يقابل الاحتياج من البروتين وكان الحد الأعلى مرتبطاً بزيادة هدم البروتين نتيجة تنشيط الإنزيمات المرتبطة بذلك:

إن مستوى الأحماض الأمينية فى البلازما قد يتأثر بواسطة الناقل العصبى سيروتونين serotonin حيث يشير Li و Anderson (١٩٨٤) أنه عند ارتفاع الأحماض الأمينية فى البلازما والمخ يعطى السيروتونين إشارات عصبية لتنظيم تناول البروتين.

ومن جهة أخرى وجد Anderson, Peter (١٩٨٥) علاقة بين البروتين المتناول وبين تركيز الأحماض الأمينية المتناولة المتشعبة السلسلة (branched-chain) وهي Valine, leucine isoleucine ويشير Anderson وآخرون (١٩٩٠) أن زيادة تناول هذه الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتشعبة قد يكون له دور فى تنظيم تناول البروتين عن طريق تأثيرها على طعم الغذاء وأيضاً فى نشاط لإنزيمات هدم هذه الأحماض الأمينية.

واهتم Weehler و Morgan بدراسة العلاقة بين نسب الأحماض الأمينية لبعضها وبين إتاحة الأحماض الأمينية الحدية Limiting فى الغذاء قبل وبعد المعاملات الحرارية. وقد ظهر أن مستوى الأحماض الأمينية فى الوريد البابى يتوقف ليس فقط على محتوى البروتين من الأحماض الأمينية بل أيضاً على سرعة هضم الغذاء وإنتلاق الأحماض الأمينية وامتصاصها حيث ظهر أن وجود الجلوكوز فى الغذاء يساعد على امتصاص الأحماض الأمينية أكثر من وجود الكربوهيدرات. علاوة على ذلك فإن الجلوكوز يساعد فى عمليات بناء البروتين من الأحماض الأمينية فى الأنسجة، ومن جهة أخرى فإن وجود الدهون يعطل من الهضم والامتصاص.

وفى تجارب على الإنسان ظهر أن تناول البيض واللبن أدى إلى رفع مستوى الأحماض الأمينية ولكن ذلك لم يكن موازياً لنمط الأحماض الأمينية فى الغذاء ولكنه قد يفيد فى التعرف على مدى إتاحة الأحماض الأمينية فى الغذاء بعد معاملته بالحرارة مثل حامض Lysine. وقد اتفقت مع نتائج تجارب النمو.

كما يتأثر مستوى الأحماض الأمينية فى الدم بدرجة التنافس بين الأحماض فيما بينها فى الامتصاص من القناة الهضمية وإعادة الامتصاص فى الكلى وفى نقل الأحماض الأمينية والميتابوليزم والإنزيمات المرتبطة.

ويعمل الجسم على الحفاظ على مستوى الأحماض الأمينية فى البلازما وعندما ينخفض مستوى الأحماض الأمينية عن الحد الطبيعى فإن الأحماض الأمينية تخرج من الخلايا لتعديل المستوى. وقد ظهر أن بعض الهرمونات يمكنها أن تغير التوازن بين الأحماض الأمينية فى الأنسجة وفى البلازما مثل هرمون النمو والأنسولين فهى تشجع تكوين البروتين أما هرمونات الأدرنوكورتيكال جلوكوكورتيكويد adrencortical glucocorticoid فإنها تشجع على زيادة الأحماض الأمينية فى الدم.

ويوجد تعادل بين الأحماض الأمينية فى الدم وبين بروتينات الأنسجة حيث تدخل هذه الأحماض الأمينية فى بناء بروتين أى نسيج لأى عضو مثل الكبد كما يوجد تعادل بين بروتينات الخلايا مع بعض فإذا كان أى نسيج فى احتياج إلى بروتين فإنه يمكن أن يتكون هذا النسيج من الأحماض الأمينية فى الدم وهذه يتم تعويضها من هدم بروتين فى نسيج آخر.

**الهدم الإجبارى للبروتين :**

### **Obligatory Degradation of proteins :**

إن بناء وهدم البروتين مستمر يومياً طوال حياة الإنسان ويقوم ببناء وهدم ما يصل إلى ٤٠٠ جم يومياً مهما كانت حالة الإنسان. ولذا فإن النسبة بين البروتين الكلى للأنسجة وبروتين البلازما يعادل دائماً ٣٣:١ مهما كانت حالة الجسم التغذوية (Hall, Gyton ١٩٩٦) وعندما لا يتناول الإنسان أى بروتين فإن جزءاً من البروتين يهدم وتزال منه المجموعة الأمينية. يستخدم كما سبق ويتراوح هذا الجزء بين ٢٠ - ٣٠ جم من البروتين يومياً وهذا يطلق عليه الفقد الإجبارى للبروتين obligatory loss.

ويمنع هذا الفقد ويعوض عن طريق تناول على الأقل ٢٠ - ٣٠ جم يومياً ولكن للأمان يفضل زيادة هذه الكمية إلى ٥٠ - ٧٥ جم ويجب أن تكون نسب الأحماض الأمينية فى الغذاء تشابه نسب وجودها فى النسيج البروتينى المراد تكرينه فى الجسم لأن الخلية إما تكون البروتين الكامل أو لا تكون.

ويتأثر الهدم الإجبارى بالبروتين بالجوع فإن الجسم يستخدم الكربوهيدرات والدهن فى توليد الطاقة طوال فترة إتاحتها ولكن بعد مدة من الجوع التى قد تصل إلى عدة أسابيع (Hall, Gyton ١٩٩٦) يقوم الجسم باستخدام الأحماض الأمينية فى توليد الطاقة وقد يصل الفقد فى بروتينات البلازما نتيجة ذلك إلى ١٢٥ جم/اليوم وهنا تقتل وظائف الخلية.

### **التعادل الديناميكى بين بروتينات الأنسجة والغذاء :**

ويوجد تعادل ديناميكى dynamic equilibrium بين بروتين الأنسجة والبروتين المتناول من الغذاء وأول من أشار إلى ذلك هو Schoenheimer (١٩٤٢)

الذى لاحظ أن الأحماض الأمينية الموجودة فى الغذاء تدخل فى الأنسجة بسرعة مختلفة وأن الأحماض الأمينية الموجودة فى الأنسجة فى حالة تغير مستمر، حيث أن الأنسجة تعطى وتأخذ باستمرار، ودخول الأحماض الأمينية فى الأنسجة يتوقف على عمرها، فالأنسجة ذات العمر القصير تظهر تغيراً مستمراً فى الأحماض الأمينية، وقد أشارت تجارب Schoenheimer ومن بعده إلى أن ٣٠٪ من أنسجة الجسم تظهر حالة الديناميكية.

وقد أظهرت الدراسات أن ميوكوزا الأمعاء الدقيقة تتغير كل يومين، وأن الكرات الدموية الحمراء تتغير كل ١٢٠ يوماً، وأن الجلد يتغير باستمرار، وأن الجسم يكون البيومين السليم بسرعة ١٠ جم كل يوم، والفيرينوجين بسرعة ٢ جم كل يوم.

**تخزين البروتين :**

تتوقف كمية البروتين فى الجسم على بروتين الغذاء، فإذا فرض شخص معتاد تناول غذاء غنياً فى البروتين، ثم تغير طعامه فجأة إلى غذاء فقير فى البروتين، فإن إخراجها من النيتروجين فى البول يقل حتى يصل إلى حد أدنى معادلاً لنيتروجين الغذاء، وإذا تغير الغذاء إلى طعام غنى فى البروتين فإن الإخراج من النيتروجين يرتفع تدريجياً حتى يصل إلى حد أقصى، فالزيادة فى إخراج النيتروجين أو حجزه فى الجسم بتغير الطعام من غنى فى البروتين إلى فقير، ثم إلى غنى فى البروتين يعادل ١٧٥ - ٣٥٠ جم من البروتين فى الشخص البالغ، وهذا يسمى البروتين القابل للتغير labile protein وقد أثبت Chan سنة ١٩٦٨ أن هذا البروتين القابل للتغير يعادل ١٪ فى الأطفال، وهذه كمية منخفضة لا يمكن اعتبارها تخزين بروتين ويعتقد أنه يوجد منطقة تسمى بالبركة الميثابولية metabolic pool من الأحماض الأمينية فى سوائل الأنسجة المختلفة، وهذه تستخدم فى تخليق البروتين.

### العوامل التى تؤثر فى ميثابوليزم البروتين:

- ١- مدى توازن الأحماض الأمينية فكما ذكر فإن عدم التوازن يقلل من استفادة الجسم من البروتين فى بناء أنسجته كما سبق.
- ٢- مدى سلامة عملية امتصاص البروتين ودخوله فى الأنسجة وفى إعادة امتصاصه فى الكلى.

٣- الهرمونات (Hall, Guyton ١٩٩٦).

\* هرمون النمو الذى يعمل على زيادة بناء بروتين الأنسجة وقد يحدث ذلك عن طريق تسهيل نقل الأحماض الأمينية إلى داخل الخلية، أو زيادة نشاط RNA، DNA، أو إلى زيادة هدم الدهون المخزنة وانطلاق الأحماض الدهنية كمصدر للطاقة. \* الأنسولين: نقص الأنسولين يعمل على خفض بناء البروتين وقد يرجع ذلك إلى أن وجود الأنسولين يعمل على سرعة نقل الأحماض الأمينية داخل الخلية. \* جلوكوكورتيكويد glucocorticoids الذى تفرزه الأدرنال يقلل من كمية البروتين فى الأنسجة ولكنه يزيد تركيز الأحماض الأمينية فى الدم وفى بروتينات البلازما والكبد وفى غياب هذا الهرمون فإن تركيز الأحماض الأمينية يقل فى البلازما مما يقلل من حدوث Ketogenesis, gluconeogenesis.

#### \* الهرمونات الجنسية


التسترون testosterone وهو هرمون الذكورة يعمل على ترسيب البروتين فى الأنسجة. كما فى ذلك العضلات لفترة، أما استروجين estrogen هرمون الأنوثة فإنه يعمل على ترسيب البروتين، لكن بدرجة أقل.

#### \* الثيروكسين thyroxine

وهو يؤثر على سرعة الميثابوليزم فى العضلات ولذا فهو يؤثر بطريق غير مباشر فعند نقص أو غياب الكربوهيدرات أو الدهون فإن الثيروكسين يساعد فى هدم البروتينات لتوليد الطاقة ومن جهة أخرى ففى وجود كفاية الكربوهيدرات والدهون فإن الثيروكسين يشجع بناء البروتين من الأحماض الأمينية الزائدة.

#### العلاقة بين ميثابوليزم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون :

إن ميثابوليزم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون كعناصر مولدة للطاقة لا يتم لكل عنصر على حده ولكن يوجد علاقة فيما بينها كما يوضحها شكل (١٩-٥).



شكل (٥-١٩) أكسدة البروتين والكربوهيدرات والدهون

### اضطراب الميتابوليزم Metabolism Disorders:

هناك بعض الأخطاء الوراثية فى الميتابوليزم inborn errors of metabolism وهذه تؤثر فى ميتابوليزم الكربوهيدرات، الليبيدات، والأحماض الأمينية.. إلخ، ومن هذه الحالات:

١- جالاکتوسيميا Galactosemia وتنتج هذه الحالة نتيجة نقص الإنزيم الخاص بتحويل الجالاکتوز إلى جلوكوز، وهذه الحالة تؤدي إلى فشل النمر وتضخم الكبد وظهور الجالاکتوز فى البول وتخلف عقلی. وفى هذه الحالة يعطى الفرد غذاء فقيرا فى اللاکتوز.

٢- فنيل كيتونيوريا Phenylketonuria وتنتج هذه الحالة نتيجة نقص الإنزيم اللازم لتحويل phenylalanine إلى tyrosine وهذه تؤثر على القدرة الحركية للفرد، وظهور إكزيما وتغير فى الجلد والشعر، وظهور رائحة خاصة، وتخلف عقلی.

### ٣- الارتفاع الزائد للکولسترول فى الأسرة :

#### familial Hypercholestrolemia :

وهذه حالة وراثية حيث يظهر فى الإنسان نقص فى الجين المكون للبروتين المستقبل للبيوبروتينات الخفيفة LDL على سطح الجدار الخارجى لخلايا الجسم. وفى غياب هذا المستقبل تصبح الكبد غير قادرة على إعادة امتصاص الليبيوبروتينات الوسط IDL ولا الخفيفة LDL. ولهذا يرتفع ويزيد تكوين الكولسترول الجديد زيادة كبيرة، ولا يحدث فى مقابل ذلك خفض فى الكولسترول الجديد البلازما. ونتيجة لخروج كولسترول الكبد إلى الدم يرتفع مستوى كولسترول الدم وقد يصل إلى ٦٠٠-١٠٠٠ جم/ ١٠٠ مل ويكون الإنسان معرضاً للوفاة فى سن ٢٠ سنة وإذا حدث انسداد للشرايين فقد تحدث الوفاة عند سن ٤ - ٦ سنوات.



الباب السادس

**الحاجة إلى الطاقة**

**THE NEED FOR ENERGR**



## الحاجة إلى الطاقة

### The Need for Energy

#### مقدمة :

زادت المعلومات عن الطاقة وقيمتها فى الأغذية، ومدى احتياج الفرد إلى الطاقة والآثار التى تترتب على زيادة الطاقة فى الإنسان وآثار السمّة. ويعتبر لافوازيه واضع أسس ميثابوليزم الطاقة فى القرن الثامن عشر.

وتوجد الطاقة فى الطبيعة فى عدة صور: فهناك الطاقة الشمسية، والطاقة الكيميائية، والطاقة الميكانيكية، والطاقة النووية، وتختلف الحيوانات عن النباتات فى أنها لا يمكن أن تستفيد من طاقة الشمس مباشرة، فيمكن للنبات أن يستفيد من الطاقة الشمسية حيث يحولها أثناء التمثيل الضوئى إلى طاقة كيميائية التى تخزن فى النبات ويحصل الإنسان والحيوان على ما يحتاجه من الطاقة الكيميائية المخزنة فى النبات والكامنة فى الكربوهيدرات والدهون والبروتين ويستعملها الإنسان فى القيام بالأعمال والأنشطة المختلفة وفى المحافظة على درجة حرارة الجسم حول معدّلها، وتنطلق الطاقة الكامنة فى الأغذية عن طريق أكسدة المواد العضوية فى الغذاء والتى يعتبر الكربون والأيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت من أهم عناصرها.

ويتم الحصول على الأكسجين اللازم لعملية الأكسدة من الرئتين فيتحول نتيجة لذلك الكربون إلى ثانى أكسيد الكربون. ويتحول الأيدروجين إلى ماء والكبريت إلى كبريتات، أما النيتروجين فلا يتأكسد أكسدة تامة بل يخرج جزء منه فى صورة بولينا عن طريق الكلى، وبأكسدة مواد الطعام تنطلق ما بها من طاقة كامنة يستعملها الجسم فى القيام بالوظائف المختلفة الحيوية ويخرج مقدار كبير من هذه الطاقة فيفقدّها الجسم على شكل حرارة تضيع من الجسم إلى الجو المحيط، أما ما يتبقى من عمليات الأكسدة هذه فيخرجها الجسم بواسطة الإفرازات المختلفة كالكلية والأمعاء الغليظة والجلد والرئتين.

ويستطيع الجسم تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية بمقدوره تعادل ٢٥٪ حيث يضيع جزء كبير من الطاقة فى صورة حرارة ويستعمل الجسم جزءاً من الحرارة الناتجة أثناء إنتاج هذه الطاقة الكيميائية فى حفظ درجة الحرارة حول معدّلها. ووحدة قياس الحرارة هى الكالورى Calorie ويعرف السعر بأنه كمية

الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة ١ سم<sup>٣</sup> من الماء درجة مئوية واحدة (من ١٥°م إلى ١٦°م). أما في التغذية فيتسعمل الكالورى الكبير Kilo Calorie أو Calorie، ويعرف بأنه كمية الحرارة اللازمة لرفع حرارة لتر من الماء درجة مئوية واحدة من ١٥°م إلى ١٦°م) وينبغي أن نشير إلى أن لفظ الكالورى المستعمل فى هذا المرجع مقصود به الكالورى الكبير.

وقد اقترح باستعمال الجول Goule كوحدة لقياس الحرارة، والكالورى الكبير يعادل ٤,١٨ جول كبير. ويمكن قياس ما يحتاجه الجسم فى الظروف المختلفة وعند أداء أى نوع من الأعمال والأنشطة المتنوعة، أى أنه يمكن قياس سرعة الميتابوليزم بأجهزة تسمى الكالوريميتز ويمكن بواسطتها تقدير الطاقة الحرارية المبعثة من الجسم أثناء قيامه بهذا المجهود ويجرى ذلك القياس إما بطرق غير مباشرة حيث تقاس الحرارة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة حيث تقاس كمية الأكسجين المستهلكة أو كمية ثانى أكسيد الكربون الناتجة.

### قياس القيمة السعرية للأغذية

#### الطرق المباشرة :


عند أكسدة الغذاء أكسدة تامة -تنبعث كمية من الحرارة يطلق عليها القيمة السعرية للأغذية، ويمكن تقديرها بواسطة أجهزة خاصة تسمى بالمسعات Calorimeters وتستعمل بعض المسعات لتقدير القيمة السعرية للأغذية عند احتراقها خارج الجسم ومنها المسعر ذو البمبة Bomb Calorimeter والمسعر الأكسجيني Oxy -Calorimeter كما توجد أنواع أخرى تستعمل لتحديد القيمة السعرية للأغذية عند احتراقها داخل الجسم مثل المسعر التنفسي Respiratory Calorimeter، وتتوقف القيمة السعرية للأغذية عند احتراقها فى الجسم على عدة عوامل منها معامل الهضم (وهو ٩٨٪ للكربوهيدرات و ٩٥٪ للدهون، ٩٢٪ للبروتينات)، كما تتوقف على العناصر الداخلة فى تركيب الغذاء. فالدهون والكربوهيدرات التى تتكون من عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين، وهذه يمكن أن تتأكسد كلية إلى ثانى أكسيد كربون وماء.

أما البروتينات فلا يتم أكسدتها أكسدة تامة داخل جسم الإنسان إلى ثانى أكسيد الكربون والماء نظراً فقط لاحتوائها على نيتروجين مما يعادل ١٥-١٧٪ وهذا يفرز

فى صورة أمونيا أو يوريا أو حامض بولىك أو كرياتين فى البول وهى مركبات لازالت تحتوى على كمية من الطاقة، ولذا فعند احتراق البروتينات فى الجسم فإنها تعطى طاقة أقل منها عند احتراقها خارج الجسم وهذه الطاقة المفردة تعادل ١,٢٥ كالورى كبيراً لكل ١ جم بروتين.

### المسعر ذو البمبة Bomb Calorimeter

يتكون المسعر ذو البمبة (شكل ٦-١) من وعاء (١) يسمى بالبمبة له جدران سميكة من الصلب غير قابل للصدأ ومطلّى من الداخل، وللبمبة غطاء محكم (م) يتصل به من الداخل قضبان من نفس المعدن فى اتجاه رأسى إلى أسفل ينتهى أحدهما بحلقة معدنية لحمل بوتقة (ب) توضع بها العينة المراد تقدير قيمتها السعيرية، ويوصل طرفا القضيب من أسفل بسلك من المغنسيوم، كما يتصل طرف القضيبين عند موضع اتصاها بغطاء البمبة بسلك كهريى (و،ى) يتصلان بمصدر تيار كهريى، ويرحد بالغطاء صمام (ع) يمكن بواسطته شحن البمبة بالأكسجين إلى ضغط ٢٠-٣٠ جوى.



شكل ٦-١ المسعر ذو البمبة

ويحيط بالبمبة ماء ويحاط الحمام المائي بمادة عازلة وله ترمومتر (د) لتسجيل درجة حرارة الماء بمقلب (س) وعند توصيل التيار الكهربى يشتعل المغنسيوم وتشرق العينة، وتتبع حرارة تنتقل خلال جدران البمبة إلى الماء المحيط بها فيمتصها وتعرف درجة حرارة الماء قبل وبعد حرق العينة، وكمية الماء يمكن حساب القيمة السعرية لعينة الغذاء من المعادلة التالية (وذلك بعد إجراء التصحيح اللازم لمركبات النيتروجين وما يتبقى منها بعد الاحتراق والفرق بين درجة حرارة المعادن الموجودة قبل وبعد الاحتراق وهذا يمكن تقديره بحرق وزن معلوم من حامض البنزويك).  
والمعادلة هي:

القيمة السعرية للعينة = فرق درجة حرارة الماء

وزن الماء في الحمام المائي × قبل وبعد حرق العينة - التصحيح

وزن العينة بالجرامات

وتوقف الحرارة الناتجة عن احتراق المواد العضوية على العناصر الداخلة فى تركيبها واحتراق جرام من الكربون إلى ثانى أكسيد كربون يعطى ٨,٠٨ سعر، وجرام من الأيدروجين ينتج ٣٤,٥ سعرًا.

وحيث أن الكربوهيدرات والدهون تتكون من عناصر الكربون والأيدروجين يتأكسدان بواسطة الأكسجين الموجود فى الجزئ. وعلى هذا فعند احتراق الكربوهيدرات أو الدهون فإنها تعطى حرارة أقل منها عند احتراق وزن مساو من الكربون النقى أو الأيدروجين النقى.

وعند احتراق البروتينات فى المسعر، فإن الكربون ينتج ثانى أكسيد كربون والأيدروجين ينتج ماء، والنيتروجين ينتج غاز النيتروجين، وقد يتأكسد جزء بسيط من النيتروجين إلى أكاسيد نيتروجين فى المسعر وهذه يتم تقديرها، وتطرح الحرارة الناتجة عن ذلك من النتائج النهائية:

ويتقدير القيمة السعرية للأغذية فى المسعر وجد أن:

١ جم من الكربوهيدرات يعطى ٤,١ سعرًا.

١ جم من البروتينات يعطى ٥,٦٥ سعرًا.

١ جم من الدهون يعطى ٩,٤٥ سعرًا.

ويلاحظ أنه عند احتراق ١ جم من الدهون تتولد كمية أكبر من الحرارة أكثر من ضعف الحرارة المتولدة عند احتراق ١ جم من الكربوهيدرات وذلك لأن جزئى الدهون به كمية من الأكسجين لا تكفى لاحتراق كل الكربون والأيدروجين الموجود فى الجزئى فيحتاج إلى كمية من الأكسجين الخارجى أكثر منه فى حالة الكربوهيدرات والجدول رقم (٦-١) يبين احتراق وتركيب بعض المواد.

وعند احتراق المواد الغذائية داخل الجسم فإن كمية الحرارة الناتجة تكون أقل من حالة المسعر وذلك لعدم اكتمال هضم المواد الغذائية كما سبق ذكره، إن معامل الهضم للكربوهيدرات ٩٨٪ والدهون ٩٥٪ والبروتينات ٩٢٪ علاوة على ذلك ففى حالة البروتين يوجد فقد من الطاقة فى البول.

جدول (٦-١) حرارة احتراق وتركيب بعض المواد

المادة	حرارة الاحتراق كالىورى/جم	كربون %	ايدروجين %	أكسجين %	نيتروجين %	كبريت %	فوسفور %
جلوكوز	٣,٧٥	٤٠,٠	٦,٧	٥٣,٣	-	-	-
سكروز	٣,٩٦	٤٢,١	٦,٤	٥١,٥	-	-	-
نشأ	٤٤,٤	٤٤,٤	٦,٢	٤٩,٠	-	-	-
دهن الزبد	٩,٣	٧٥,٠	١١,٧	١٣,٣	-	-	-
كازين	٥,٨٥	٥٣,١	٧,٠	٢٢,٥	١٥,٨	٠,٨	٠,٨
البومين	٥,٨	٥٢,٥	٧,٠	٢٣,٠	١٦,٩٠	١,٥	-

وعلى هذا، فعند حساب القيمة السعريية لحرق الأغذية فى جسم الإنسان يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن:

$$١ \text{ جم كبروهيدرات} = ٤,١ \times \frac{٩٨}{١٠٠} = ٤ \text{ كالىورى / جم}$$

$$١ \text{ جم دهن} = ٩,٤٥ \times \frac{٩٥}{١٠٠} = ٩ \text{ كالىورى / جم}$$

$$١ \text{ جم بروتين} = (١,٢٥ - ٥,٦٥) \times \frac{٩٢}{١٠٠} = ٤ \text{ كالىورى / جم}$$

وتسمى هذه القيمة الفسيولوجية للأغذية أو القيمة الميتابوليزمية والتي تنتج من ضرب القيم السعريية للأغذية فى معاملات الهضم.

وباستعمال هذه الأرقام يمكن حساب القيمة الفسيولوجية أى الميتابوليزمية للأطعمة التى تحتوى على أكثر من واحد من المركبات الغذائية بعد معرفة نسبة هذه المختريات، فلحساب القيمة الميتابوليزمية للبن المحتوى على ٤,٩٪ كربوهيدرات ٣,٥٪ بروتين، ٣,٩٪ دهن:

$$١٠٠ \times \frac{٤,٩}{١٠٠} = ٤,٩ \text{ جم كربوهيدرات } ٤ \times ٤,٩ = ١٩,٦ \text{ كالورى.}$$

$$١٠٠ \times \frac{٣,٥}{١٠٠} = ٣,٥ \text{ جم بروتين } ٤ \times ٣,٥ = ١٤,٠ \text{ سعراً.}$$

$$١٠٠ \times \frac{٣,٩}{١٠٠} = ٣,٩ \text{ جم دهن } ٩ \times ٣,٩ = ٣٥,١ \text{ سعراً}$$

المجموع ٦٨,٧ كالورى

فيكون كوب اللبن الذى به ٢٨٠ لبن قيمته السعري

$$١٩٢,٤٤ = ٢٨٠ \times ٦٨,٧ \text{ كالورى.}$$


الطرق غير المباشرة :

المسعر الأكسجيني Oxy- Calorimeter :

صمم Benedict & Fox سنة ١٩٢٤ المسعر الأكسجيني، ويقيس القيمة السعري للأغذية عن طريق الأكسجين المستعمل فى حرق وزن معلوم من الغذاء، وهو أبسط من المسعر ذو البمبة إلا أن نتائجه أدق (شكل ٦-٢) ويتركب المسعر الأكسجيني من حجرة احتراق (أ) بها بوتقة لوضع العينة ويتصل بها من أسفل سلكين كهربيين يتصلان بمصدر كهربى، ومن أعلى أنبوبة عليها صمام محكم (ل) لمرو الأكسجين من الخزان (م)، وتملأ الخزان بالغاز عن طريق صمام (ص)، ويقيس حجم الأكسجين عداد (ع) Spirometer وتوجد مروحة (ح) لسحب الغازات من حجرة الاحتراق إلى خزان (ب) به صودا جيرية لامتصاص ثانى أكسيد كربون، وهذا الخزان مزود بترمومتر وعند الاستعمال توضع العينة المراد تقدير قيمتها السعري فى البوتقة الموجودة فى حجرة الاحتراق وتقفل الدائرة الكهربائية فتحترق العينة، وتسحب الغازات الناتجة من الاحتراق إلى خزان الصودا الجيرية بواسطة المروحة ويجب توريد هذا الخزان وحجرة الاحتراق باستمرار وبحسب حجم الأكسجين المستهلك فى



حرق العينة وذلك بقياس حجم الأكسجين المتبقى في خزان الغاز ويصحح هذا الرقم بالنسبة لدرجة الحرارة والضغط.



(شكل ٢-٦) المسعر الأكسجيني

وبالاستعانة بمجداول Benedict & Fox يمكن معرفة القيمة السعرية لعينة الغذاء وذلك بضرب حجم الأكسجين (بالتر) اللازم لحرق العينة في المكافئ السعري Caloric equivalent (المعامل) لكل لتر من الأكسجين المستخدم في حرق المادة (الجدول ٢-٦).


جدول (٦-٢) معامل Benedict & Fox لبعض الأغذية عند احتراقها

فى المسعر الأكسجيني

الأغذية	كالورى / لتر	الأغذية	كالورى / O <sub>2</sub>
جلوكوز	٥,٠١	زيت زيتون	٤,٧٤
سكروز	٥,٠٨	لحم محمر	٤,٨٤
نشأ	٥,٠٦	ساندوتش جنبه	٤,٩٥
دهن حيوانى	٤,٧٢	فطائر	٤,٩٠
بروتين	٤,٦	وجبة غذائية	٤,٨٢٥

ويشتق معاملات Benedict & Fox من الحرارة الناتجة من حرق المواد الغذائية:

جلوكوز + أكسجين —————> ثانى أكسيد الكربون + ماء




١٨٠ + ١٩٢ —————> ١٠٨ + ٢٨٤ (أوزان جزئية)

وحيث أن الجرام الواحد من الجلوكوز يعطى عند احتراقه ٣,٧٤ سعراً وأن

الجرام من الأوكسجين يعادل ٠,٦٩٩٧ لتر فتكون القيمة السعرية لكل لتر من

$$\frac{O_2}{\text{كالورى/لتر}} = \frac{٣,٧٤ \times ١٨٠}{٠,٦٩٩٧ \times ١٩٢} = ٥,٠١١$$

وبالمثل دهن (استيرين ثلاثى) أكسجين —————> ثانى أكسيد كربون + ماء



١٩٨٠ + ٥٠١٦ —————> ٥٢١٦ + ١٧٨٠

(أوزان جزئية)

ومنهما يمكن حساب القيمة السعرية لكل لتر من الأكسجين يستخدم

فى حرق الدهون والتي تساوى ٤,٧٢٩، أما فى حالة الوجبات فقد وجد أن

القيمة السعرية لكل لتر من الأكسجين اللازم لحرق ١ جم من الأغذية يعادل ٤,٨

سعر/ لتر O<sub>2</sub>.

### النسبة التنفسية Respiratory Quotient


عند احتراق المواد الغذائية داخل الإنسان ينتج ثانى أكسيد الكربون ويخار

الماء وحرارة تتناسب مع كمية الأكسجين المستهلك أى خارج قسمة ثانى أكسيد الكربون الخارج أثناء عملية الزفير فى وقت معين على حجم الأكسجين الذى يستعمله الفرد فى نفس الوقت هذا ما يطلق عليه اسم النسبة التنفسية ومن هذه النسبة التنفسية يمكن معرفة نوع المادة العضوية التى تأكسدت داخل الجسم، ومدى تحول إحدى الموارد الغذائية إلى أخرى والجدول (٦-٣) يوضح النسبة التنفسية للكربوهيدرات والدهون والبروتينات وأول من وضع هذا الجدول Znut العالم الفسيولوجى السويسرى أوائل القرن العشرين.

جدول (٦-٣) النسبة التنفسية والقيمة السعيرية لبعض الأغذية

١ جم من الغذاء	الأكسجين المطلوب ملليمتر	ثانى أكسيد الكربون الناتج ملليمتر	النسبة التنفسية	القيمة السعيرية
نشا	٨٢٨,٨	٨٣٨,٨	١,٠	٤,١٨
دهن	٢٠١٩,٢	١٤٢٧,٣	٠,٧٠٧	٩,٤٦١
بروتين	٩٦٦,١	٧٨,٧	٠,٨٠٩	٤,٤٤٢


ولحساب النسبة التنفسية فى حالات الكربوهيدرات فإنها تتأكسد فى الجسم حسب المعادلة التالية:



وعند درجة حرارة واحدة وضغط واحد فإن الأوزان الجزئية للغازات تكون

$$1 = \frac{6\text{CO}_2}{6\text{O}_2} = \text{النسبة التنفسية}$$

وفى الدهون فإنها تتأكسد فى الجسم حسب المعادلة فى المثال لحمض Palmitic



$$0,7 = \frac{16\text{CO}_2}{23\text{O}_2} = \text{النسبة التنفسية}$$

وفى حالة الأحماض الدهنية القصيرة فإن النسبة التنفسية = ٠,٨

أما فى حالة البروتين فنظراً لعدم تمام أكسدته وخروج جزء من الكربون والأيدروجين فى البول فى صورة يوريا - كما سبق ذكره - لذا فتجرى بعض

الحسابات لمعرفة البروتين المحترق في الجسم، وقد وجد أن النسبة بين حجم ثاني أكسيد الكربون الناتج إلى حجم الأكسجين المستهلك يساوى ١,٢:١ وهى تعادل ٠,٨٦.

### العوامل التى تؤثر فى النسبة التنفسية:

- ١- تزيد النسبة التنفسية عند تحويل الكربوهيدرات إلى دهون حيث لا يحتاج إلى الأكسجين الخارجى وذلك لأن الكربوهيدرات غنية بالأكسجين.
- ٢- فى حالة تكوين أحماض بالجسم مثل حامض اللاكتيك فى حالة النشاط الرياضى أو تكوين أحماض كيتونية فى حالة مرض السكر. تمر الأحماض بالدم وتتفاعل مع بيكربونات الصوديوم وينتج  $CO_2$  الذى يخرج فى هواء الزفير فتزيد النسبة التنفسية .

٣- إصابة الجسم بحالة الحموضة acidosis نظراً لزيادة خروج ثانى أكسيد الكربون.

٤- الضغوط العصبية وغيرها ترفع النسبة التنفسية عن ١ .

### نقل النسبة التنفسية عند:

- ١- تحويل الدهون إلى كربوهيدرات.
- ٢- تخلص الجسم من الأحماض المتكررة.
- ٣- تعاطى مواد ذات تأثير قلقى

## قياس الميتابوليزم


### الطرق المباشرة Direct Calorimetry:

تقاس الطاقة الحرارية الكلية المنبعثة من الجسم "وتتضمن الحرارة المنبعثة من الجسم نتيجة قيامه بمجهود والحرارة الكامنة فى بخار الماء الخارج من الرئتين والجلد" ويجرى ذلك فى جهاز خاص يسمى المسعر التنفسى Respiratory Calorimeter.

وقد صمم Atwater Benedict (شكل ٦-٣) ويتكون من حجرة ذات جدران مزدوجة بينها مواد عازلة وبها حوائط مزدوجة لمنع تسرب الهواء أو الحرارة من داخل الغرفة إلى خارجها والحجرة متسعة لأن يقوم الفرد بما يحتاجه فى الحياة الطبيعية وعند القيام بأى مجهود تنطلق طاقة من الجسم حيث تمتص بواسطة ماء يجرى فى

أنابيب داخل الحجرة ومزودة بترمومترات حساسة وتقيس درجة الحرارة للماء عند دخوله وخروجه من الغرفة كما يوجد عدادات حساسة تقيس كمية الماء بها وتزود الغرفة بأسطوانات من الأكسجين المضغوط تمد الحجرة بتيار منتظم من الأكسجين يستنشقه الشخص بداخل الغرفة ويخرج ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وعند مرور هواء الغرفة على الزجاجاة رقم (١) المحتوية على حامض كبريتيك مركز، فإنه يمتص ما به من بخار الماء. ثم يمر على الزجاجاة رقم (٢) والمحتوية على جير الصودا لامتصاص ما بالهواء من ثاني أكسيد الكربون ثم يمتص بخار الماء الناتج عند مروره على الزجاجاة رقم (٣) والمحتوية على حامض كبريتيك، ثم يضاف إليه أكسجين ويمر الهواء ثانيًا إلى الغرفة. وكمية الحرارة التي يفقدها الشخص بداخل الغرفة عند القيام بمجهود معين تعادل كمية الحرارة التي يمتصها الماء بداخل الأنابيب المارة بالغرفة مضافًا إليهما كمية الحرارة الكامنة لبخار الماء الذي يتبخر من الجسم في نفس الوقت، وتقدر الحرارة الكامنة بقياس الهواء الخارج من المسعر، والحرارة الكامنة لتبخير ١ جم من الماء تعادل ٥٨٠ كالورى على درجة ٣٠°م كما تعمل تصحيحات لأى تغير في درجة حرارة الجسم وكذا عند إدخال أى غذاء أو شراب داخل الغرفة.

وهناك طريقة لقياس سرعة الميتابوليزم بالطرق المباشرة حيث تترجم الحرارة المنبعثة من حجرة المسعر التنفسى إلى قوة كهربية تسجل باستمرار.



شكل (٦-٣) حجرة قياس طاقة الميتابوليزم حسب تصميم Atwater


## الطرق غير المباشرة: Indirect Calorimetry:

فى الطريقة غير المباشرة، تقاس الطاقة عن طريق قياس حجم الأكسجين الذى يستهلكه الفرد فى فترة معلومة من الزمن حيث أنه لا بد للإنسان من أن يستهلك الأكسجين اللازم لحرقه أو أكسدة المواد الغذائية داخل جسم الفرد، وهذا الأكسجين المستهلك يعادل بالتالى كمية معينة من الحرارة. والأسس التى تقوم عليها هذه الأجهزة تشابه الأسس التى يقوم عليها المسعر الأكسجينى سابق الذكر، ومن هذه الأجهزة نوع ذو دائرة مغلقة Closed Circuit ونوع ذو دائرة مفتوحة open circuit.

**الأجهزة ذات الدائرة المغلقة:**

وهى أكثر الأجهزة شيوعاً، سهل الحمل ومنها جهاز Benedict Roth (شكل ٦-٤) حيث يقيس حجم الأكسجين المستهلك خلال مدة معينة، ثم ينقى هواء الزفير من  $H_2O + CO_2$  ثم يعاد استعماله.

ويضرب حجم الأكسجين المستهلك فى القيمة السعرية فينتج مقدار الطاقة الحرارية تحت ظروف الاختبار ويمكن إجراء الاختبار لشخص وهو مستلق، وفى هذه الحالة يقيس الميتابوليزم القاعدى ولإجراء الاختبار يتنفس الشخص من فمه بينما يسد أنفه بمشبك فيسحب هواء الشهيق من صمام (أ). أما هواء الزفير فيمر إلى أسطوانة امتصاص (ب) لامتصاص  $H_2O$   $CO_2$  ويحيط بالأسطوانة (ب) أسطوانة أخرى (ج) وتغلق المسافة بينهما بالماء، وينغمس بين الأسطوانتين (ب، ج) أسطوانة ثالثة (د) مقلوبة الوضع وعلا الفراع بين الأسطوانتين (ب، ج) بالأكسجين عن طريق صمام (ع)، وتصل الأسطوانة المتحركة (د) بخيط يمر على عجلة (ر) تنتهى فى الطرف الآخر بريشة ويلاحظ أن هذه الريشة ترتفع إذا قل الأكسجين فى مخزن التنفس. وتسجل هذه التغيرات على ورق يبانى مثبت على أسطوانة (ز) تدور حول محورها بسرعة معينة ومنها يمكن حساب كمسة الأكسجين المستهلك، ويجب أن تكون درجة الحرارة ثابتة أثناء الاختبار.




شكل (٦-٤) جهاز BENEDICT ROTH لقياس الطاقة

#### الأجهزة ذات الدوائر المفتوحة:

وفى هذه الأجهزة يحصل الشخص على الأكسجين اللازم من الهواء الجوى وتركيبه ثابت، ويقدر حجم هواء الشهيق والزفير كما يقدر كمية الأكسجين وثانى أكسيد الكربون فى هواء الزفير، وبذلك يمكن حساب حجم الأكسجين المستهلك ومنه يمكن حساب الطاقة ويمكن إجراء هذا الاختبار أثناء القيام بأعمال مختلفة من النشاط.

#### صور طاقة الغذاء التى يستفيد منها الإنسان utilisable energy :

لا يستفيد جسم الإنسان من كل الطاقة الموجودة فى الغذاء نظراً لعاملة الهضم والامتصاص كما سبق. وتختلف صور الطاقة التى يستفيد منها الإنسان (شكل ٦-٥).



شكل (٥-٦) صور طاقة الغذاء التى يستفيد منها الجسم

\* Ensminger وآخرون ١٩٩٥.

**طاقة الغذاء الإجمالية: gross energy :**

وهى تعادل كمية الطاقة المنطلقة من الغذاء عند احتراقه فى الكالوريمتر.

وهى أكبر من الطاقة المنطلقة من الغذاء داخل الجسم.

**طاقة البراز Fecal energy :**

تمثل الطاقة المفقودة فى البراز نتيجة عدم هضمه مثل السليلوز أو عدم إتمام

هضمه تبعاً لمعامل الهضم (كما سبق) وعدم إتمام امتصاصه كما فى الأغذية البروتينية.

**الطاقة المهضومة digestible energy :**

وهى تعادل طاقة الغذاء المهضومة والممتصة وهى تعادل طاقة الغذاء الإجمالية

مطروحاً منها طاقة البراز.



## طاقة البول Urinary energy :

وهي تعادل الطاقة الخارجة في البول.

## الطاقة الميتابوليزمية metabolizable energy :

هي الطاقة المنطلقة من الغذاء نتيجة احتراقه داخل الجسم وهي تعادل طاقة الغذاء الإجمالية مطروحاً منها طاقة البراز مطروحاً منها طاقة البول.

## — الحرارة المتولدة نتيجة تناول الغذاء : Thermic effect of food :

وكانت تسمى بالفعل الديناميكي الخاص بالغذاء specific dynamic action of food وهي تعادل الحرارة التي يستخدمها الجسم نتيجة تناول الغذاء والاستفادة منه. وهي تعتبر طاقة مفقودة إلا إذا استخدمها الجسم في الحفاظ على درجة حرارته عند انخفاض درجة حرارة الجو وهي تختلف باختلاف الغذاء المتناول كما سيأتي ذكره.

## صافي الطاقة net energy :

وهي تعادل الطاقة المتاحة التي يمكن أن يفسد منها الإنسان بعد إستبعاد ١٠٪ من الطاقة الميتابوليزمية.

## صافي الطاقة للصيانة net energy for maintenance :

وهي تعادل الطاقة اللازمة لحفظ الجسم في حالة توازن بلون أن يكون هناك فقد أو اكتساب الطاقة في جميع أنسجة الجسم. وهي تعادل طاقة الميتابوليزم القاعدي في الإنسان البالغ الذي يتمتع بصحة جيدة وفي الإناث لا يكن في مرحلة حمل أو رضاعة.

## صافي الطاقة لأداء وظائف الجسم net energy for body function :

وهي الطاقة اللازمة لأداء وظائف الجسم من عمل ونشاط وغمر، وتنظيم درجة حرارة الجسم، وفي الإناث: للحمل والرضاعة هذا بالإضافة إلى الطاقة اللازمة للصيانة وهي تعادل طاقة قد تفوق طاقة الميتابوليزم القاعدي مضافاً إليها طاقة الصيانة.

## احتياج الجسم للطاقة

يشمل احتياج الجسم الكلي للطاقة:

١ - طاقة الميتابوليزم القاعدي Basal Metabolism - طاقة ميتابوليزم الراحة Resting

Metabolic Expenditure

٢ - طاقة النشاط الجسمي Physical Activity

٣ - التأثير الحرارى نتيجة تناول الغذاء Thermic effect of food

٤ - (طاقة الفعل الديناميكي Specific Dynamic Action for food)

### طاقة الميتابوليزم القاعدي

تعرف طاقة الميتابوليزم القاعدي بأنها الطاقة اللازمة لحفظ درجة حرارة الجسم حول معدلها ولأداء الأعمال غير الإرادية مثل حركات الهضم وعضلات الصدر أثناء التنفس ونشاط الكلى والغدد، ولإتمام التفاعلات الحيوية التى تتم فى الخلية واللازمة للحياة وتمثل طاقة الميتابوليزم القاعدي الجزء الأكبر من الاحتياج الكلى للطاقة. ويفيد قياس طاقة الميتابوليزم القاعدي فى التعرف على أمور كثيرة منها هل السمنة ترجع إلى بطء فى الميتابوليزم hypometabolism؟ هل النحافة ترجع إلى سرعة

الميتابوليزم Hypermetabolism؟

وتقاس طاقة الميتابوليزم بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة للفرد وهو فى حالة راحة تامة جسمياً وعقلياً ونفسياً، ويكون قد مضى من ١٢ - ١٨ ساعة على آخر وجبة، وأن يكون نائماً، وحيث أن ذلك غير متيسر عملياً، ولذا فإنها تقدر والفرد مستلقى فى حالة استرخاء، ويطلق عليها طاقة الميتابوليزم القياسى Standard Metabolism وتختلف قيمة الميتابوليزم القاعدي باختلاف الجسم ووزنه، ولكنها تكون متماثلة بالنسبة للمتر المربع من سطح الجسم، وهى مبنية على افتراض أن فى الإنسان يتناسب الميتابوليزم مع سطح الجسم، وقد اقترحت معادلات لحساب مساحة سطح الجسم من وزن الإنسان وطوله.

معادلة حساب مساحة سطح الجسم :


$$\text{منها معادلة Du Bois, Du Bois م} = 0.207 \times \text{ع}^{0.725} \times 71.84$$

حيث : م : مساحة سطح الجسم بالمتر المربع

و : وزن الجسم بالكيلو جرام

ع : الطول بالسنتيمتر

وقد استعملت هذه المعادلة في رسم خريطة شكل (٦-٦) تربط المساحة بالطول والوزن وقد وجد أن هذه المعادلة والخريطة تنطبق بدقة على عدد كبير من الأفراد.



شكل (٦-٦) العلاقة بين مساحة سطح الجسم والطول والوزن حسب معادلة

Du Bois: Du Bois

## قياس الميتابوليزم القاعدي:

يقاس الميتابوليزم القاعدي إما بالطرق المباشرة بقياس الحرارة المنبعثة كما سبق ذكره، أو بالطرق غير المباشرة بتقدير  $O_2$  المستهلك و  $CO_2$  الناتج وهنا يمكن تقدير النسبة التنفسية.

وتبلغ قيمة الميتابوليزم القاعدي فى الشخص البالغ الذكر ٣٧,٥ كالورى لكل متر مربع فى الساعة وفى الأنثى ٣٥,٢ م<sup>٢</sup>/ ساعة كما يمكن تقدير الميتابوليزم القاعدي للفرد على أساس ١ كالورى/ كجم وزن الجسم/ ساعة فقيمة الميتابوليزم القاعدي لفرد وزنه ٧٠ كجم تساوى  $70 \times 1 \times 24 = 1680$  كالورى فى اليوم.

## العوامل التى تؤثر فى الميتابوليزم القاعدي:

١- السن والجنس: تكون قيمة الميتابوليزم القاعدي لدى الأطفال عند الولادة حوالى ٣٠ كالورى/م<sup>٢</sup>/ ساعة وتخفض خلال الأسبوع الأول ولكنها تبدأ فى الارتفاع حتى تصل إلى أعلى قيمة بين العام الأول والثانى (٥٥ - ٦٠ كالورى/ م<sup>٢</sup>/ ساعة) ثم تقل تدريجياً حتى تصل فى سن الشيخوخة إلى ٣٢,٠ كالورى/م<sup>٢</sup>/ ساعة للذكر، ٣٠,٩ كالورى/م<sup>٢</sup>/ ساعة للأنثى.

والجدول (٦-٤) يبين قيمة الميتابوليزم القاعدي فى الذكور والإناث فى الأعمار المختلفة ويلاحظ أن قيمة الميتابوليزم القاعدي للذكور أعلى منه فى الإناث، وتزيد قيمة الميتابوليزم أثناء الحمل والرضاعة، وذلك يرجع إلى زيادة أكسدة الغذاء فى جسم الجنين وزيادة الأنسجة العضلية.

جدول (٦-٤) قيمة الميتابوليزم القاعدي كالوري / م / ساعة

العمر بالسنين	١	٣	٥	٧	٩	١١	١٣	١٥	١٧	١٩	٢٠
ذكور	٥٣,٠	٥١,٣	٤٩,٣	٤٧,٣	٤٥,١	٤٣,٠	٤٢,٣	٤١,٨	٤٠,٨	٣٩,٢	٣٨,٦
إناث	٥٣,٠	٥١,٢	٤٨,٤	٤٥,٤	٤٢,٨	٤٢,٠	٤٠,٣	٣٧,٩	٣٦,٣	٣٥,٥	٣٥,٣

العمر بالسنين	٢٥	٣٠	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	٦٠	٦٥	٧٠	٧٥	٨٠
ذكور	٣٧,٥	٣٦,٨	٣٦,٥	٣٦,٣	٣٦,٢	٣٥,٨	٣٥,٤	٣٥,٩	٣٤,٤	٣٣,٨	٣٢,١	٣٣,٠
إناث	٣٥,٢	٣٥,١	٣٥,٠	٣٤,٩	٣٤,٥	٣٣,٠	٣٢,٧	٣٢,٧	٣٢,٣	٣١,٧	٣١,٣	٣٠,١

٢- الحالة الصحية: تزيد قيمة الميتابوليزم القاعدي لدى الأفراد المرضى بأى مرض بسبب ارتفاع درجة الحرارة الجسم حيث تزيد بمعدل ٧٪ لكل ارتفاع فى درجة الحرارة قدره درجة واحدة مئوية فوق المعدل الطبيعى، أما الأفراد ذوى الحالة الغذائية السيئة فتقل الميتابوليزم القاعدي لديهم، كما تزيد أيضاً فى حالة الإصابة بأمراض القلب، النحافة.

٣- نوع الغذاء: تزيد قيمة الميتابوليزم القاعدي بتناول كميات كبيرة من البروتين.

٤- تركيب الجسم: تزيد قيمة الميتابوليزم القاعدي بزيادة الأنسجة العضلية وهى الأنسجة النشطة حيث أن العضلات هى مركز نشاط عمليات الأكسدة metabolically active tissue.

٥- النشاط الرياضى: تزيد قيمة الميتابوليزم القاعدي لدى الأفراد الرياضيين حيث وجد أنها تزيد بنسبة حوالى ٦٪ للرياضيين عنه لغير الرياضيين فى نفس السن ونفس حجم وتركيب وشكل الجسم.

٦- النوم: تقل قيمة الميتابوليزم القاعدي أثناء النوم بمقدار ١٠٪ عنه أثناء اليقظة.

٧- إفرازات الغدد الصماء: تؤثر بعض الغدد الصماء على قيمة الميتابوليزم القاعدي وخصوصاً الغدة الدرقية التى تفرز هرمون الثيروكسين، فزيادة نشاط هذه الغدة يودى إلى زيادة فى قيمة الميتابوليزم القاعدي وقد تصل هذه الزيادة فى بعض الأحيان إلى ٨٠٪، وإذا قل نشاط هذه الغدة فيحدث انخفاض فى قيمة الميتابوليزم القاعدي قد يصل إلى ٣٠٪ - ٤٠٪ كما يؤثر الانبغرين فى الميتابوليزم القاعدي ولكن بدرجة أقل ولفترة أقصر ويودى نشاط الغدة النخامية إلى ارتفاع فى قيمة الميتابوليزم القاعدي، ولكن تأثير هذه الغدة أقل من الغدة الدرقية.

وعموماً يودى النقص فى إفراز الهرمونات إلى انخفاض قيمة الميتابوليزم القاعدي وكذلك فى حالة الاكتئاب ولكن تزيد فى حالة القلق والضغط العصبى. طاقة ميتابوليزم الراحة:

#### Resting Energy Expenditure (REE) :

تمثل أكبر قدر من الطاقة تستهلك بواسطة الفرد فى وقت الراحة وفى درجات حرارة معتدلة. وهى تماثل طاقة الميتابوليزم القاعدي فى الصباح بعد

الاستيقاظ من النوم مباشرة، أو على الأقل بعد مرور ١٢ ساعة على آخر وجبة تناولها الفرد.

وقد تختبر على متبقيات التأثير الحرارى للوجبة السابقة وقد تكون اقل من طاقة الميتابوليزم القاعدى أثناء النوم الهادئ.

وعموماً فالفرق بينهما لا يتعدى ١٠٪ وأحياناً يستخدمان بالتبادل. ويوضح جدول (٥-٦) طاقة ميتابوليزم الراحة المحسوبة باستخدام معادلات وضعتها WHO (١٩٨٥) حسب الوزن/ العمر/ الجنس.

جدول (٥-٦) "احتياج طاقة ميتابوليزم الراحة"

الذكور		الإناث	
العمر بالسنين	كالورى/ اليوم	العمر بالسنين	كالورى/ اليوم
صفر - ٣	(٦٠,٩ × الوزن) - ٥٤	صفر - ٣	(٦١,٠ × الوزن) - ٥١
٣ - ١٠	(٢٢,٧ × الوزن) + ٤٩٥	٣ - ١٠	(٢٢,٥ × الوزن) + ٤٩٩
١٠ - ١٨	(١٧,٥ × الوزن) + ٦٥١	١٠ - ١٨	(١٢,٢ × الوزن) + ٧٤٦
١٨ - ٣٠	(١٥,٣ × الوزن) + ٦٧٩	١٨ - ٣٠	(١٤,٧ × الوزن) + ٤٩٦
٣٠ - ٦٠	(١١,٦ × الوزن) + ٨٧٩	٣٠ - ٦٠	(٨,٧ × الوزن) + ٨٢٩
٦٠ +	(١٣,٥ × الوزن) + ٤٨٧	٦٠ +	(١٠,٥ × الوزن) + ٥٩٦

Source: Ensminger (1995).

## طاقة النشاط العضلى

يحتاج الجسم إلى الطاقة للقيام بأنواع النشاط الجسمى المتنوعة، وهذا الجزء من الطاقة يمثل نسبة كبيرة من الاحتياج الكلى للطاقة بعد طاقة الميتابوليزم القاعدى.

### العوامل التى تؤثر فى طاقة النشاط العضلى :

إن الاحتياج لطاقة النشاط يتوقف إلى حد كبير على نوعية العمل الذى يؤديه الفرد ودرجة الجهد المبذول فيه ووزن الجسم، فاحتياج الفرد للطاقة لصعود السلم (٢,٥٤ سعراً/كجم / ١٠ دقائق) يصل إلى ثلاثة أضعاف احتياجه لنزول السلم (٠,٩٧٦ سعراً/كجم / ١٠ دقائق) كما يزيد احتياج الفرد بزيادة شدة العمل، فمثلاً احتياج الشخص للطاقة فى المشى بسرعة (٥,٨ ميل/ ساعة) يصل إلى ١,١٦٦٧ كالورى / كجم / ١٠ دقائق) يزيد عن الطاقة اللازمة للمشى بسرعة (٢,٢٧ ميل/ ساعة)، حيث تصل إلى ٠,٥٣ كالورى / كجم / ١٠ دقائق ويزيد احتياج الفرد للطاقة بزيادة الوزن، فمثلاً هناك شخصان وزن أحدهما ٤٥ كجم والثانى ٦٠ كجم يسيران بسرعة ٤ ميل/ ساعة، فإن احتياجهما للطاقة هو ١,٤، ٥,٢ كالورى/ دقيقة على التوالى.

والجدول (٦-٦) يوضح مقدار الطاقة التى يبذلها الإنسان فى بعض أنواع النشاط المختلفة وجدول (٦-٧) إحتياجات الطاقة لأداء بعض الأعمال حسب الجنس ونوع العمل.

وتقاس طاقة النشاط العضلى إما بالطريقة المباشرة أو بالطريقة غير المباشرة كما سبق.



جدول (٦-٧) مقدار الطاقة التي يبدؤها الإنسان في الأنشطة المختلفة

النشاط	سر /كجم / ١٠ دقائق	النشاط	سر /كجم / ١٠ دقائق	النشاط
ارتداء الملابس	٢,٠٤٥	الجرى بسرعة ٧ ميل / ساعة	٠,٥١٣	الشي بسرعة ٢,٢٧ ميل / ساعة
النضارة	٢,٢٧٣	الجرى بسرعة ٨,٧ ميل / ساعة	٠,٦٩٠	الشي بسرعة ٣,٢ ميل / ساعة
لعب كرة القدم	١,٤٧٠	الجرى البطيء	٠,٧٣٣	الشي بسرعة ٣,٥ ميل / ساعة
لعب التنس	٠,١٩٥	الاسترخاء	٠,٩٦٩	الشي بسرعة ٤,٤٧ ميل / ساعة
لعب كرة تنس الطاولة	٠,٥١٤	رياضة الحائط	٠,١٥٠٥	الكرة الطائرة
التميم	٠,٧٩٤	الجولف	١,٤٥٤	المساحة
نزول السلم	٠,٣٤٢	قيادة اللورى	٠,٥٢٥	مسح الأرض
صعود السلم	٠,٥٣١	قيادة التوتسيكل	٠,٢٦٨	الكتابة
	١,٤٣٨	قيادة العربة	٢,٠٤	الاكل

جدول (٦-٧) احتياجات الطاقة لأداء بعض الأعمال حسب نوع العمل والجنس<sup>(١)</sup>

نوع النشاط	الزمن بالساعة	رجل (٧٠ كجم)		امراة (٥٦ كجم)	
		المعدل / الساعة كالورى	الإجمالى كالورى	المعدل / الساعة كالورى	الإجمالى كالورى
النوم	٨	٧٥	٦٠٠	٦٠	٤٨٠
<b>عمل خفيف جداً</b> القراءة والكتابة مشاهدة التلفزيون الحياطة الكتابة على الآلة الكاتبة مزاولة بعض الأعمال الرياضية جلوساً	١٢	١٠٠	١٢٠٠	٨٠	٩٦٠
<b>عمل خفيف</b> إعداد الطعام أعمال التنظيف غسل الأطباق والطهي مشي البطيء بسرعة ٣-٤ كم/ ساعة شراء الحاجيات	٣	١٦٠	٤٨٠	١١٠	٣٣٠
<b>عمل متوسط</b> المشي بسرعة ٤-٦ كم/ ساعة ترتيب المنزل - تنظيف الغسيل في آلة الغسيل لعب التنس	١	٢٤٠	٢٤٠	١٧٠	١٧٠
<b>عمل ثقيل</b> العمل في الحديقة رياضة الجلف والبولينج تلميع الأرض بالورنيش	صفر	٣٥٠	-	٢٥٠	-
<b>عمل ثقيل جداً</b> حرق الأرض الجرى - السباحة رياضة الترحلق ركوب الدراجة بسرعة ١٠-١٢ كم/ الساعة	صفر	+٣٥٠	-	+٣٥٠	-
الإجمالى	٢٤		٢٥٢٠		١٩٤٠

Esminger (١٩٩٥).

## التأثير الحرارى نتيجة تناول الغذاء.

### Thermic effect of food

وتعرف هذه الظاهرة بالتأثير الحرارى للوجبة thermic effect وهو ما كان يعرف بالفعل الديناميكي الخاص بالغذاء specific dynamic action of food. ترتفع قيمة الميتابوليزم ويزيج انبعاث الحرارة بعد تناول الفرد الطعام وكان Rubner أول من لاحظ هذه الظاهرة سنة ١٩٠٢ وكان يطلق عليها اسم الفعل الديناميكي الخاص للغذاء، وتتوقف قيمة الفعل الديناميكي الخاص على حسب نوعية الطعام، فإذا كان فرد صائم فى حالة راحة تامة، وفى بيئة ذات درجة حرارة طبيعية، وتناول كمية من البروتين تحتوى على نفس الطاقة المساوية للميتابوليزم القاعدى، فإن الحرارة المنبعثة من الشخص تزيد بمقدار حوالى ٣٠٪ عن المستوى القاعدى، بينما إذا كان مصدر الطاقة كربوهيدرات أو دهون، فإن الزيادة تعادل حوالى ٦، ٤٪ على الترتيب.

وقد يرجع سبب التأثير الحرارى للأغذية إلى التفاعلات التى تحدث للأحماض الأمينية ونزع المجموعة الأمينية فى حالة البروتين وإلى التفاعلات الوسطية بين الجليكوجين والجلوكوز فى حالة الكربوهيدرات، وإلى وجود مواد سريعة التأكسد فى حالة الدهون. ويلاحظ أن معظم الطاقة الكيميائية المتولدة من الأغذية تخزن فى مركب غنى بالطاقة مثل أدينوسين ثلاثى الفوسفات (ATP) تستفيد منها الأنسجة حسب احتياطيها وهذا يتضمن فقد فى الحرارة. وقد وجد Krebs سنة (١٩٦٤) أن التأثير الحرارى يكون أكثر عند تكوين مركب (ATP) نتيجة لميتابوليزم البروتين أكثر منه فى حالة الدهون أو الكربوهيدرات.

وعموماً فإن هذه الحرارة الزائدة ضائعة لا يستفيد منها الجسم، ولذلك يعمل حساب هذا الفقد عند تقدير الاحتياجات الكلية للطاقة بأن يضاف ١٠٪ من مقدار الميتابوليزم القاعدى لتغطية الفعل الديناميكي الخاص أى التأثير الحرارى للغذاء.

## الاحتياج الكلى للطاقة فى اليوم

يعتبر النشاط الجسمى من العوامل المهمة التى تؤثر على احتياج الفرد للطاقة ومن الصعب قياسها فى مختلف الشعوب، وقد وضعت منظمة الأغذية والزراعة أمثلة

لنواحى استهلاك الطاقة لرجل نمطى وامرأة نمطية Reference man & Reference Woman مفترضين أن استهلاك كل الطاقة يمثل متوسط استهلاك البالغ للطاقة ويوجد فى كل دولة أفراد أكثر نشاطاً وأفراد أقل نشاطاً منهما والجدول (٦-٨) يوضح استهلاك الطاقة خلال ٢٤ ساعة لفرد نمطى بالغ عمره ٢٥ سنة ووزنه ٦٥ كجم وأنثى نمطية عمرها ٢٥ سنة ووزنها ٥٥ كجم ومتوسط درجة الحرارة السنوى ١٠ م°.

جدول (٦-٨) استهلاك الطاقة للرجل والأنثى النمطين خلال ٢٤ ساعة بالكالورى

نوع النشاط		عمل خفيف		عمل متوسط		عمل شاق	
		ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى
٨ ساعات عمل		١١٠٠	٨٠٠	١٤٠٠	١٠٠٠	١٩٠٠	١٤٠٠
٨ ساعات أنشطة أخرى.		١٥٠٠	٩٨٠	١٥٠٠	٩٨٠	١٥٠٠	٩٨٠
٨ ساعات نوم		٥٠٠	٤٢٠	٥٠٠	٤٢٠	٥٠٠	٤٢٠
ميتابوليزم قاعدى							
الاستهلاك الكلى		٣١٠٠	٢٢٠٠	٣٤٠٠	٢٤٠٠	٣٩٠٠	٢٨٠٠

وفى بعض الحالات التى يقوم فيها الفرد بعمل شاق جداً، قد يصاحبه استهلاك الفرد للطاقة خلال ٢٤ ساعة إلى ٤٠٠٠ سعراً كالورى.

وقد يحتاج بعض الأفراد إلى سرعات أكثر، ومن ناحية أخرى فقد يحتاج بعض الأفراد إلى سرعات أقل خصوصاً إذا كانوا يؤدون أعمالاً لا تحتاج إلى مجهود وحركة كثيرين مثل بعض الأعمال الكتابية. ويوضح جدول (٦-٩) إجمالى استهلاك الطاقة اليومي لأفراد يؤدون أنواعاً مختلفة من الأعمال.

جدول (٦-٩) استهلاك الطاقة اليومية لأفراد في وظائف مختلفة

العمل	ذكور	العمل	إناث
استهلاك الطاقة بالسعر		استهلاك الطاقة بالسعر	
على المعاش	١٧٥٠ - ٢٨١٠	ربة بيت كبيرة فى السن	١٤٩٠ - ٢٤١٠
كاتب	٢٢٣٠ - ٢٢٩٠	ربة بيت متوسطة العمر	١٧٦٠ - ٢٣٢٠
فنى فى معمل	٢٢٤٠ - ٣٨٣٠	فنية فى معمل	١٣٤٠ - ٢٥٤٠
عامل بناء	٢٤٤٠ - ٣٧٣٠	فى محل تجارى	١٨٢٠ - ٢٨٥٠
طالب جامعة	٢٢٧٠ - ٤٤١٠	طالبة جامعية	١٣٨٠ - ٢٥٠٠
عامل بمصنع	٢٦٠٠ - ٣٩٦٠	عاملة بمصنع	١٩٧٠ - ٢٩٨٠
فلاح	٢٩٠٠ - ٤٠٠٠	عاملة بمخبز	١٩٨٠ - ٢٣٩٠
عامل بمنجم	٢٩٧٠ - ٤٥٦٠		
عامل بالغابة	٢٨٦٠ - ٤٨٠٠		

ويلاحظ أنه كلما زاد تصنيع البلاد كلما انخفض استهلاك الفرد للطاقة

الكميات الموصى بها لتناول الطاقة يوميًا :

**Recommended caloric daily Intakes :**

وصفت هيئة الغذاء والتغذية بالولايات المتحدة الأمريكية الكميات الموصى

لتناولها من الطاقة يوميًا (جدول ٦-١٠) حسب من المقررات الغذائية (NRC- NAS ١٩٨٩) ويمكن تعديلها حسب الظروف.

فبالنسبة للبالغين يمكن إحداث تعديلات حسب نوع العمل وفترته كما هو موضح فى جدول (٦-٦، ٦-٧) وبالنسبة لفئات الرضع والأطفال والمراهقين فإنه يوجد اختلافات كبيرة بين أفراد هذه الفئات فى الوزن، والطول، نوع النشاط الجسمى.. إلخ، وخصوصًا بين المراهقين ولذا فإنه يمكن عمل التعديلات حسب المعادلات التالية:

$$\text{كالورى/ كجم} = ١٠٠ - (٣ \times \text{العمر بالسنوات})$$

وقد يحتاج الأفراد فى الدول النامية لكمية من الطاقة أكبر نظرًا لأنهم يقومون بأعمال يدوية وشديدة أكثر من زملائهم فى الدول المتقدمة.

جدول (٦- ١٠) الكميات الموصى بها من الطاقة الكلية يوميًا حسب الجنس والعمر ومقاييس الجسم

الاحتياج للطاقة					
الفئة العمرية	العمر بالسنوات	الوزن كجم	الطول سم	كالورى/كجم	كالورى/اليوم
الرضع	٠ - ٥,٥	٦	٦٠	١٠٨	٦٥٠
	٥,٥ - ١	٩	٧١	٩٨	٨٥٠
أطفال	١ - ٣	١٣	٩٠	١٠٢	١٣٠٠
	٤ - ٦	٢٠	١١٢	٩٠	١٨٠٠
	٧ - ١٠	٢٨	١٣٢	٧٠	٢٠٠٠
ذكور	١١ - ١٤	٤٥	١٥٧	٥٥	٢٥٠٠
	١٥ - ١٨	٦٦	١٧٦	٤٥	٣٠٠٠
	١٩ - ٢٤	٧٢	١٧٧	٤٠	٢٩٠٠
	٢٥ - ٥٠	٧٩	١٧٦	٣٧	٢٩٠٠
	٥١ +	٧٧	١٧٣	٣٠	٢٣٠٠
إناث	١١ - ١٤	٤٦	١٥٧	٤٧	٢٢٠٠
	١٥ - ١٨	٥٥	١٦٣	٤٠	٢٢٠٠
	١٩ - ٢٤	٥٨	١٦٤	٣٨	٢٢٠٠
	٢٥ - ٥٠	٦٣	١٦٣	٣٦	٢٢٠٠
	٥١ +	٦٥	١٦٠	٣٠	١٩٠٠
الحمل الرضاعة	خلال الستة شهور الأخيرة				٣٠٠ + ٥٠٠ +

### العوامل التي تؤثر فى الاحتياج الكلى للطاقة

حجم الجسم ووزنه وتركيبه:

يتأثر استهلاك الفرد للطاقة بوزن الجسم وتركيبه، ويلاحظ أن الاحتياج للطاقة يقل كلما زادت نسبة الدهن فى الجسم، وعندما يكون تركيب الجسم طبيعيًا، فإن الجسم يحتاج للطاقة حسب وزن الجسم كما هو فى جدول (٦- ١٢)، كما وضعت منظمة الأغذية والزراعة معادلة حسابية تربط بين احتياج الجسم للطاقة ووزن الجسم:

المصدر Ensminger (١٩٩٥).

للرجال: عدد السرعات =  $815 + 36,6$  و

السيدات: عدد السرعات =  $580 + 31,1$  و

حيث و = وزن الجسم بالكيلو جرام.

### العمر:

يقبل احتياج الفرد للطاقة بتقدم العمر وذلك نظراً لانخفاض معدل الميتابوليزم القاعدى وانخفاض نشاط الفرد وقلة مقدرته على أداء الأعمال.

ويزيد معدل احتياج الأطفال أثناء فترات النمو حيث يجب أن تكون الطاقة كافية للنمو والنشاط الجسمى.

### المناخ:

يتأثر احتياج الفرد للطاقة بتنوع المناخ، وقد تغيرت التعديلات فى احتياج الفرد للطاقة حسب درجة الحرارة. وآخر التعديلات هى أن يراعى أن يزداد الاحتياج للطاقة بمعدل ٢-٥% فقط من الكميات الموصى بها عند انخفاض درجة الحرارة لمقابلة زيادة الاحتياج للقيام بالعمل. خصوصاً مع الملابس الثقيلة. ومن جهة أخرى فإنه عند الزيادة الكبيرة فى درجة الحرارة عن  $30^{\circ}\text{C}$  يحتاج إلى زيادة فى الطاقة بمعدل ٥,٠ / درجة مئوية زيادة عن المعدل وذلك لمقابلة زيادة المجهود الذى يبذله القلب لخفض درجة حرارة الجسم فى هذا الجو الحار.

وقد كان المتبع هو خفض الاحتياجات من الطاقة فى الجو الدافئ أو الحار.


### الحالة الصحية:

لا بد أن تكون كمية الطاقة المتناولة كافية حتى لا يستخدم البروتين فى توليد الطاقة بل يوجه إلى عمليات الشفاء.

ويزداد الميتابوليزم القاعدى بمعدل ٧% لكل ارتفاع فى درجة حرارة الجسم يعادل  $1^{\circ}\text{F}$ . وفى حالة الكسور فى العظام يزداد ١٠ - ٣٠% من طاقة الراحة، وفى الجراحة تزداد إلى ١٠% من طاقة الميتابوليزم القاعدى.

### نوع العمل وشدته:

يزيد استهلاك الفرد للطاقة كلما زادت شدة العمل وكما يظهر من شكل (٦-٧) أن الزمن اللازم لاستهلاك الطاقة يقل بزيادة شدة العمل.



## MINUTES OF ACTIVITY NEEDED TO "BURN-UP"

### FOOD CALORIES

شكل (٦ - ٧) الزمن لاستهلاك الطاقة حسب نوع العمل



## الحمل:

يكون احتياج المرأة أثناء فترة الحمل بمعدل ٣٦ كالورى/ كجم ويمكن تحقيق ذلك بزيادة ٣٠٠ كالورى عن المعتاد يوميًا وذلك لتغطية احتياجات نمو الجنين.

## الرضاعة:

إن إنتاج ٨٥٠ - ٩٠٠ مل لبن فى الدم يحتاج إلى ٧٥٠ - ٩٠٠ كالورى/ اليوم. والمعروف أن المرأة التى تتناول وجبات متوازنة كافية ذات قيمة تغذوية مرتفعة تكون قد كونت ٢- ٤ كجم دهن فى جسمها وهذه يمكن أن تكون مصدر لطاقة تكوين اللبن ولهذا يوصى بزيادة المتناول من الطاقة ٥٠٠ كالورى عن المتناول يوميًا.

**النشاط العقلى:**

إن احتياج الفرد للمجهود العقلى يمثل ٢٠ حوالى % من الاحتياج الكلى للطاقة (جدول ٦- ١١) رغم انخفاض وزن المخ، وهذا يفوق قليلاً احتياج العضلات الذى يمثل ١٨ % من الاحتياج الكلى للطاقة وبالنسبة للرضيع فإن احتياج المخ من الطاقة يمثل ٤٤ % من الاحتياج الكلى للطاقة.

جدول (٦- ١١) معدل المتابوليزم لأعضاء الجسم<sup>(١)</sup>

العضو	شخص بالغ			طفل حديث الولادة		
	الوزن كجم	معدل المتابوليزم/ اليوم كالورى	% المتابوليزم الكلى للجسم	الوزن كجم	معدل المتابوليزم / اليوم كالورى	% المتابوليزم الكلى للجسم
الكبد	١,٦	٤٨٢	٢٧	٠,١٤	٤٢	٢٠
المخ	١,٤	٣٣٨	١٩	٠,٣٥	٨٤	٤٤
القلب	٠,٣٢	١٢٢	٧	٠,٠٢	٨	٤
الكلى	٠,٩٢	١٨٧	١٠	٠,٠٢٤	١٥	٧
العضلات	٣٠,٠٠	٣٢٤	١٨	٠,٨	٩	٥
المجموع	١٧٠,٠٠	١٨٠٠		٢٣,٥	١٩٧	

<sup>(١)</sup> WHO (١٩٨٥). ١- وزن الفرد. ٢- وزن الطفل

كما هو معروف أن الميتابوليزم القاعدى يتوقف على الأنسجة النشطة بالجسم، ورغم أن الدهون تشكل حوالى ٦٠٪ من المخ وأن الأنسجة العضلية به أقل من ٥٪ إلا أن استهلاكه يمثل تقريباً  $\frac{1}{3}$  طاقة الميتابوليزم الكلى وذلك يتمثل فى التعلم وتشغيل المعلومات information processing لإنتاج التفكير بأنواعه المختلفة من تفكير إبداعى، ناقد، تحليلى، تلازمى، تخيلى... إلخ بالإضافة إلى سيطرة المخ على جميع أعضاء الجسم وأنسجته ووظائفها واستجاباته لكل مؤثر داخلى وخارجى. وقد يزيد هذا الاحتياج إذا صحبه توتر عضلى شديد خصوصاً فى الأفراد عصبى المزاج.

### حساب الطاقة الكلية للشخص:

تقدر الطاقة الكلية لفرد ما بحساب الميتابوليزم القاعدى له فى اليوم، ثم يطرح منه (٠,١ كالورى/ كجم من وزن جسمه/ ساعة نوم) ويضاف إليه ١٠٪ من الميتابوليزم القاعدى لتغطية التأثير الحرارى للغذاء مع حساب ما يبذله الفرد من الطاقة للنشاط (يمكن حساب ذلك من الجداول الخاصة).

مثال: لحساب الطاقة الكلية لفرد وزنه ٥٥ كجم وينام ٨ ساعات وقيمة الميتابوليزم القاعدى ١٣٠٠ كالورى ويبذل ٩٠٠ كالورى للنشاط العضلى.

$$\text{الميتابوليزم القاعدى} = ١٣٠٠ \text{ كالورى}$$

$$\text{التصحيح نتيجة النوم} = ٠,١ \times ٨ \times ٥٥ = ٤٤ \text{ كالورى}$$

$$١٢٥٦ \text{ كالورى}$$

$$١٣٠ \text{ كالورى} = \text{التأثير الحرارى للغذاء}$$

$$٩٠٠ \text{ كالورى} = \text{طاقة النشاط العضلى}$$

$$٢٢٨٦ \text{ كالورى} = \text{الاحتياج الكلى للطاقة}$$

### توازن الطاقة Energy Balace :

يحصل الفرد على ما يلزمه من الطاقة عن طريق الغذاء. فإذا كانت كمية الطاقة المكتسبة يومياً أكثر من احتياجه، فإن الطاقة الزائدة تخزن فى الجسم فى صورة دهن فيزيد وزن الجسم، أما إذا كانت الطاقة المكتسبة تساوى الطاقة المفقودة فإن وزن الجسم يظل ثابتاً، وإذا كانت الطاقة المكتسبة أقل من احتياج الجسم اليومى فإن وزن- الجسم يقل نظراً لاستهلاك جزء من الدهن المخزن فى جسمه لسد احتياجات

من الطاقة، ويكون التغير فى وزن الجسم بمعدل ١ كم/ ١٠٠٠ كالورى عند زيادة أو نقص الطاقة المتناولة بالنسبة لحاجة الجسم.

وللحفاظ على توازن الطاقة يجب على الفرد أن يقوم بالعمل المناسب حتى يتمكن من استهلاك الطاقة الزائدة نتيجة قيامه بهذا النشاط ويمكن استخدام بيانات شكل (٦-٧) كأسس للتعرف على الزمن الذى يستهلكه الفرد عند قيامه بأى نشاط حسب نوع العمل.

وعند تصميم الوجبات يجب أن يراعى الفرد أن يختار الأغذية المفضلة له على أن تحتوى على كيميات مناسبة من الطاقة حسب العوامل سابقة الذكر لتجنب استهلاك كميات تزيد أو تقل كثيراً عند احتياجاته والتى قد تعرض الفرد للحالات المرضية المختلفة كما سيأتى ذكره.

ولتقدير محتوى الوجبة من الطاقة يمكن استخدام جداول تحليل الأغذية ويفضل الجداول المحلية وعادة يظهر فى بعض الجداول محتوى الغذاء من عناصر البروتين والدهن والطاقة الكلية. وبضرب محتوى كل من البروتين والدهن فى معاملات التحويل وهى على التوالى ٤، ٩ (كما سبق) نحصل على الطاقة المستمدة من كل عنصر والفرق بين مجموع الطاقة لهما والمحتوى الكلى للغذاء نحصل على الطاقة المستمدة من الكربوهيدرات.

### استخدامات الطاقة:

يتضمن استخدامات الطاقة فى جسم الإنسان سلسلة من التفاعلات الكيميائية المرتبطة التى تنتقل فيها الطاقة من مركب لآخر مع تسرب جزء من الحرارة فى أماكن مختلفة من السلسلة، ولهذا فإن ميتابوليزم الطاقة ينتهى بإنتاج ثانى أكسيد الكربون وماء وطاقة كيميائية فى صورة مركبات عضوية فوسفاتية وحرارة، كما تنتج يوريا نتيجة ميتابوليزم البروتين. ويلاحظ أن أكثر من نصف الطاقة المنتجة من الميتابوليزم تكون فى صورة حرارة تستخدم فى المحافظة على درجة حرارة الإنسان عند ٣٧°م، ومعظم الباقي يخزن فى المركبات الفوسفاتية أهمها ATP ولهذا فإن عمليات توليد الطاقة التى تتم فى ميتوكوندريا الخلايا تمد الجسم بالطاقة اللازمة للعمل والنشاط.

## حفظ درجة حرارة الجسم : maintenance of body temperature :

عندما تكون درجة الحرارة مناسبة فإن الحرارة المنبعثة نتيجة قيام الجسم بوظائفه تكون مناسبة لحفظ درجة حرارة الجسم.

وعند استخدام الجسم لصور الطاقة فإنه يعمل للتكيف حتى يتمكن من مواجهة ظروف مضادة. وهذا يؤدي إلى تحويل جزء من الطاقة إلى حرارة. كما أن جزء من الحرارة يتسرب من سلسلة التفاعلات الكيميائية التي تنتج ATP كما سبق. ولكن عند تغير درجة حرارة الجو صعوداً أو هبوطاً فإن الجسم يحتفظ بدرجة حرارته عند  $37^{\circ}\text{C}$  (36,5 - 37,5)° لتتمكن خلاياه من أن تؤدي أعمالها صيفاً وشتاءً بنفس السرعة، وينظم حرارة الجسم في الإنسان مركز عصبى أسفل المخ هو: هيپوثالاميس Hypothalamus الذى يتأثر بأقل تغير فى درجة حرارة الدم الذى يغذيه كما يتأثر بإشارات عصبية تصل إليه من أعضاء حساسة موجودة بالجلد، نتيجة لتأثير هذه الإشارات يوازن المركز العصبى بين كمية الحرارة التى يولدها الجسم نتيجة أكسدة المواد الغذائية وبين كمية الحرارة التى يفقدها الجسم وبذلك تبقى درجة حرارة الجسم ثابتة.

ويحتفظ الجسم بدرجة الحرارة بواسطة طرق كيميائية وطبيعية، وتتضمن الطرق الكيميائية التفاعلات التى تؤدي إلى إنطلاق الحرارة داخل الخلايا أثناء ميتابوليزم المواد الغذائية، أما الطرق الطبيعية فتتضمن حفظ هذه الحرارة (عن طريق الفقد والزيادة) لحفظ التوازن الحرارى مناسباً.

### ١- توليد الحرارة:

إذا انخفضت درجة حرارة الجو عن  $20^{\circ}\text{C}$  فإن الفرق بين حرارة الجو وبين الدرجة التى يكون عليها سطح الجلد يكون كبيراً، فيفقد الجسم حرارة، ولذا تزيد سرعة التفاعلات الكيميائية التى تؤدي إلى إنطلاق الحرارة داخل الخلايا أثناء ميتابوليزم المواد الغذائية، حتى تزيد الحرارة المتولدة من الجسم لتعوض الحرارة التى يفقدها الجسم نتيجة لانخفاض درجة الجو، لأنه إذا زاد انخفاض درجة حرارة الجو واستمر لمدة طويلة فإنه يعرض الإنسان لخطر صبحى قد يؤدي إلى شلل فى بعض المراكز العصبية بالمخ، مما يؤدي إلى مواجهة صعوبة فى التنفس ونقص فى ضغط الدم وغيبوبة ويلزم للفرد أن

يستخدم وسائل تدفئة صناعية كما أن الجسم يقوم بزيادة إفراز الهرمونات مثل الأبنفرين ونورانفرين لإسراع الميتابوليزم مما يؤدي إلى زيادة الحرارة المتولدة مع نقص فى نسبة تكوين ATP وكذلك فإن الغدة الدرقية تزيد من إفرازاتها للمساعدة فى سرعة الميتابوليزم وتقوم العضلات بزيادة نشاطها بحركات لا إرادية تساعد على زيادة الحرارة فى الجسم.

### فقد الحرارة:

وبالعكس إذا زادت درجة الحرارة فى الجو عن ٢٠°م، فإن الجسم يقوم بمحاولة المحافظة على درجة حرارة ثابتة، فإذا زادت الحرارة فى الجو بدرجة لا يستطيع معها الجسم مواجهة هذه الزيادة لأنها تؤدي إلى زيادة سرعة الميتابوليزم مما يرفع درجة حرارة الجسم وقد تصل فوق ٤٠°م مما يؤدي الأمر إلى وفاة الفرد، ولذا فإن الجسم يواجه ارتفاع درجة الحرارة، فيقوم الجلد بمحاولة فقد الحرارة إلى الجو بطرق متعددة ومختلفة، وذلك بالإشعاع أو التوصيل أو الحمل، وقد يكون التبخير من الشعيرات والأنسجة تحت الجلد ومن الرئتين، وقد يكون إفراز العرق وعمليات الإخراج من البول وبراز، كل هذا يؤدي إلى فقد فى الحرارة.

ويقوم الجسم عن طريق المركز العصبى بدور كبير فى تنظيم درجة حرارة الجسم بالرغم من ارتفاع درجة حرارة الجو، مما يؤدي إلى اتساع الشرايين ومرور كميات أكبر من الدم حتى يتخلص الجلد من الحرارة الزائدة، كما أن الهيبوثالامس يدفع الغدة العرقية على زيادة إفراز العرق مما يؤدي إلى فقد الحرارة. آثار نقص أو زيادة الطاقة:

يؤدي نقص أو زيادة الطاقة إلى ضعف الجسم وزيادة تعرض الفرد للمرض نتيجة نقص أو زيادة التغذية. وقد أظهرت الدراسات (Keys ١٩٨٠) حول العالم أن أقل نسبة وفيات تكون بين فئة ذوى الوزن المتوسط ولكن تزيد بين من يعانون نقص أو زيادة الوزن.

### ويؤدي نقص الطاقة Caloric deficiency :

\* فشل نمو وتطور الرضيع والطفل والمراهق لأن الطاقة لازمة للتمثيل الأمثل للبروتين والنمو والتطور الجنسي ونقص الطاقة يؤدي إلى وتأخيرهما أثناء فترة المراهقة ويؤدي النقص الشديد إلى القزمية Stunt.

\* زيادة شعور الفرد بالبرد نظراً لعدم كفاية طبقة الدهن تحت الجلد التي تحفظ حرارة الجسم، كما أن القدرة على توليد الطاقة تقل.

\* زيادة التعرض للعدوى نظراً لانخفاض المناعة مع شدة ظهور الأعراض ولمدة طويلة نظراً لقلة المخزون من الطاقة اللازمة لصيانة الجسم.

\* انخفاض القدرة على النشاط العضلي مع عبوث الطفل وسرعة إثارتة وعدم رغبته في العمل نتيجة لأن نقص التغذية يؤدي إلى عدم توازن إفراز الهرمونات اللازمة للحياة والنشاط.

أما بالنسبة للزيادة في الطاقة المتناولة فإنه يؤدي إلى تراكم الدهون التي تعمل على ارتفاع الوزن البدانة وما يترتب على ذلك من زيادة التعرض للإصابة بأمراض القلب، الكلى، السكر، تكوين حصوة، النقرس، سرعة الشعور بالتعب بعد أى مجهود خصوصاً عند ارتفاع درجة حرارة الجو.

الباب السابع

**الفيتامينات**

**The Vitamins**





## الفيتامينات<sup>(١)</sup>

### The Vitamins

#### مقدمة :

كان اكتشاف الفيتامينات حدثاً هاماً فى التغذية، فبالرغم من وجودها بكميات صغيرة، إلا أنها تودى وظائف هامة فى الجسم، بل إنها تعتبر أساسية بالنسبة للجسم.

وقد اكتشفت الفيتامينات حينما كانت تجرى بحوث لمعالجة بعض الأمراض التى تصيب الإنسان وتعوقه عن العمل، مثل مرض الإسقربوط Scurvy، ففى سنة ١٧٤٧ تم التوصل لعلاج البحارة الإنجليز من هذا المرض حين تعاطوا عصير الليمون والبرتقال، كما أمكن سنة ١٨٨٤ علاج البحارة اليابانيين -الذين كانوا يعتمدون فى غذائهم على الأرز المبيض- من مرض البرى برى بتعاطيهم الخضروات واللحم والسّمك، ولكن تقدم هذه الدراسات كان بطيئاً، فمثلاً لم يتم التأكد أن مرض الإسقربوط ينتج عن سوء التغذية إلا بعد مرور ١٥٠ سنة، وأن مرض البرى برى هو أيضاً من أمراض سوء التغذية إلا سنة ١٩٠٠.

أى أن القول بأن «سوء التغذية مسئول عن هذا المرض» كان مفهوماً جديداً... وكان الاتجاه الجديد الآخر فى التغذية هو استعمال حيوانات التجارب فى التغذية العملية للدراسة أثر سوء التغذية، وكانت التجارب مقننة ودقيقة حتى إنها أعطت دليلاً على أن بعض الأمراض تنتج بسبب نقص بعض العناصر الغذائية.

وفى بعض تجارب الحيوانات كان يعطى الحيوانات وجبات نقية purified diets من عناصر غذائية تم تحضيرها كيميائياً من البروتين النّقى (مثل الكازين والألبومين) ومن الكربوهيدرات النقية (مثل الدكستروزين) ومن الدهون النّقى والمواد المعدنية، كان استعمال هذه الوجبات النّقية هو أساس التجربة، وذلك لأنه إذا أعطيت الحيوانات أغذية عادية، فقد يكون هناك احتمال أن تلك الأغذية قد تمد الحيوانات بعناصر أخرى غير معروفة... وقد ظهرت أن الحيوانات الصغيرة التى أعطيت هذه الوجبات النّقية غير قادرة على النمو، وأن الحيوانات الكبيرة قد أصبحت غير قادرة

<sup>(١)</sup> ليفيس نوار وآخرون (١٩٩٠)، ليفيس نوار وآخرون (٢٠٠٠).

على صيانة جسمها... وكان Jean Dumas (١٨٠٠ - ١٨٨٤) هو أول من ذكر أن الوجبة المكونة من بروتين وكربوهيدرات ودهن وأملاح تعتبر وجبة غير كاملة، وذلك بعد أن قام بتجارب على مواطنين فرنسيين، ففي أثناء حصار الألمان لفرنسا في الحروب السبعينية (١٨٧٠ / ١٨٧١) كان الطعام قليلاً، كان اللبن الذى يقدم للأطفال غير موجود، وقد حاول العلماء تصنيع اللبن من البروتين والدهن والكربوهيدرات والأملاح، ولكنه كان غذاءً ضاراً بالأطفال، مما دعا Dumas إلى الوصول إلى الفكرة سابقة الذكر.

ثم أجرى Pekelharing سنة ١٩٠٥ تجارب على فيران، وذلك حين قدم لبعض الفئران النامية غذاءً مكوّنًا من كازين وألبومين للبيض، ومسحوق أرز ولحم خنزير وأملاح، ولكن الفئران لم تعيش إلا أربع أسابيع فقط. وحين قام بإضافة اللبن، استمرت الفئران فى حالة صحية جيدة.

وذكر Hopkins الإنجليزى سنة ١٩٠٦ بعد إجراء تجاربه على الحيوانات أنه لا يمكن للحيوان أن يعيش إذا تغذى على مخلوط مكون من بروتين وكربوهيدرات وأملاح معدنية، كما ذكر McCollum سنة ١٩٠٧ أن الفئران التى تغذت على المخلوط سابق الذكر لم تعيش لأنها رفضت تناول الغذاء لأن طعمه غير مقبول.

وقد توصل Davis, McCollum أن إضافة لبن أو دهن صفار البيض كان ضرورياً لاستمرار حياة الحيوانات، كما وجد Mendel, Osborne أن زيت كبِد الحوت كان لازماً لحياة الحيوانات... وقد أدت هذه التجارب إلى اكتشاف أول فيتامين، وأعطى اسم فيتامين (A) القابل للذوبان فى الدهن، وكان يظن أن فيتامين (A) هو الواجب إضافته إلى الوجبات، ولكن بعد مرور عامين من اكتشاف فيتامين (A) توصل العلماء إلى وجود عامل آخر بجانب فيتامين (A) لازم لمعيشة الحيوانات، وهذا العامل الآخر قابل للذوبان فى الماء، ثم توصل العلماء بعد ذلك إلى معرفة باقى الفيتامينات التى تذوب فى الدهن، وتلك التى تذوب فى الماء. والجدول (٧-١) يوضح ترتيب اكتشاف أو عزل الفيتامينات من سنة إلى أخرى.

أما لماذا أطلق اسم فيتامين على هذه العوامل، فذلك لأن الشق الأول vita معناه الضرورى للحياة، وأما الشق الثانى amine فهو إشارة للتركيب الكيميائى، وقد

استعمل هذا الاسم سنة ١٩١٩، ولكن ظهر بعد ذلك أن بعض الفيتامينات لا تحتوي على هذا التركيب الكيميائي (amine)، ولهذا فقد حذف الحرف الأخير (e) لمنع أى تعقيدات، وقد أعطيت الفيتامينات حروفاً لتمييزها عن بعضها... وبعد عزلها ومعرفة تركيبها أعطيت أسماء مختلفة.

وعموماً، يمكن تعريف الفيتامينات بأنها مواد عضوية، لا يتولد عند احتراقها طاقة، ذات وزن جزيئي منخفض، توجد فى الأغذية بكميات صغيرة أو بتركيزات منخفضة، ويحتاجها الجسم أيضاً بكميات صغيرة للقيام بوظائفه وأنشطته الحيوية. ويقوم كل فيتامين بأداء وظيفة خاصة، فأى فيتامين لا يحل محل آخر، ولا يستطيع الجسم تخليقها، ولذا لابد من وجودها فى الغذاء.

#### جدول (٧-١) ترتيب اكتشاف وعزل الفيتامينات

السنة	اكتشاف أو عزل	تأليف أو تركيب
١٩٢٥	فيتامين (D) بالإشعاع	
١٩٢٦	فيتامين (B <sub>1</sub> )	
١٩٢٨	اينوسيتول	
١٩٣١	فيتامين (A)	
١٩٣٢	فيتامين (C)	
١٩٣٣	ريبوفلافين	فيتامين (C)
	حامض بانتوثينيك	
١٩٣٥	بيوتين	ريبوفلافين
	العامل المضاد فى زلال البيض	فيتامين (D)
١٩٣٦	فيتامين (E)	ثيامين Thiamin
١٩٣٧		فيتامين (A) ألفا توكوفيرول
١٩٣٨	حامض نيكوتينيك وعرف العامل المانع للبللجرا، بيروكسين	
١٩٣٩	فيتامين (K)	فيتامين (K)
		بيروكسين
١٩٤٠	حامض بارا أمينو بنزويك	حامض بنتوثنتك
١٩٤٢		تركيب بيوتين
١٩٤٥	حامض فوليك	حامض فوليك
١٩٤٨	فيتامين B <sub>12</sub>	حامض فولينيك
١٩٥٥-١٩٥٦		تركيب فيتامين B <sub>12</sub>

ولكن يستطيع الجسم تخليق بعض الفيتامينات داخله، مثل فيتامين D حيث أن مولده يوجد في طبقة الدهن تحت الجلد. وبعض فيتامينات المجموعة B والتي تخلق بواسطة بكتريا الأمعاء intestinal tract bacterial، وبعض الفيتامينات يمكن تخليقها بتوافر مواد أخرى مثل فيتامين A, niacin, choline، وباقي الفيتامينات لا تخلق في الجسم ويجب تناولها مع الوجبات الغذائية.

### **تسمية الفيتامينات وتقسيمها : Nomenclature and classification**

لا يوجد اتفاق تام على تسمية الفيتامينات، ولكن الاتجاه الحديث هو استخدام الاسم الكيميائي، وخصوصاً بالنسبة لمجموعة فيتامينات B.

وتنقسم الفيتامينات إلى قسمين رئيسيين وفق القابلية للذوبان: القسم الأول: ويشمل فيتامينات تذوب في الدهن، والقسم الثاني: ويشمل مجموعة الفيتامينات التي تذوب في الماء، ولكن حديثاً ذكر Ensimer و آخرون (١٩٩٥) أن الفيتامينات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كما يلي :

١- فيتامينات تذوب في الدهن وأخرى تذوب في الماء.

٢- مجموعة فيتامينات "ب المركب" B complex وهي تذوب أيضاً في الماء.

٣- مشابهات الفيتامينات vitaminlike substances أو vitamers.

إن دور الفيتامينات بالنسبة لجسم الإنسان متعلق إلى ظاهرة الذوبان. فالفيتامينات إما تذوب في الدهن أو الماء. وعلى هذا الأساس تصنف الفيتامينات كما في جدول (٧-٢). وتقدر الإشارة إلى أن فيتامين C هو الفيتامين الوحيد الذي يذوب في الماء وليس من ضمن مجموعة فيتامينات B.

جدول (٧-٢) مجموعات الفيتامينات

الفيتامينات التي تذوب في الماء				الفيتامينات التي تذوب في الدهن		
1	Biotin	بيوتين	١	Vitamin A	فيتامين أ	١
2	Choline	كولين	٢	Vitamin D	فيتامين د	٢
3	Folacin (Folic acid)	الفولاسين (حامض الفوليك)	٣	Vitamin E	فيتامين هـ	٣
4	niacin (B <sub>3</sub> ) (nicotinic acid) (nicotin amide)	نياسين ب٣ (حامض النيكوتينيك) (أميد النيكوتين)	٤	Vitamin K	فيتامين ك	٤
5	Pantothenic acid (B <sub>5</sub> )	حامض بتوثنيك (ب٥)	٥			
6	Thiamin (B <sub>1</sub> )	ثيامين (ب١)	٦			
7	Riboflavin(B <sub>2</sub> )	ريبوفلافين (ب٢)	٧			
8	Pyridoxine (B <sub>6</sub> ) Pyridoxal Pyridoxamine	بيرووكسين (ب٦) بيرووكسال بيرووكسامين	٨			
9	Cobalamine (B <sub>12</sub> )	كوبالامين (ب١٢)	٩			
10	Ascorbic acid (C)  Dehydroascorbic acid	حامض الاسكوربيك (ج)  حامض الاسكوربيك اللاأيدروجيني	١٠			

### ومن مشابهاة الفيتامينات vitaminlike substances :

- ١- البيروفلافينويدات 1- Bioflaviminooids
- ٢- كارتين فيتامين (B-T) 2- Carnitine vitamin (B-T)
- ٣- مرافق الإنزيم Q 3- Coenzyme Q  
(يوريكينون) (Ubiquinone)
- ٤- إينوسيتول 4- Ionsitol
- ٥- حامض ليبريك 5- Lipoic acid
- ٦- حامض بنجاميك (فيتامين B<sub>15</sub>) 6- Pangamic acid (B<sub>15</sub> vitamin)
- ٧- حامض بارا أمينوبنزويك (PABA) 7- Paraaminobenzoic acid (PABA)
- ٨- حامض أوروتيك (فيتامين B<sub>13</sub>) 8- Orotic acid (vitamin B<sub>13</sub>)
- ٩- لثريل (فيتامين B17) 9- Laetrile (vitamin B17)  
أميچدالين، نتريلوسيد amygdalin, nitrilosides
- ١٠- فيتامين U 10- S-Methylmethionine

### خصائص عامة للفيتامينات :

#### - التركيب الكيماوى Chemical Composition :

تحتوى الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهن عناصر C, H, O, بينما الفيتامينات القابلة للذوبان فى الماء (مجموعة B) تحتوى على العناصر الثلاثة السابقة بالإضافة إلى عنصر N وقد يحتوى بعض أفرادها على S.

#### - وجودها :

تتكون الفيتامينات عادة فى الأنسجة النباتية باستثناء فيتامين C و D فإنه توجد فى الأنسجة الحيوانية إذا كان غذاء الحيوان يحتوى على هذه الفيتامينات أو تتكون بواسطة بعض الكائنات الدقيقة. وتوجد الفيتامينات الذائبة فى الدهن فى النباتات فى صورة مولد الفيتامين provitamin التى يمكن لجسم الحيوان تحويلها إلى الفيتامين المقابل. ولكن لأن لم يعرف مولدات للفيتامينات الذائبة فى الماء. وبصفة عامة، فإن مجموعة فيتامين B واسعة الانتشار فى جميع الأنسجة الحية، بينما الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهن فقد لا توجد فى بعض الأنسجة.

## - الامتصاص :

تمتص الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهن من القناة الهضمية فى وجود الدهن. فأى عامل يزيد من امتصاص الدهن مثل صغر حجم حبيبات الدهن أو وجود الصفراء bile من شأنه أن يزيد من امتصاص هذه الفيتامينات. أما امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان فى الماء، فهو عملية أسهل؛ لأنه يوجد امتصاص باستمرار للماء وما به من الأمعاء إلى الدم.

## - التخزين Storage :

يمكن أن تخزن الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهن: فى كميات لا بأس بها وبكمية أكبر من تلك للفيتامينات القابلة للذوبان فى الماء ويمكن تخزين أى فيتامين قابل للذوبان فى الدهن فى أى مكان يوجد به تخزين للدهن. وكلما زاد المتناول من هذه الفيتامينات كلما زادت الكمية المخزنة. بعكس الفيتامينات القابلة للذوبان فى الماء فإنها تخزن بكمية أقل، ويمكن أن تخرج مع سوائل الجسم، ولذا لا بد من تناولها يوميًا وباستمرار. هذه الكميات المخزنة يمكن أن يستخدمها الجسم فى حالة عدم تناول الفيتامينات، ولذا فإن غياب هذه الفيتامينات أو نقصها فى الوجبة الغذائية لا ينتج عنه ظهور الأعراض بسرعة.

## - الإخراج Excretion :

تخرج الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهن غالبًا فى طريق البراز بواسطة الصفراء. بينما تخرج الفيتامينات القابلة للذوبان فى الماء عن طريق البول غالبًا، وقد يخرج جزء بسيط منها عن طريق البراز. وطريقة الإخراج هذه تعكس الفرق فى القابلية للذوبان.

## - الوظائف Function :

يحتاج الجسم للفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهن فى ميثابوليزم المركبات المختلفة، وكل فيتامين غالبًا ما يكون له أكثر من دور. أما الفيتامينات القابلة للذوبان فى الماء فإنها بصفة عامة تقوم بنقل وتوليد الطاقة.

## - أعراض النقص Deficiency Symptoms :

إن نقص واحد أو أكثر من الفيتامينات قد يؤدي إلى فشل النمو growth failure أو الإنجاب، أو ظهور بعض الأعراض الخاصة بكل فيتامين -وفى الحالات

الشديدة النقص فإنها تؤدي إلى الوفاة. إن علامات نقص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون تكون متعلقة بوظيفة الفيتامين، أى متخصصة، فمثلاً فيتامين D لازم لميتابوليزم الكالسيوم، فأى نقص في فيتامين D يؤدي إلى تغير في العظام. أما أعراض نقص الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء فهي غير متخصصة، ومن الصعب ربط هذه الأعراض بفيتامين معين. ومعظم أعراض نقص مجموعة فيتامين B تظهر في الجلد dermatitis أو الشعر rough hair وضعف النمو poor growth. إن نقص بعض هذه الفيتامينات يؤدي إلى غياب صبغة الشعر، في حين نقص بعضها يؤدي إلى ظهور أنيميا.

إن نقص الفيتامينات بصفة عامة أكثر خطورة من نقص كمية الغذاء، ومع ذلك فإن الجوع أكثر انتشاراً في العالم من نقص الفيتامينات.

### - العلاقات المتبادلة بين الفيتامينات Interaction of Vitamins :

يقوم كل فيتامين أو مرافق إنزيم للفيتامين بتنظيم مجموعة من التفاعلات الحيوية في الجسم ويتم ذلك إما بنقل مجموعة فعالة أو بتنظيم تركيزات معينة في الخلية... إلا أن بعض الفيتامينات تتداخل معاً أثناء الميتابوليزم منتجاً تأثيرات معينة خاصة بالفيتامين ويتم ذلك في ثلاثة أنماط تمثل في: تأثير فيتامين في هدم فيتامين آخر، تنظيم صورة تكوين مرافق إنزيم لتزيد فعاليته، أو اشتراك مجموعة من الفيتامينات في تفاعل واحد.

ويتمثل النمط الأول في قيام فيتامين E بحماية فيتامين A ومنع أكسده، وأيضاً مثل زيادة الريوفلافين تسرع من هدم النياسين أو البيرووكسال مما يؤدي إلى نقصهم... أما النمط الثاني فيتمثل في نواحي كثيرة منها أن مرافقات إنزيمات الريوفلافين تساعد في تحويل البيرووكسال فوسفات إلى بيرووكسين وبذا يقوم برؤاؤه. كما يقوم B<sub>12</sub> وفيتامين C بتسهيل تكوين مرافق إنزيم حامض الفوليك ليتمكن من أداء وظائفه...

أما النمط الثالث فيتمثل في اشتراك فيتامين A مع الريوفلافين والبيرووكسين والنياسين في إنتاج صبغة rhodospin في العين. أو اشتراك فيتامين B<sub>12</sub> وحامض الفوليك وفيتامين C وB<sub>6</sub> في التفاعلات الحيوية المؤدية إلى تكاثر خلايا الدم وتنظيمها.



كما يوجد أيضًا اكمال وظائف الفيتامينات مع المعادن حيث يشير Bier و Schoenthaler (٢٠٠٠) أن تناول الفيتامينات مع المعادن أدى إلى تهذيب سلوك أطفال المدارس وتقليل العنف وزيادة التعاون الاجتماعى.

### **أسباب نقص الفيتامينات : Causes of Vitamins Deficiency**

يمكن حصر الأسباب التى تؤدى إلى إحداث نقص فى كمية الفيتامينات التى يحصل عليه الفرد فى النقاط التالية :

١- قلة كمية الغذاء المتحصل عليها، وقد يكون ذلك راجعًا لأحد الأسباب التالية: قلة إنتاج الغذاء - الفقر - الجهل - عادات غذائية - فقد الشهية - أمراض فى الأسنان.

٢- حدوث فقد للفيتامين أثناء تخزين وتسويق وإعداد وتصنيع الأغذية.

٣- خلل فى الامتصاص بسبب أمراض الجهاز الهضمى، الطفيليات، أمراض الشيخوخة.

٤- زيادة الاحتياج من الفيتامينات فى فترات معينة فى حياة الفرد مثل: أثناء النمو السريع وزيادة النشاط الفسيولوجى وأثناء الحمل والرضاعة.

٥- زيادة الفقد بسبب زيادة إفراز العرق (فى الأيام الحارة) والذى يحمل معه كميات من الفيتامينات أو أثناء الرضاعة.

### **متى تظهر أعراض نقص الفيتامين ؟**

عادة لا تظهر أعراض نقص الفيتامين خلال الأيام الأولى من حدوث النقص، وذلك لأن الفرد يستنفذ المخزون عنده depletion، ثم يلى ذلك تغير فى العمليات الحيوية بالخلايا، وعندها تظهر أعراض مرضية قد تكون فقد الشهية، أو الشعور بالتعب عند أى مجهود، أو نقص الوزن، أو سرعة الإثارة... وغيرها من الأعراض. وهذا يستمر لفترة طويلة من واحد إلى عدة شهور تختلف باختلاف الفيتامينات.

وهنا يجب أن يعالج النقص قبل حدوث أى خلل بيوكيمائى فى الخلية  
cellular biochemical abnormality.

### **الأثر السام toxicity :**

إن التسمم الناتج من زيادة الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهون أكثر بكثير من تلك القابلة للذوبان فى الماء، وخصوصًا فيتامينات A, D.

## مشابهات الفيتامينات (Vitamers) Vitaminlike Substances :

وهى المواد التى تشابه الفيتامينات فى تركيبها إلا أنها ليست فيتامينات، وفى بعض الأحيان تضاف إلى مجموع فيتامينات B ... ودائماً عندما يكتب عنها فى أى مصدر تغذية أو نشرة دواء يشار إليها بأنه لم يثبت بعد أهميتها للإنسان. إن احتياج الإنسان لها أو دورها البيولوجى يحتاج إلى توضيح. بعض الأدوار متداخلة ومحيرة ومتناقضة، ولكن غالباً ما يذكرونها فى مصادر التغذية المكتوبة لسببين رئيسيين:

١- للتاريخ وللإعلام عنها. ٢- لإجراء المزيد من الدراسات والبحوث الخاصة بها.

## الثبات Stability :

يلاحظ بصفة عامة أن الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهون أكثر ثباتاً أثناء معاملة الأغذية بمعاملات الطهى المختلفة عن الفيتامينات القابلة للذوبان فى الماء، حيث أن الأخيرة تهدم بدرجات الحرارة العالية، علاوة على ذوبانها فى ماء الطهى. ويوضح جدول (٧-٣) مدى ثبات الفيتامينات أثناء إعداد الأغذية<sup>(١)</sup>.

جدول (٧-٣) مدى ثبات الفيتامينات أثناء إعداد الأغذية<sup>(١)</sup>

الفيتامينات	القابلة للذوبان				درجة الحساسية لـ	
	فى الماء	فى الدهن	الحموضة	القلوية	الحرارة	الأكسدة
A D E K	*	*	*	*	*	*
ثيامين	*	*	*	*	*	*
ريبوفلافين	*	*	*	*	*	*
نياسين	*	*	*	*	*	*
B <sub>6</sub>	*	*	*	*	*	*
حامض البتوتريك	*	*	*	*	*	*
بيوتين	*	*	*	*	*	*
فولاسين	*	*	*	*	*	*
B <sub>12</sub>	*	*	*	*	*	*
حامض الاسكوربيك	*	*	*	*	*	*

(١) ليزيس نوار وآخرون (١٩٩٠).

## **تقدير الفيتامينات فى الغذاء : Determination of Vitamins in Food :**

يمكن تقدير الفيتامينات فى الغذاء إما بيولوجيًا أو ميكروبيولوجيًا أو كيميائيًا أو فيزيقيًا.

### **١- التقدير البيولوجى (Animal) Bioassay أو :**

يمكن أن يقدر الفيتامين فى الغذاء عن طريق النمو أو إزالة أعراض النقص إذا ما أعطيت الجرعة dose إلى حيوانات التجارب، وهى غالبًا الفئران mice, rats خنازير جينيا guinea pigs أو الكواكيت chicks... إلخ، ولا زالت تستخدم هذه الطرق لبعض الفيتامينات مثل E, D, A.

وهذه الطرق تحتاج إلى وقت طويل وشاقة ومكلفة، وتحتاج إلى عدد كبير من الحيوانات، وكمية كبيرة من العينات التى تعطى للحيوانات حتى يمكن الحصول على نتائج دقيقة. وتختلف النتائج باختلاف سن الحيوان وجنسه ذكر أو أنثى، ووزنه. كما أن النتائج لا يمكن تعميمها بين أنواع الحيوانات المختلفة. إلا أنها لازمة للتعرف أن الفيتامين له أهمية بالنسبة للكائن الحى وعلى أساسها يمكن تصميم التجارب الأخرى.

### **٢- التقدير الميكروبيولوجى Microbiological Assay :**

وفىها تستخدم الكائنات الدقيقة على أساس اختيار الكائن الذى يلزمه هذا الفيتامين فى غذائه ولا يمكن تكويته داخل جسمه، وفى هذه الحالة فإن إضافة الفيتامين فى الغذاء يسبب نمواً يعكس كمية الفيتامين. هذه الطريقة تحتاج لوقت أقل من سابقتها، ولكن يلزمها استخلاص الفيتامين من الغذاء قبل استخدام فى التجربة.

### **٣- التقدير الكيمياءى Chemical Assay :**

ويستخدم لتحليل الغذاء طرق صعبة معقدة متقدمة، ويقدر الفيتامين بالوزن إما بالمليجرام (ملجم) أو ميكروجرام، وهى طرق سريعة وتحتاج إلى خبرة وتأهيل خاص لاستخدام الأجهزة، ولا بد من مقارنة نتائجها بالنتائج المتحصل عليها من التقدير البيولوجى.

#### ٤ - التقدير الفيزيقي Physical Assay :

يمكن تقدير الفيتامين بإحدى الطرق الفيزيكية مثل قياس chromatography, absorption spectra أو turbidity, fluorescence... إلخ

#### ٥ - التقدير على الإنسان Human Assay :

يمكن استخدام الإنسان فى إجراء هذه التقديرات، ولكن هذه الطرق مكلفة وأصعب من سابقتها فى التحكم فى المتغيرات البحثية، ولا بد من التأكد من عدم إضرارها بالإنسان ومراعاة حقوق الإنسان. وفيها يستخدم :  
١- placebo كعينة ضابطة control وهى حبوب تُعطى للإنسان على أنها تحتوى على مادة تجريبية، ولكنها لا تحتوى على أى مادة فعّالة مثل السكر.  
٢- ولا يستخدم فيها الفرد القائم بتصميم التجربة أو تنفيذها.

#### العوامل التى تؤثر فى تمثيل الفيتامينات :

Factors Affecting Vitamins Utilization :

##### ١- إتاحة الفيتامينات Availability :

ليس كل الفيتامينات الموجودة بالغذاء فى صورة يسهل امتصاصها، فمثلاً :  
أ - النياسين فى معظم الحبوب يكون فى صورة معقدة مع البيوتين، ولا يمكن امتصاصها إلا إذا عومل الغذاء بمادة قوية لاستخلاص الفيتامين من هذه الصورة، ويصبح متاحاً.  
ب- الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهون لا تمتص إذا كان هناك أى اضطراب فى ميثابوليزم الدهون.  
ج- فيتامين B<sub>12</sub> يحتاج لامتصاصه وجود العامل الداخلى intrinsic factors فى المعدة.

#### ٢- مضادات الفيتامينات (Pseudovitamins) Antivitamins :

وهذه المضادات عبارة عن مواد موجودة طبيعياً فى الغذاء لا تقوم بدور الفيتامين ولر أنها تشابه الفيتامين فى التركيب الكيميائى، ونتيجة لذلك قد تسبب نقصاً فى الفيتامين deficiency وذلك لأن الجسم لا يمكنه التمييز بينها وبين الفيتامين، كما أنها توجد فى بعض المركبات اللازمة للجسم.

### ٣ - مولدات الفيتامين Provitamins :

وهي مركبات لا تعتبر فيتامينات ولكن يمكن للجسم تحويلها إلى الفيتامين المقابل مثل :

أ - بتا كاروتين beta-carotene، وتحول في جدار المعدة إلى فيتامين A.

ب - 7-dehydrocholesterol فى طبقة الدهن تحت الجلد الذى يتحول إلى D<sub>2</sub> بواسطة الأشعة فوق البنفسجية ultraviolet فى ضوء الشمس.

ج - إرجوستيرول ergosterol فى أنسجة النبات الذى يتحول إلى فيتامين D<sub>3</sub> بواسطة الأشعة البنفسجية فى ضوء الشمس.

د - الحامض الأمينى تريبتوفان tryptophan الذى يتحول إلى نياسين فى الجسم، وحيث أن كل ٦٠ ملجرام من التريبتوفان تتحول إلى ١ ملجرام من النياسين، لذا فهو مصدر غير اقتصادى بالنسبة للجسم، ولا يحسب كثيراً مع مولدات الفيتامينات.

### ٤ - التخليق داخل القناة الهضمية Synthesis in the Gut :

بعض الكائنات الدقيقة فى القناة الهضمية يمكنها تكوين بعض الفيتامينات التى يمكن للجسم الاستفادة منها، ولكن من جهة أخرى يمكن أن يحدث منافسة على الفيتامين بين الإنسان والكائن الدقيق الذى يمكن أن يحتفظ به، وهذا لا يستفيد منه الإنسان ويخرج مع البراز، ولكن ما يحدث غالباً أن الأمعاء الدقيقة لا يوجد بها كائنات دقيقة، وهذه توجد فقط فى الأمعاء الغليظة الذى يكون الامتصاص فيها قاصراً على الماء والأملاح. ولذا فإن وجود البكتريا لا يقلل من الفيتامين المتاح للإنسان. ولكن فى حالات الإسهال أو اضطراب آخر، فإن الإنسان يفقد الفيتامين.

### ٥ - التداخل بين العناصر الغذائية Interaction of Nutrients :

توجد مجموعة كبيرة من الفيتامينات متعلقة بعناصر أخرى، فمثلاً :

١- فى الوجبة الغنية بالكربوهيدرات لابد من زيادة الثيامين B<sub>1</sub> اللازم للميتابوليزم.

٢- تناول كمية كبيرة من الأحماض الدهنية عديدة عدم التشبع polyunsaturated

يلزمها زيادة تناول فيتامين E...

ولهذا لابد أن تكون الوجبة متزنة وبها كل العناصر الغذائية ومتنوعة.

## الكميات الموصى بها (RDA) Recommended Dietary Allowances :

أجريت الكثير من الدراسات والبحوث المختلفة للتعرف على احتياجات الجسم من الفيتامينات حسب السن والجنس والمجهود...


## الفيتامينات التي تذوب فى الدهون Fat Soluble Vitamins :

### فيتامين (أ) Vitamin (A) :

#### Retinol or antixerophthalmic

أظهرت تجارب Mendel, Osborne, Davis, McCullum سنة ١٩١٣ أن اللبن والزبدة وصفار البيض وزيت الحوت تحتوى على عامل يضمن استمرار حياة حيوانات التجارب عندما أعطيت غذاءً مكون من بروتين وكربوهيدرات وشحم خنزير وأملاح، ولا يوجد هذا العامل فى زيت الزيتون، وقد ساعد هذا على سرعة اكتشاف فيتامين (A) كما ساعدت تجارب Stenbock سنة ١٩١٩ و Rosenheim و Drummond سنة ١٩٢٠ على تأكيد أن جذور بعض النباتات المختبرية على صبغة الكاروتين مثل الجزر والبطاطا، وكذلك حبوب الذرة الصفراء لازمة لحيوانات التجارب التى كانت تعطى مع الوجبات النقية سالفة الذكر، بعكس البنجر والبطاطس والذرة الأبيض، وبذلك عرفت خاصية أخرى لهذا العامل، وهو اللون الأصفر، بالإضافة إلى خاصية القابلية للذوبان فى الدهن، وأن الحيوان غير قادر على تكوينه فى جسمه. وفى سنة ١٩٢٩ عرف أن الكاروتين له فاعلية فيتامين (A) وقد أثبت Moore سنة ١٩٥٧ أن الكاروتين مولد لفيتامين (A).

فيتامين (A) مادة عضوية عديدة اللون وهو كحولى غير مشبع (ريتينول Retinol) وهو مكون من كربون و هيدروجين وأكسجين، ويحتوى على حلقة بتا أيرنون  $\beta$ -ionone وسلسلة أليفاتية. والفيتامين يفقد فعله الحيوى إذا تشبعت هذه السلسلة، ويوجد صورتان للفيتامين  $A_1$ ,  $A_2$  ويوجد فيتامين  $A_1$  فى أسماك المياه المالحة، أما فيتامين  $A_2$  فيوجد فى أسماك المياه العذبة، وبه رابطة غير مشبعة زيادة، ويسمى dehydroretinol وفعاليته تعادل  $\frac{1}{40}$  من  $A_1$  وعادة يطلق عليهما فيتامين A. ويوضح شكل (٧ - ١) تركيب فيتامين A (Retinol).



شكل (٧-١) تركيب فيتامين A ريتينول

ويمكن لفيتامين A (رتينول) أن يكون استر مع الأحماض الدهنية مثل حامض البالتيك Retinyl Palmitate وهذه الاسترات أكثر ثباتاً من الكحول الحر، وتوجد في زيت أسماك المحيطات والدهون والكبد وصفار البيض، كما يوجد الفيتامين في صورة الكهيد retinal أو retinene والحامض يسمى retinoic acid.


وفيتامين A عبارة عن مادة عضوية توجد في المملكة الحيوانية، ويوجد في الدهون ومذيبات الدهون، وهو ثابت إلى حد ما بالحرارة أثناء الطهي، ولكنه يتلف على درجات حرارة أعلى من ١٠٠م°، كما يتلف بواسطة الأكسدة، وفي الدهون المزنخة، وبواسطة الأشعة فوق البنفسجية، قليل التأثير بمادة بيكربونات الصوديوم، ويفقد أثناء تحفيف الأغذية في الشمس، ولذا فإن تخزين الأغذية في أماكن باردة جافة يساعد على حفظ الفيتامين.

ولكى يتم امتصاص فيتامين A فى جسم الإنسان لابد من وجود الدهون والصفراء bile ويلاحظ أن العوامل المؤثرة فى امتصاص الدهون تؤثر أيضًا فى امتصاص فيتامين A، ومن المعروف أن تناول الزيوت المعدنية يقلل من مدى استفادة الجسم من فيتامين A حيث أن فيتامين (A) يذوب فى هذه الزيوت التى لا تُمتص، وتُخرج خارج الجسم بما فيها من فيتامين ذائب.

### الكاروتين :

ويوجد الكاروتين في النبات، ويستمد اسمه من الجزر carrot، وهو عبارة عن كربون وأندروجين وبعض المواد الكاروتينية تولد فيتامين A، مثل ألفا كاروتين، بتاكاروتين، وجاما كاروتين وكريتوزانتين cryptoxanthine كما يوجد مراد كاروتينية أخرى مثل ليكوبين lycopene في الطماطم، ويعتبر بتا كاروتين أكثر الكاروتينات فاعلية، حيث أن الجزىء يعطى جزئين من فيتامين (A) (شكل ٧-٢).

أما الكاروتينات الأخرى مثل ألفا كاروتين وجاما كاروتين فإن الجزئ الواحد عند انقسامه يعطى جزئاً واحداً فقط من الريتينول حيث يحتوى كل منها على حلقة بتا أيونون واحدة أما الحلقة الأخرى فهي ألفا أيونون وجاما أيونون على التوالي.



شكل (٧-٢) بتا كاروتين  $\beta$ -carotene

ويعتمد تحويل بتا كاروتين إلى فيتامين A على وجود فيتامين C والزنك وهرمون الثيروكسين.

ويعتص الكاروتين في جسم الإنسان بنفس ظروف امتصاص فيتامين A إلا أنه وجد أن الجسم يمتص حوالي ثلث الكمية من الكاروتين حيث يفقد الباقي خارج الجسم، وبعد امتصاص الكاروتين يتحول إلى فيتامين A في جدر الأمعاء، وهرمون الثيروكسين مع فيتامين C والزنك كما سبق دور في عملية تحويل الكاروتين إلى فيتامين A ويحدث فقد في الكاروتين أثناء تحويله إلى فيتامين A كما أن كفاءة الإنسان في تحويل الكاروتين إلى فيتامين A منخفضة والميكروجرام من بتا كاروتين الممتص يعادل في فعاليته نصف فاعلية فيتامين A، وعلى هذا فالميكروجرام من بتا كاروتين الموجود في الغذاء يعادل  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = 0,167$  ميكروجرام من الريتينول.

#### وحدات قياس فيتامين A :

كان فيتامين A يقاس بالوحدات الدولية، والوحدة الدولية تعادل ٠,٣ ميكروجرام فيتامين A (كحول) أو ٠,٦ ميكروجرام من بتاكاروتين، أو ١,٢ ميكروجرام من الكاروتينات الأخرى، وحيث أن للوحدات فيتامين A أصبحت مرجوة، لذا فلم يعد هناك داعياً لاستعمال الوحدات الدولية لقياس الفيتامين.

#### خصائص فيتامين A ومولداقه :

- نظراً لوجود مجموعة الهيدروكسيل (OH-) في الفيتامينات، فهو سهل الاتحاد مع



الأحماض ليكون إسترات، هذه الإسترات أكثر ثباتاً من الكحول، ولكن ليس لها الفعل الحيوى للفيتامين.

- نظراً لاحتواء كل من الفيتامين ومولداته على روابط مزدوجة، لذا فهى سهلة الأكسدة، وبالتالي تفقد فعلها الحيوى.

- فيتامين A ومولداته حساسة للأشعة فوق البنفسجية.

- ثابت للحرارة فى غياب الأكسجين، فلا يحدث أى تغير سواء فى التركيب الكيميائى أو النشاط الحيوى للفيتامين حتى لو سخن على درجات حرارة تصل إلى ١٢٠ ° ١٣٠ ° فى غياب الأكسجين.

- نيتامين A ومولداته ثابتة نسبياً أثناء معاملات الطهى المختلفة للأغذية، ولكنها قد تفقد أثناء عمليات التحمير الطويلة.

- يتلف فيتامين A عند ترنخ الدهون المختوية عليه.

- يعمل فيتامين E على حماية الريتينول ومولداته من الأكسدة.

ولملاحظ وجودهما معاً فى معظم المصادر الغذائية.

#### **مصادر الفيتامين ومولداته Sources :**

يوجد فيتامين A فى الأغذية الحيوانية فقط - كما سبق الإشارة. أما مولداته فتوجد بصورة واسعة فى الأغذية النباتية، وهى تشمل على الكاروتينات والكريبتوزانثين cryptoxanthin التى تسبب فى تلوين بعض الخضروات والفاكهة باللون الأصفر أو البرتقالى أو الأحمر مثل الجزر، المانجو، المشمش، الطماطم... وغيرها، كما توجد فى الخضروات الورقية مثل الملوخية والسبانخ... وغيرها.

وتعتبر الحبوب واللحوم والبطاطس فقيرة فى فيتامين A أما الزيوت النباتية فلا يوجد بها فيتامين A باستثناء زيوت النخيل. وعادة يوجد فيتامين A فى الأغذية الحيوانية فى صورة إستر وهى «السرة الأكثر ثباتاً»، ولذا تفقد كميات ضئيلة منه أثناء تعرض الأغذية للمعاملات المختلفة من تسويق ونقل وإعداد وحفظ وطهى... إلخ. والجدول رقم (٧-٤) يبين بعض مصادر الريتينول والكاروتينات.

جدول (٧-٤) محتوى بعض الأغذية من الريتينول والبتاكاروتين

الغذاء	ريتينول (بجم / ١٠٠ جم)	بتا كاروتين (بجم / ١٠٠ جم)
كبد الأسماك	أكثر من ٣٠٠	
كبد الماشية	١٥٠ - ٥	
بيض	٠,٦ - ٠,٣	
زبد	٢,٠ - ٠,٥	١,٠ - ٠,٢
لبن	أكثر من ٠,١	٠,٢ - ٠,٣
جزر		١٢,٠
بسلة خضراء		٠,٥
ملوخية		١٦,٠

#### ميثابوليزم فيتامين A ومولداته :

يقصد بالميتابوليزم امتصاص وتخزين ونقل وإخراج الفيتامين. نحصل على فيتامين A من الأغذية إما فى صورة كحول retinol أو صورة إسترات (retinyl acetate or retinyl palmitate) يحدث له تحلل مائى hydrolysis فى الأمعاء الدقيقة ليعطى الكحول (retinol). يمر الريتينول من خلال جدر خلايا ميكوزا الأمعاء mucosal cell wall ثم يحدث له عملية أسطرة مرة أخرى ويحمل فى صورة retinyl esters إلى الكبد حيث يتم تخزينه.


أما الكاروتينات (مولدات فيتامين A) والمتحصل عليها من الأغذية النباتية فهي تمتص جزئياً من الأمعاء بعد تحويلها إلى retinol. وعملية تحويل الكاروتينات إلى فيتامين A تنظم كما سبق بواسطة هرمون thyroxine الذى يتكون بواسطة الغدة الدرقية thyroid gland مع فيتامين C والزنك.

ووجد أن الجسم لا يمتص كل كمية الكاروتين، فقد وجد Rodale (١٩٥٧) أن أقل من ١/٤ كمية الكاروتين الموجودة فى الجزر وبعض الخضروات الجذرية يمكن تحويلها إلى فيتامين A، بينما ١/٢ كمية الكاروتين الموجودة فى الخضروات الورقية الخضراء يمكن تحويلها إلى فيتامين A. ويفقد الباقي خارج الجسم.

كما وجد أن المعاملة الحرارية للأغذية (عملية الطهي) تزيد من نسبة الاستفادة من كاروتين الغذاء، تناول كميات زائدة من الكحول أو استعمال الكورتيزون يقلل من عملية تحول الكاروتين إلى فيتامين A في الجسم. أما مرضى السكر فلا يستطيعون تحويل الكاروتين إلى فيتامين A.

والرسم التخطيطي التالي، (شكل ٣-٧) يوضح عملية امتصاص وتخزين ونقل

فيتامين A في الجسم.



شكل (٣-٧) ميثابوليزم فيتامين A\*

\* مصدر : إيزيس نوار وآخرون (١٩٩٠)

كما يتضح من الشكل (٣-٧) أنه يسهل امتصاص فيتامين A في صورة إستر فتتم عملية الامتصاص بعد اتحاد الفيتامين مع حامض دهني (حامض البالميتيك) وتكوين retinyl palmitate ثم ينتقل خلال الجهاز الليمفاوي إلى الدم ثم إلى الكبد حيث يخزن فيه حوالي ٩٥٪ من الفيتامينات الموجودة في الجسم، وتخزن الكميات الباقية في الأنسجة الدهنية والرتين والكلبي والعين. وعند الحاجة إل فيتامين A فإنه يتحول مرة أخرى إلى كحول بواسطة إنزيم خاص (retinyl esterase) حيث يمكن نقله إلى الدم ليتحد مع بروتين خاص مكوناً معقد فيتامينA-كحول-بروتين، ويعرف بـ(RBP) retinol-binding protein لينقل إلى جميع أجزاء الجسم. ويحتوى الجسم في الأحوال العادية على حوالي ٣٥ - ٤٠ ميكروجرام لكل ١٠٠ مل دم.

## وظائف فيتامين A :

فيتامين A له تأثير فى العمليات الميتابوليزمية داخل العديد من الخلايا يمكن

صرها فيما يلى :

- له دور خاص فى عملية الرؤية وسلامة قرنية العين.
- وجوده ضرورى للنمو وسلامة الجلد والعظام والأسنان.
- له دور فى تكوين هرمون الثيروكسين، بناء البروتين، بناء هرمون cortecosterone من الكولسترول وفى البناء الطبعى للجليكوجين (Esminger وآخرون ١٩٩٥).

- يحافظ على سلامة الأغشية الطلائية epithelial tissues للحم الحلق والبرتين والمعدة والأمعاء والجهاز البولى والتناسلى، وكذا العين والجلد، من الإصابة بالأمراض المعدية. وهو ينشط جهاز المناعة فى الجسم، بما فى ذلك الاستجابة للأجسام المضادة ونشاط الكرات الدموية البيضاء، ولذا يقال عنه إنه فيتامين ضد العدوى.

- أثبتت الدراسات الحديثة أن فيتامين A له تأثير فى وقاية الجسم من الإصابة بالسرطان.

- يعمل فيتامين A كمادة مضادة للتأكسد antioxidant، فهو يقي الفرد من الأصول أو الشوارد الحرة free radicals وفعلها الضار الذى يؤدى إلى الإصابة بعدد من الأمراض (Zhang وآخرون ١٩٩٧). وقد يرجع هذا العمل إلى مولد فيتامين A وهو الكاروتين الذى يقوم هو أيضاً بحماية فيتامين A.

- فيتامين A مهم لنمو وتطور وتصنيف الخلايا differentiation والأنسجة، ولذا فهو مهم لنمو وتطور الجنين (Rothman وآخرون، ١٩٩٥) ويقى من العديد من مخاطر الأمراض (Hunter وآخرون ١٩٩٣)، حيث ينظم ويقلل تكوين مراد مثل proteinglycan التى تكون مع الليبوبروتينات الخفيفة المؤكسدة والمتحدة مع الكوليسترول (LDLC) مركباً معقداً غير قابل للذوبان ويترسب على جدر الأوعية الدموية والشرين مسبباً انسدادها.

- لفيتامين A أيضاً دور فى ميتابوليزم الحديد وتخزينه، وأيضاً ميتابوليزم الكالسيوم.


- يقوم فيتامين A مع مرافق إنزيم كمركب وسطى عند تخليق glycoprotein، كما يقوم كهرمون ستيرويد steroid فى النواة عند تصنيف الأنسجة.

## دور فيتامين A فى عملية الرؤية vision :

فيتامين A ضرورى لتكامل خلايا استقبال الرؤية. شبكية العين retina وهى

النسيج الحساس ضوئياً، تتكون من نوعين من خلايا استقبال الرؤية هما خلايا القضبان rods المسؤولة عن الرؤية فى الظلام أو الضوء الخافت، وخلايا المخروطات cones المسؤولة عن الإبصار فى الضوء الشديد، وعرف ذلك بواسطة Wald وزملائه، ونالو عليها جائزة نوبل فى عام ١٩٥٠. فيتكون الارجوان البصرى visual purple (ويعرف أيضاً بالـ rhodopsin) فى خلايا القضبان من اتحاد فيتامين A فى صورة ألدهيد (retinal) ويسمى أحياناً (retinene) مع مركب بروتينى يوجد أيضاً فى خلايا القضبان يعرف بالأوبسين opsin. عندما يقع الضوء الساطع على خلايا القضبان فإن صبغة الارجوان البصرى تتحلل لتعطي مكوناتها، وهى فيتامين A- ألدهيد opsin وينتج عن هذا التفاعل طاقة كهربائية ترسل من شبكية العين إلى عصب الرؤية optic nerve ثم إلى المخ حيث تحدث الرؤية، أما فيتامين A الناتج فإنه يختزل إلى كحول أو يعاد اتحاده مع opsin فى الظلام لتكون الارجوان البصرى.

أما فى الضوء الساطع فإن فيتامين A ضرورى لتكوين صبغات الرؤية visual pigment والتي تعرف أيضاً بالـ iodopsin وتتكون فى خلايا المخروطات cones بشبكية العين، وهى كما فى حالة صبغة rhodopsin تتكون من اتحاد فيتامين A- ألدهيد مع بروتين opsin إلا أن تكوين هذه الصبغة يستغرق وقتاً أطول بكثير من تكوين صبغة الأرجوان البصرى. ولذا فإن نقص فيتامين A فى الجسم تكون أعراضه أكثر وضوحاً بالنسبة لمقدرة الفرد على الرؤية فى الظلام حيث تعتمد العين على الكمية المتوافرة من فيتامين A فى الدم لتنظيم إعادة تكوين الارجوان البصرى. فبإذا كان مد العين بفيتامين A ببطء فإن القدرة على الرؤية فى الضوء الخافت تتطلب فترة زمنية طويلة نسبياً، حتى تستطيع العين الرؤية فى الظلام وخاصة إذا كانت معرضة قبل ذلك لضوء ساطع. ويوضح شكل (٧-٤) دور فيتامين A فى الرؤية فى الظلام أو الضوء الخافت.



### شكل (٧-٤) وظيفة فيتامين A فى الرؤية فى الظلام

ولهذا السبب فإن العمى الليلي night blindness من العلامات الأولى لنقص الفيتامين. وهذا المرض يرتبط بمستوى الريتينول فى الدم، والسدى يتراوح تركيزه ما بين ٣٥ - ٤٠ ميكروجرام ريتينول / ١٠٠ مل دم. ووجد أن حقن الدم بفيتامين A يحسن هذه الحالة فى دقائق.

### دور فيتامين A فى النمو Growth :

فيتامين A ضرورى للنمو وتكوين الأنسجة، نتيجة لتأثيره على تخليق البروتين protein synthesis كما أن فيتامين A يؤثر فى تخليق هرمون Thyroxine (هرمون الغدة الدرقية) والذى ينظم العديد من العمليات الفسيولوجية اللازمة للنمو الطبيعى، ويعتقد أن retinol هو المسئول عن عمليات النمو. وعموماً فإن دور فيتامين A فى النمو مازال غير مفهوم تماماً.

وقد ترجع علاقة فيتامين A بالنمو إلى أنه فى حالة نقص الفيتامين يحدث نقص فى الشهية، أو قد يكون ذلك راجعاً إلى تلف أو موت خلايا الغشاء المخاطى الخاص بالأمعاء، أو بسبب حدوث عملية تكوين الكراتين keratinization على خلايا اللسان، فتفقد الإحساس بالطعم مما يقلل الشهية ويؤثر على النمو.

### دور فيتامين A فى نمو العظام Bone Development :

لفيتامين A دور فى تكوين الهيكل العظمى وتجديد خلايا العظام حيث لوحظت عيوب فى تكوين العظام فى حالات نقص فيتامين A فى الوجبة، وأن تعاطى كميات كافية من فيتامين A فى الوجبة يساعد على التكوين الطبيعى للعظام، كما يساعد على تكوين خلايا طبقة الإينامل enamel forming cells فى حالة تكوين الأسنان.

ويعتقد أن retinoic acid هو المسئول الأساسي عن سلامة الهيكل العظمي وليس retinol.

كما لوحظ أن نمو العظام يتوقف بسبب نقص فيتامين A قبل توقف نمو الأنسجة المختلفة، كما يؤثر على المخ والجهاز العصبي.

### **المحافظة على سلامة الجلد والأغشية الطلائية :**

يلعب retinoic acid دوراً هاماً في المحافظة على التركيب الطبيعي للأغشية الطلائية والجلد. فعند نقص فيتامين A فإن الخلايا الطلائية وخلايا الجلد تفرز بروتين الكراتين keratin الموجود أساساً في شعر الإنسان وأظفاره، ولكن إذا وجد في الخلايا الطلائية epithelial cells فإنها تصبح جافة وصلبة، وتعرف هذه الحالة بالكيراتينية keratinization وحينئذ لا تستطيع الخلايا أن تقوم بعملها ثم تموت، وعندما تموت الخلايا فإنها تتجمع على سطح النسيج الطلائي مما يجعله عرضة للإصابة بالعدوى بالميكروبات. ولذلك فمنذ زمن بعيد يعرف فيتامين A بأنه الفيتامين المانع للعدوى anti-infection حيث أنه يحمي الأنسجة من الجفاف والموت، ومن ثم من العدوى، فهو يحمي أغشية العين والجهاز التنفسي والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وغيرها، علاوة على الجلد الخارجي.

### **المقاومة للعدوى (المناعة) Immunity :**

علاوة على دور فيتامين A في حماية الأنسجة من تكثر الكراتين، وجفاف الخلايا وموتها، ثم تعرضها للإصابة بالعدوى، فقد لوحظ أن عدد مكونات خلايا الدم البيضاء من T-lymphocytes تقل في حالة نقص فيتامين A وهي لها دور في إكساب الجسم المناعة.

### **مضاد للسرطان Anti-cancer :**

بعض الدراسات دلت على أن نقص فيتامين A يرتبط لحْد كبير بمقاومة الجسم للمسببات السرطانية carcinogenesis في كل من التجارب، سواء على الإنسان أو الحيوان، فإن فيتامين A له دور في عدم ظهور طفرات malignancy في الأنسجة والخلايا. وقد لوحظ أن الأفراد المصابين بسرطان الرئة كان محتوى وجباتهم من فيتامين A منخفضاً.

## خفض مستوى كولسترول الدم :

أظهرت بعض الدراسات أنه أمكن خفض مستوى الكولسترول فى دم مريض تصلب الشرايين بتناول كميات كبيرة من فيتامين A إلا أنه لم يحدث ذلك فى الأصحاء.

## أعراض نقص فيتامين A :

يمكن تلخيص أهم أعراض نقص فيتامين A فى الإنسان فيما يلى :

-أعراض عامة : تشتمل على فقد الشهية، بطء فى النمو، الشعور بالتعب المتكرر.

-أعراض متخصصة : تشتمل على التهاب الجلد والعى اللبلى.

-أعراض أكثر تقدماً: قرحة فى قرنية العين وتعرف بالـ xerophthalmia (شكل ٧-٥)

علاوة على لين العظام والأسنان.

ويعتبر نقص فيتامين A من ثانى مشاكل نقص التغذية فى العالم بعد نقص البروتين والطاقة، ويظهر النقص بصفة خاصة فى الرضع والأطفال. ويصاب سنوياً بالـ xerophthalmia التى قد تودى للعمى ١٠٠ ألف فى العالم.

كما ظهر أن نقص فيتامين A يقلل من إفراز هرمون الثيروكسين، فيزيد من انتشار الجوتير.

وجدير بالذكر أن نميز بين حب الشباب acne الذى يصيب جلد الشباب، لا يعالج بتعاطى فيتامين A حيث أنه لا ينتج بسبب نقص الفيتامين، ولكنه راجع إلى تغيرات هرمونية.



شكل (٧-٥) طفل مصاب بحالة xerophthalmia



## تخزين فيتامين A فى الجسم :

يتوقف المخزون على كمية فيتامين A الموجود فى الغذاء، ويمكن لكبد الإنسان أن يخزن منه ما يكفيه ثلاثة أشهر أو أكثر، وبعد امتصاص الفيتامين وتكوين إستر عادة مع حامض البانتيك ينقل مع الكيلوميكرون chylomicron خلال الجهاز الليمفاوى إلى الدم ثم إلى الكبد، ثم يحلل إلى كحول ثانياً بواسطة إنزيم خاص، حيث يمكن نقله إلى الدم، ثم إلى جميع أجزاء الجسم، ويختلف محتوى فيتامين A فى كبد الطفل عند الولادة، وعادة يكون منخفضاً، وينصح بإضافة فيتامين A إلى غذاء الطفل بعد أسبوعين من ولادته؛ كما وجد أن إعطاء الأم فيتامين A بعد الولادة أدى إلى ارتفاع مستوى فيتامين A فى البولستروم colostrum، ولذا ينصح بإعطاء الأم أثناء الحمل وبعد الولادة جرعات من فيتامين A لوقاية الأطفال من أمراض العين، ويخرج الفيتامين عن طريق البراز.

## قياس الحالة التغذوية لفيتامين (A) لدى الأفراد :

يعتبر العمى الليلي من الأعراض المبكرة لنقص فيتامين A، وقد صممت أجهزة كبيرة لقياس مدى ما وصلت إليه هذه الحالة، منها photometer، حيث يقيس كمية وشدة الضوء اللازم للشخص لرؤية الأشياء قبل وبعد التعرض للضوء المبهر، فكمية الضوء وطول الوقت اللازمين للفرد لإعادة الرؤية تعكس حالة نقص فيتامين (A). كما أن مستوى فيتامين A والكاروتين فى الدم له علاقة بذلك فى حدود معينة، فقد ظهر أن التغذية على غذاء خالٍ من الفيتامين لم يؤثر على مستوى الفيتامين لعدة أسابيع، حيث أن الجسم يستعمل فيتامين A المخزن فى الكبد، أما التغذية على غذاء خالٍ من الكاروتين فإنه يؤدي إلى خفض مستوى الكاروتين فى الدم، نظراً لعدم تخزين الفرد للكاروتين.

ويتراوح مستوى فيتامين A ٢٥ - ٩٠ ميكروجرام/ ١٠٠ مل دم، ويقل هذا المستوى أثناء المرض، وأيضاً ينخفض فى الثلاثة شهور الأخيرة من الحمل بمعدل ٣٠٪.

## الكميات الموصى بها من فيتامين A :

حيث أن فيتامين A يخزن فى الكبد، فمن الصعب تحديد الكمية اللازمة، أو من مولده يومياً. ولكن توصى الهيئات الأمريكية المتخصصة بالتغذية والتغذية

بتناول كميات مناسبة منه، ويوضح جدول (٥-٧) الكميات الموصى بتناولها  
(١٩٨٩).

جدول (٥-٧) الكميات الموصى بها من فيتامين A

الفئة	العمر بالسنوات	وحدة دولية	كميات فيتامين A / اليوم / الفرد ميكروجرام ريتول
رضع	صفر - ٠,٥	١٢٥٠	٣٧٥
	٠,٥ - ١	١٢٥٠	٣٧٥
أطفال	١-٣	١٣٣٣	٤٠٠
	٤-٦	١٦٦٧	٥٠٠
	٧-١٠	٢٣٣٣	٧٠٠
ذكور	١١-١٤	٣٣٣٣	١٠٠٠
	١٥-١٨	٣٣٣٣	١٠٠٠
	١٩-٢٤	٣٣٣٣	١٠٠٠
	٢٥-٥٠	٣٣٣٣	١٠٠٠
	٥١+	٣٣٣٣	١٠٠٠
إناث	١١-١٤	٢٦٦٧	٨٠٠
	١٥-١٨	٢٦٦٧	٨٠٠
	١٩-٢٤	٢٦٦٧	٨٠٠
	٢٥-٥٠	٢٦٦٧	٨٠٠
	٥١+	٢٦٦٧	٨٠٠
حامل		٢٦٦٧	٨٠٠
مرضع		٤٠٠٠	١٢٠٠

ويمكن سد الاحتياجات بالنسبة للشخص البالغ عن طريق تناول كوب  
(٢٥٠ مل) من اللبن كامل الدسم، أو ١٠٠ جم جبن دسم، أو ١٢٠ جم زبد، أو  
٤٠ جم سبانخ / ملوخية / طماطم / جزر.

## أعراض زيادة فيتامين A :

تحدث حالات التسمم عند تعاطى كميات زائدة من فيتامين A أو الكاروتين لمدة طويلة، حيث ينجزن فى الأنسجة كميات كبيرة تؤدى إلى إحداث أضرار بالجسم تشتمل على : غثيان : قىء، إسهال، جفاف الجلد، سقوط الشعر، صداع، فقد الشهية، ثم عظام هشة، آلام شديدة فى العظام، تضخم فى الكبد والطحال، وطفح جلدى. وحالات التسمم بواسطة فيتامين A يمكن أن تحدث إذا تناول الفرد ٣٠٠٠٠ ميكروجرام من فيتامين A يومياً لعدة شهور. ويمكن إخفاء أعراض حالة التسمم بعدم تناول الفرد الفيتامين بضعة أيام.

## بعض وظائف الكاروتين الأخرى :

عرف أخيراً أن بتا كاروتين يقى الجسم من الآثار الضارة الناتجة عن التأكسد بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، حيث ينشط ويحفز الأنظمة المناعية بالجسم، فتزيد من عدد خلايا المناعة immune cells مثل خلايا B&T lymphocytes وهذه تتج من الغدة التيموسية thymus وهى سريعة التلف بواسطة الأصول أو الشوارد الحرة free radicals والتأكسد الضار. وبتا كاروتين يحمى خلايا macrophages، والكرات الدموية البيضاء.

ويقوم بتا كاروتين بالوقاية من حالات السرطان المختلفة فى الرئة والمعدة والثدى والبروستاتا والقولون (Papalardo وآخرون ١٩٩٧).

وأظهرت الدراسات أن نقص بتا كاروتين يؤثر على الوظائف العقلية مثل التذكر والتوازن وحل المشكلات. وكذلك لبتاكاروتين دور فى زيادة مقاومة مرضى نقص المناعة (Fryberg Aids وآخرون ١٩٩٥) ويساعد بتا كاروتين فى تأخير وظهور الشيخوخة على الجلد، وأعراض أخرى وذلك نتيجة حمايتها من الأصول أو الشوارد الحرة free radicals.

وتزيد فاعلية بتا كاروتين بواسطة مضادات التأكسد الأخرى مثل فيتامين E، فيتامين C، والسلينيوم selenium. ولذا فعند زيادة تناول بتا كاروتين فإنه يتطلب زيادة من فيتامين E.

ولبتا كاروتين دور فى تحسين امتصاص الحديد.

## فوائد الكاروتينويدات الأخرى :

### الليكوبين Lycopene :

الليكوبين هو الكاروتينويد الذى يعطى الطماطم لونها الأحمر وتوجد هذه الصبغة بتركيزات عالية فى غدة الأدرينالين والبروستاتا والخصيتين. تنخفض هذه التركيزات مع تقدم العمر.

وقد أظهرت بعض الدراسات أن الليكوبين قد يساعد فى الحماية من أمراض القلب، سرطان البروستاتا والبنكرياس والقناة الهضمية. وقد أظهرت دراسات فى ألمانيا ١٩٩٧ أن الليكوبين فى مركز عصير الطماطم أكثر فائدة من الليكوبين الموجود فى الطماطم الطازجة، (Goivannucci وآخرون ١٩٩٥)، (Gärtner وآخرون ١٩٩٧).

### لوتين Lutein :

لوتين مضاد للتأكسد، ويوجد هذا الكاروتينويد مع زيكرانثين Zeaxanthin فى صبغة العين. إن انخفاض مستواه يؤدي إلى زيادة حساسية مقلة العين ونعرضها للتلف بواسطة الضوء الأزرق. وكذلك يزيد من عتامة عدسة العين (Landrun وآخرون ١٩٩٧).

### فيتامين د Vitamin D :

فيتامين D هو العامل المانع للكساح Rickets وهى حالة فشل تكليس calcify العظام. وقد ظل الأطفال قروناً طويلاً يصابون بالكساح، وقد استعمل فى اسكتلندا فى القرن الثامن عشر زيت كبد الحوت كدواء شعبى لمعالجة الكساح. كما لاحظ Palm العالم الإنجليزى سنة ١٨٩٠ أن الكساح ينتشر حين تقل فترات سطوع الشمس، وبالعكس؛ تقل الإصابة بالمرض كلما زادت فترات سطوع الشمس ويكثر تعرض الناس لأشعتها. وقد توصل Mellanby سنة ١٩١٨ إلى أن الكساح عبارة عن مرض من أمراض سوء التغذية، ويمكن علاجه بعنصر فابل للنبوان نى الدهن، وهذا العنصر موجود فى زيت كبد الحوت.

وقد توصل العلماء إلى دور أشعة الشمس فى معالجة الكساح سنة ١٩٢٥، حيث عرف أن الدهون المعاملة بالطاقة المشبعة يمكنها معالجة الكساح، وتم عزل الفيتامين وحضر سنة ١٩٣٦.

### خواص الفيتامين :

الفيتامين النقي بللورات بيضاء عديمة اللون، تذوب فى الدهون ومذيبات الدهن، وهو عبارة عن سترول sterol يتكون من كربون وأيدروجين وأكسجين.


ومن صور فيتامين D :  $D_2$  و  $D_3$  والأنسم الكيميائى لفيتامين  $D_2$  إرجوكالسيفيرول Ergocalciferol، ومولد هذا الفيتامين هو إرجستيرول Ergosterol ويوجد فى النباتات البسيطة مثل الخميرة والطحالب، أما فيتاتين  $D_3$  فاسمه الكيميائى كولكالسيفيرول Cholecalciferol ومولده 7-Dehydrocholesterol، ويوجد فى الأنسجة الحيوانية، مثل الطبقة الدهنية الموجودة تحت الجلد.

ويتحول مولد هذا الفيتامين إلى فيتامين D بتعرض هذا المولد إلى الأشعة فوق البنفسجية وأشعة إكس وأشعة الكاثود.

والجدول (٦-٧) يوضح الاسم الكيميائى لفيتامين D ومولد كل منهما ومصادرها، كما يوضح شكل (٦-٧) تركيب فيتامين D.

جدول (٦-٧) فيتامينى  $D_3$ ,  $D_2$  ومولداتهما ووجودهما

المولد	الاسم الكيميائى	الفيتامين	مصادره
Ergosterol	Ergocalciferol	$D_2$	النباتات البسيطة (الطحالب - الخميرة)
7-Dehydrocholesterol	Cholecalciferol	$D_3$	الأنسجة الحيوانية فى طبقة الدهن تحت الجلد (زيت كبد الأسماك)



شكل (٦ - ٧) تركيب فيتامين D

## قياس فيتامين D :

كان يقاس فيتامين D بالوحدات الدولية قبل معرفة تركيبه الكيميائي، والوحدة الدولية لهذا الفيتامين تساوي ٠,٠٢٥ ميكروجرام من هذا الفيتامين.

## وظائف فيتامين D :

يعمل فيتامين (D) على زيادة امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وقد أظهر Harrison & Harrison سنة ١٩٥٠ أن فيتامين (D) يساعد على امتصاص الكالسيوم في الجزء الثاني من الأمعاء الدقيقة عندما يكون الامتصاص بطيئاً. كما أن هذا الفيتامين يساعد على إعادة امتصاص الفوسفور بواسطة الكلى، وهذا الفيتامين يساعد على الاستفادة من الفوسفور في العظام في حالة نقص الفوسفور في الغذاء.

ولهذا الفيتامين دور في المحافظة على بقاء مستوى هرمون الغدة فوق الدرقية parathyroid مناسباً لحركة الكالسيوم والفوسفور من العظام.

إن دور فيتامين D في تحسين امتصاص الفوسفور قد يرجع إلى دوره في المساعدة على امتصاص الفوسفور أو قد يرجع إلى زيادة امتصاص الكالسيوم، كما أن الفيتامين يشجع إنزيم الفيتيز phytase في الأمعاء الذي يعمل على انفصال الفوسفات من الفيتين phytin.

ويعمل هذا الفيتامين على المحافظة على مستوى الكالسيوم والفوسفور في الدم عن طريق زيادة امتصاص الكالسيوم، وبالتالي الفوسفات، وكذا خفض نسبة خروجهما مع البول، وانخفاض مستوى الكالسيوم والفوسفور في الدم قد يؤدي إلى تشوه عظام الفك والأسنان وضعف الأنامل، وهناك احتمال أن هذا الفيتامين يؤثر في امتصاص المغنسيوم وفي المحافظة على مستواه في الدم (George وآخرون ١٩٦٢). كما لاحظ Hoekstra و Becker (١٩٦٦) زيادة ترسيب الزنك في عظام الحيوانات المصابة بالكساح عند تعاطيها فيتامين D. وحيث أن الفيتامين ينظم مستوى الكالسيوم في الدم وبالتالي فهو يؤثر في قدرة الأعصاب على توصيل الإشارات العصبية. وفيتامين D لازم للمحافظة على مستوى حامض الستريك في الدم، وهذا الحامض مهم للجسم وخصوصاً في تنظيم حركة المعادن من العظام إلى الدم والعكس، كما

أنه يحافظ على مستوى الأحماض الأمينية فى الدم عن طريق منع فقدائها عن طريق الكلى.

ويلعب فيتامين (D) دوراً كبيراً فى تكوين الهيكل العظمى بطريقة طبيعية، ولو أن هذا الدور معقد، ولايزال يحتاج إلى الكثير من الدراسة، إلا أن الدراسات أثبتت أنه فى حالة غياب أو نقص هذا الفيتامين، تحدث تشوهات فى الهيكل العظمى، ويقشل النمو، وقد أظهرت الدراسات أن فيتامين (D) يساعد فى تحويل الفوسفور العضوى إلى فوسفور غير عضوى فى العظام بواسطة إنزيم الفوسفاتيز القاعدى alkaline phosphatase.

وقد أظهر Harrison & Harrison سنة ١٩٥٠ باستعمال الكالسيوم المشع فى الفئران النامية أن هنا تبادلاً مستمراً بين كالسيوم العظام و كالسيوم الدم، وهذا التبادل كان يشجع بواسطة تعاطى فيتامين D، ولم يؤثر تعاطى الكالسيوم فى هذا التبادل.

ويؤدى نقص هذا الفيتامين -حتى ولو كان الغذاء به ما يكفى من كالسيوم وفوسفور- إلى إصابة الطفل بالكساح rickets، وإصابة الفرد البالغ -وخصوصاً السيدات- بحالة لين العظام osteomalacia، وهذا لأن نقص الفيتامين يؤدى إلى زيادة إفراز الغدة فوق الدرقية، مما يساعد على إزالة الكالسيوم من العظام، كما يؤدى النقص إلى تسوس الأسنان وضعف السمع نتيجة تأثر عظام الأذن. كما أن نقصه يؤدى إلى هشاشة العظام osteoporosis حيث تصبح العظام خفيفة سهلة الكسر.

ويتميز مرض الكساح بكم الرأس وبروز الجبهة وتقوس الضلوع، فيصغر حجم القفص الصدرى ويعرف باسم pigeon chest، وتضخم مفاصل الركبة والقدم وتقوس العظام وتأخر ظهور الأسنان وتشوه الهيكل العظمى وفشل النمو (شكلى ٧ - ٧ / أ، ب)



شكل (٧ - ٧) (أ) أرجل أطفال مصابين بالكساح



شكل (٧ - ٧) (ب) حالة الصدر والمفاصل لطفل مصاب بالكساح



ولفيتامين (D) تأثير على ميتابوليزم حامض الستريك، إذ أن حوالي ٧٠٪ من حامض الستريك موجود فى العظام. لكن وجد أن تركيز هذا الحامض فى العظام يقل فى حالة إصابة العظام بالكساح. إن حامض الستريك مهم فى الميتابوليزم وحركة المعادن والكالسيوم بين الدم والأنسجة.

وقد وجد **Harrison & Harrison** سنة ١٩٥٠ أن مستوى السرات فى الأطفال المصابين بالكساح كان ١,٥ / ١٠,٠ مل دم، ولم يعرف إلى الآن إذا كان لهذا الفيتامين دور فى دورة حامض الستريك، وبالإضافة إلى ما سبق فإن فيتامين D يرتبط بميتابوليزم الأحماض الأمينية، حيث يزيد إفراز الأحماض الأمينية فى البول عند إصابة الفرد بالكساح.

كما لاحظ المتخصصون فى ألمانيا (١٩٩٨) على ٩٦ مريضاً أن هناك علاقة بين مستوى فيتامين D فى الدم وظهور بعض حالات التهاب المفاصل وفقد الكالسيوم المفاصل. كما لاحظوا أيضاً زيادة عدد **proliferation** كرات الدم البيضاء (Oelzner وآخرون ١٩٩٨). أى أنه يدخل فى تنظيم الجهاز المناعى بالجسم.

كما لوحظ علاقة بين انخفاض مستوى فيتامين D وبعض حالات سرطان القولون والبروستاتا والثدى والرئة والبنكرياس، وأنه أمكن تقليل هذه الحالة فى المعمل بواسطة فيتامين D، (Pichard وآخرون ١٩٩٦).

وأشار (Gann وآخرون ١٩٩٦) إلى أن هناك علاقة بين مستوى فيتامين D وسرطان البروستاتا. كما ظهر أنه قد يكون هناك علاقة بين فيتامين D وتصلب الشرايين حيث أشار **Hays** وآخرون (١٩٩٧) أن هذه الحالة تزيد بين الناس عندما يقل التعرض لأشعة الشمس، كما أن نقص فيتامين D يزيد من حالات أمراض القلب، لأنه يزيد من ترسب الكالسيوم فى الأوعية الدموية (Watson وآخرون ١٩٩٧).

علاوة على ذلك فإن نقص فيتامين D يقلل من إفراز الإنسولين ويؤثر على ميتابوليزم الجلوكوز (Boucher وآخرون ١٩٩٥)، ولذا فتناول مستحضراته تساعد فى الحماية من مرض السكر.

## مصادر فيتامين D :

أهم المصادر الغنية هي كبد الأسماك ( $D_3$ ) يليها القشدة والزبد وصفار البيض والكبد، والجدول (٧-٧) يبين محتوى بعض الأغذية من فيتامين (D)


جدول (٧-٧) محتوى بعض الأغذية من فيتامين D

الغذاء	فيتامين د (وحدة دولية/١٠٠ جم)	ميكروجرام/١٠٠ جم
لبن	٢	٠,٠٥
حليب	١٠٠	٠,٢٥
بيض	٥٠ - ١٧٠	١,٢٥ - ٤,٢٥
لحوم	٤	٠,١
أسماك	صفر - ٥٠٠٠٠	١٢٥
زبد	٤٠	١,٠

٤٠٠ وحدة دولية = ١٠ ميكروجرام ، ١ وحدة دولية = ٠,٠٢٥ ميكروجرام

## ميتابوليزم فيتامين D :

عندما يتناول الفرد فيتامين D عن طريق الفم فإنه يمتص من الأمعاء في وجود الدهون، مثل الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، ويلزم وجود أملاح الصفراء حتى يتم الامتصاص، أما الفيتامين المخلوق في الجسم من تعرض الجلد لأشعة الشمس، حيث يتحول مولد الفيتامين وهو 7-dehydrocholesterol إلى فيتامين D فإنه يسير مع تيار الدم، حيث يرتبط مع بروتين البلازما مكرناً Vitamin D Binding Protein (DBP) والذي ينتقل إلى الكبد ليتحول إلى المركب 25-hydroxycholecalciferol أو  $25-OHD_3$  أو 25-HCC وهى الصورة النشطة active form للفيتامين. ويخزن الفيتامين في الكبد والجلد والمخ والعظام، ويحتل تخزينه فى أنسجة أخرى، وعند الحاجة إلى الفيتامين فإنه يذهب مع تيار الدم إلى الكلى، حيث يتحول إلى مركب آخر عبارة عن 1,25-dihydroxycholecalciferol أو  $1,25-(OH)_2D_3$  أو يسمى calcitriol وهى صورة نشطة أخرى للفيتامين، وهى عبارة عن مولد هرمون، ويتم إخراج هذا الفيتامين عن طريق البراز. وشكل (٧-٨) يوضح ميتابوليزم فيتامين D.



### شكل (٧-٨) ميټابوليزم فيټامين D

#### خصائص فيټامين D :

يعتبر هذا الفيتامين ثابتاً لحد كبير للحرارة في عدم وجود الأكسجين، وتفقد منه كمية صغيرة أثناء الطهي ومعاملة الأغذية.

### الكميات اليومية الموصى بها :

حيث أن الفيتامين يخزن في الجسم فلا يلزم تعاطيه يوميًا. وتظهر الكميات

الموصى بها في جدول (٧-٨) :

جدول (٧-٨) الكميات الموصى بها من فيتامين D / اليوم

الفئة	العمر بالسنوات	وحدة دواء / يوم	كميات فيتامين D / اليوم / الفرد ميكروجرام / يوم
رضع	٠ - ٠,٥	٣٠٠	٧,٥
	٠,٥ - ١	٤٠٠	١٠
أطفال	١ - ٣	٤٠٠	١٠
	٤ - ٦	٤٠٠	١٠
	٧ - ١٠	٤٠٠	١٠
ذكور	١١ - ١٤	٤٠٠	١٠
	١٥ - ١٨	٤٠٠	١٠
	١٩ - ٢٤	٤٠٠	١٠
	٢٥ - ٥٠	٤٠٠	٥
	٥١ +	٤٠٠	٥
إناث	١١ - ١٤	٤٠٠	١٠
	١٥ - ١٨	٤٠٠	١٠
	١٩ - ٢٤	٤٠٠	١٠
	٢٥ - ٥٠	٢٠٠	٥
	٥١ +	٢٠٠	٥
حامل		٤٠٠	١٠
مرضع		٤٠٠	١٠

إن الزيادة أثناء الحمل والرضاعة ذلك لأن الحامل والمرضع تحتاج إلى كميات زائدة لأن فيتامين D لبناء الهيكل العظمي للجنين ولتكوين اللبن.

ووجد أنه ليس هناك ضرر من تعاطى كميات تعادل ٤-٥ أضعاف المقرر اليومي، إلا أن الزيادة عن ذلك تؤدي إلى ظهور أعراض تسمم، منها الإسهال والقىء وفقد الشهية والعطش، ثم الدوخة والهلزال. إذا استمرت الزيادة فإنه يرتفع مستوى الكالسيوم والفوسفور في الدم، كما يزداد إفرازهما في البول، وقد يترسب الكالسيوم في بعض الأنسجة الغضة للجسم، مثل القلب والرئتين والكلىتين.

ويمكن سد الاحتياجات اليومية من فيتامين D عن طريق تناول ٥ جم كبد أو ١ بيضة يومياً إلى جانب التعرض لأشعة الشمس.

#### **أثر زيادة الفيتامين D : Hypervitaminosis D :**

تؤدي زيادة الفيتامين في الغذاء المتناول عن المتوسط ٤٠٠ وحدة دولية، تصبح سامة، وتؤدي إلى زيادة امتصاص الكالسيوم في الدم hypercalcemia. أما في حالات التسمم المتوسط تؤدي إلى فقد الشهية وزيادة الإحساس بالعطش، وزيادة الحساسية، وضعف وإمساك وقد يحدث إسهال وفشل في النمو في الرضع والأطفال ونقص الوزن في الكبار.

واستمرار هذه الحالة تؤدي إلى ترسيب الكالسيوم في الأنسجة الرخوة soft tissues مثل القلب والرئة والأوعية الدموية والأنابيب الكلوية، وتلف في الكبد. وإذا استمر أكثر من ذلك فإنها تؤدي إلى الوفاة.

وفي حالات الحمل أو في الطفولة المبكرة، فإنه يحدث ضيق في صمام الأورطي aortic valve وتشوه في الوجه peculiar facial appearance وتخلع عتلى.

#### **فيتامين E : Vitamin E :**


#### **توكوفيرول The Tocopherol :**

اكتشف هذا الفيتامين Evans & Bishop سنة ١٩٢٠ أثناء دراستهما، حيث وجدا أن الفئران التي تغذت على الكازين ونشا الذرة وشحم الخنزير والزبدة والخميرة، لم تتمكن من الإنجاب، وأصبحت إناث الفئران بالإجهاض، والذكور بالعقم، وقد أمكن علاج هذه الحالة بإعطاء زيت بعض النباتات وسمى بالعامل المانع للعقم. وقد تمكن Evans وآخرون من فصل الفيتامين من زيت جنين القمح، وأطلق عليه توكوفيرول (وهو اسم يوناني : tokos معناها ميلاد الطفل، pheros معناه يحمل، ol

تشير إلى الكحول)... وقد أمكن تخليق ألفا توكوفيرول سنة ١٩٣٨. وقد أصبح معروفاً بأهميته ١٩٦٦، وهذا الاسم tocopherol مصطلح يوناني معناه "يحمل جنيناً"، كما يوجد مجموعة أخرى من هذه المركبات تسمى tocotrienol.

### خواص فيتامين E :

إن المركبات المعروفة الآن من فيتامين E هي ألفا، بيتا، جاما، ودلتا، وإبسلون... واقواها ألفاتوكوفيرول، وتختلف هذه المركبات عن بعضها في وجود مجموعة الميثيل، وتحتوي هذه المركبات على حلقة كرومان (شكل ٧-٩).



... α-Tocopherol.

### شكل (٧-٩) ألفا توكوفيرول

وتحتوي الحلقة على مجموعة هيدركسيل إما حرة أو إستر، وهذه الحلقة المتصل بها مجموعة الهيدركسيل ضرورية للفعل الحيوى للفييتامين، ويتصل بالحلقة سلسلة أليفاتية عبارة عن فينول، والفعل الحيوى للفييتامين في حالة الإستر أقوى منه في الحالة الحرة، ويرجع ذلك إلى قدرة الإستر على مقاومة التأكسد.

### خصائص الفيتامين :

والفيتامين سائل زيتي لزوج لونه أصفر، لا يذوب في الماء، ولكنه يذوب في الدهون أو مذيبات الدهون، وهو ثابت للأحماض والحرارة في غياب الأكسجين، ولكنه يتلف بواسطة القلوى وبواسطة الأكسجين، وتفقد منه كمية بسيطة أثناء الطهي.

### ميتابوليزم فيتامين E :

امتصاص فيتامين E يشابه امتصاص الفيتامينات الأخرى القابلة للذوبان في الدهن، وينتقل في الدم محملاً مع الليبوبروتينات. ووجد أن دم الإنسان البالغ يحتوي على تركيزات من الفاتوكوفر تعادل حوالي ١ مجم / ١٠٠ مل. أما الأطفال حديثي الولادة فيكون تركيز الفيتامين في الدم منخفضاً ويعادل حوالي ٠,٢ - ٠,٤ مجم /

١٠٠ مل. ويفضل ألا يقل فى البالغ عن ٠,٥ ملجم. والمقياس المفضل هو نسبة الفيتامين إلى ليبيدات الدم الكلية وهى ٠,٨ ملجم / ١ جم ليبيدات. ووجد أن فيتامين E يوزن أساساً فى الأنسجة الدهنية، كما وجد أن بعض الأعضاء تحتوى على تركيزات عالية من فيتامين E مثل الكبد والقلب، ويوجد ٨٣٪ من الفيتامين فى الدم وكرات الدم الحمراء فى صورة ألفا والباقى فى صورة جاما.

### وظيفة فيتامين E :

ظل الاعتقاد السائد طويلاً أن فيتامين E يقوم بدوره كمانع للأكسدة antioxidant فهو فعلاً يقى الجسم من تأثير الأصول أو الشوارد الحرة free radicals وتأثير المعادن الثقيلة heavy metals. ويقى من مظاهر الشيخوخة وحماية الذاكرة من التدهور وحماية العين والجهاز المناعى والحماية من السرطان.

وفيتامين E يحمى الدهون من التزنخ، كما أنه يحمى فيتامين A والكاروتين من الأكسدة سواء خارج الجسم أو داخله، كما أن لهذا الفيتامين دور فى المحافظة على سلامة كرات الدم الحمراء، وكذا المحافظة على الميكانيكية التى تحكم نفاذية جدر الخلايا، فيمنع تأكسد الأحماض الدهنية غير المشبعة فى جدر الخلايا، وحماية جهاز المناعة بالجسم وسلامة العين. كما تظهر التجارب أن للفيتامين دور فى ميتابوليزم الأحماض الأمينية ويعمل الفيتامين على تكوين الأحماض الأمينية المحتوية على كبريت. كما أن للفيتامين دور فى تنشيط بعض الإنزيمات ومرافقات الإنزيمات التى تدخل فى عملية التنفس، كما أنه ينظم هذه العملية، خصوصاً فى القلب والعضلات.

ويلاحظ أن الميتوكوندريا mitochondria غنية بهذا الفيتامينات. كما وجد علاقة وثيقة بين ميتابوليزم المعادن النادرة ومنها السليسيوم selenium حيث أن الفيتامين يحمى السليسيوم الموجود فى مركز الإنزيمات الخاصة بالمساعدة فى نقل الإلكترونات. كما يعمل فيتامين E والسليسيوم معاً فى حماية الجسم من أكسدة الدهون ونواتجها، ويعمل الفيتامين على تحسين كفاءة الأنسولين حيث يحمى خلايا بيتا البنكرياس كما أنه يحمى مرضى السكر من أكسدة الليبوبروتينات الخفيفة ويخفض دهون الدم. وفيتامين E يحمى الرئة من ملوثات الهواء، وينظم بناء DNA وفيتامين C ومرافق الإنزيم Q، يلاحظ أن فيتامين E يخلب scavenge الأصول الحرة من الوسط الدهنى، ولذا يحمى الدهون وبتاكاروتين ... من الأكسدة.

## أثر نقص فيتامين E :

يؤدى غياب أو نقص فيتامين E فى الحيوان إلى العقم، ففى الفئران يؤدى نقصه أو غيابه إلى اضمحلال الجهاز التناسلى فى الذكر والأنثى، فيحدث ضمور الخصيتين فى الذكر، ويموت الجنين ويحدث إجهاض بالنسبة للإناث، كما يؤدى نقص هذا الفيتامين إلى ضمور العضلات، ويرجع هذا إلى زيادة أكسدة الأحماض الدهنية غير المشبعة، وخصوصاً الموجودة فى العضلات، وذلك لأن الفيتامين يساعد فى تكوين "راد الانسرين anserine والكارنوسين Carnosine وهى البيبتيدات الثنائية الداخلة فى تكوين العضلات كما يخرج الكرياتين وبعض السكريات فى البول، وكل من هاتين المادتين متعلق بتوليد الطاقة فى العضلات، وإذا صاحب نقص البروتين أو نقص السيلينيوم selenium نقص فيتامين E فإن هذا يؤدى إلى تليف الكبد، كما يؤدى نقص هذا الفيتامين إلى أن تصبح كرات الدم الحمراء هشة وقصيرة العمر، وأيضاً إلى تجمع السوائل تحت الجلد edema، وأحياناً تتلون هذه السوائل بلون أخضر نظراً لتحلل الهيموجلوبين، وقد تراكمت هذه السوائل أيضاً فى المخ، كما يحدث ذلك فى الكلى وهزال وأنيميا.

أما بالنسبة للإنسان، فلم يثبت للآن ظهور أعراض واضحة، إلا أنه ظهر أن مستوى التوكوفيرول ينخفض فى الدم فى حالة الإصابة بمرض الكواشيوركور... وقد أمكن تحسين حالة الأنيميا ذات كرات الدم المتضخمة بإعطاء الأطفال فيتامين E كما لوحظ أن انخفاض فى التوكوفيرول قد تصاحب بارتفاع نسبة تحليل كرات الدم الحمراء فى الأطفال حديثى الولادة... وقد لوحظ أن مستوى التوكوفيرول مرتفع فى الأطفال حديثى الولادة بعد تعاطيهم لبن الأم، ولم يحدث هذا فى حالة تعاطيهم لبن البقر، وقد يرجع ذلك إلى إزالة الدهن من لبن البقر، ولذا ينصح بإعطاء هؤلاء الأطفال فيتامين E. أما بالنسبة لأهميته بالنسبة للإنسان فى مجال التناسل، فلم تثبت هذه الأهمية إلا أن هناك بعض حالات عقم وإجهاض متكرر عولجت بتعاطى هذا الفيتامين.

ولاشك فى أن الفيتامين يوجد فى أنسجة الإنسان، وهو مهم فى عمليات الميتابوليزم التى تتم بها، إلا أن سعة انتشاره فى الأغذية وخصوصاً الرحيصة، قلل من ظهور حالات نقصه.



وبصفة عامة، فإنه لم تظهر أعراض على الإنسان، وذلك لأنه واسع الانتشار في الأغذية ويستطيع الجسم تخزينه، كما لوحظ نقصه في الرضع المبترسين وحدوث أنيميا نتيجة هدم كرات الدم الحمراء نظراً لاحتوائها على أحماض دهنية غير مشبعة.

#### **المقررات الموصى بها :**

من الصعب تحديد الكميات للإنسان من هذا الفيتامين، حيث أنه لم تظهر أعراض نقص واضحة، وقد وجد أن متوسط ما يحصل عليه الفرد من هذا الفيتامين تحت ظروف التغذية العادية هو ١٤ ملجم. وقد أثبت Horwitt وآخرون (١٩٥٦)، (١٩٦١، ١٩٦٣) أن :

١- الاحتياج للتركوفيرول يدل لحد ما على كمية الدهون غير المشبعة في الوجبة وفي أنسجة الجسم.

٢- يقل احتياج الفرد للتركوفيرول بانخفاض مستوى الأحماض الدهنية غير المشبعة في الغذاء، ولكن العادات السابقة للفرد التي أثرت على تكوين الأنسجة يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

٣- يقصر عمر كرات الدم الحمراء في الإنسان عند تغذيته على غذاء فقير في التركوفيرول بالنسبة لحماض لينولينك، وذلك لمدة طويلة.

ويلاحظ أنه قد ذكر أنه لم يثبت حالات تسمم نتيجة تعاطي كميات كبيرة من هذا الفيتامين بعكس الفيتامينات الأخرى القابلة للذوبان في الدهون.

#### **الكميات الموصى بها :**

يوضح جدول (٧-٩) الكميات الموصى بها من فيتامين E ، وتزداد احتياجات الجسم من فيتامين E بزيادة كمية الدهون غير المشبعة في الوجبة، وعموماً فإن الفيتامين يوجد دائماً مع الدهون غير المشبعة في الأغذية. ومن ناحية أخرى فإنه تقل الحاجة للفيتامين في وجود عنصر selenium وبعض المركبات المانعة للأكسدة antioxidants ويمكن الحصول على الكميات الموصى بها بتناول ٦ جم زيت ذرة أو ٢٠ جم زيت فول صويا أو ٢٥٠ جم خس. ونادراً ما يحدث تسمم عند زيادة الكميات المتناولة من فيتامين E، إلا أن الزيادة بدرجة كبيرة تعوق ميثابوليزم فيتامين A.

جدول (٧-٩) الكميات الموصى بها من فيتامين E / اليوم / الفرد

الفئة	العمر بالسنوات	ملحجم الفاتوكويرول/ اليوم	وحدة دولية/ يوم
رضع	صفر - ٥,٥	٣	٤,٤٧
	٥,٥ - ١,٥	٤	٥,٩٦
أطفال	١-٣	٦	٨,٩٤
	٤-٦	٧	١٠,٤٣
	٧-١٠	٧	١٠,٤٣
ذكور	١١-١٤	١٠	١٤,٩٠
	١٥-١٨	١٠	١٤,٩٠
	١٩-٢٤	١٠	١٤,٩٠
	٢٥-٥٠	١٠	١٤,٩٠
	٥١+	١٠	١٤,٩٠
إناث	١١-١٤	٨	١١,٩٢
	١٥-١٨	٨	١١,٩٢
	١٩-٢٤	٨	١١,٩٢
	٢٥-٥٠	٨	١١,٩٢
	٥١+	٨	١١,٩٢
حامل		١٠	١٤,٩٠
مرضع		١٢	١٦,٣٩

#### وجود ومصادر فيتامين E :

توجد التوكويرولات بكميات صغيرة في كثير من النباتات، حيث يوجد الفيتامين في جدر جميع الخلايا ليحمى الأحماض الدهنية غير المشبعة من الأكسدة، وكذا كل من فيتامين A, C. وأهم مصادر فيتامين E هي : الزيوت النباتية، وأغناها زيت جنين القمح وزيت البذور.

تحتوى الزيوت النباتية على أكثر من ٥٠ مجم ألفا توكوفيرول / ١٠٠ جم زيت، إلا أن هذه المعاملات التى تتعرض لها تلك الزيوت من حرارة عالية وأكسدة قد تؤدى إلى خفض هذه الكمية.

النباتات الخضراء مثل الخس، الكرنب، مصدر جيد للفيتامين، كما أنه يوجد فى صفار البيض، ودهون اللبن والزبد، والكبد، والمكسرات. ويوجد بكميات بسيطة فى التفاح والفسول والدواجن، ويوجد بكميات ضئيلة فى معظم الفواكه والخبز الأبيض والسكر.

### **البحوث الحديثة :**

أظهرت التجارب الحديثة والدراسات المعاصرة أن لفيتامين E وظائف أخرى، فقد أشار Hunter وآخرون (١٩٩٣) أن لفيتامين E دور فى الحماية من الشلل الرعاش Parkinson's disease .

كما أظهرت دراسات أخرى فى اليابان أن نقص فيتامين E يزيد من تلف المخ brain damage والأعصاب وعدم القدرة على التركيز والخفاض مستوى هرمون الغدة فوق الدرقية والخفاض المناعة والإصابة بالأنيميا.

كما أظهر Bostick وآخرون ١٩٩٥ أن نقص فيتامين E قد يؤدى إلى زيادة الإصابة ببعض أمراض السرطان. بينما أظهر Kushi وآخرون (١٩٩٦) أن تناول فيتامين E يقلل من التعرض للإصابة بأمراض القلب.

ويخزن الفيتامين فى الأنسجة الدهنية فى الكبد والعضلات، ويوجد كميات بسيطة فى باقى الأنسجة. كما يوجد بنسبة كبيرة فى غدة الأدرينالين والغدة النخامية والقلب والرئة.

ومعظم الفيتامين يخرج عن طريق البراز ونسبة بسيطة عن طريق البول.

### **فيتامين ك Vitamin K :**


#### **عامل تجلط الدم Coagulant Factor :**

كان العالم Dan الداغركى هـ ر أول من لاحظ سنة ١٩٢٩ حدوث حالة نزيف شديد تحت الجلد الكسايكيت أثناء إجراء إحدى التجارب. وكان يقدم للكسايكيت وجبات مصنعة، ولم ينجح علاج هذه الحالة بإعطاء الكسايكيت فيتامين C،

فقد كانت ناتجة عن عدم قدرة الدم على التجلط. وقد أمكن علاج هذه الحالة بتعاطي الكناكيت غذاءً مكوّنًا من خليط من أغذية طبيعية وحبيب، وكان العامل الفعال في هذه الأغذية موجودًا في الجزء الدهني من هذه الأغذية، ويمكن استخلاصه بواسطة الإثير، وقد سماه Dan العامل المسبب للتجلط Coagulation factor (Koagulation).

### خواص فيتامين K :

ويوجد في الطبيعة مركبان لهذا الفيتامين هما  $K_1$ ،  $K_2$ ، ويوجد  $K_1$  في الأوراق الخضراء، أما  $K_2$  فينبى بواسطة البكتيريا، والفيتامين لونه أصفر يذوب في الدهن والمواد الدهنية، ثابت بالنسبة للحرارة والعوامل المختزلة، ولكنه حساس بالنسبة للضوء، ولذا يباع في زجاجات قاتمة، ويفقد فاعليته بالأكسدة وبالأحماض والقلويات القوية، كما أنه يفقد بالتجميد freezing. ويوجد صورتان للفيتامين في الطبيعة هما  $K_1$ ،  $K_2$  كما يوجد مستحضر له هو  $K_3$  (شكل ٧ - ١٠).



شكل (٧-١٠) التركيب الكيميائي لفيتامين K


ويوجد فى الطبيعة كما سبق صورتان من الفيتامين  $K_1$  : (phyloquinone) أو (phytylmenaquinone) وتوجد فى النباتات الخضراء، و  $K_2$  : (menaquinone) أو (multiprenyl menaquinone) الذى يكون بواسطة الكائنات الدقيقة بما فيها الكائنات الموجودة فى الجهاز الهضمى للإنسان. وقد أمكن تحضير مركبات كيميائية أحسنها menadione وكان يعزف سابقاً باسم  $K_3$  الذى يتحول داخل الجسم إلى  $K_2$  وهو أكثر فعالية من  $K_1$ ،  $K_2$ .

### الميتابوليزم :

يمتص الفيتامين بنفس ظروف الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهن. ويلاحظ أن المستحضرات الكيميائية قابلة للذوبان فى الماء، فهى سهلة الامتصاص. ويمتص عادة فى الجزء العلوى من القناة الهضمية من ١٠ - ٧٠٪ منه. ويتثقل فيتامين K فى اللف ثم إلى الدم حيث يرتبط مع بـتا ليبوبروتين وينقل إلى الكبد وإلى الأنسجة الأخرى. ويخزن فى الكبد (٥٠٪) والعضلات. ويخرج عن طريق البراز والبول.

### وظيفة فيتامين K :

فيتامين K مادة أساسية ومهمة لتكوين مادة البروثرومبين prothrombin فى الكبد، والبروثرومبين عبارة عن جليكوبروتين glycoprotein، ويوجد فى الدم، وهو لازم لتجلط الدم الطبيعى، ولو أن دور فيتامين K فى تكوين مادة البروثرومبين غير معروف للآن، إلا أن هناك اعتقاد بأنه قد يكون جزءاً هاماً فى التركيب الإنزيمى الداخلى فى تكوين هذه المادة، وفى حالة نقصه فإن مستوى البروثرومبين ينخفض فى الدم، وتطول مدة تجلط الدم، ويحدث نزيف وفقدان فى الدم، وعمر تجلط الدم بعدة خطوات كالآتى :



ولم تحدث حالة نقص غذائى فى الإنسان، وذلك لأن الأحياء الدقيقة

الموجودة بالأمعاء الغليظة تمد الجسم بما يحتاجه من هذا الفيتامين. إلا فى بعض حالات الصفراء jaundice أو تناول أجسام مضادة أو مركبات السلفا.

ظهر فى بعض الدراسات أنه يرجد فى العظام والكللى والكبد بروتينات تعتمد فى عملها على فيتامين K، ومن هذه البروتينات بروتين MGP الموجود فى العظام والأسنان والأنسجة الضامة، كما أن الفيتامين لازم لتنشيط بروتين osteocalcin اللازم لميتابوليزم العظام وترسيب المعادن. كما أن فيتامين K لازم لتكوين بروتين يلزم للكللى لمنع ترسيب الكالسيوم فى صورة أكسالات كالسيوم وتكوين حصوة الكللى، وقد يكون ذلك السبب فى عدم تعرض النباتيين إلى تكوين حصوة الكللى نتيجة لارتفاع فيتامين K فى غذائهم. كما ظهر أن نقص فيتامين K قد يؤدى إلى هشاشة العظام (Tamatani وآخرون ١٩٩٨).

وفى الطفل حديث الولادة يكون مستوى البروثرومين فى الدم منخفضاً، ويعادل من ٢٠-٧٠٪ منه فى الفرد البالغ، وينخفض إلى أدنى مستوى حتى اليوم الثالث، ثم يبدأ يرتفع تدريجياً بعد عدة أسابيع، بالإضافة إلى ذلك فإن أمعاء تكون معقمة، ولذا يحتاج إلى جرعات هذا الفيتامين حوالى ١ ملليجرام إلى أن يتمكن من الحصول عليه من الأمعاء، ويفضل أن تتناول الأم جرعة (٢ - ٥ ملليجرام) من هذا الفيتامين قبل الولادة، حيث ظهر أن مستوى البروتين فى دم الطفل يكون أعلى منه لو أعطى الطفل جرعة الفيتامين، ونلاحظ أنه إذا انخفض مستوى البروثرومين كثيراً فى الطفل حديث الولادة فإنه يصاب بحالة نزيف شديد.

وهناك بعض المركبات التى يتناولها الإنسان وتصيب الأحياء الدقيقة فى الأمعاء، مثل مركبات السلفاناميد والمضادات الحيوية، كما أن حالات الإسهال الشديدة قد تؤدى إلى انخفاض مستوى البروثرومين فى الدم. ويلاحظ أن ظروف امتصاص هذا الفيتامين هى نفس ظروف امتصاص الدهن، فوجود الدهن والصفراء وغيرها من العوامل اللازمة لامتصاص الدهن يعتبر أمراً هاماً لامتصاص الفيتامين، وهناك حالات انخفاض فى البروثرومين فى الدم أمكن علاجها بتعاطى أملاح الصفراء على حدة، أو أملاح الصفراء مع فيتامين K عن طريق الفم، وفى حالة تلف الكبد فى كثير من الأمراض، فإن مستوى البروثرومين ينخفض فى الدم، ولا ينفع تعاطى فيتامين K بأى طريقة.

ومن المضادات لفعل فيتامين ك: ثنائي كرومارول dicumarol وهيدروكرومارول hydrocomarol حيث تؤدي إلى خفض مستوى البروثرومبين في الدم، وتستعمل هذه المواد طبيًا في علاج الذبحة الصدرية، وغيرها من الأمراض التي تحتاج في علاجها إلى مواد مانعة لتجلط الدم.

وبالإضافة إلى دور فيتامين ك في تجلط الدم، فإن فيتامين ك مثل فيتامين E يدخل في تفاعلات الأكسدة وفي التفاعلات اللازمة لتوليد الطاقة في الخلايا. ومن أهم الوظائف لفيتامين K هي إنتاج بعض مواد بروتينية تعمل كعوامل مساعدة لتجلط بلازما الدم، هذه العوامل تنتج في الكبد، ويتوقف تخليقها على وجود كميات دقيقة من فيتامين K.

### **مصادر هذا الفيتامين :**

يوجد هذا الفيتامين في النباتات المختلفة مثل الكرنب والقرنبيط والسبانخ وفول الصويا والكبد. أما الفواكه والحبوب والأغذية الحيوانية فهي فقيرة في هذا الفيتامين.

### **مظاهر النقص Deficiency Symptoms :**

من مظاهر النقص زيادة الوقت اللازم للتجلط وحدوث النزيف - أي الوقت اللازم لتحول prothrombin إلى thrombin - وكذا زيادة وقت ظهور الجلطة عن الوقت الطبيعي، يكون الوقت اللازم لتجلط الدم حوالي ١٠ دقائق. وأيضًا هشاشة العظام Osteoporosis.

### **زيادة تناول الفيتامين K Hypervitaminosis :**

زيادة الفيتامين لا يحدث تسمم من الفيتامين من مصادره الطبيعية، ولكن قد يحدث تسمم من المركبات المحضرة. فقد يسبب Hemolytic anemia الناتجة عن تكسير كرات الدم الحمراء وتلف الكبد.

### **الكميات الموصى بها :**

تظهر الكميات الموصى بها في جدول (٧-١٠) :

جدول (٧-١٠) الكميات الموصى بها من فيتامين K / اليوم / الفرد

الفئة	العمر بالسنوات	فيتامين K ملجم / اليوم
رضع	صفر - ٠,٥	٥
	٠,٥ - ١,٠	١٠
أطفال	١-٣	١٥
	٤-٦	٢٠
	٧-١٠	٣٠
ذكور	١١-١٤	٤٩
	١٥-١٨	٦٥
	١٩-٢٤	٧٠
	٢٥-٥٠	٨٠
	٥١+	٨٠
إناث	١١-١٤	٤٥
	١٥-١٨	٥٥
	١٩-٢٤	٦٠
	٢٥-٥٠	٦٥
	٥١+	٦٥
حامل		٦٥
مرضع		٦٥

الفيتامينات التي تذوب في الماء Water Soluble Vitamins :

مجموعة فيتامينات ب The B-Complex Vitamins

وفيتامين ج Vitamin C :

فيتامينات مجموعة ب

مقدمة :

بمجموعة فيتامينات ب تشتمل على عدة فيتامينات تعمل مع بعضها البعض أى فيتامينات بينها علاقات وظيفية Functional relationships ويحتاجها الجسم مجتمعة، وهى توجد فى كل من المملكتين الحيوانية والنباتية ويمكن تخليقها بواسطة البكتريا والخمائر والفطريات.



وتشتمل فيتامينات ب على الفيتامينات الآتية :

- ١- فيتامين B<sub>1</sub> (الثيامين) Thiamin
- ٢- فيتامين B<sub>2</sub> (الريبوفلافين) Riboflavin
- ٣- فيتامين B<sub>3</sub> (حامض النيكوتينيك) Nicotinic acid
- والنيكوتيناميد Nicotinamide
- أو النياسين Niacin
- ٤- فيتامين B<sub>6</sub> (البرودكسين) البرودكسال والبرودكسول والبرودكسامين Pyridoxine
- ٥- فيتامين B<sub>12</sub> (كوبالامين) Cobalamin
- ٦- فيتامين B<sub>5</sub> (حامض البنتوثينيك) Pantothenic acid
- ٧- فيتامين M (الفولاسين) Folic acid
- ٨- فيتامين H (البيوتين) Biotin

يجب أن تعطى فيتامينات المجموعة B فى صورة مخلوط أو مجمعة مع بعضها البعض، فالكميات المعطاة منها يجب أن تكون متوازنة، فزيادة أحد أفراد فيتامينات المجموعة B فى الوجبة يؤدى إلى إحداث عدم توازن imbalance أو نقص فى أحد فيتامينات B الأخرى، حيث أن كل فيتامينات المجموعة لها وظائف متداخلة بشدة.

ويتم تخليق فيتامينات المجموعة B بواسطة بكتريا الأمعاء، وتنمو هذه البكتريا بصورة أفضل فى وجود سكر اللبن (لاكتوز) وفى وجود كميات صغيرة من الدهون فى الوجبة الغذائية. أما خلو الوجبات من اللبن milk-free diets أو تناول مركبات السلفوناميد أو مضادات حيوية أخرى قد يؤدى إلى هدم هذه البكتريا الطبيعية.

عموماً فإن الاحتياج من فيتامينات B يزداد فى حالات المرض، وعند تناول كميات كبيرة من المواد الكربوهيدراتية. كذلك الأطفال والحوامل والمرضعات يحتاجون إلى كميات زائدة من الفيتامينات.


تعتبر الأغذية الطبيعية كمصدر لفيتامينات B أفضل من الفيتامينات المصنعة، حيث أن الفيتامينات الطبيعية تحمل كل أفراد المجموعة B ومنها ما لم يتم اكتشافه حتى الآن، بجانب وجود إنزيمات أخرى ذات أهمية لعملية استفادة الجسم بالفيتامينات، أما الفيتامينات المصنعة فتفقد فى العلاج السريع لحالات النقص.

أهم المصادر الغذائية لفيتامينات المجموعة B هي الكبد واللحوم والألبان ومنتجاتها والحبوب الكاملة والبقول والخميرة.

تمتص فيتامينات B بسهولة من الأمعاء الدقيقة وتنقل بواسطة الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة. وبسبب قابليتها للذوبان في الماء فإن الزيادة منها تفقد خارج الجسم ولا تخزن فيه.

وجودها ضرورى لإتمام عمليات ميّتابوليزم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، حيث أنها تعمل كمرافقات إنزيمية Co-enzymes تساعد فى تلك التفاعلات (شكل ٧-١١).

والمرافق الإنزيمى Co-enzyme عبارة عن جزيء صغير الحجم يستطيع الاتحاد مع بروتين غير نشط inactive protein ليحوله إنزيمًا نشطًا active enzyme.



المركبات A, B لا يستطيعان الالتصاق  
بالبإنزيم فى وجود مرافق الإنزيم  
شكل (٧-١١) دور مرافق الإنزيم مع الإنزيم فى المساعدة فى التفاعلات

الفيتامين جزء من تركيب الإنزيم الذى وجوده ضرورى وأساسى كى يستطيع الإنزيم المساعدة فى إتمام التفاعلات الإنزيمية، ولذا فإن الفيتامينات ضرورية، ويحتاجها الجسم باستمرار لإتمام التفاعلات الحيوية.

وبصفة عامة ففيتامينات المجموعة B ضرورية للمحافظة على صحة الأعصاب، سلامة الجهاز الهضمى وسلامة الجلد والأغشية الطلائية للعين والفم. وتشتمل أعراض نقص فيتامينات المجموعة B على فقد الشهية والتعب والتوتر والأنيميا والاضطراب العصبى علاوة على التهاب الجلد واحمرار اللسان وسقوط الشعر.

فيما يلي عرض لخصائص كل فيتامين من فيتامينات المجموعة B.

### فيتامين B<sub>1</sub> (الثيامين) Vitamin B<sub>1</sub> (Thiamin) :

#### الفيتامين المانع للبرى برى. Antiberi-beri Vit. أو الفيتامين الضابط للأعصاب

عرف مرض البرى برى الناتج من نقص الثيامين فى الوجبة الغذائية فى الصين منذ عهد بعيد (حوالى ٢٦٠٠ سنة قبل الميلاد)، وقد يكون أقدم مرض عرف نتيجة نقص عنصر غذائى.


وكان أول من لاحظ علاقة المرض بالوجبة الغذائية هو Takaki سنة ١٨٨٤، وفى سنة ١٨٩٠ تمكن من الوصول إلى أن هناك مادة قابلة للذوبان فى الماء، توجد متشرة فى قشر الأرز، لها علاقة بهذا المرض.

وخلال الحرب العالمية الأولى ظهرت أعراض مرض البرى برى على الجنود الإنجليز الذين كانوا يعتمدون فى غذائهم على الخبز الأبيض، بينما لم تظهر على الجنود الهنود الذين كانوا يحاربون معهم، والذين كانوا يعتمدون فى غذائهم على الخبز الأسمر، أى المصنوع من دقيق حبوب القمح الكاملة أو الدقيق ذى نسبة الاستخلاص العالية، وحينما نفذ غذاء الجنود الإنجليز نتيجة للحصار اضطروا إلى الاستعانة فى غذائهم بالخبز الأسمر، وهنا بدأ أعراض مرض البرى برى فى الاختفاء، وكان لابد من ملاحظة الاختلاف فى طبيعة غذاء كل من الطرفين.

وفى عام ١٩١٣ أعلن Funk استخلاصه للمادة الفعالة فى أغلفة الأرز، والمادة لمرض البرى برى فى الإنسان فى صورة نقية ومركزة، وفى سنة ١٩٣٠ أمكن تخليق الفيتامين.

### تركيب الثيامين :

يتكون جزئ الثيامين من حلقة بيريميدين pyrimidine ring ومركب الثيازول thiazol يرتبطان معاً عن طريق رابطة مثيلينية، ويحتوى الفيتامين على ذرة نيتروجين رباعية quaternary N atom (شكل ٧ - ١٢).



### شكل (٧-١٢) تركيب Thiamin

وأمكن تصنيع الفيتامين فى صورة هيدروكلوريد الثيامين.

#### خصائص الثيامين :

الثيامين سريع الذوبان فى الماء، وثابت فى الوسط الحامضى حتى على درجات حرارة تصل إلى ١٢٠م، حساس للحرارة فى المحاليل المتعادلة والقلوية، يفقد فعلة الحيوى بالأكسدة والأشعة فوق البنفسجية. كما يتلف الفيتامين بمعاملة بعض الأغذية بغاز  $SO_2$  بغرض الحفظ، حيث تنفصل نواة البريميدين عن الثيازول ويفقد الفيتامين فعلة الحيوى.

أما أثناء معاملة الأغذية بالحرارة (عمليات الطهى) فإن فقد الثيامين يتراوح بين ٢٠-٤٠٪ أو أكثر، وذلك إما بسبب القابلية للذوبان فى الماء أو بتأثير الحرارة والأكسدة.

#### وجود أو مصادر الثيامين :

أهم مصادر فيتامين  $B_1$  الحبوب الكاملة أو الدقيق الأسمر، حيث يتركز الفيتامين فى أغلفة الحبوب أو فى الردة؛ إذ تحتوى على حوالى ٩٠٪ منه، بينما الدقيق الأبيض (الاندوسيرم) لا يحتوى على أكثر من ١٠٪.

البقول، المكسرات، اللحوم، الكبد، الخميرة، اللبن ومنتجاته، معظم الخضروات.

يمكن القول بأن الفيتامين يوجد فى جميع الأنسجة النباتية والحيوانية، كما

يتضح من الجدول (٧ - ١١) :

جدول (٧-١١) محتوى بعض الأغذية من الثيامين

الغذاء	ثيامين (مجم / ١٠٠ جم)
<b>أغذية نباتية :</b>	
دقيق قمح كامل	٠,٣٦ - ٠,٥
٨٥٪ استخلاص	٠,٣ - ٠,٤
٧٢٪ استخلاص	٠,١ - ٠,٠٧
أرز كامل	٠,٥
أرز بدون قشر	٠,٣
قشر الأرز	٢,٣٠
بسلة خضراء	٠,٣٦
بقوليات أخرى	٠,٤ - ٠,٦
بطاطس	٠,١ - ٠,٠٨
<b>أغذية حيوانية :</b>	
لحم بقرى	< ٠,٦
دجاج	٠,١
لبن بقرى	٠,٠٤٥

**ميثابوليزم الثيامين :**

يمكن لـ بكتريا الأمعاء تخليق جزء من احتياجات الجسم للثيامين. وزيادة تخليق الثيامين تعتمد على عدد كبير من العوامل تشتمل على نوع الوجبة المتحصل عليها، كما ذكر سابقاً.

يمتص الثيامين بسرعة وسهولة من الأمعاء الدقيقة، وينقل مع الدم إلى الكبد وأجزاء الجسم، حيث يتحول بعملية فسفرة phosphorylation إلى مرافق إنزيم هو thiamin- pyro-phosphate (TPP) وهو من نوع co-carboxylase وتتم عملية الفسفرة في أغلب أنسجة الجسم، ولكنها تتم بصفة أساسية في خلايا الكبد.

مستوى الثيامين في دم الإنسان حوالى ١٠ ميكروجرام / ١٠٠ مل، ويكون في صورة co-carboxylase وحوالى ١ ميكروجرام / ١٠٠ مل في صورة فيتامين حر thiamin.

وتحتوى خلايا الدم البيضاء على تركيزات عالية من الثيامين تصل إلى ١٠٠ ميكروجرام / ١٠٠ مل.

الكميات الزائدة من الفيتامين تفرز مع البول بعد عملية نزع الفوسفور dephosphorylation والتي تتم فى الكلى (ويحتمل حدوثها فى أعضاء أخرى) حيث يفرز الفيتامين الحر thiamin مع البول وكميات قليلة منه تفرز مع العرق.

### وظائف الفيتامين :

يقوم الفيتامين بدور هام فى عمليات انطلاق الطاقة من المواد الكربوهيدراتية ويدخل الثيامين فى هذه التفاعلات فى صورة مرافق الإنزيم co-carboxylase والذي يساعد على إزالة المجموعة الكربوكسيلية أثناء ميتابوليزم المواد الكربوهيدراتية، ويساعد هذا الإنزيم فى تحويل الجلوكوز إلى دهن (transketolation).

ولذا فإنه عند نقص الثيامين فإن النواتج الوسطية لميتابوليزم الكربوهيدرات تتراكم فى أنسجة الجسم، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مرضية. ومثال على ذلك إزالة المجموعة الكربوكسيلية من حمض البيروفيك تحتاج إنزيم (TPP)، وفى حالة نقصه فإنه يؤدي إلى زيادة حمض البيروفيك فى الدم، مما يؤثر على نشاط عضلات الجسم. ولذلك فإن الثيامين له أهمية كبيرة بالنسبة للعضلات عامة ولعضلات الأمعاء بوجه خاص، إن نقص الثيامين يؤدي إلى ضعف هذه العضلات مما ينتج عنه اضطراب الجهاز الهضمي وحدوث حالات الإمساك وضعف الشهية.

وحيث أن الثيامين يؤثر على الهضم واضطرابه، لذا فإنه يؤثر على مدى الاستفادة من الغذاء، وبالتالي على النمو، وبخاصة الأطفال فى مراحل نموهم السريع.

يحافظ الثيامين على سلامة الجهاز العصبي فى الجسم، كما أن إنزيم (TPP) هام فى العمليات الميتابوليزمية لكل من الكربوهيدرات والدهون، حيث أنه يساعد على إزالة المجموعة الكربوكسيلية من حمض الألفا كيتوجلوتاريك  $\alpha$ -ketoglutaric acid ليكون حامض السكسينيك succinic acid. وهو هام أيضاً لتخليق acetylcholine وهو ناقل عصبى لازم الأداء العديد من وظائف المخ منها التذكر.

كما أن إنزيم (TPP) يساعد في تكوين سكر الريبوز ribose (وهو سكر حماسي) وذلك عن طريق تنشيط إنزيم transketolase، وهذا التفاعل هام حيث أن سكر الريبوز يدخل في تكوين الأحماض النووية DNA, RNA، ولذا فهو مهم في إنتاج الدم وأيضاً في المناعة.

### **أعراض نقص الثيامين :**

أجريت العديد من التجارب لإحداث حالات نقص الثيامين في بعض المتطوعين أكثر من ٢٥ عاماً مضت. وقد ظهر على المتطوعين أعراض مميزة اشتملت على : التعب، عدم القدرة على التركيز، سرعة التهيج. وعموماً يمكن إخفاء هذه الاعراض عند تعاطي الكميات المناسبة من الثيامين، ولكن كانت هناك اعراض مرضية في الجهاز العصبي لم يمكن علاجها حيث كانت غير عكسية.

ويحدث نقص الثيامين إما لقلّة الكميات المتناولة منه، أو لأن كمية الكربوهيدرات المتناولة كبيرة وغير متناسبة مع كمية الثيامين، وأثناء فترة الحمل والرضاعة، وأثناء مرحلة الطفولة، وكذا عند زيادة المجهود العضلي المبذول، يزداد احتياجات الجسم من الثيامين.

كما يظهر نقص الثيامين athiaminosis في بعض حالات الحمى pyrexia زيادة إفرازات الغدة الدرقية hyper thyroidism أو في حالة الأمراض التي تتداخل مع الامتصاص والتمثيل السليم له مثل أمراض المرارة.

### **وأهم أعراض نقص الثيامين هي :**

#### **أولاً : بالنسبة للأطفال :**

يعتبر برى برى الأطفال من الأمراض الحادة acute disease بعكس برى برى الكبار، والذي يكون معظمه مزمنًا، وحتى الحاد منه يكون مرتبطاً بأمراض مزمنة، وعادة تكون علامات الإصابة الأولية بسيطة جدًا بحيث لا يمكن للألم أن تلاحظها. ويتطور المرض سريعًا، ويؤدي للوفاة إذا لم يتم علاجه، وعادة يحدث بصورة فجائية fulminant بين سن ٢- ٤ أشهر، ويقل معدل الإصابة به بعد ٦ أشهر.

ويمكن تلخيص الأعراض المرضية لبرى برى الأطفال حسب سرعة انتشار المرض

فيما يلي :

١- الإصابة الحادة للقلب acute cardiac : وتظهر هذه الأعراض بطريقة فجائية بين عمر ٢ - ٤ أشهر، بظهور قلق على الطفل وصراخه على فترات وضيق تنفس، ويصبح الطفل باهت اللون pale ولكن مزرق cyanosed، وتظهر علامات فشل الجهاز الدموي، وقد تحدث الرقاة في ظرف ساعات أو دقائق.

٢- فقد الصوت aphonic : تظهر عادة في سن بين ٥ - ٧ أشهر، وتبدأ بإصابة الطفل بالسعال مما يشير إلى إصابة الجهاز التنفسي، بعد ذلك تحدث خشونة في الصوت أو بحجة في الصوت hoarseness, dysphonia ثم يفقد الصوت ويكفي الطفل بدون صوت نتيجة لحدوث شلل لأعصاب الحنجرة laryngeal nerve paralysis أو حدوث استسقاء للحنجرة.

٣- التهاب سحائي كاذب pseudomeningeal ويشمل جملة أعراض تشبه أعراض التهاب السحائي للأطفال الكبار. وتظهر في الأطفال بين سن ٨ - ١٠ أشهر وتكون مصحوبة ببلادة أو فتور apathy ونعاس drowsiness مع رجوع الرأس للخلف وعلامات زيادة الضغط داخل الجمجمة intracranial pressure.

#### ثانياً : بالنسبة للبالغين :

عموماً يؤدي نقص الثيامين إلى اضطراب الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والقلب كما يؤدي إلى اضطراب ميثابوليزم الكربوهيدرات وتراكم حامض البيروفيك في الدم وفقدان الشهية وتوقف النمو وضعف عام وسرعة التهيج والميل للمشاجرة والشعور بالحزن والخوف وكثرة النسيان والأرق مع شعور بالتعب السريع والصداع والدوار وتغيرات في ملمس الجلد واضطراب ضربات القلب وصعوبة التنفس والتهاب الأعصاب وآلام الجسم وضمور العضلات وتقلصها، كما يصعب السير. وتبدأ هذه الأعراض من أسفل إلى أعلى أي تبدأ من القدم ثم الساق ثم الأذرع والأيدي ويفقد المريض القدرة على الحركة ويصاب بالإمساك.

وفي حالات النقص الشديد يصاب الفرد في النهاية بمرض البري بري وهو ثلاثة : النوع الأول : وهو البري بري الجفاف dry beriberi : وهو يصيب عادة البالغين حيث يصيب الجهاز العصبي فيحدث التهاب الأعصاب الدائرية peripheral polyneuritis وشلل paralysis واضمحلال العضلات muscle atrophy وتبدأ الأعراض على الأرجل ثم تشمل الجهاز العصبي.



النوع الثاني : البرى برى الرطب wet beriberi : يحدث التأثير أساساً على الجهاز الدورى حيث يحدث احتقان فى القلب يؤدي إلى هبوط فى القلب congestive heart failure مصاحباً لحدوث تمدد فى القلب cardiac dilatation وقصور فى الأوعية الدموية، وظهور الأورعما بوضوح فى الأنسجة. يؤدي ذلك إلى صعوبة التنفس dyspnea وعدم انتظام ضربات القلب وارتفاع الضغط . وظهور السوائل فى التجريف البلورى وحول القلب.

أما النوع الثالث فهو البرى برى الحاد acute fulminating type : ويحدث بصورة فجائية ويصيب القلب بالتضخم، وهو من الحالات الخطيرة.

### الاحتياجات :

ترتبط احتياجات الفرد اليومية من الثيامين بعدة عوامل هى :

١- مدى احتياج الفرد للطاقة.

٢- كمية الكربوهيدرات فى الغذاء.

٣- نشاط الفرد.

وكلها لها علاقة طردية مع الاحتياج للثيامين.

والجدول (٧-١٢) يبين الكميات الموصى بها (RDA) (١٩٨٩) وهى بمعدل

حوالى ٠,٥ مجم/ ١٠٠٠ كالورى.

جدول (٧-١٢) الكميات اليومية الموصى بها من Thiamin / اليوم ومن الطاقة

الفئة	العمر بالسنوات	الطاقة المتناول كالورى	Thiamin ملجم / اليوم/ الفرد
رضع	صفر - ٠,٥	٦٥٠	٠,٣
	٠,٥ - ١,٠	٨٥٠	٠,٤
أطفال	١-٣	١٣٠٠	٠,٧
	٤-٦	١٨٠٠	٠,٩
	٧-١٠	٢٠٠٠	١,٠
ذكور	١١-١٤	٢٥٠٠	١,٣
	١٥-١٨	٣٠٠٠	١,٥
	١٩-٢٤	٢٩٠٠	١,٥
	٢٥-٥٠	٢٩٠٠	١,٥
	٥١+	٢٣٠٠	١,٢
إناث	١١-١٤	٢٢٠٠	١,١
	١٥-١٨	٢٢٠٠	١,١
	١٩-٢٤	٢٢٠٠	١,١
	٢٥-٥٠	٢٢٠٠	١,١
	٥١+	١٩٠٠	١,٠
حامل		٣٠٠ +	١,٥
مرضع		٥٠٠ +	١,٦

ويمكن سد هذه الاحتياجات بالنسبة للبالغ عن طريق تناول ١ رغيف مصنوع من دقيق القمح الكامل أو ٢٥٠ جم بقول خضراء، أو ٢٠٠ جم لحم بقرى.


**فيتامين ب٢، أو الريبوفلافين Vitamin B<sub>2</sub>, Riboflavin :**

سنة ١٩٢٠ اكتشف العلماء أن فيتامين B الموجود فى الغذاء نوعان : نوع يتلف بالحرارة وهو المضاد لمرض البرى برى ويسمى فيتامين B<sub>1</sub> أما النوع الثانى فثابت للحرارة، وهو هام للنمو وأطلق عليه B<sub>2</sub>.

وتتم عزل الفيتامين من بياض البيض واللبن والكبد والخميرة وبعض الأغذية النباتية، وتم معرفة تركيبه الكيميائي وتخليقه سنة ١٩٣٥.

### تركيب الفيتامين :

الريبوفلافين عبارة عن مشتق من الأيزو ألكو- سازين iso-alloxazine derivative مع سلسلة ريبيتول ribitol، ووجود مجموعتي الميثايل مهم لبقاء فعله الحيوى وغياهما يؤدي إلى تكرين مواد سامة فى الجسم (شكل ٧-١٣).



شكل (٧-١٣) تركيب الريبوفلافين

### خواص الريبوفلافين :

يعتبر الفيتامين ثابت الحرارة ولا يتأثر بالأكسجين الجوى. يذوب بصعوبة فى الماء ومحلوله يظهر خاصية الفلورسنت القوية. ثابت فى المحاليل الحامضية القوية وغير ثابت فى الوسط القلوى أو عند تعرضه للضوء أو الأشعة فوق البنفسجية. ولا يتأثر كثيراً بعملية الطهى، حيث يتراوح الفقد منه ١٠ - ٢٠٪.

### وجوده أو مصادر الريبوفلافين :

يوجد الريبوفلافين فى مختلف الأغذية، كما يتضح من الجدول (٧ - ١٣)، وعموماً فالريبوفلافين ينتشر بصورة واسعة فى الأوراق الخضراء للخضروات وفى الحبوب الكاملة والأنسجة الحيوانية، أما الفواكه والبذور والدرنات فهى فقيرة فيه.

وتزداد نسبته في لبن الأبقار والجاموس التي تعتمد في غذائها على العلف الأخضر، بينما تقل نسبته في لبن الحيوانات التي تعتمد على الأعلاف الجافة.

جدول (٧-١٣) محتوى بعض الأغذية من الريبوفلافين

الغذاء	ريبوفلافين مجم / ١٠٠ جم
<b>أغذية نباتية :</b>	
دقيق كامل	٠,٢ - ٠,١
دقيق أبيض	٠,٠٨ - ٠,٤
خبز غامق	٠,٠٩
خبز أبيض	٠,٠٧
أرز بدون قشر	٠,٠٩ - ٠,٠٦
سبانخ	٠,٤ - ٠,٢
فاصوليا	٠,١٨
<b>أغذية حيوانية :</b>	
لبن بقرى	٠,١٨ - ٠,١٤
جبن	٠,٧ - ٠,٣
لحم	٠,٣ - ٠,١
بيض	٠,٤
سمك	٠,٣٤

#### فيتابوليزم الريبوفلافين :

يتم فسفرة الريبوفلافين في ميكروا الأمعاء أثناء عملية الامتصاص، ويخزن بكميات صغيرة في الكبد، تفقد الكميات الزائدة منه مع البول، فيخرج مع البول يومياً حوالي ٣٠٪ من كمية الريبوفلافين المتحصل عليها، ووجدت كميات صغيرة من الريبوفلافين مع العرق.

#### وظائف الفيتامين :

يلعب الفيتامين دوراً هاماً في عملية تنفس الخلايا، حيث أنه يعمل كمرافق إنزيمي يساعد على نقل الهيدروجين في عمليات التأكسد في الخلايا الحية، وهو يدخل في تركيب نوعين من مرافقات الإنزيم هي :

- فلافين أحادى النيوكليوتايد (FMN) flavin mononucleotide  
- فلافين أدنين ثنائى النيوكليوتايد (FAD) flavin adenine dinucleotide  
وفى هذين المركبين فإن الفيتامين يتحد مع بروتينات ليكون معظم الإنزيمات  
الفلافوبروتينية flavoprotein enzyme systems وهذه الإنزيمات هامة فى عمليات  
تنفس الخلايا وفى داخل الخلية يحدث العديد من تفاعلات الأكسدة والاختزال التى  
تتم أثناء ميتابوليزم الكربوهيدرات والدهون والبروتينات وهذه التفاعلات يتوقف  
حدوثها على وجود نظم إنزيمية تحتوى على كل من الريبوفلافين والثيامين والنياسين  
(فيتامينات مجموعة B).

- يؤثر الفيتامين تأثيراً مباشراً فى النمو وحفظ الصحة لأنه يدخل فى بناء الأنسجة.  
- للفيتامين علاقة هامة وحيوية بالنسبة للعين وتكوين منبهات الرؤية.  
- للفيتامين علاقة وثيقة بعمليات تمثيل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات فى  
الجسم، كما يساعد على امتصاص الحديد وتمثيله داخل الجسم.  
- يقوم الفيتامين بدور هام فى بناء هيموجلوبين الدم، وتطور الأعصاب وميتابوليزم  
الوصلات العصبية، ويساعد فى أداء غدة الأدرينال لنشاطها، وأيضاً فى تكوين  
هرمون corticosteroid فى قشرة الأدرينال، كما أنه ينشط فيتامين ب<sub>٦</sub> اللازم  
لتكوين النياسين من tryptophan.

### **أعراض نقص الريبوفلافين :**

لا توجد أعراض مميزة للريبوفلافين، حيث غالباً ما يحدث نقص هذا الفيتامين  
مع غيره من فيتامينات المجموعة ب، وعموماً يمكن التعرف على الأعراض المميزة  
لنقص الفيتامين بعمل تجارب على المتطوعين يمكن حصرها فيما يلى :

**أعراض عامة :** وتمثل فى : اضطراب الهضم، فقد الشهية وضعف عام،  
بطء النمو وتوقفه لدى الأطفال.

**أعراض جلدية :** وتشمل : التهاب اللسان، والثقة، تشقق زوايا الفم  
والتهابة وتشقق الشفاه cheilosis قد تظهر بعض الالتهابات الشديدة على الجلد  
وحول الأنف، وفى سقف الحلق (شكل ٧-١٤).

**أعراض بصرية :** وتمثل فى : كثرة الدموع وعدم القدرة على مقاومة  
الضوء photophobia احتقان أوعية العين.

**أعراض أخرى:** مثل انخفاض الإحساس بالحرارة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الحلق والمرىء.

### **الكميات اليومية الموصى بها من الريبوفلافين :**

يمكن تخليق الريبوفلافين بواسطة بكتريا الأمعاء ولكنها تنتج بكميات لا تكفى احتياجات جسم الإنسان.

والاحتياج اليومي من الريبوفلافين يتوقف على مدى احتياج الفرد للطاقة. والكميات اليومية الموصى بها من الريبوفلافين حسب RDA (١٩٨٩) موضحة فى الجدول (٧-١٤)، وهى بمعدل حوالى ٠,٦ مجم / ١٠٠٠ كالورى والزيادة من الفيتامين تودى إلى أضرار بالجلد وصداع وميل للقيء ومشاكل فى الرؤية وتغيير فى ميثابوليزم الكربوهيدرات وخصوصاً الجلوكوز. كما أن الزيادة الكبيرة تضر الكبد وتودى إلى اصفرار الجلد والعين.



شكل (٤-١) أعراض نقص الريبوفلافين

جدول (٧-١٤) الكميات اليومية الموصى بها من الريبوفلافين

الفئة	العمر بالسنوات	ملجم ريبوفلافين/ اليوم/ الفرد
رضع	صفر - ٠,٥	٠,٤
	٠,٥ - ١,٠	٠,٥
أطفال	١-٣	٠,٨
	٤-٦	١,١
	٧-١٠	١,٢
ذكور	١١-١٤	١,٥
	١٥-١٨	١,٨
	١٩-٢٤	١,٧
	٢٥-٥٠	١,٧
	٥١ +	١,٤
إناث	١١-١٤	١,٣
	١٥-١٨	١,٣
	١٩-٢٤	١,٣
	٢٥-٥٠	١,٣
	٥١ +	١,٢
حامل		١,٦
مرضع		١,٨

### النياسين - Vitamin B<sub>3</sub> - Niacin


حمض النيكوتينيك - النيكوتين أميد Nicotinic acid, Nicotinamide

### الفيتامين المانع للبلاجرا / Pellagra preventive vit. (PP)

لوحظ مرض البلاجرا في إيطاليا منذ القرن الثامن عشر، وكلمة بلاجرا بالإيطالية تعنى الجلد الخشن. وفي عام ١٩١٢ اكتشف Funk عامل مانع البلاجرا، وفي ١٩٢٦ عولجت البلاجرا في الإنسان بتعاطى الخميرة وعزل حامض النيكوتينيك في ١٩٣٣ من الخميرة وعرف بأنه العامل المانع للبلاجرا من عام ١٩٣٧.

### تركيب الفيتامين :

الفيتامين عبارة عن Pyridine  $\beta$ -carboxylic acid ونيكوتيناميد عبارة عن أميد الحامض (شكل ٧-١٥).



**R = -OH**  
Nicotinic acid

**R = -NH<sub>2</sub>**  
Nicotinamide

### شكل (٧-١٥) تركيب النياسين

### خواص الفيتامين :

الفيتامين يذوب في الماء، والصورة الأميدية أكثر قابلية للذوبان من الحامض ويعتبر من أكثر الفيتامينات ثباتاً ضد العوامل المختلفة مثل الحرارة والأحماض والقلويات والأكسدة والضوء. ولا تزيد الكمية التي تفقد منه أثناء إعداد وطهي الأغذية عن ١٥ - ٢٥ %.

### وجوده ومصادره :

من أهم مصادر النياسين : اللحوم والكبد والأسماك والبقول وبعض الخضروات كالسبانخ والجزر. وقد يوجد في بعض الأغذية النباتية في صورة معقدة غير قابلة للامتصاص، ويعتبر الحمض الأميني الترتوفان مولد Precursor للناسين. والجدول (٧ - ١٥) يبين محتوى بعض الأغذية من النياسين.



جدول (٧-١٥) محتوى بعض الأغذية من النياسين

الغذاء	نياسين (مجم / ١٠٠ جم)
<b>أغذية نباتية :</b>	
دقيق قمح كامل	٥,٥ - ٤,٨
مكرونة	٢ - ١
استخلاص ٨٠٪	١,١ - ٠,٩
استخلاص ٧٠٪	٠,٨ - ٠,٧
دقيق ذرة	٢,٠
بطاطس	٠,٩
بقول جافة مطهية	٢ - ١
طماطم	٠,٩
جزر	٠,٧
<b>أغذية حيوانية :</b>	
لحزم	٥,٨ - ٤,٠
أسماك	١١,٠ - ٢,٠
تونة	٤٠ - ٤٥ / علب
بيض	٠,٠٣
لبن بقرى	٠,٤ - ٠,٠٧
جب	٢,٠ - ١,٠

**ميثابوليزم النياسين :**

يمتص النياسين بسهولة من الأمعاء الدقيقة، ويتحول في الجسم الحى إلى مرافقات إنزيمية لذلك فهو يوجد فى مختلف أجزاء الجسم، ووجد أن الجسم يخلق كميات صغيرة من الحامض وأميده عن طريق بكتريا الأمعاء الدقيقة .

**وظائف النياسين :**

يتحول كل من الحامض وأميده فى الجسم إلى مرافقات إنزيمية خاصة بعمليات تنفس الخلية والخاصة بنقل الإيدروجين وهى :

مرافق الإنزيم، وهو (NAD) Nicotinamide adenine dinucleotide

مرافق الإنزيم، وهو

(NADP) Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate

مرافق الإنزيم، وهو

ويعمل NAD, NADP مع إنزيمات التنفس، ويلعب النياسين دوراً حيوياً هاماً

فيما يلي :

- يدخل النياسين في تركيب مرافقات الإنزيمات NAD, NADP التى تلعب دوراً هاماً في تنفس الخلايا. ويساعد في خفض كولسترول الدم.

- ينقل الهيدروجين ويدخل في تركيب وتحلل المواد الكربوهيدراتية حيث يستخدم NAD في تخليق الجليكوجين، ثم هدمه لإطلاق الطاقة.

- يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء. وأيضاً زيادة فاعلية الأنسولين.

- يساعد على النمو عند الأطفال.

- يساعد في بناء الأحماض الدهنية والبروتين وDNA.

### أعراض نقص النياسين :

تظهر البلاجرا نتيجة لحدوث نقص شديد إما في فيتامين niacin أو مولدة،

وهو الحمض الأميني التربتوفان والذي يتحول بسهولة إلى النياسين بنسبة ٦٠ : ١.

ويرتبط نقص النياسين البسيط بتناول وجبات تتكون أساساً من الذرة أو

محتوية على كميات بسيطة من البروتينات المحتوية على الحمض الأميني التربتوفان.

ولذلك تنتشر البلاجرا في المناطق التي ينخفض مستواها الاقتصادي بجانب اعتمادها

أساساً على وجبات محتوية على الذرة، وعادة ينتشر بين الجماهير الآتية :

١-الأفراد أو الجماهير الفقيرة التي تستمر لفترات طويلة على عادات غذائية خاطئة

وعادة تتميز وجبات هؤلاء الأفراد بانخفاض محتوى وجباتهم من الطاقة عمومًا،

ارتفاع محتواها من المواد الكربوهيدراتية والدهون نسيبًا، انخفاض محتواها من

البروتينات والفيتامينات والمعادن وغياب أو عدم تناول الخضروات والفاكهة

الطازجة واللحوم الحمراء والبيض واللبن ومنتجاته.

٢-الأفراد المصابين بأمراض معينة تتداخل مع شهية الفرد أو تؤثر على امتصاص

أو تمثيل الغذاء، فعادة يظهر نقص النياسين وsecondary tryptophan الثانوي

نتيجة للإصابة بأمراض الإسهال المزمن، سوء الامتصاص، تليف الكبد والمرارة،

السل، أو أى من الأمراض التي تؤثر على عمليات الميتابوليزم.

٣- مدمنى الخمر.

٤- المرضى الذين يعالجون لمدة طويلة بدواء isonicotinic acid hydrazide وهذا المركب مضاد لفيتامين B<sub>6</sub> (pyridoxine) وبالتالي يسبب نقص لهذا الفيتامين ويعتبر هذا الفيتامين B<sub>6</sub> ضرورى لتحويل الحمض الأميى الترثرفان إلى نياسين. وهناك أيضًا أسباب أخرى لظهور البلاجرا فى بعض البلاد، ففى الهند يتناول الأفراد كميات كبيرة من الحبوب تعرف باسم jower بجانب الذرة فى وجباتهم اليومية، ووجد أن هؤلاء الأفراد ينتشر بينهم البلاجرا. وقد فسر ذلك بأن jower يحتوى على نسبة عالية من الحمض الأميى leucine (كما هو الحال فى الذرة) وقد وجد أن ارتفاع leucine يتداخل مع ميتابوليزم الترثرفان والنياسين.

### أعراض المرض :



عادة يعانى الأفراد المصابين بالبلاجرا بسوء التغذية والضعف العام وانخفاض وزنهم عن الوزن المفروض لسنهم. وتبدأ الأعراض بشعور بالتعب والكسل وفقدان للشهية، ثم تظهر بعد ذلك الأعراض المميزة لمرض البلاجرا المعروفة باسم "3Ds" وهى:

- التهاب الجلد Dermatitis
- الإسهال Diarrhea
- اضطراب الجهاز العصبى Dementia

### = التهاب الجلد Dermatitis :

ويعتبر من أهم علامات المرض هو مظهر جلد المريض، تبدأ الحالة بحدوث التهاب فى الجلد، ثم يزداد عمق لون الجلد وتفقد هذه المناطق مظهرها الصحى اللامع، وتصبح جافة خشنة، وقد تتشقق، وقد تبقى هذه الحالة كما هى أو تحسن أو تزداد سوءاً إذا ساءت الحالة، فتظهر قشور على هذه المناطق ثم تتشقق وتقرح وتظهر هذه الحالة فى جميع أجزاء الجسم المعرضة للضوء (الوجه، الرقبة، الأيدى، الأذرع، الأقدام) بشكل متناظر (شكل ٧-١٦)، ويسبب ذلك حرقاناً شديداً وآلاماً. هذا التناظر يوضح أنه يوجد علاقة بين ظهور هذه الأعراض والجهاز العصبى المركزى - كما أن الحالات المتأخرة من المرض تنتهى بتدهور المخ والجنون ثم الوفاة.

كما تلتهب الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والقسم، ويلتهب اللسان ويتنفخ ويزداد إفراز اللعاب ويصبح لون اللسان احمر ويزداد الشعور بالألم وتظهر فيه تقرحات مؤلمة مما يسبب رفض المريض تناول الأكل.



أ (قبل العلاج)

ب (بعد العلاج)

شكل (٧-١٦) أعراض نقص النياسين على اليدين

**الإسهال Diarrhea :**

يحدث أيضًا التهاب شديد في جميع الأغشية المخاطية المبطنة للجهاز الهضمي وظهور قرحات سطحية، وقد يحدث نزيف. وتختفى الإفرازات المعدية والبنكرياسية، ويعتبر هذا هو السبب الأساسي لسوء الهضم وحالات الإسهال الشديدة المرتبطة بالبلاجرا.

وتبدأ أعراض اضطراب الجهاز الهضمي بالشعور بالحرقان وعدم الراحة، وانتفاخ وتكرار التجشؤ وقيء، يتبع ذلك الإسهال وقد يكون مدمم.

**اضطراب الجهاز العصبي Dementia :**

تتفاوت الأعراض العصبية، ويمكن تلخيصها في حدوث صداع، ويصبح الفرد عصبيًا سريع التهيج، مع فقدان الذاكرة وإحساس بالحزن والخوف والأرق والهذيان والإغماء وتدهور عام في الجهاز الهضمي، ويقل الإحساس باللمس الخفيف. ولكن نادرًا ما يحدث شلل في مرضى البلاجرا.

**الاحتياجات من الفيتامين :**

يقدر الاحتياج من النياسين على أساس جزء من tryptophan في الغذاء

يتحول بمعدل ٦٠ : ١ وعلى هذا فيكون الاحتياج على أساس ملجم مكافئ نياسين.  
ويوضح جدول (٧-١٦) الكميات الموصى بها حسب RDA (١٩٨٩).

### مثال لحساب مكافئ النياسين :

إذا فرض أن كمية من اللبن بها ٤٤٩ مم tryptophan ، ١,٧ ملجم نياسين  
∴ كمية النياسين المتكونة من tryptophan =  $\frac{449}{60} = 7,5$  ملجم نياسين  
من tryptophan.

وعلى هذا تكون هذه الكمية من اللبن : ١,٧ + ٧,٥ = ٩,٢ ملجم مكافئ  
نياسين.

وترتبط الاحتياجات اليومية من النياسين بمدى احتياج الفرد للطاقة؛ وتقدر  
بحوالى ٦ ملجم مكافئ نياسين لكل ١٠٠٠ كالورى. ولا يقل الاحتياج الكلى عن  
١٣ ملجم مكافئ نياسين إذا كان المتناول أقل من ٢٠٠٠ كالورى.

ويمكن تغطية هذه الاحتياجات بتناول (١) رغيف دقيق كامل أو ٦٠٠ جم  
بطاطس أو ٦٠٠ جم طماطم أو ١٥٠٠ جم لبن أو ١٠٠ جم سمك.

وبالنسبة للرضع حتى عمر شهر يكون الاحتياج يساوى ٧,٧ ملجم مكافئ  
نياسين ١٠٠٠ كالورى، وللرضع فوق ٦ شهور من العمر وللمراهقين ٧,١ ملجم  
مكافئ نياسين، يزداد بالنسبة للحمل ٢ ملجم مكافئ نياسين، وبالنسبة للرضاعة  
يضاف ٣,٣ ملجم مكافئ نياسين.

جدول (٧-١٦) الكميات الموصى بها من مكافئ النياسين والطاقة والبروتين/  
الفرد/ اليوم

الفترة	العمر بالسنوات	الطاقة كالورى	بروتين جم	مكافئ النياسين ملجم
رضع	صفر - ٠,٥	٦٥٠	١٣	٥
	٠,٥ - ١,٠	٨٥٠	١٤	٦
أطفال	١-٣	١٣٠٠	١٦	٩
	٤-٦	١٨٠٠	٢٤	١٢
	٧-١٠	٢٠٠٠	٢٨	١٣
ذكور	١١-١٤	٢٥٠٠	٤٥	١٧
	١٥-١٨	٣٠٠٠	٥٩	٢٠
	١٩-٢٤	٢٩٠٠	٥٨	١٩
	٢٥-٥٠	٢٩٠٠	٦٣	١٩
	٥١+	٢٣٠٠	٦٣	١٥
إناث	١١-١٤	٢٢٠٠	٤٦	١٥
	١٥-١٨	٢٢٠٠	٤٤	١٥
	١٩-٢٤	٢٢٠٠	٤٦	١٥
	٢٥-٥٠	٢٢٠٠	٥٠	١٥
	٥١+	١٩٠٠	٥٠	١٣
حامل		٣٠٠ +	٦٠	١٧
مرضع		٣٠٠ +	٥٠	٢٠

**البرودكسين ب<sub>٦</sub> Pyridoxine B<sub>٦</sub> :**

يرجع تاريخ اكتشاف هذا الفيتامين إلى ١٩٣٤ حيث لاحظ Gyorgy وجود مادة فى الخميرة لها أثر كبير فى منع حدوث نوع من التهاب الجلد فى الفئران، وعلاجها أيضاً، وسميت هذا المادة فيتامين B<sub>٦</sub>.

وعزل سنة ١٩٣٩ ثم عرف بعد ذلك أنه عبارة عن مجموعة من مركبات قريبة الشبه فى التركيب، ويمكن أن يتحول المركب من صورة إلى الأخرى بيريدوكسول pyridoxol، وبيريدوكسال pyridoxal، وبيريدوكسامين

pyridoxamine، وعادة يوجد pyridoxal و pyridoxamine فى الأنسجة الحيوانية، أما pyridoxol فيوجد فى الأنسجة النباتية، وعادة يستخدم اسم بيريدوكسين بصفة عامة عند الإشارة إلى أى صورة من صور فيتامين B<sub>6</sub>.

**تركيب الفيتامين :** تشتمل صورة الفيتامين على :

Pyridoxol وهو عبارة عن كحول

Pyridoxal وهو عبارة عن ألدهيد

Pyridoxamine وهو عبارة عن أمين


ويظهر التركيب الكيميائى لهذه المركبات فى شكل (٧-١٧) بحيث أن R

عبارة عن :

CH<sub>2</sub>OH بالنسبة للكحول

CHO بالنسبة للألدهيد

CH<sub>2</sub>NH<sub>2</sub> بالنسبة للأمين



شكل (٧-١٧) فيتامين B<sub>6</sub>

#### خواص الفيتامين :

أمكن عزل هذه المركبات فى صورة بللورات عديدة اللون، تذوب فى الماء، ثابتة للحرارة، ولكنها تهدم بواسطة القلويات والأشعة فوق البنفسجية، وتفقد حوالى ٥٠٪ من B<sub>6</sub> الموجود فى الأغذية أثناء المعاملات المختلفة من تسويق وتخزين وحفظ وطهى.

#### مصادر البيرووكسين :

مصادر الثلاث أشكال أو المركبات توجد منتشرة انتشاراً واسعاً بتركيزات صغيرة فى جميع الأنسجة النباتية والحيوانية، فيوجد الفيتامين فى صورة pyridoxol فى

الأغذية النباتية، وفى صورتى pyridoxal و pyridoxamine فى الأغذية الحيوانية. ويبين الجدول (٧ - ١٧) أهم مصادره فى الوجبات الغذائية.

جدول (٧-١٧) وجود فيتامين B<sub>6</sub> فى بعض الأغذية

أغذية نباتية	فيتامين B <sub>6</sub> (مجم/١٠٠ جم)	أغذية حيوانية	فيتامين B <sub>6</sub> (مجم/١٠٠ جم)
دقيق كامل	٠,٧ - ٠,٤	لبن بقرى	٠,٣٠ - ٠,٠٣
دقيق مستخلص ٨٠٪	٠,٣ - ٠,١	جبن	٠,٨٠ - ٠,٠٤
دقيق مستخلص ٧٠٪	٠,١٦ - ٠,٠٨	بيض	٠,٢٥
زبيب	٠,٣٤ / كوب	لحوم	٠,٣٠ - ٠,٠٨
بطاطس	٠,٢٣ - ٠,١٤	أسماك	٠,٤٥
سبانخ	٠,٢٢	كبد	١٥,٠
فاصوليا	٠,١٠	تونة	٠,٥١ / علبة
بسله	٠,١٦		
بسله خضراء مطهية	٠,٣٣ / كوب		
جزر	٠,٧٠		
موز	٠,٧٠ واحدة متوسطة		
برتقال	٠,٠٥		

#### ميثابوليزم فيتامين B<sub>6</sub> :

غير معروف تماماً العوامل التى تؤثر على امتصاص فيتامين B<sub>6</sub>، ولكنه يمتص بسهولة من الأمعاء الدقيقة، ويساعد انخفاض رقم حموضة الأمعاء (pH) على زيادة امتصاص البرودكسين، وتحدث فسفرة لصور الفيتامين المختلفة بمساعدة إنزيم phosphokinase لتكوين مرافقات إنزيمية هى pyridoxaminephosphate و pyridoxal phosphate والتى تعمل مع العديد من الإنزيمات الضرورية لميثابوليزم البروتينات والكربوهيدرات والدهون، وعمليات انطلاق الطاقة مثل transaminases, decarboxylases, deaminases وإنزيمات أخرى مثل phosphorylases.



## وظائف فيتامين B<sub>6</sub> :

لفيتامين B<sub>6</sub> دور أساسي فى ميثيليزم الأحماض الأمينية، فتفاعلات نقل الجاميع الأمينية transamination من حمض أمينى إلى بعض مركبات ألفا-كيتو لتخليق أحماض أمينية أخرى يحتاجها الجسم.

أما تفاعلات إزالة الجاميع الأمينية deamination من الأحماض الأمينية فهى تمثل خطوة هامة قبل تحرير الطاقة من البروتينات وتفاعلات إزالة الجاميع الكربوكسيلية decarboxylation من الأحماض الأمينية ينتج عنها مركبات تعمل كمواد منظمة ضرورية للجسم essential body-regulating compounds مثل serotonin و norepinephrine و dopamine وهذه تلعب دوراً كبيراً فى المزاج والعمليات العقلية.

كما يساعد فيتامين B<sub>6</sub> فى تحويل الحمض الأمينى Tryptophan إلى النياسين ويدخل الـ pyridoxal فى تركيب إنزيم glycogen phosphorylase. ومعظم الفيتامين الموجود فى جسم الإنسان يكون على هذه الصورة، والذى يساعد فى تحرير الطاقة من الجلوكوجين وتكوين المركب glucose-1-phosphate.

أما دور pyridoxine فى ميثيليزم الدهون فهو غير واضح، ويحتاج لمزيد من الدراسات، إلا أن Witten و Hollinsn سنة ١٩٥٢ يذكرون أن فيتامين B<sub>6</sub> مسئول عن تحويل حامض لينولينك إلى حامض أراكيدونيك، علاوة على أنه قد وجد أن الأعراض الجلدية التى تنشأ عن نقص pyridoxine تشبه تلك التى تنشأ عن نقص الأحماض الدهنية غير المشبعة الأساسية، ويمكن علاجها بإعطاء الأحماض الدهنية الأساسية. وبالعكس، أى أنه يمكن علاج الأعراض الجلدية الناشئة عن نقص الأحماض الدهنية الأساسية بواسطة إعطاء البيريدوكسين (Sherman سنة ١٩٥٠) و (Dueul & Reiser سنة ١٩٥٥). كما يساعد فى تكوين مادة Prostaglandin واللازمة للعديد من الوظائف كتنظيم الضغط ووظائف القلب. كما يدخل فى نقل بجاميع (HS) sulfhydryl من methionine إلى serine لتكوين cysteine.

ويدخل هذا الفيتامين فى نقل المجموعة أحادية الكربون single carbon unit حيث أنه يدخل فى تحويل glycine إلى serine وبالعكس. كما يساعد الفيتامين فى تخليق بعض الهرمونات مثل الهرمونات الجنسية.

كما أن لهذا الفيتامين دور فى تكوين الأجسام المضادة فى الإنسان، فيذكر (Hodges وزملاؤه سنة ١٩٦٢) أنه فى حالة نقص pyridoxine مع حامض pantothenic فى الإنسان أدى إلى فقدان القدرة على تكوين الأجسام المضادة لمرض التانوس والتيفويد، ولكنه يحتاج للمزيد من الدراسات.

كما لوحظ أن pyridoxine ضرورى لتخليق مركب Porphyrin الذى يدخل فى تركيب هيموجلوبين الدم، وله دور فى تكوين الأجسام المضادة. وأيضاً فى امتصاص فيتامين B<sub>12</sub>.

ويعتقد أن فيتامين B<sub>6</sub> له دور فى تخليق الإنزيمات اللازمة لوظائف الجهاز العصبى المركزى. كما أنه يعرف بفيتامين النساء women's vitamin فهو يعالج بعض الأعراض المصاحبة للدورة الشهرية وأيضاً الأعراض المرضية فى شهر الحمل الأولى كما أنه مهم للحفاظ على صحة الشعر والجلد.

ويدخل هذا الفيتامين فى عمليات تخليق mRNA، COA، وميتابوليزم الأحماض النووية nucleic acids ووظائف الغدد الصماء.

#### **أعراض نقص فيتامين B<sub>6</sub> :**

نادراً ما يحدث نقص فى فيتامين B<sub>6</sub> فى الحالات العادية نظراً لتخليقه بواسطة فلورا الأمعاء، علالة على انتشاره فى كثير من الأغذية. وعند إحداث حالات نقص بإعطاء الإنسان مضادات للفيتامين مثل deoxypyridine فإنه ظهرت عليه الأعراض التالية: التهاب الجلد، الأنيميا، التهاب الشفاه واللسان وتشقق أركان الفم، قد تظهر قشور على جلد الأنف والفم والعين، مع التهاب الجلد واحمراره، والتهاب الأعصاب وتشنجات. يلاحظ أن هذه الأعراض تشابه أعراض نقص فيتامينات B الأخرى التى سبق الكلام عنها، ولكن لم تحتفى هذه الأعراض بتناول الثيامين أو الريبوفلافين أو النياسين، بل اختفت بتناول فيتامين B<sub>6</sub>.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن Crawhill وآخرون سنة ١٩٥٩، سنة ١٩٦١ ذكروا أن نقص فيتامين B<sub>6</sub> يشجع على ترسيب إكسالات الكالسسيوم فى الكلى وتكوين حصوة. كما اقترح Hillman وزملاؤه سنة ١٩٦١ أن pyridoxine يحمى الأسنان من التسوس أثناء الحمل.

ولم يلاحظ زيادة إفراز الزانثينورينيك xanthurenic acid في البول في حالة نقص فيتامين B<sub>6</sub>، والذي يمكن تقريره كميًا. كما تدل الدراسات الحديثة على تراكم الحامض الأميني homocystiene الذي يساعد على حالة تصلب الشرايين، وقد لوحظ حديثًا أيضًا أن أكثر الفئات تعرضًا للنقص هم كبار السن ومرضى القلب وعند زيادة التوتر وعند الرياضيين أو التغذية على وجبات عالية في الدهون. الكربوهيدرات وفي النساء التي يتعاطين حبوب منع الحمل.

ومن جهة أخرى، ذكر أن نقص pyridoxine متعلق بحدوث بعض الاضطرابات الإكلينيكية منها :

- اضطراب الجهاز العصبي وذلك لأن هذا الفيتامين يساعد في ميثابوليزم الطاقة في المخ والأنسجة العصبية أى أداء المخ لوظائفه، ولهذا فإن نقصه يؤدي إلى حدوث تشنجات في الإنسان البالغ والطفل وأيضًا في الحيوان.

- الاغتراب autism وهو اضطراب في التطور العقلي والعاطفي في الأطفال، ويتميز بتهرب الطفل من الواقع وضعف غياب استجابته، وإن كان هذا يحتاج إلى مزيد من الدراسة، ولكن استخدام جرعات زائدة من الفيتامين تفيد في علاج هذه الحالة.

- الأنيميا، وقد أظهرت الدراسات أن بعض أنواع الأنيميا التي لا تستجيب للعلاج بالحديد (iron resistant anemia) أمكن علاجها بواسطة B<sub>6</sub>.

- في بعض حالات علاج السل كيميائيًا فإن بعض الأدوية يتعارض فعلها مع عمل B<sub>6</sub>. تظهر أعراض بعض اضطرابات الجهاز العصبي، ولهذا يفيد استخدام جرعات كبيرة من هذا الفيتامين.

- بعض الاحتياجات الفسيولوجية أثناء الحمل يمكن مقابلتها بواسطة تناول B<sub>6</sub>، كما أنه في حالات تناول حبوب منع الحمل يلزم تعاطي B<sub>6</sub>.

يلاحظ أن تعاطي كميات كبيرة منه يوميًا لمدة تصل إلى ٣٣ يومًا قد يؤدي إلى حالات تسمم.

### الكميات الموصى بها من البيريدوكسين :

حيث أن الفيتامين ينتج بواسطة فلورا الأمعاء، فغير معلوم الكميات اللازمة منه يومياً، ولم تشتمل جداول RDA على فيتامين B6 قبل سنة ١٩٦٨. ولكن أمكن تقدير تلك الكميات عن طريق التصرف على محتوى الوجبة الملائمة للفرد من هذا الفيتامين.

وقد أوصت لجنة الغذاء والتغذية بالولايات المتحدة الأمريكية سنة ١٩٨٩ بتناول حوالى ٠,٤ - ٠,٦ مجم / ١٠٠٠ سعر حرارى أى الكميات الموضحة فى الجدول (٧-١٨).

جدول (٧-١٨) الكميات اليومية الموصى بها من فيتامين B<sub>6</sub>

السن	فيتامين B <sub>6</sub> (مجم/ اليوم / الفرد)
أطفال أقل من سنة	٠,٣ - ٠,٦
أطفال من سنة - ٦ سنوات	٠,٩ - ١,٣
أولاد ورجال	١,٦ - ٢,٢
بنات ونساء	١,٨ - ٢,٠
حوامل	٢,٦
مرضعات	٢,٥

### فقد الفيتامين أثناء عمليات الإعداد والطهى :

- يفقد معظم الفيتامين (٧٥٪) من الحبوب أثناء الطهى.
- التعليب والتجميد يودى إلى فقد الفيتامين، وخصوصاً التعليب.
- يصل الفقد نتيجة طهى الخضروات والفاكهة إلى ٥٠٪ وفى اللحم يصل ٢٥-٥٠٪.
- تخزين الخضروات مثل البطاطس على درجة منخفضة (٤,٤° م) لمدة ٦ أشهر لم يحدث أى فقد يذكر.


### الكوبالامين - فيتامين ب ١٢ (Cobalamin) :

يعتبر فيتامين ب<sub>١٢</sub> من الفيتامينات حديثة الاكتشاف، حيث أنه فى سنة ١٩٢٦ لاحظ كل من Minot و Murphy فى بوسطن أنه يمكن علاج الأنيميا الخبيثة

**Pernicious anemia** يتناول الكبد النية، وقد ساعد ذلك على إجراء العديد من التجارب والدراسات دامت حوالى عشرين عامًا لمحاولة عزل هذا العامل الفعال فى علاج الأنيميا، والذي سمي بواسطة Castle بالعامل الخارجى **extrinsic factor** اللازم لعلاج الأنيميا الخبيثة، إلى أن عرف أن هذا العامل هو فيتامين **B<sub>12</sub>** أو الكوبالامين.

### تركيب الفيتامين :

يتركب فيتامين **B<sub>12</sub>** من ٤ حلقات بيرول **pyrole rings** (شكل ٧ - ١٨) ويحتوى فى مركزه على ذرة كوبلت، كما يحتوى على فوسفور ومجموعة سيانيد ( $-C \equiv N$ ) ورمزه الكيميائى  $C_{63}H_{90}N_{14}O_{14}PCo$  ويسمى **cyanocobalamin**، ويمكن أن تحل مجموعة السيانيد بمجموعة هيدروكسيد ( $-OH$ ) ليعطى المركب **hydroxycobalamin** وهذا شائع فى الأغذية أو تحل محل مجموعة السيانيد بمجموعة نيتريت ( $-NO_2$ ) ليكون **nitritocobalamin**، وهذه تخلقه البكتريا وهذان المركبان لهما نفس الفعل الحيوى للفيتامين.



شكل (٧-١٨) تركيب فيتامين **B<sub>12</sub>**

كما يوجد صورتان للفيتامينات تعملان كمرافقات إنزيمية هما Adenocylcobalamin وهي تختزى على adenosine مع سكر ريبوز بدلاً من مجموعة السيانيد وغالباً هذه الصورة هي شائعة فى الأغذية. أما الصورة الأخرى فهي methylcobalamin حيث تحل مجموعة  $CH_3$  محل السيانيد، وتحتاج عملية تحويل الفيتامين إلى هذه الصورة الأخرى الريبوفلافين والنياسين والمغنسيوم، والصورتان متساويتان من حيث نشاط  $B_{12}$ .

### خواص الفيتامين :

فيتامين  $B_{12}$  عبارة عن بللورات هيجروسكوبية لونها أحمر، تذوب فى الماء والكحول ولا تذوب فى الأسيتون والكلوروفورم أو الأثير غير ثابت فى الأحماض القوية والقواعد، ثابت على درجات الحرارة العادية (درجة حرارة الغرفة). ويفقد منه ٣٠٪ عند طهى الأغذية. كما يفقد ١٠٪ عند بسترة اللبن و ٤٠ - ٩٠٪ عند تجفيف اللبن.

### مصادر الفيتامين :

يوجد فيتامين ب<sub>١٢</sub> فى الأغذية بكميات صغيرة جداً، وأهم مصادره الأغذية الحيوانية، أما الأغذية النباتية فقد تخلو تماماً من فيتامين ب<sub>١٢</sub> (جدول ٧ - ١٩).

جدول (٧-١٩) محتوى بعض الأغذية الحيوانية من فيتامين  $B_{12}$

الغذاء	ب ١٢ (ميكروجرام / ١٠٠ جم)	طازج	مطهى
لحم	٢ - ٣		٢
دج	٦٠		١١٨
كلى	٣٠		٥٢
قلب	٢٥		٣٠
أسمك	٥ - ١٤		-
لبن بقرى	٠,٣ - ٠,٦		-
جبن	٠,٢ - ٢,٠		-
بيض	٠,٤		٠,٨ / واحدة

## ميتابوليزم فيتامين B<sub>12</sub> :

يخلق فيتامين B<sub>12</sub> بكميات بواسطة فلورا الأمعاء، وغير معلوم بالضبط أى كمية منها تمتص. والكمية اللازمة منه بالضبط للإنسان غير معلومة. امتصاص فيتامين ب<sub>12</sub> من الأمعاء يتوقف على محتوى العصير المعدى على ما يسمى بالعامل الداخلى intrinsic factor والذي سمي بواسطة Castle ١٩٢٩ وهو عبارة عن مركب بروتينى، والدراسات الحديثة دلت على أن العامل الداخلى يتفاعل مع فيتامين B<sub>12</sub> فى وجود أيونات الكالسيوم، ويحفظه أثناء نقله إلى الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة ileum والتي يتم فيها فقط امتصاص فيتامين B<sub>12</sub>، وفى هذه الحالة ينفصل فيتامين B<sub>12</sub> عن العامل الداخلى فى وجود أيونات الكالسيوم، ويسمح للفيتامين بدخول خلايا الميكوزا حتى يمتص. ويستغرق الامتصاص ٣ ساعات بعكس الفيتامينات الأخرى التى تمتص بعد بضعة ثوان.

يخزن الفيتامين الممتص فى الكبد ٨٠٪ منه (٢٠٠٠ - ٥٠٠٠) ميكروجرام، و ١-٢٪ فى النخاع الشوكى والباقي فى الكلى والعضلات والطحال ومستواه فى الدم ٢٠٠ - ٧٠٠ بيكو جرام (picogram) / ١٠٠ مل دم (البيكو جرام = ١٠<sup>-١٢</sup> جرام/ مليلتر). وينقل الفيتامين للدم بواسطة نوعين على الأقل من المركبات البروتينية تعرف بـ I، II transcobalamin. ويحتوى الجسم على ٢ - ٥ ملجم والمخزن فى الكبد يكفى عادة من ٣ - ٥ سنوات. ويمتص يوميًا حوالى ١,٥ - ٣ ميكروجرام وتنخفض نسبة الامتصاص عند المسنين حوالى ٥٪.

## وظائف فيتامين B<sub>12</sub>:

هناك علاقة بين كل من النشاط الفسيولوجى لكل من فيتامين B<sub>12</sub> وحامض الفوليك (وهو أحد أفراد فيتامينات المجموعة B). يعمل فيتامين B<sub>12</sub> بعد تحويله إلى مرافق إنزيم وهى الصورة النشطة للإنزيم، ويوجد صورتان مرافقتان للإنزيم methy B-12 Coenzyme B-12 (adenocylcobalamine). والصورة الأخرى methy B-12 adenosine coenzyme B<sub>12</sub> ويرجع فى methylcobalamine) ويرجع فى ribonucleoside مرتبط بذرة الكربولت محل مجموعة سيانيد، أما فى methyl B-12 فتوجد مجموعة ميثيل محل مجموعة سيانيد.

ويطلب تحويل الفيتامين إلى مرافق إنزيم مجموعة من العناصر هي ريبوفلافين،  
نياسين، والمغنسيوم.

وتقوم مرافقات الإنزيمات بالوظائف الآتية فى خلايا الجسم، وخصوصاً  
خلايا نخاع الشوكى، الأنسجة العصبية، القناة الهضمية:

- تكوين كرات الدم الحمراء الطبيعية من نخاع الشوكى الذى يتطلب وجود  
مرافقات إنزيم B-12. وفى حالة غيابه يكون نضج كرات الدم الحمراء غير طبيعى  
وتصبح متضخمة غير ناضجة megaloblasts وتسبب أنيميا megaloblastic  
.anemia

- صيانة الأنسجة العصبية وسلامتها، فمرافقات الإنزيمات لازمة لتكوين myelin وهو  
ليبوبروتين.

- ميتابوليزم الكربوهيدرات والدهن والبروتين: إن مرافق الإنزيم مهم لتحويل حامض  
methy-malonate إلى succinate وهذا مهم للميتابوليزم الطبيعى للكربوهيدرات  
والدهون. كما أنه لازم لميتابوليزم البروتين.

- تكوين أو نقل المجموعات ذات ذرة الكربون الواحدة single carbon unit وغالباً  
يدخل B<sub>12</sub> فى تكوين هذه المجموعة ويقوم فيتامين الفولاسين folacin (كما  
سيأتى) بعملية النقل. وعلى هذا يقوم B<sub>12</sub> بمعظم التفاعلات التى يقوم بها  
الفولاسين مثل: تحويل glycine إلى serine والعكس، تكوين methionine من  
homocysteine، تكوين choline من ethanolamine.

- يقوم مرافق إنزيم B<sub>12</sub> بتخليق بجامع CH<sub>3</sub> وفى تفاعلات الاختزال مثل تحويل  
الرابطه (S-S) disulfide إلى مجموعة (-SH) sulfhydryl.

### أعراض نقص الفيتامين B<sub>12</sub> :

يؤدى نقص B<sub>12</sub> إلى الإصابة بالأنيميا الخبيثة pernicious anamia والى تتميز  
بتكوين كرات دم حمراء غير طبيعية، سريعة الهدم مصاحبة لتغيرات مميزة فى نخاع  
الشوكى مع غياب حامض HCl من العصير المعدى. كما تشتمل أعراض الأنيميا  
الخبيثة على اصفرار لون الجسم وتلون اللسان بلون أحمر قانى أو باهت، ويكون طرفه  
أملساً منتفخاً مع نعومة ملمسه وانتفاخ الشفاه ويصاحب تلك الأعراض أيضاً  
اضطرابات فى عضلات الأطراف مع تشنجات عصبية.



ونقص فيتامين B<sub>12</sub> قد يحدث إما نتيجة عجز في تخليق فيتامين B<sub>12</sub> بواسطة فلورا الأمعاء أو لغيابه في الوجبة الغذائية أو لغياب ما يسمى بالعامل الداخلي، وقد يحدث بين بعض النباتيين.

وفي حالة غياب العامل الداخلي فلا يجدى العلاج بتعاطى فيتامين B<sub>12</sub> عن طريق الفم ولابد من إعطاء الفيتامين عن طريق حقن B<sub>12</sub>. ولم يلاحظ أى حالة سمية من زيادته.

### الكميات اليومية الموصى بها من فيتامين B<sub>12</sub> :

حتى عام ١٩٦٨ لم تدرج الكميات اليومية الموصى بها من فيتامين B<sub>12</sub> فى الجداول ضمن الفيتامينات حيث من الصعب تقدير الاحتياجات اليومية منه بسبب إمكانية تخليقه بواسطة بكتريا الأمعاء.


وتوصى هيئة الغذاء والتغذية بالولايات المتحدة الأمريكية (١٩٨٩) بتعاطى الأطفال كميات حوالى ٠,٥ ميكروجرام يوميًا تزداد بالتدرج حتى تصل إلى ٣ ميكروجرام للبالغين كما تزداد إلى ٤ ميكروجرام فى حالات الحمل والرضاعة.

### حامض البنتوثنيك (Vitamin B5) Pantothenic acid :

أطلق Williams وزملاؤه سنة ١٩٣٣ اسم حامض البنتوثنيك على عامل لازم لنمو الخميرة لمركب غير معروف. وفى سنة ١٩٤٠ أمكن عزله والتعرف على تركيبه الكيميائى وتخليقه.

### تركيب الفيتامين :

يتكون حامض البنتوثنيك من جزئين هما الحامض الأمينى β-alanine ومركب آخر مشتق من حامض البوتريك butyric acid وهو dimethyl derivative of butyric acid (شكل ٧ - ١٧) يسمى حامض بانتوثنيك Pantothic acid.



شكل (٧-١٧) تركيب البنتوثنيك

### خواص حامض البنتوثنيك :

الحامض عبارة عن سائل زيتى القوام لزج، يذوب فى الماء والكحول ولا يذوب فى البنزين والكلوروفورم.

وبصفة عامة فإن الفيتامين ثابت أثناء إعداد وطهى الأغذية باستخدام طرق الطهى بالحرارة الرطبة moist heat وخاصة فى الوسط المتعادل، أما عند استعمال طرق الطهى بالحرارة الجافة dry heat أو فى الوسط القلوى أو الحامضى فتفقد كميات كبيرة من الفيتامين.

ويحضر الفيتامين صناعياً فى صورة بللورات عبارة عن بنتوثينات الكالسيوم calcium pantothenate.

### مصادر الفيتامين :

الفيتامين واسع الانتشار فى الأغذية الحيوانية والنباتية، ويلاحظ أن اسم الفيتامين مشتق من الكلمة اليونانية Panto، بمعنى " من كل شئ" أو فى كل مكان وهو اسم مناسب، نظراً لسعة انتشاره، ويوجد فى صورة حامض أو ملح الحامض مثل بنتوثينات الصوديوم أو الكالسيوم ومن أغنى مصادره الخميرة والكبد والبيض والمكسرات والبيض والدجاج. ولكن يوجد كميات صغيرة، فى الخضروات والفواكه. والجدول (٧-٢٠) يوضح محتوى بعض الأغذية من حامض البنتوثنيك.

جدول (٧-٢٠) محتوى بعض الأغذية من حامض البنتوثنيك

المصدر	حامض بنتوثنيك مجم / ١٠٠ جرام
خميرة	٢٠
كبد	٨ (مطهى ٥ - ٦)
لحوم	٠,٣ - ٠,٥
أعماك بحرية	٠,٢ - ١,٠
بيض	١,٠٨ (٠,٧ - ٠,٨ / بيضة مسلوقة)
لبن بقرى	٠,٤
دقيق قمح كامل	٠,٥
دقيق قمح ٧٥٪ استخلاص	٠,٢٣
بطاطس	٠,٦٠
بصلة	٠,٣٤
عسل مطهى	١,٢ / كوب
فاصوليا	٠,١٤
فول سودانى	٢ - ٣ / كوب
عصير برتقال	٠,١٦



- بناء الأحماض الدهنية وإطالتها، وهذا يبدأ بارتباط COA مع حامض الأسيتيك acetic لتكوين أستيل COA المنشط الذى يتحول إلى المالونيل malonyl COA وهو الخطوة الأولى فى بناء الأحماض الدهنية، ويتم بفعل إنزيم محتوى على فيتامين بيوتين Biotin ثم يتم إطالة malonyl COA بإضافة ٢ ذرة كربون ( $C_2$ ) وهكذا... كما يمكن إطالة حامض palmitic ( $C_{16}$ ) إلى حامض Stearic ( $C_{18}$ ) بنفس الطريقة.
- هدم الأحماض الدهنية وذلك عن طريق فصل ٢ ذرة كربون بواسطة COA وانطلاق الطاقة التى تخزن فى ATP.
- تكوين حامض الستريك citric وغيره من المركبات اللازمة لإتمام دورة حامض الستريك وانطلاق الطاقة والاستفادة منها.

.. تشجيع تكوين antibodies التى تساعد على مقاومة الأمراض.

- تكوين الناقل العصبى acetyl choline من الكولين وهو مهم فى نقل الإشارات العصبية للمخ، تخليق Porphyrin والذى يكون Heme اللازم لتكوين كرات الدم الحمراء، وأيضاً تخليق الكولسترول والاستيرولات الأخرى، وتكوين هرمونات غدة الادرنال والغدد الجنسية والحفاظ على مستوى جلوكوز الدم طبيعى وفى تكوين المضادات الحيوية، كما يساعد على التخلص من سموم بعض الأدوية salphonamides.

### أعراض نقص حامض البنتوثنيك :

من النادر حدوث حالات نقص لحامض البنتوثنيك فى الإنسان نظراً لانتشاره فى الطبيعة بصورة واسعة. ولكن أمكن إحداث حالات نقص فى الإنسان عن طريق التغذية على وجبات خالية منه أو بإضافة مضادات للحامض فى الغذاء مثل sulphoantothenic أو methylantothenic acid، والوجبات الخالية من الحامض أظهرت أعراض النقص على هؤلاء الأشخاص بعد حوالى ١٢ أسبوعاً وكانت تشتمل على الصداع والتعب والميل للنوم مع اضطرابات عصبية شديدة. وتقلص العضلات وتميل الأيدي والقدم واضطرابات عصبية وضمور ندة الإدرنال. ولوحظ انخفاض مستوى البنتوثنيك فى الدم فى حالة إحداث النقص.

**مصادر الفيتامين :** واسع الانتشار فى الأغذية.

### **فقد الفيتامين :**

يفقد حوالى ٥٠٪ من الحبوب أثناء الطحن، كما يفقد إلى حوالى ٥٠٪ من الخضروات والفواكه أثناء التعليب أو التجفيد والتخزين، ١٥٪ يفقد نتيجة المعاملات الحرارية ويمكن حفظه أثناء تخزين الأغذية إذا منعت الأكسدة أو درجات الحرارة المرتفعة.

### **الاحتياجات اليومية :**

غالبًا ما تكون الرجة كافية حيث يحتاج الإنسان لحوالى ٥-١٠ مجم من حامض البنتوثينيك يوميًا ويخلق جزء من الفيتامينات بواسطة فلورا الأمعاء؛ ولذا لم توضع مقررات يومية لهذا الفيتامين للإنسان حتى الآن. الكميات الكبيرة (١٠ - ٢٠ ملجم تسبب إسهال وفقد الذاكرة).


### **حامض الفوليك Folic Acid (فولاسين Folacin) (Vitamin M):**

أدت دراسات Lucy Wills سنة ١٩٣١ على سيدات حوامل إلى ظهور نوع من الأنيميا ذات الخلايا المتضخمة megaloblastic anemia نتيجة سوء التغذية كما تمكنت الباحثة من إحداث هذه الأنيميا بأى فيتامين معروف فى ذلك الوقت، ولكن أمكن علاجها بواسطة الخميرة (Wills, ١٩٣٣) وعرف أن الخميرة بها عامل مضاد للأنيميا وسمى بعامل Wills. وفى سنة ١٩٣٥ أحدث Day وآخرون حالة أنيميا فى القُرود leukopenia مع إسهال، وأمكن علاجها بمعامل سُمى بمعامل Bay وفى سنة ١٩٣٨ وصف Manning وStoksau عامل نمو الكسكايت وسمى بالعامل M وفى سنة ١٩٣٩ سجل Hogan وParrot ملاحظتهما عن مضاد عامل للأنيميا فى الكسكايت وسمى B<sub>١٢</sub>. وفى سنة ١٩٤٠ وصف Peterson وSnell عامل نمو للبكتريا وسمى عامل lactobacillus. وتمكن Mitchell وآخرون ١٩٤١ من تحضير هذا العامل من الأوراق الداكنة الخضراء فى النباتات، وأعطى اسم حامض الفوليك، والاسم مأخوذ من الكلمة اللاتينية Folium (Foliage) بمعنى الخضروات الورقية حيث عزل منها. وفى ١٩٤٥ أمكن التوصل إلى أن هذه العوامل سابقة الذكر عبارة عن مادة واحدة أو صور مختلفة لها، وظهر أنها يمكن أن تعالج حالات أنيميا ذات الخلايا المتضخمة، وحالات الإسهال المزمنة وأنيميا الحمل وأنيميا الأطفال.

ثم ثبت أن كل العوامل السابقة عبارة عن حامض بتيروجلوتاميك أو حامض الفوليك أو الفولاسين. وهناك صورة أخرى لحامض الفوليك يسمى فولينك folinic acid أو عامل citrovorum حيث أنه ضروري لنمو leuconostic citrovorum. وفى سنة ١٩٤٧ عرف أن حامض الفوليك يعالج الأنيميا ذات الخلايا المتضخمة الناتجة عن سوء التغذية وأنيميا الحمل.

### تركيب الفيتامين :

يتركب حامض الفوليك من اتحاد نواة بتريدين pteridine ring مع حامض البارامينو بنزويك، الحامض الأميني جلوتاميك (شكل ٧ - ٢١).



### شكل (٧-٢١) تركيب حامض الفوليك

وهناك صور مختلفة لهذا الفيتامين، وهى بترول ثلاثى حامض الجلوتاميك و petroyl-triglutamic acid والذي يحتوى الجزئ منه على ثلاثة جزيئات من حامض الجلوتاميك، بترويل سباعى حامض الجلوتاميك petroyl heptaglutamic acid حيث يحتوى على سبعة جزيئات من حامض الجلوتاميك، وهذه المواد لها فاعلية الفيتامين وتسمى فولات folate، ويمكنها أن تتحول إلى حامض الفوليك، وتعتبر مولدات للفيتامين فى الغذاء.

كما لوحظ أنه باختزال نواة البتريدين ينتج صورة فعالة أخرى للفيتامين أطلق عليها حامض الفوليك folinic acid.

وأكثر الصور انتشاراً فى الجسم وأيضاً فى الأغذية tetrahydrofolic acid (شكل ٧-٢٢).




Fig. 1. Structures of tetrahydrofolic acid. The N-5 and N-10 nitrogen atoms participate in the transfer of one-carbon groups.

## شكل (٧-٢٢)

### خواص حامض الفوليك :

الفيتامين على شكل بللورات صفراء، ضعيفة الذوبان في الماء، وهو ثابت في الوسط الحامضي، وسريع التلف بالحرارة في الوسط القلوي أو المتعادل، ويسهل فقده أثناء الطهي أو التخزين، ويتلف بضوء الشمس.

### مصادر الفيتامين :

تعتبر الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ وغيرها من الخضروات داكنة الخضرة مصادر هامة للفلوولاسين. كما أن الكبد والكلية غنية بالفيتامين، وكذلك بعض الخضروات الأخرى والفواكه بصفة عامة تعتبر مصادر جيدة للفيتامين، أي أن الفيتامين واسع الانتشار في الأغذية المختلفة. ولكن يلاحظ أنه تفقد كميات كبيرة من الفيتامين أثناء تخزينه وتسويق وإعداد وطهي الأغذية قد تصل إلى ٩٠ ٪ (جدول ٧-٢١).

جدول (٧-٢١) محتويات بعض الأغذية من الفولاسين

المصدر	فولاسين (ميكروجرام / ١٠٠ جم)
الكبد	٤٠٠ - ٥٠
الكلية	١٥٠ - ٨٠
سبانخ مطهية (كوب)	٢٥٠
خضروات خضراء	١٣٠ - ٥٠
برتقال	٤٠ - ٣٠
كنتالوب	١٠
بقول مطهية (كوب)	٢٠٠
بقول خضراء	٨٠ - ٥٠

**ميثابوليزم حامض الفوليك :**

ويوجد الفولاسين في الأغذية بصورتين: الصورة الحرة free folates وهي تشكل ٢٥٪ من الفولاسين المتناول وسهلة الامتصاص، والصورة الأخرى مرتبطة وتسمى عديدة الجلوتامين polyglutamates وقبل امتصاص هذه الصورة تفصل جزيئات الجلوتاميك الزيادة ويترك واحد فقط بواسطة إنزيم conjugase ويتم ذلك إما في الأمعاء الدقيقة أو في الجدار. أى أن امتصاص حامض الفوليك يتوقف على فعل الإنزيم الذى قد يتأثر ببعض الموانع inhibitors الموجودة في الغذاء مثل الخميرة. ودرجة امتصاص الفيتامين المرتبط يتوقف على طول السلسلة.

وتختلف درجة امتصاص الفيتامين من ١٠٪ في الخميرة إلى ٨٠٪ فى البيض والكبد، أما فى الفواكه فهى مختلفة، فقد أظهرت بعض الدراسات أن نسبة الامتصاص فى عصير البرتقال ٣١٪ فى حين فى الموز ٨٢٪، ويبدو أن عدد جزيئات حامض الجلوتاميك تؤثر فى درجة الامتصاص.

وبعد الامتصاص ينتقل فى الدم بعد ارتباطه ببروتين ناقل إلى نخاع العظام وإلى كرات الدم الحمراء أثناء نضجها، ويمكن إلى خلايا أخرى. وأكثر صور الفيتامين وجوداً فى أنسجة الجسم هى ميثيل فولات methyl folate. ويوجد فى "سرم" بنسبة ١٦-٢٧ نانوجرام / ١٠٠ مل. ويخزن فى أنسجة الجسم بكمية ١٢-٥ ملجرام نصفها فى الكبد، ويخرج فى البول وبعضه يخرج فى الصفراء.



## وظائف الفيتامين :

بعد امتصاص الفيتامين يمر حامض الفوليك بعدة عمليات اختزال التى تحتاج وجود النياسين ويتكون خمسة مرافقات أساسهم إنزيم tetrahydrofolic acid (شكل ٧-٢٢). ويلاحظ أن ذرتى N رقم ٥، ١٠ تقومان بنقل مجاميع كل مجموعة تحمل ذرة كربون واحدة (one carbon group) قد تكون مجموعة formyl، forminino، methyl، أو methylene.

وتقوم مرافقات إنزيمات الفولاسين بالوظائف التالية :

- تكوين قواعد purines و pyrimidine اللازمة لتكوين الأحماض النووية RNA، DNA وهذا يوضح أهمية الفولاسين فى انقسام الخلية.

- تكوين الهيم من البروتين المحتوى على الحديد فى الهيموجلوبين ولذا هو مهم لتكوين الدم بصورة طبيعية.

- تكوين الحامض الأمينى tyrosine من phenylalanine، والحامض الأمينى glutamic من histidine، والحامض الأمينى methionine من homocysteine وهذا مهم لأن تراكم homocysteine يؤدي إلى مخاطر أمراض القلب.

- تكوين الكولين من الأيثانولامين.

- تكوين dopamine و serotonin وهى ناقلات عصبية مهمة لوظائف المخ مثل النوم والشهية والحالة المزاجية.

- تحويل nicotinamide إلى N-methylnicotinamide وهى ناتج ميتابوليزم النياسين الذى يخرج فى البول.

إن نشاط مرافقات إنزيمات الفولاسين تحتاج إلى وجود B<sub>6</sub>، B<sub>12</sub>، حامض الاسكوربيك.

## أعراض النقص :

- يؤدي نقص حامض الفوليك إلى حدوث أنيميا فى جميع الحيوانات وفى الإنسان، فإن نقص الفولاسين يؤدي إلى حدوث حالة أنيميا ذات الخلايا الدموية الحمراء المتضخمة macrocytic anemia، (أنيميا الحمل)، megablastic anemia (أنيميا الطفولة). وفيما يلي خطوات تكوين ونضج الخلايا الدموية الحمراء، بعد إنتاج الخلايا

الدموية الحمراء فى نخاع العظام، لابد أن تمر بعدة خطوات تسمى نضج الخلايا الدموية الحمراء قبل أن تصل إلى الدم، وفى الخطوة الأولى فإن الخلية الدموية الحمراء غير الناضجة تكون كبيرة بها نواة، وبها قليل من الهيموجلوبين megaloblastic ويتقدم النضج يصغر حجم النواة ويزيد الهيموجلوبين ويصغر حجم الخلية، وتسمى الخلية الدموية الحمراء الناضجة erythrocyte ومن المعتقد أن حامض الفوليك يدخل فى عملية النضج، فى بعض الحالات قد ترجع هذه الأنيميا إلى نقص خلقى فى تكوين إنزيمات الفولاسين.

وفى حالة نقص حامض الفوليك أو الفولاسين نجد أنه يظهر بالدم خلايا دم حمراء متضخمة غير ناضجة immature megaloblast وعدد بسيط من خلايا الدم الحمراء الناضجة، ولأن كمية الهيموجلوبين منخفضة، فإن مقدرة خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين تكون منخفضة، ولذا تظهر على الفرد مظاهر التعب، ويسرع التنفس وتبطئ العمليات الحيوية بالجسم، كما يتغير نحو وتطور الخلايا الدموية البيضاء والصفائح الدموية، ويقل عدد الخلايا الدموية البيضاء، وتقل قدرة الفرد على المناعة ضد العدوى الميكروبية، كما تقل مقدرة الدم على التجلط ويهزل الجسم ويتهب اللسان ويضطرب الجهاز الهضمى ويفشل الامتصاص. وقد يحدث تخلف عقلى. وقد ترجع الإصابة بالأنيميا إلى نقص فى قدرة تكوين نكليوبروتين وهذه الحالة تسبب منع الكرات الدموية الحمراء المتكونة فى نخاع العظام من النضج.

ويمكن للفولاسين علاج حالات الأنيميا ذات الخلايا المتضخمة، وحالة الأنيميا المصاحبة لمرض البلاجر أو أنيميا كل من الحمل والطفولة، وتعود صورة الدم إلى الحالة الطبيعية.

ولقد دلت نتائج بعض الدراسات أن نقص كل من حامض الاسكوربيك وفيتامين B<sub>12</sub> يعوق تكون المرافقات الإنزيمية التى يدخل فى تركيبها حامض الفوليك. ويلاحظ أن النساء فى سن الإنجاب اللواتى يتعاطين حبوب منع الحمل، وأيضاً الحوامل هن أكثر الفئات تعرضاً لنقص هذا الفيتامين كما يسبب النقص أيضاً ولادة أطفال مصابة بالأنثروب العصبى.

تحدث حالات نقص حامض الفوليك نتيجة استخدام بعض العقاقير لمعالجة بعض الحالات المرضية وهنا يفيد فيها تناول حامض الفوليك مثل :

- لوكيميا Leukemia : يستخدم دواء aminopterin فى علاج اللوكيميا وهو مضاد لفعل الفولاسين يلاحظ أن حامض الفوليك يدخل فى تكوين الأحماض النووية داخل النواة وهى لازمة لنمو الخلية. وهذا الدواء يمنع إنتاج كرات الدم البيضاء leucocytes الخاصة باللوكيميا ولكن بعد مدة تقاوم خلايا الكرات البيضاء مفعول الدواء ويتوقف تأثيره.

- السرطان cancer: يعطى لمريض السرطان دواء methotrexate amethopterin (وهو دواء يشابه aminopterin) ومفعول هذا الدواء أنه يرتبط بـ إنزيم dehydrofolate reductase وهذا يمنع ارتباط ذرة الكربون مع حامض الفوليك، وبذلك يمنع تكوين DNA والبيورين purine فى الخلية.

- الإسهال sprue : حامض الفوليك فعال فى علاج الإسهال الناتج عن اضطراب فى القناة الهضمية، وسوء امتصاص الغذاء. ويوجد بالبراز كمية كبيرة من الدهون، كما أن الفيتامين فعال عند الإصابة بالأنيميا macrocytic وحالة سوء تغذية العامة.

#### الكميات الموصى بها يوميًا من الفولاسين : (جدول ٧-٢٢)

جدول (٧-٢٢) كميات الفولاسين الموصى بها يوميًا ١٩٨٩ / الفرد

الفئة	العمر بالسنوات	فولاسين - ميكروجرام
رضع	صفر - ٠,٥	٢٥
	٠,٥ - ١,٠	٣٥
أطفال	١-٣	٥٠
	٤-٦	٧٥
	٧-١٠	١٠٠
ذكور	١١-١٤	١٥٠
	١٥-١٨	٢٠٠
	١٩-٢٤	٢٠٠
	٢٥-٥٠	٢٠٠
	٥١ +	٢٠٠
إناث	١١-١٤	١٥٠
	١٥-١٨	١٨٠
	١٩-٢٤	١٨٠
	٢٥-٥٠	١٨٠
	٥١ +	١٨٠
حامل		٤٠٠
مرضع		٢٦٠ - ٢٨٠

### فقد الفولاسين أثناء الإعداد والطهى :

يتعرض الفولاسين إلى الفقد أثناء عمليتي الإعداد والطهى، ويفقد ٥٠-٧٥٪ من الفولاسين أثناء التخزين على درجة حرارة الغرفة بعد ٢-٣ يوماً. ويمكن حفظ الأغذية فى الثلاجة لمدة أسبوعين بدون فقد يُذكر. ويحدث فقد ٥٠-٩٥٪ من الفيتامين أثناء الطهى والتعليب. ويزيد الفقد كلما ارتفعت درجة الحرارة، استعمال كمية كبيرة من ماء الطهى.. معظم الفولاسين يفقد أثناء غلى اللبن. كما يفقد الفيتامين عند التعرض للضوء. ويلاحظ أن الأغذية الغنية فى فيتامين C تفقد قليلاً من الفولاسين وذلك لأن فيتامين C يمنع فقد الفولاسين من التأكسد.

### حامض فولينيك Folinic acid ( $C_{20}H_{23}N_7O_7$ ) :

حامض فولينيك هو أحد نواتج الفولاسين، وقد يكون هو الصيغة النشطة لحامض الفوليك فى الخلية، ويلزم فيتامينى  $B_{12}$  و C لتحويل الفيتامين إلى حامض فولينيك.

### بيوتين (Vitamin H) Biotin :


اكتشف هذا الفيتامين عندما لاحظ Bateman سنة ١٩١٦ أن نائية الفئران على زلال بيض نسيء أدى إلى ظهور التهابات فى الجلد وفقدان الشعر، ثم وفاة الفئران. وقد عرف العامل السام فى زلال البيض المسئول عن هذه الحالة، وهو بروتين، وسمى أفيدين avidin وهذا يتحد مع البيوتين ويكون مركباً بمعقد لا يتحلل. العصارات الهاضمة أو الأحماض، ١٤ يؤدى إلى نقص البيوتين، ويلاحظ أن الأفيدين يتلف بالحرارة أثناء طهى البيض، حيث يحدث دفعة للبروتين.

وقد أمكن فصل البيوتين والتعرف على تركيبه وتم تخليقه منذ سنوات

١٩٣٦-١٩٤٣.

### تركيب البيوتين :

البيوتين عبارة عن مشتق حلقى من اليوريا يحتوى على حلقة ثيوبين thiophene بها كبريت، وللفيتامين ٨ أيزومرات كان يعتقد أن من بينها واحد فقط هو D-biotin له نشاط الفيتامين، إلا أنه الآن يوجد على الأقل خمسة صور للبيوتين لها النشاط الحيوى للفيامين شكل (٧ - ٢٣).



Structure of biotin.

### شكل (٢٣-٧) تركيب البيوتين

#### خصائص البيوتين :

يذوب الفيتامين بصعوبة فى الماء البارد، وأكثر ذوباناً فى الكحول، ثابت ضد الحرارة ولا يتحلل بواسطة الأحماض أو القلويات القوية والتأكسد والأشعة فوق البنفسجية. ولذا تفقد منه كميات بسيطة أثناء تخزين الأغذية وحفظها وطهيها.

#### مصادر البيوتين :

يوجد البيوتين بصورة واسعة بكميات صغيرة فى جميع الأنسجة الحيوانية والنباتية، وتعتبر الخمائر والكبد والكلبي والبيض والألبان مصادر غنية بالفيتامين كما أنه يوجد فى الحبوب والبقول والمكسرات، وجدول (٢٣-٧) يوضح محتوى بعض الأغذية من البيوتين.

جدول (٢٣-٧) محتوى بعض الأغذية من البيوتين

المصدر	البيوتين (ميكروجرام / ١٠٠ جم)
كبد	١٠٠
لحم بقرى	٢,٦ - ٤,٣
لحم دجاج	١٠,٠
أسماك	٠,١ - ٣,٠
أسماك بحرية	٨
لبن بقرى	٢ - ٥
بيض	١٢ - ٢٥
دقيق قمح كامل	٧ - ١٢
٨٠٪ استخلاص	١,٤ - ٣
أرز (مضروب)	٤ - ٦
تفاح	٠,٩
عصير برتقال	٠,٥ - ١,٥


### میتابولیزم البیوتین :

يتمتص البيوتين بسهولة من الأمعاء الدقيقة، وتحتوى جميع خلايا جسم الإنسان على البيوتين، ويوجد بكميات أعلى فى كل من الكبد والكلى.

ولم تُجرَ الدراسات الكافية لمعرفة المزيد عن ميثابوليزم البيوتين، إلا أن بعض التجارب أثبتت أن إفراز البيوتين فى البول يزداد بزيادة الكمية المتحصل عليها فى الوجبة.

### وظائف البيوتين :

يدخل البيوتين كمرافق إنزيمى فى عمليات إضافة ونزع المجموعة الكربوكسيلية decarboxylation وإضافتها carboxylation (شكل ٧-٢٤). ولذا فإن للفيتامين دور هام فى تفاعلات انطلاق الطاقة من المواد الكربوهيدراتية وفى تفاعلات أكسدة وتخليق الأحماض الدهنية.



Transfer of CO<sub>2</sub> by biotin.

شكل (٧-٢٤) نقل مجاميع كربوكسيل بواسطة Biotin

كما أنه يعمل كمرافق إنزيمى فى تفاعلات نزع المجموعة الأمينية deamination من الأحماض الأمينية، ولذا فله دور هام فى عمليات انطلاق الطاقة من البروتينات. كما أنه مهم لتحويل تحويل التربتوفان إلى نياسين، وكذا عند تخليق أميليز البنكرياس، وهو من إنزيمات carbohydrase الهامة. وله دور فى تكوين الأحماض

DNA و RNA أى أنه مهم لنمو وتكاثر الخلايا وهو مهم أيضاً لسلامة وصحة الشعر والأظافر.

ومن بين تفاعلاته فى ميتابوليزم الكربوهيدرات والدهن والبروتين :

١- التحول المتبادل بين حامض pyruvic وحامض oxaloacetic والمعروف أن oxaloacetic هو الخطوة الأولى فى دورة حامض الستريك citric حيث تنطلق الطاقة من العناصر الغذائية لاستخدامها فى أداء وظائف الجسم.

٢- التحول المتبادل بين أحماض succinate و propionate وبين malate و pyruvate.

٣- تحويل acetyl COA إلى malonyl COA وهى الخطوة الأولى لإطالة سلسلة الأحماض الدهنية.

٤- بناء البيورين purines وهى الجزء الأساسى فى DNA, RNA اللازم لبناء البروتين.

٥- تحويل ornithine إلى citrulline وهى خطوة هامة لتكوين اليوريا urea.

٦- يلاحظ أن البيوتين يساعد فى عملية نزع المجموعة الأمينية deamination لانطلاق الطاقة من بعض الأحماض الأمينية وخصوصاً من حامض aspartic و serine و threonine.

وظائف البيوتين مرتبطة ميتابولياً بوظائف الفولاسين وحامض pantathenic وB<sub>12</sub>.

### أعراض نقص البيوتين :

تحدث أعراض نقص الفيتامين إذا تغذى الفرد على زلال البيض النيء لمدة طويلة نظراً لاحتوائه على avidin، أو تناول أدوية السلفا التى تعيق عمل الفيتامين كما أن هذه الأدوية تمنع الأمعاء من تكوين البيوتين.

وعموماً من النادر حدوث حالات نقص فى الإنسان باستثناء الأطفال، والتجارب التى أجريت بغرض إحداث حالات نقص فى الإنسان استخلص منها أن أعراض النقص بدأت فى الظهور بعد حوالى ٤ أسابيع، اشتملت على الشعور بالتعب والميل للنوم وفقد الشهية. وظهرت أعراض أخرى بعد الأسبوع السابع أو الثامن كانت عبارة عن حساسية فى الجلد مع جفافه وظهور حبوب صغيرة حافة واحمرار اللسان، ثم آلام فى العضلات وأنيميا والإصابة بالاكتئاب. وارتفاع مستوى كولسترول الدم كل هذه الحالات استجابت لتناول البيوتين.

ويوجد ما يشير إلى أنه في الأطفال الرضع عند عمر أقل من ٦ شهور أن التهاب الجلد وتحويل ملمسه إلى زيتي يرجع إلى نقص البيوتين، ويكون هذا مصاحباً بانخفاض مستوى الفيتامين في الدم والبول. ويستجيب الطفل للعلاج عن طريق تعاطيه ٣-٥ ملجم/ اليوم عن طريق الحقن.

#### **الكميات اليومية الموصى بها من البيوتين :**

لم تحدد للآن كميات يومية موصى بها للبيوتين، حيث أنه يُخلق في الجسم بكميات كبيرة بواسطة فلورا الأمعاء، وقد دلت الدراسات على أن الوجبة الغذائية اليومية المتوازنة تحتوي على كميات من البيوتين تتراوح من ٢٨ - ٤٢ ميكروجرام، ولذا يوصى بتناول من ٣٥-٤٠ ميكروجرام (معدل ١٥ ميكروجرام/ ١٠٠٠ كالورى) ويزداد المتناول أثناء الحمل والرضاعة.

#### **مصادره :**

البيوتين واسع الانتشار ويوجد في صورة حرة في الفواكه واللبن ومرتبطة مع البروتين في اللحم وصفار البيض والحبوب والخميرة. والبيوتين الموجود في الذرة وفول الصويا متاح بالنسبة لحيوانات التجارب، أما في القمح فهو غير متاح. وهناك حاجة للمزيد من الدراسات.

#### **نقص الفيتامين :**

يفقد جزء كبير من الفيتامين أثناء طحن الحبوب، ولذا ينصح بتناول الحبوب الكاملة. وحيث أن البيوتين ثابت للحرارة لذا فالفقد قليل أثناء الطهي. ويلاحظ أن بروتين avidin موجود في زلال البيض النيء وحيث أنه يتلف بالحرارة لذا ينصح بطهي البيض جيداً قبل تناوله.

#### **الكولين Choline :**


يرجع اكتشاف الكولين إلى Huntsman, Bear سنة ١٩٣٢، سنة ١٩٣٥ أثناء تجاربهما التي بدأت سنة ١٩٣٠ على الكلاب المنزوع منها البكرياس لدراسة بناء الأحماض الدهنية، وقد توصلوا إلى أن الكولين يمنع ترسيب الدهون، كما ظهر عند نقصه نزيف كلوى وتغيرات في العين، وكذا أنيميا وتضخم في غدة الأدرينالين، وحالة توتر. وفي سنة ١٩٣٧ أظهر Eckstein, Tucker أنه في حالة نقص الكولين



يمكن للحامض الأميني methionine، وليس cysteine، معالجة حالة ارتفاع الدهن في الكبد، وقد أرجع ذلك إلى وجود مجموعة الميثيل في mythionine، ثم توصل Du Vigneaud وآخرون سنة ١٩٣٩، ١٩٤٢، ١٩٤٣ إلى أن مجموع الميثيل في الحامض الأميني يمكن استعمالها في بناء الكولين في الجسم، ثم عرف بعد ذلك تفاعل تبادل بمجموعة الميثيل transmethylation وهو تفاعل هام في ميثيليزم الجسم. وقد عزل الكولين من أحماض الصفراء وعرف تركيبه الكيميائي.

### تركيب الكولين :

الكولين مركب غنى بمجاميع الميثيل (شكل ٧ - ٢٥)



### شكل (٧-٢٥) تركيب الكولين

ويوجد مناقشات عديدة حول اعتباره فيتامين أو مشابه فيتامين (vitamin-like)

ويساند الرأي الأول أنه فيتامين :

١- أن الفيتامين مطلوب للنمو في معظم الكائنات الحيوانية وأن نقصه يسبب ضرراً في الكلى والكبد في حيوانات التجارب مثل الفيران والكلاب والكاكيت والخننازير والعجول والبطة والقرود.

٢- وإن كان يمكن تكوينه في جسم الإنسان من methionine و serine بمساعدة فيتامين B<sub>12</sub> والفولاسين كمراقات إنزيمية إلا أن تكوينه ليس بالسرعة اللازمة كما أن الكمية المنتجة ليست كافية وذلك في معظم الحيوانات وخصوصاً النامية، علاوة على أنه لا بد من وجود الأحماض الأمينية والإنزيمات اللازمة لتكوينه.

٣- الكولين مكون هم في الفوسفوليبيدات لسثين lecithin وسفنجومايلين Sphingomyelins وهذا يكوّن ٧٠ - ٨٠ ٪ من فوسفوليبيدات الجسم، والمعروف أن اللسثين مهم في ميثيليزم الدهن في الكبد، أما الاسفنجومايلين

فهو مهم للمخ والأنسجة العصبية. كما أن الكولين مولد للأستيل كولين acetylcholin الناقل العصبى الهام فى نقل الإشارات العصبية.

أما رأى الثانى القائل بأنه شبيه فيتامين فيستند على :

- ١- لا يوجد أى أعراض نقص خاصة به أمكن تحديدها فى الإنسان.
- ٢- أن الجسم يكونه بقدر مناسب لا يحتاج إلى ضرورة إضافته إلى الغذاء.
- ٣- يستخدمه الجسم بكميات كبيرة أكبر من أى فيتامين آخر.
- ٤- يدخل فى بناء جدر الخلايا والأعصاب وليس بوظيفة مساعدة إتمام التفاعلات التى يتميز بها الفيتامينات.
- ٥- لا يساعد فى الكائنات الدقيقة مثل باقى فيتامينات B وقليل من الكائنات الدقيقة تحتاجه للنمو.

### خواص الكولين :

الفيتامين عبارة عن بلورات هيجروسكوبية، عديمة اللون. والكولين قاعدة قوية. طعمه مر، لا يتأثر بالحرارة أو التخزين.

### مصادر الكولين :

يوجد الفيتامين منتشرًا بصورة واسعة فى الطبيعة إما فى بعض الفوسفوليبيدات مثل لستين lecithin أو كمركب استيل الكولين acetylcholine، يوجد بتركيزات عالية فى معظم أنسجة الحيوانات (١٠٠ - ٦٠٠ مجم / ١٠٠ جرام) صفار البيض يعتبر أغنى المصادر فى الكولين، فهو يحتوى على أكثر من ١٧٠٠ مجم / ١٠٠ جرام، وتحتوى الحبوب ٥٠ - ٨٠ مجم / ١٠٠ جم والخضروات على حوالى ٣٠ مجم / ١٠٠ جرام. (وقد يوجد حرا بها) وفى اللحوم الحمراء (١٠٠ - ٤٠٠ ملجم / ١٠٠ جم) وفى الكبد والكلى (٥٠٠ - ٦٠٠ ملجم / ١٠٠ جم)، كما أنه يمكن تكوينه فى الجسم.

### ميتابوليزم الكولين :

أوضحت بعض الدراسات أن معظم الكولين المتحصل عليه من الغذاء يهدم بواسطة بكتريا الأمعاء إلى مركب ثلاثى ميثيل الأمين trimethylamine. ويخلق فى الكبد من الأحماض الأمينية methionine و serine بمساعدة الفيتامينات B<sub>12</sub> والفولاسين كمرافقات إنزيمية.

## وظائف الكولين :

١- يقوم الكولين بتكوين لسثين lecithin وهو الفوسفوليبيد الذى يمنع تكوين الكبد الدهنية، أى أنه عامل lipotropic الذى يمنع تراكم الدهون فى الكبد بتشجيع نقلها خارج الكبد أو تمثيلها داخل الكبد. وبدون ذلك يترسب الدهن فى الكبد فلا تقوم بوظائفها مما يضر الجسم ضرراً بليغاً.

٢- يتحد مع حامض أستيت acetate ليكون acetylcholine وهو الناقل العصبى المهم لنقل الإشارات العصبية عبر الخلايا العصبية.

٣- تسهيل الميثابوليزم facilitation : وذلك لأن وجود مجموعة الميثيل ( $\text{CH}_3$ ) يمكن نقلها من مركب لآخر ويطلق عليها "متغيرة" labile فى عملية نقل مجاميع الميثايل transmethylation اللازمة لتكوين بعض المركبات مثل creatine اللازم لميثابوليزم العضلات، إضافة مجاميع الميثيل إلى بعض المركبات الناتجة من الميثابوليزم لإخراجها خارج الجسم، تخليق عدد من الهرمونات مثل نورانفرين norepinephrine.

ويوجد بعض المركبات التى يمكن أن تحل محل الكولين مثل البتاين betaine (واسمه مشتق من الكلمة اللاتينية beta -من عائلة البنجر beet) وهو مصدر غنى له، وينتج betaine من أكسدة choline وهو مركب ميثابوليزمى وسطى ينتج عند تبادل مجاميع الميثيل وله نشاط فى نقل الدهون lipotropic.

## أعراض النقص أو الزيادة :

من النادر حدوث نقص للفيتامين فى الإنسان، إلا أنه إذا حدث نقص فإن الأعراض تشتمل على ترسب الدهون فى الكبد وإعاقة وظائفها، اضطرابات فى ميثابوليزم الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، واضطرابات فى الجهاز العصبى. ولم يلاحظ أعراض تسمم إلا إذا تناول الفرد كيات تصل إلى ٢٠ جم يومياً لعدة أسابيع.

## الكميات اليومية الموصى بها :

نظراً لأنه لم يحدث نقص فى الكولين فى الإنسان وأن الوجبات المتزنة تحوى على ١٠٠ ملجم، فإنه لم تحدد الكميات اليومية الموصى بها للفرد. ولكن عام

١٩٨٩ أوصى فى الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون المتناول يومياً ٥٥٠ ملجم للرجال، ٤٢٥ ملجم للنساء و ٤٥٠ ملجم للحوامل و ٥٥٠ ملجم للمرضعات. ويجب يومياً ألا يزيد المتناول عن ٣ جم يومياً حيث يؤدى ذلك إلى فقد الشهية واضطراب الهضم وانتعاش رائحة السمك من الفرد fish body odor. ويلاحظ أن الجسم يحصل على الكولين من المصادر الخارجية، منها الغذاء أو مصادر داخلية فى الجسم كما سبق.

### فيتامين ج Vitamin C :

#### حامض الاسكوربيك، حامض الاسكوربيك اللاهيدروجينى

: Ascorbic acid, Dehydroascorbic acid


عرف فيتامين (C) منذ أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر أثناء الرحلات الاستكشافية حول الكرة الأرضية حيث كان يصاب البحارة بمرض الاسقربوط scurvy، وكان هذا يعرق عمليات الاستكشاف، أثناء رحلة فاسكو دى جاما الشهيرة سنة ١٤٩٧ حول رأس الرجاء الصالح، مات أكثر من ثلثى البحارة بمرض الاسقربوط، وفى سنة ١٥٥٣ عانى من هذا المرض أفراد، رحلة جاك كارتية لاكتشاف أراضى العالم الجديد حينما اضطروا لتمضية فصل الشتاء فى كندا، كما كان هذا المرض منتشرًا فى شمال أوروبا. إلى أن توصل Lind الجراح البريطانى سنة ١٧٤٧ - أثناء تجاربه على البحارة - إلى أن كل من عصير الليمون وعصير البرتقال فعال فى علاج الاسقربوط، كما تمكن هذا الطبيب من تركيز وحفظ عصير الموالح لاستعماله عبر البحار. وفى سنة ١٧٩٥ كان يعطى عصير الموالح يومياً للبحارة.

وجدير بالذكر أن مرض الاسقربوط عرف ووصف وكتب عنه على أوراق البردى بواسطة قدماء المصريين منذ ٢٤٠٠ سنة قبل الميلاد، وكان هذا المرض منتشرًا فى أنحاء كثيرة من العالم.

وفى سنة ١٩٢٨ تمكن Gyorgyi من عزل حامض الاسكوربيك من عصير الموالح والكرنب، وفى سنة ١٩٣٣ عرف تركيبه الكيميائى وسمى بفيتامين (C) أو حامض الاسكوربيك.

## تركيب الفيتامين :

هناك مركبان هما الفعل الحيوى لفيتامين (C) هما المركب 1-ascorbic acid والذي يطلق عليه دائماً فيتامين (C)، وهو عبارة عن صورة 3-keto للمركب 10gulofuranolactone-، أما الأيزومر d فليس له الفعل الحيوى للفيتامين. والمركب الآخر هو حامض الاسكوربيك اللاهيدروجينى، والذي ينتج من الأكسدة العكسية لحامض الاسكوربيك (شكل ٧ - ٢٦).



شكل (٧-٢٠) تركيب حامض الاسكوربيك (أ)  
حامض الاسكوربيك اللاهيدروجينى (ب)

## خواص الفيتامين :

أمكن فصل وتصنيع حامض الاسكوربيك فى صورة بللورات بيضاء تذوب بسهولة فى الماء، والمحلول المائى من هذا الحمض (٠,٥٪) له حامضية و pH (رقم حموضة) حوالى ٣.

والفيتامين فى صورة بللورات جافة يكون ثاباً، والمحلول المائى منه ثابت فى الوسط الحامضى فقط ويهدم بسهولة فى الوسط القلوى وبفعل الأكسدة والحرارة والضوء. والفيتامين سهل الأكسدة، حيث يتحول إلى حامض الاسكوربيك اللاهيدروجينى dehydroascorbic acid وله نشاط الفيتامين، ولذا يطلق على هاتين الصورتين حامض الإسكوربيك، ولكن حامض الاسكوربيك اللاهيدروجينى قد

يتأكسد أكسدة غير عكسية ويفقد فعله الحيوى. وتساعد على عمليات الأكسدة وجود آثار من أيونات المعادن الثقيلة كالنحاس والحديد.

ويتأكسد حامض الاسكوربيك اللاهيدروجينى أكسدة غير عكسية إلى ٢-٣ حامض ثنائى كيتوجيولونيك 2,3-diketoguloic acid وهو مركب ليس له الفعل الحيوى للفيامين، والذي ينقسم بسرعة إلى حامض ثريونيك threonic acid وحامض أكساليك oxalic acid وذلك عند درجات حموضة أعلى من ٤.

#### مصادر فيتامين (C) :

يوجد فيتامين (C) بتركيزات عالية فى بعض الأغذية النباتية مثل الجوافة والخضروات الورقية والخضروات والموايح، ويوجد بصفة خاصة فى الأجزاء الغضة من النبات، ولا يوجد فى الحبوب أو البذور الجافة. وتعتبر الأغذية الحيوانية فقيرة فى فيتامين (ج) باستثناء الكبد. ويوضح جدول (٧-٢٤) بعض مصادر فيتامين (ج) الغذائية.

جدول (٧-٢٤) محتوى بعض الأغذية من حامض الاسكوربيك

الغذاء	حامض الاسكوربيك (مجم / ١٠٠ جم)
جوافة	٢٠٠ - ٣٠٠
حريت فروت	٩٤ (ثمرة متوسطة)
مقدونس	١٥٠ - ٢٠٠
فلفل أخضر	١٢٠ - ١٥٠
سبانخ	٦٠ - ٩٠
كرنب	٥٠ - ٦٠
موايح	٤٠ - ٧٠
مانجو	٦٠ (ثمرة متوسطة)
يامية	١٥ - ٤٠
طماطم	٢٠ - ٣٥
بصل	٢٠ - ٣٠
بطاطس	١٠ - ٣٠
بقوليات خضراء (بصلة - فاصوليا)	١٠ - ٣٥
كبد	١٠ - ٤٠
لبن الإنسان	٤ - ٨
لبن بقرى	١ - ٢ (٢ - ٤ / كوب)

ومحتوى الأغذية من حامض الاسكوربيك لا يختلف من غذاء إلى آخر فقط، بل يختلف داخل النوع الواحد تبعاً للصنف ودرجة النضج حيث يقل الفيتامين بزيادة النضج، والمعاملات الزراعية المختلفة التى يتعرض لها الغذاء من حيث نوع التربة وكمية مياه الري، درجة الحرارة، الضوء، حيث يزيد الفيتامين بزيادة التعرض للشمس... وغيرها.

كما أن فيتامين (C) يتأثر بدرجة كبيرة بعمليات إعداد وتسويق وطهى وتخزين الأغذية، ويعتبر أكثر الفيتامينات قابلية للفقء سواء عن طريق الذوبان أو الأكسدة، ولذا يستخدم كدليل حساس على كفاءة العمليات المختلفة وأثرها على القيمة التغذوية للأغذية.


ويعتبر فيتامين (C) فى الموالخ والطماطم ثابتاً لحد كبير نظراً لتوافر الوسط الحامضى، وعموماً فإن الأغذية النباتية تحتوى على إنزيمات أكسدة مثل oxidases, peroxidases التى تقوم بتسهيل أكسدة الحامض إلى صورة الحامض اللاهيدروجينى ثم إلى الصور غير الفعالة حيويًا وبالتالي فقد الفيتامين.

ويوضح الشكل (٧-٢٧) النسبة المئوية لكمية فيتامين (C) المتبقية فى البسلة الخضراء بعد طهيها وحفظها بطرق مختلفة، والتى يتضح منها هدم كميات كبيرة من الفيتامين نتيجة للمعاملات الحرارية التى تتعرض لها الخضروات، لذا يجب الحرص على تناول الأغذية الطازجة fresh مثل بعض أنواع الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامين.

### ميثابوليزم الفيتامين :

لا يستطيع الإنسان -على عكس بقية الحيوانات، فيما عدا خنازير غينيا- أن يخلق حامض الاسكوربيك فى جسمه، بل يعتمد على الغذاء للحصول على احتياجاته من الفيتامين.

وعموماً فإن الفيتامين يمتص من الأمعاء بسهولة ومباشرة، ويوجد فى جميع خلايا وسوائل الجسم ويوجد بتركيزات عالية فى الكبد. كما يوجد فى شبكية العين وغدة الأدرينال والنخاع الشوكى. كما يوجد فى الطحال والدم وخلايا الدم. وقد توصل Stone سنة ١٩٨١ بعد تجارب استغرقت حوالى ٤٠ عاماً، إلى أن هذا الفيتامين هام للجسم ويعتبر الوقود الأساسى اللازم لتشغيل جميع أجهزة الجسم.



شكل (٧-٢٧) النسبة المئوية للمتبقى من فيتامين (C) أثناء طهي البسلة بطرق مختلفة

إليزيس نوار، سهير نور، منى بركات (١٩٩٠).



ورجد كلاً من صورتى الفيتامين فى خلايا وسوائل الجسم، وكان لهما نفس النشاط الفسيولوجى فى الأنسجة. وتعتبر عملية تحويل الفيتامين من الصورة المختزلة إلى الصورة المؤكسدة من الأمور المهمة فى نظام الأكسدة والاختزال redox system، وغالباً تحدث هذه العملية بمساعدة السلسلة الببتيدية الجلوتاثيون و NADP, NAD علاوة عن مساعدة المرافقات الإنزيمية.

ولا يستطيع جسم الإنسان تخزين فيتامين (C) إلا بضعة ملليجرامات فى الكبد (١٠ - ٣٠) تفرز الكميات الزائدة من حامض الاسكوربيك مع البول فى صورة حامض اكساليك، علاوة على كميات صغيرة فى صورة حامض ثنائى الكيتوجيولونيك.

وهذه الكمية المختزنة فى الجسم تمنع ظهور أعراض نقص لا تظهر إذا لم يتناول الفرد الفيتامين لعدة أسابيع.

#### **وظائف الفيتامين :**

مازالت وظيفة فيتامين (C) فى جسم الإنسان غير واضحة تماماً وتحتاج إلى كثير من الدراسات. ويمكن تلخيص أهم نتائج التجارب والدراسات البحثية للتعرف على وظائف فيتامين (C) فيما يلى :

- فيتامين (C) وجوده ضرورى لإنضاج maturation وصيانة الكولاجين collagen فى جميع أنسجة الجسم. والمعروف أن هذه المادة تكون الأنسجة الضامة التى تعمل على ربط الخلايا والأنسجة بعضها ببعض. فقد أظهرت التجارب أنه يتطلب لإنضاج الكولاجين كميات هائلة من الأحماض الأمينية lysine و proline، ويلزم ذلك تحول حامض proline إلى hydroxyproline، lysine إلى hydroxylysine خلال تفاعل إنزيمى يتطلب وجود حامض الاسكوربيك. وفى حالة عدم توافر هذه الأحماض الأمينية بكميات كافية، فإن عملية إنضاج الكولاجين تكون غير كاملة، وتكون الأنسجة الضامة غير مطاطة يمكن هدمها بسرعة.

كما لوحظ أن حامض الاسكوربيك ضرورى للمحافظة على مطاطية واستاتيكية وقوة جدار الأوعية الدموية، وفى حالة نقص الفيتامين اللازم، فإنه تصبح جدر الأوعية الدموية أكثر قابلية للكسر أو الانفجار، ويظهر ذلك فى صورة نزيف بسيط تحت الجلد. والفيتامين أيضاً يساعد على التئام الجروح والكسور.

وقد أجرى الطبيب الجراح Grandon سنة ١٩٨١ فى بوسطن تجربة على نفسه حيث تناول وجبات غذائية فقيرة فى محتواها من حامض الاسكوربيك لمدة ستة شهور، فلاحظ تكوين نقر incisions على سطح الجلد. كما لاحظ عدم التآم الجروح فى حالة نقص فيتامين (C).

- يساعد الفيتامين فى نشاط الخلايا البالعة phagocytes وفى تكوين الأجسام المضادة antibodies.

- فيتامين (C) يلعب دوراً هاماً فى تكوين العظام والأسنان بصورة طبيعية، نتيجة لأهميته فى تكوين protein matrix لكل من العظام ولإنامل أو عاج الأسنان. وفى حالة نقص فيتامين (C) تظهر شقوق وعيوب فى العظام الطويلة خاصة عظام الساقين، حيث لا تتم عملية التكلس، كما أن الأسنان تصبح رقيقة السُمك thin وضعيفة وسهلة الكسر نتيجة نقص الإنامل dentin.

- يقلل الفيتامين من احتياج الحيوان إلى الثيامين والريبوفلافين وحامض البتوثنيك والفولاسين وفيتامينات A, B, وقد يكون ذلك فى الإنسان.

- لفيتامين (C) أهمية خاصة فى تكوين الدم بصورة طبيعية حيث لوحظ أنه يفيد فى وقاية الأطفال من الأنيميا ذات خلايا الدم الحمراء المتضخمة megaloblastic anemia، وقد يرجع ذلك إلى أهمية فيتامين (C) فى عملية تحويل الفولاسين إلى صورة النشطة حامض فولينيك folinic، كما أن لفيتامين (C) علاقة بالوقاية من الأنيميا الخبيثة pernicious anemia مع فيتامين B<sub>12</sub> حيث لوحظ انخفاض مستوى حامض الاسكوربيك فى بلازما المصابين بهذا النوع من الأنيميا.

- يساعد فى التخلص من الأمونيا الناتجة من المجاميع الأمينية المزالة من الأحماض الأمينية بتحويلها إلى يوريا تخرج فى البول.

- يزيد فيتامين (C) من امتصاص الحديد والاستفادة منه، حيث أنه يساعد على وجود الحديد فى صورة مختزلة (حديدوز) كما يساعد فى نقل الحديد من بروتين البلازما إلى بروتين الأعضاء، ويساعد أيضاً على تخزين الحديد فى نخاع العظام وكذا الطحال والكبد.

- يساعد فى تخليص الجسم من بعض السموم وخصوصاً وأن الفيتامين يساعد فى ارتباط الحديد مع الهيم، الذى يصبح جزء من بروتينات تحمل السموم للخارج.

- فيتامين (C) له علاقة بميتابوليزم بعض الأحماض الأمينية، حيث لوحظ أهميته فى المحافظة على الميتابوليزم الطبيعى للحامض الأمينى تيروسين tyrosine، حيث وجد فى بول الأطفال المصابة بنقص فيتامين (C) بعض نواتج الأكسدة غير التامة لحمض tyrosine، كما يعتقد أن عمليات تحويل كل من tyrosine و phenylalanine إلى هرمونات وهى thyroxine و adrenaline و norepinephrine يتطلب وجود فيتامين C، وكذلك عملية تحويل الحامض الأمينى tryptophan إلى المركب serotonin، و tyrosine إلى catecholamines. وهذه ناقلات عصبية neurotransmitter مهمة لعمل المخ، وأيضاً لتكوين الميلين myelin وخلايا الجليا glial cells فى المخ (Katsuki ١٩٩٦).

- يعمل فيتامين C كمضاد للأكسدة antioxidant فهو يحمى كل من فيتامين A، E والأحماض الدهنية عديدة عدم التشبع من الأكسدة، وفيتامين C يعطى هيدروجين إلى فيتامين E فيستعيد نشاطه، وبذا فهوبقى من العديد من الأمراض كما أنه يعمل على إيقاف تفاعلات الأصول أو الشوارد الحرة Free radicals الضارة والبروكسيدات فى الوسط المائى ويحمى العين منها، وهو يعمل كمناخ للهيدروجين أو صاحب للأكسجين ولذا فهو مهم فى عمليات الأكسدة والاختزال.
- أظهرت نتائج تجارب أجريت على خنزير غينيا guinea pig أن نقص فيتامين (ج) يتسبب فى خفض مقدرة الكبد على التخلص من التأثير السام لبعض العقاقير.
- يساعد حامض الاسكوربيك على خفض المستويات المرتفعة من الكوليستيرول والجليسريدات الثلاثية فى الدم، حيث يساعد فى تحويل الكوليستيرول إلى أحماض صفراء مما يدل على أهميته فى الوقاية من أمراض القلب الوعائية.
- يحمى الجسم من تكوين حصوة المرارة gallstone.
- يعمل فيتامين (C) كمضاد للهستامين وهو هرمون مرتبط ببعض أمراض الحساسية.
- بالنسبة لدور حامض الاسكوربيك فى وقاية وعلاج الأمراض المعدية، فأوضحت كثير من الدراسات والتجارب التى نوقشت نتائجها سنة ١٩٧١ أن تناول كميات يومية من الفيتامين حوالى ٣٥ ملليجرام لا تكفى لوقاية الجسم من نزلات البرد

والعدوى، ولذا زادت الكميات الموصى بها من قبل هيئات الغذاء والتغذية العالمية منذ سنة ١٩٧٤ لتصل إلى ٦٠ مجم يوميًا للبالغين، وفي نفس الوقت أوصى بعدم تناول جرعات كبيرة بصفة روتينية حيث أنها تؤدي إلى ظهور أضرار صحية منها ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. فى عام ١٩٦٨ أعلن العالم الكيميائى Pauling نظريته الخاصة بأهمية فيتامين (C) فى وقاية وعلاج نزلات البرد، وأجريت العديد من التجارب والدراسات للتأكد من صحة هذه النظرية. وأكد كل من Pauling و Meier ١٩٧٥ عدم صحة نظرية Pauling وأوضح أن دور فيتامين (C) فى وقاية وعلاج البرد إنما يرجع لتأثيره المضاد للهستامين، وأوضح أن الجرعات الزائدة من فيتامين (C) لها تأثيرات سلبية على صحة الإنسان، منها:

- \* تثبيط فيتامين ب١٢ وظهور أعراض الأنيميا الخبيثة.

- \* زيادة إفراز حامض اليوريك uric acid فى البول، وذلك يؤدي إلى إهلاك الكلى، وإتاحة الفرصة لتكوين الحصوى عند بعض الأفراد.
- \* لرحظ أعراض إسهال وآلام فى البطن.
- \* ارتفاع نسبة كولسترول الدم.

والفيتامين عامل مساعد فى العمليات اللازمة لتكوين الإنزيمات المحتوية على حديد ونحاس (metallo enzymes) فى صورتها المختزلة.

وحديثاً ظهر أن الفيتامين له دور فى تقليل أكسدة الليبوبروتينات الخفيفة LDL لأن LDL المؤكسدة تؤدي إلى تصلب الشرايين، كما أنه يلزم لتكوين مختلف الإيكوزانويدات eicosanoids ولذا فهو له دور فى منع تجلط الدم والحفاظ على الأوعية الدموية (Horrobin ١٩٩٦)، وأيضاً فى حماية DNA من التلف وحماية الجسم من المخاطر الناتجة من أفراد الأكسجين أو النتروجين النشطة و reactive oxygen or nitrogen species (Young وآخرون ١٩٩٠، Drake ١٩٩٦). كما أن الفيتامين يحمى خلايا الدم البيضاء phagocytes من الأكسدة (Lenton وآخرون ١٩٩٩).

### أعراض النقص :


تشتمل أعراض نقص فيتامين (C) على أعراض عامة تتضمن الشعور بالتعب بعد أقل مجهود، اعتلال الصحة وضعف المقاومة للعدوى ثم آلام فى المفاصل وصعوبة

انتفاخ الجروح، وفي حالات النقص الشديدة يصاب الفرد بمرض الاسقربوط حيث يصاب الفرد بهزال، وآلام شديدة في عضلات الأذرع والأرجل وفي المفاصل مع تضخمها وجفاف الجلد وحدوث نزيف تحت الجلد في صورة بقع دموية ويرجع ذلك إلى ضعف حدر الأوعية الشعرية نتيجة لنقص الكولاجين المكون للمواد اللاصقة بين الخلايا. كما يصاب الفرد بأنيميا ذات خلايا الدم الحمراء المتضخمة Macrocytic anemia.

ويتقدم الحالة تتورم اللثة وتصبح شبه اسفنجية ولا يكتمل بناء الأسنان وتنظيمها وفي الحالات الشديدة يزيد ورم اللثة وتقرح وتسقط الأسنان أو تختفى تحت اللثة (شكل ٧-٢٨).

وقد يحدث اضطراب في الجهاز العصبي مع تشنجات ويسرع النبض وتزرق الشفاه والأظافر وينخفض ضغط الدم، وقد يحدث نزيف في المخ، وتنتهى الحالات الشديدة بالوفاة.

ويشير Ramakrishna (١٩٩٩) أن نقص فيتامين C يؤثر سلبيًا على عمليات الميتابوليزم في المخ ويقلل القدرة على التعلم.



شكل (٧-٢٨) حالة اللثة والأسنان في حالة نقص فيتامين C

**الكميات اليومية الموصى بها من الفيتامين :**

تبعًا إلى RDA (١٩٨٩) فإن احتياجات الشخص البالغ من فيتامين C يوميًا هي ٦٠ ملجم والمرأة ٥٠ ملجم.

ولكن فى حالة الحمل فإن RDA (١٩٨٩) توصي بأن تتناول المرأة ٨٠ ملجم/ يومياً، وأثناء الرضاعة ١٠٠ ملجم / يومياً.

أما الأطفال أقل من سنة، فإن احتياجاتهم ٣٥ ملجم يومياً تزداد إلى ٤٥ ملجم حتى سن ١٠ سنوات.

ويلاحظ ضرورة الاهتمام بإعطاء الأطفال ابتداءً من الشهر الثالث عصير خضروات أو فواكه كمصدر لفيتامين (C) حيث أن اللبن سواء لبن الأم أو الأبقار فقير فى محتواه من فيتامين (C).

### مشابهات الفيتامينات Vitamin-like Substances :

مشابهات الفيتامينات هى مواد لا تعتبر فيتامينات ولكنها مشابهات للفيتامينات فى نشاطها وفى تركيبها، ويعتبر بعضها من مجموعة فيتامينات B ويطلق عليها أيضاً vitamers. وهى إن كان لها نشاط إلا أنه أقل من الفيتامينات وإن وجودها يخفف من نقص الفيتامينات.

وعندما تذكر فإنه يكتب عنها فى الهامش أنه لم يتم بعد التعرف على فائدتها التغذوية بالنسبة للإنسان. وعندما يكتب عنها الباحثون فإنه يكون ذلك لغرض تاريخي وللعلم بها، وتشجيع إجراء البحوث فى هذا المجال، علماً بأنه دائماً يكون هناك فجوة بين الوصول إلى الإثبات العلمى وبين قبولها كفيتامينات.

ومن مشابهات الفيتامينات :

- ١- بيوفلافينويدات 1-Bioflavonoids
- ٢- كارنتين 2- Carnitine
- ٣- يوبيكوينون 3- Ubiquinone
- ٤- اينوسيتول 4- Inositol
- ٥- حامض ليبويك 5- Lipoic acid
- ٦- حامض بنجاميك 6- Pangamic acid
- ٧- حمض بارا أمينوبنزويك 7- Paraaminobenzoic acid
- ٨- حامض أوروتك 8- Orotic acid

9- Laetrile, amygdalin

٩- لآريل، أمجدالين

Nitrosides vitamin B<sub>16</sub>

(نتريلوسيد) فيتامين ب<sub>١٦</sub>

10- Vitamin U

١٠- فيتامين U

S-methylmethionine

### ١- البيوفلافونويدات (فيتامين ب) : Bioflavonoids (vitamin P)

يرجع تاريخ اكتشاف البيوفلافونويدات في منتصف الثلاثينات من القرن العشرين بواسطة Szent-Györgyi العالم المجرى، ولكن لم يثبت لآن أهميتها في الغذاء، وتعرف بفيتامين P، وهى مجموعة من الصبغات الموجودة فى الخضروات والفواكه والأزهار والحبوب، مثل anthocyanins, anthoxanthins.

وهى توجد مع فيتامين C فى المصادر الطبيعية، ولكن لا توجد فى مستحضرات هذا الفيتامين. ويرجع اسم flavonoid إلى أن اللون الأصفر هو الأساس فى معظمها، وهو مشتق من الكلمة اللاتينية "flavus" للون الأصفر. والآن أمكن تحديد أكثر من ٨٠٠ نوع منها أكثر من ٣٠ موجود فى المراجع.


وأكثر البيوفلافونويدات المعروفة هى :

hesperidin - الهسبريدين

naringin - نارنجين

ruten - روتين

يوضح شكل (٧-٢٩) تركيب بعض الفلافونيدات.



شكل (٧-٢٩) تركيب بعض الفلافونيدات

ويوجد hesperidin فى الأزهار والفواكه غير الناضجة، وفى قشر البرتقال السكرى الناضج، كما يوجد فى الليمون واليوسفى والبرتقال البلدى. وتحتوى البرتقالة الناضجة على ١ جم من هذه المادة، وعادة تستخدم فى التصنيع.

ويوجد naringin فى الجريب فروت، ويتميز بطعمه المر الذى يعطى الجريب فروت نوعاً من المرارة، وعادة يستخدم فى إعداد بعض المشروبات.

و nuten ويوجد فى مجموعة من النباتات وفى الأوراق الخضراء المجففة، وتحضر منه بعض كبسولات فى مصانع الأدوية لاستخدامها فى معالجة جدر الشعيرات الدموية الضعيفة والشديدة المسامية.

وتمتص هذه الفيتامينات وتخزن فى الجسم بنفس طريقة ميتابوليزم فيتامين C، وتخرج الكميات الزائدة عن طريق البول.

وهى مركبات سهلة الذوبان فى الماء ملونة لا تتأثر بالحرارة أو الأكسجين أو التحفيف أو الأحماض المخففة، ولكنها سريعة التلف بواسطة الضوء.

وترجع أهميتها إلى :

١- دورها فى تقوية الشعيرات الدموية التى تصل فروع الشرايين بالأوردة حيث يحدث تبادل الدم النقى. مما فيه من أكسجين وعناصر غذائية ليصل إلى جميع أنسجة الجسم من خلال القلب، والدم غير النقى المحمل بشائى أكسيد الكربون وفضلات الميتابوليزم، توطئة لخروج الفضلات خارج الجسم. ولهذا فإن نسبة مسامية هذه الشعيرات محدودة ومنظمة حسب حاجة الجسم. فإذا زادت المسامية وأصبحت جدر الشعيرات ضعيفة فإن خروج الدم أثناء عملية التبادل يكون كبيراً نسبياً وتظهر بقع نزيف تحت الجلد، كما تسبب أيضاً فى خروج الماء وتراكمه فى الأنسجة (إدما edema). إن ميكانيكية عمل flavonoids غير معروفة، ولكن المعروف أن ضعف الشعيرات الدموية مرتبط بنقص فيتامين C، وأيضاً مرض الاسقربوط، ولكن حيث أن flavonoids موجودة دائماً مع فيتامين C فى الطبيعة، فيبدو أنهما يعملان معاً فى المحافظة على جدار الأوعية الدموية وتنظيم مساميتها.



٢- كما تعمل هذه bioflavonoids كمضادات للتأكسد فى الأغذية، وتأتى فى مرتبة تالية لفيتامين E، فهى تحمى الأغذية المحتوية عليها من التأكسد والتدهور، وزيادة مدة بقائها سليمة، وتحسن طعم الأغذية، كما تزيد من مدة صلاحية الوجبات المحتوية على الأغذية الحيوانية السريعة التلف والتأكسد.

٣- هذه المواد سريعة الاتحاد مع المواد المعدنية التى قد تؤثر على نشاط الإنزيمات وتؤثر على جدر الخلايا.

٤- لها دور فى المحافظة على فيتامين C فى أنسجة الجسم.

٥- تشترك مع فيتامين C فى إنتاج الكولاجين.

٦- يمكن أن تقوم بدور الأجسام المضادة وتقى الأغذية من تأثير الميكروبات الضارة.

٧- تحمى الجسم من تأثير المواد المسببة للسرطان عن طريق إيقاف نمو الخلايا السرطانية وحماية الخلايا الأخرى من أثر للمواد الضارة.

ويمكن استخدامها لمنع ومعالجة بعض الحالات رغم أنه لم يثبت بعد فعاليتها مثل:

١- ضعف الأوعية والشعيرات الدموية وزيادة مساميتها.

٢- نزيف اللثة والعين والمخ.

٣- البواسير والقرحة.

٤- معالجة بعض أنواع الجلوكروما.

٥- تقليل متاعب الدورة الشهرية عند النساء والحماية من الإجهاض.

٦- الضرر الناتج عن أشعة إكس.

٧- مرض السكر وأثره على العين.

٨- مانع لتجلط الدم فى الأرجل وغيرها.


### أعراض النقص :

تشبه أعراض نقص فيتامين C.

أما من حيث الكميات الموصى بتناولها فإنه يعتقد المتخصصون أنه يمكن تناول كميات شبيهة بفيتامين C كما يوصى بتناولها مع فيتامين C لأنها أكثر فاعلية، كما يعتقد أنها تزيد أيضاً من فاعلية فيتامين C.

## ٢- الكارنتين (فيتامين ب - ت) Carnitine (vitamin B-T) :

الكارنتين عبارة عن مرافق إنزيم Coenzyme وقد استخلص فى بادئ الأمر من اللحم ١٩٠٥، إلا أنه لم يتوصل إلى تركيبه حتى ١٩٢٧. وفى عام ١٩٤٧ عندما كان Fraenkle يدرس أهمية حامض الفوليك لاحظ وجود هذه المادة فى الخميرة yeast، وأطلق عليها Bt. وأعطاهما هذا الاسم لأنها قابلة للذوبان فى الماء ويرجع استخدام الحرف "T" إلى Tenebrio وهو مأخوذ من الاسم العلمى للددوة Tenebrio molitor. ولم يعرف لآن أنه ضمن الفيتامينات، وأطلق عليه carnitine. ويشترك فى تكوينه حامضان أمينان أساسيان هما : methionine و lysine، وذلك فى الكبد. وهو سهل الامتصاص فى الجسم مثل باقى مجموعة B. ويستمد carnitine الهيكل الكربونى من lysine وبمجاميع ميثيل من methionine.



## أهم وظائف كارنتين :

يلعب الكارنتين دوراً أساسياً فى ميثابوليزم الطاقة، ودوره فى ذلك يتلخص فيما يلى :

١- نقل وأكسدة الأحماض الدهنية، ويسهل عملية نقل الأحماض الدهنية من خلال جدار الميتوكوندريا، كما يسهل بناء الدهن، كما أنه هام فى أكسدة الأحماض الدهنية وانطلاق الطاقة.

٢- تخليص الجسم من المواد الكيتونية.

٣- هناك شواهد تشير إلى أن الكارنتين يشجع البنكرياس لتوليد العصارات الهاضمة وأيضا تنشيط الحيوانات المنوية.

ويوجد الكارنتين فى الأنسجة الحيوانية وقليل الوجود فى الأنسجة النباتية. وهو سريع الفقد بالذوبان والطهى بالحرارة الرطبة. ويرجع انخفاضه فى الأنسجة


النباتية نظراً لانخفاض محتوى هذه النباتات فى الحامضين الأمينين methionine و lysine، اللازمين لتكوينه. ويؤدى نقص الكارتين إلى تأثر العضلات. فلو حظ انخفاض الكارتين فى العضلات التى حدث لها ضمور كما يؤدى نقصه إلى تقليل سمك الألياف العصبية.

ويلاحظ أن وجبات النباتين منخفضة فى الكارتين سواء الموجود طبيعياً أو المحضر من الأحماض الأمينية.

### ٣- يوبكوينون Ubiquinone مرافق الإنزيم كيو Coenzyme Q :

اسم اليوبكوينون Ubiquinone عبارة عن اسم يجمع مجموعة من اليوبكوينون شبيهة بفيتامين K، وقد اكتشف فى عام ١٩٥٧ / ١٩٥٨ فى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية فى وقت واحد أثناء دراسة الأحماض الدهنية الذائبة فى الدهن، وأيضاً دراسة بعض التفاعلات الإنزيمية فى الميتوكوندريا.

ويتكون من حلقة quinone وسلسلة جانبية مكونة من ٣٠ - ٥٠ ذرة كربون، وهذه هى التى تميز مركبات هذه المادة (شكل ٧-٣) ويمكن للجسم تكوينه من مواد وسطية لأحماض phenylalanine و tyrosine.



Structure of ubiquinones (coenzymes Q). The "n" in the formula varies according to the source—it varies from 6 in some yeasts to 10 in mammalian liver.

### شكل (٧-٣) يوبكوينون

#### وظائفه :


يعمل فى سلسلة التفاعلات التى تعمل على انطلاق الطاقة من ATP ويعتقد البعض أنه يمكن أن يمنع أو يقلل من آثار نقص فيتامين E. وقد يكون لهذا المركب

دور فى مد الجسم بالحلقة aromatic كنواة لاستخدامها فى الجسم فى تخليق بعض المواد.

وهذا المركب واسع الانتشار فى النباتات والحيوانات والبكتريا يمكن تخليقه فى الجسم. كما أمكن تحضيره معمليًا.

#### ٤ - إينوسيتول Inositol :

عرف الإينوسيتول منذ سنة ١٨٥٠ وهو واسع الانتشار فى الأغذية مع الجلوكوز، وكان يطلق عليه اسم سكر العضلات muscle sugar. وفى عام ١٩٤٠ كان يعتقد أنه مادة أساسية فى التغذية وضم إلى مجموعة فيتامين B. ولكن لا يوجد ما يثبت الآن أن الجسم لا يمكن تخليقه. وهناك الكثير من العلماء والمراجع يضعون الإينوسيتول مع مجموعة B. وهو يشبه فى تركيبه الجلوكوز. وله تسع صور إلا أن أكثرها فاعلية هو myo-inositol (شكل (٧-٣١)).



. Structure of myo-inositol (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>)

#### شكل (٧-٣١) تركيب الإينوسيتول

ويوجد فى جميع الأغذية مثل المخ وصفار البيض والخبز والبسلة الخضراء وعيش الغراب، وفى جميع الخلايا وفى الأنسجة الحيوانية يوجد مع الفوسفوليبيدات، وفى النباتات يوجد فى صورة حامض فيتيك Phytic acid. ويخزن الإينوسيتول فى المخ وعضلة القلب والعضلات، ويخرج من الجسم كميات صغيرة فى البول، إلا أن المريض بالسكر يخرج كمية كبيرة.

والإينوسيتول مادة بللورية عديمة اللون، تذوب في الماء، ولا تتأثر بالأحماض أو القلويات.

### وظائف الإينوسيتول :

لا تعرف كل وظائف الإينوسيتول، ولكن له دور في نقل الدهون lipotropic وتساعد الجسم في بناء اللسثين الذى يساعد على نقل الدهون من الكبد للخلايا، ويعمل على خفض الكولسترول، كما أنه يعتقد أنه مولد لمادة phosphoinosites التى توجد في أنسجة مختلفة بالجسم، وخصوصاً في المخ. ولم تثبت أعراض نقص على الإنسان، ولكن ظهرت على الفئران من حيث سقوط الشعر حول العين.

### ٥ - حامض ليبويك Lipic Acid :

حامض الليبويك مادة قابلة للذوبان في الدهن، وتحتوى على كبريت، ويمكن تخليقها في الجسم. وقد اكتشفه Reed عام ١٩٥١ أثناء عمله مع بكتيريا حامض اللاكتيك وأطلق عليه هذا الاسم مستخدماً الكلمة اليونانية lipos بمعنى دهن.


### وظائفه :

يشترك في الإنزيمات التى تعمل على إزالة المجموعة الكربوكسيلية وأكسدة حامض pyruvic، فيعمل حامض lipoic كمرافق لإنزيم pyrophosphatase المحتوى على ثيامين اللازم لميتابوليزم الكربوهيدرات وانطلاق الطاقة، كذلك يتحد مع نواتج ميتابوليزم البروتين والدهن في دورة حامض الستريك لتوليد الطاقة من هذه العناصر.

### ٦ - حامض بانجاميك Pangamic Acid

(فيتامين ب<sub>١٥</sub>) (vitamin B<sub>15</sub>)

في عام ١٩٥١ اكتشف Krebs وآخرون وجود مادة قابلة للذوبان في الماء في بذرة المشمش، كما عزلوها أيضاً في ردة الأرز ومن الخميرة. اشتق هذا الاسم من pan بمعنى عالمي، و gamic بمعنى بذرة، وأعطيت اسم ب<sub>١٥</sub>، وسبب ضمه إلى مجموعة فيتامين B أنه يوجد حيث توجد معظم هذه الفيتامينات في الأغذية المختلفة. ولكن حتى الآن لا يعرف هل يمكن للإنسان تخليقه أم لا. وهو سريع الامتصاص والانتشار في الجسم. ويوجد بنسبة كبيرة في الكلى. وهو مادة بللورية سريعة الذوبان في الماء، وشكل (٧-٣٢) يوضح تركيبه.



Pangamic acid (C<sub>10</sub>H<sub>19</sub>O<sub>8</sub>N).

### شكل (٧-٣٢) تركيب حامض بالجاميك

**وظيفته :** يودى حامض بالجاميك وظائف عدة، منها :

١- يعتبر مصدر لمجموعة الميثيل CH<sub>3</sub> وبذلك يمكن للجسم تكوين الكولين وأيضاً مادة الكرياتين في العضلات وأنسجة القلب، وفي حالة زيادة تكوين ATP يمكن تكوين مادة فوسفوكرياتين التي تحتفظ بالطاقة، كما يمكن تكوين ATP عند انخفاضه بتفاعل معاكس لما سبق.

٢- يساعد في كفاءة انتقال الأكسجين من الدم إلى الخلايا وخصوصاً القلب والعضلات عندما ينخفض الأكسجين.

٣- يمنع تكوين الكبد الدهنى fatty liver وخصوصاً في حالة الجوع أو الوجبات الخالية من البروتين.

٤- تكيف الجسم لزيادة النشاط الجسمي.

٥- تنظيم كولسترول الدم حيث يخفض من تكوينه.

ويمكن استخدام حامض pangamic في علاج :

١- تصلب الشرايين، الصّداع، عدم كفاءة التنفس في حالة انسداد الشريين وتقوية عضلات القلب التي يتسبب عنها أضرار كثيرة، وتنظيم ضربات القلب وخصوصاً بعد الأزمات القلبية.

٢- في حالة الشعور بالتعب والإرهاق لخفض هذا الشعور وزيادة الطاقة و تحسين الميتابوليزم.

- ٣- ضيق التنفس وزيادة كفاءة انتقال الأكسجين من الدم إلى الخلايا.
- ٤- فى حالة ارتفاع كولسترول وقد ظهر تأثيره بعد تعاطى هذا المركب لمدة ١٠ - ٣٠ يوماً.
- ٥- لعلاج وظائف الكبد فى حالة إصابة الفرد بالعدوى وانخفاض درجة حرارته، وكذلك فى حالة الإصابة بالصفراء، وفى حالة التهاب الكبد المزمن.
- ٦- علاج بعض أمراض الجلد والأنسجة المبطنة، وأيضاً لخفض الأديما والهرش والإكزيما.

### أعراض النقص :


المعروف للآن من أعراض النقص هو زيادة الشعور بالتعب واضطراب بعض الغدد والجهاز العصبى.

### أحسن مصادر هذا المركب :

من أحسن المصادر بذور عباد الشمس والقرع العسلى والخميرة والكبد والأرز والحبوب الكاملة والشمش.

### ٧- حامض بارا أمينوبنزويك (Para-aminobenzoic Acid (PABA :

يوجد هذا المركب فى الأغذية الغنية بمجموعة فيتامينات B وهو عامل للنمو فى بعض البكتريا، كما أن له تأثير الفولاسن إذا أعطى لحيوانات لا يمكنها تخليق الفولاسين. وبالنسبة للإنسان يدخل فى تركيب الفولاسين ولكن ليس له فاعلية الفيتامين، ولذا لا يعتبر فيتامين، ويمكن لجسم الإنسان تكوينه (شكل ٧-٣٣).



Structure of para-aminobenzoic acid.

### شكل (٧-٣٣) تركيب البارا أمينوبنزويك

## وظائفه :


- ١- تكوين فيتامين الفولاسين folacin.
  - ٢- يعمل كمرفق إنزيم فى هدم وتمثيل البروتين وتكوين كرات الدم وخصوصاً الحمراء.
  - ٣- يستخدم مستحضره فى حماية الجسم من أشعة الشمس.
  - ٤- يصاد فعل مركبات السلفا التى تقتل البكتريا النافعة للجسم.
- يمكن إذا تعاطى الإنسان كميات كبيرة من السلفا قد تعرض الإنسان لنقص فى PABA وكذلك فى الفولاسين، ومن أعراض ذلك : التعب والحساسية والاكنتاب والعصبية، والصداع، والإمساك. ويوصى بتناول ٢ - ٦ جم يوميًا. وأحسن مصادره الخميرة، السمك، فول الصويا، السوداني، الكبد، البيض، جنين القمح، والمولاس.
- وليس من زيادة تناوله أى خطورة، ولكن استمرار تناول كميات كثيرة منه قد يؤدى إلى الدوار والقيء.

## ٨- حامض أوروتيك (فيتامين ب١٣) Orotic Acid (vitamin B<sub>13</sub>) :

قد يكون هذا المركب عاملاً مشجعاً للنمو والحماية من العديد من الأمراض، لكن لا يعرف الآن دوره فى ذلك، وهو واسع الانتشار ولا يوجد منه أى مشاكل. ويستخدمه الإنسان فى ميتابوليزم الفولاسين والكوبالامين، مما يساعد فى تحديد بعض الخلايا. وهناك احتمالات فى أن هذا المركب ممكن أن يعالج بعض حالات التصلب.

كما يستخدمه الإنسان فى بناء قواعد pyrimidine اللازمة لتكوين الأحماض النووية، وبالتالي يساعد فى تخليق البروتين وتكاثر الخلايا. وأعراض نقص هذا الفيتامين لم تثبت بعد، ولكن احتمال نقصه يؤدى إلى اضطراب الكبد، تدهور الخلايا. وأحسن مصادره اللبن المتخثر curdle milk والجنود الدرنية لبعض الخضروات. يوضح شكل (٧-٤٣) تركيبه.





Orotic acid


### شكل (٣٤-٧) تركيب حامض الأوروتيك

٩= لتريل، أميجدالين، نترولوسيد (فيتامين ب١٧)

Laetrile, amygdalin, nitrilosides (vitamin b<sub>16</sub>) :

لتريل أو أميجدالين مركبات موجودة في المشمش، وهناك من يقول إنه يحمي من السرطان، وكان Ernest Kreb أول من استخدم هذه المادة في العلاج وأطلق عليها فيتامين ب١٧.

استخرج من بذور المشمش في عام ١٩٠٠ في الولايات المتحدة وابتدأ في استخدامه في علاج السرطان ١٩٢٠. ويعتقد كثير من الأطباء أنه يعطي نتائج جيدة في علاج السرطان، وكان الصينيون القدماء يستخدمونه لعلاج حالات السرطان. والأميجدالين (لتريل) عبارة عن نترولوسيد nitriloside يتركب من ٢ جزىء من جلوكوز، وجزىء من بنزالدهيد benzaldehyde وجزىء من سيانيد الهيدروجين HCN (شكل ٣٥-٧).



### شكل (٣٥-٧) تركيب لتريل - أميجدالين

ويوجد أكثر من ٢٠ مركب مختلف موجود فى ١٢٠٠ نبات، ويستخدم الكثير منها. والسيانيد الموجود طبيعياً فى بذور المشمش أو فى اللوز المر يحاط بالجلوكوز ولكنه يخرج فى القناة الهضمية للإنسان. وتعمل الإنزيمات على هدم الأجدالين إلى أربعة مركبات تمتص فى الليمف ثم إلى الوريد البابى ومنها إلى جميع أجزاء الجسم.

### وظائف الأجدالين (ليتريل) :

إن الأجدالين الموجود فى بذور المشمش أو اللوز المر يمد الجسم بكميات بسيطة من السيانيد (HCN). ويتحول هذا المركب فى جسم الإنسان بواسطة إنزيم rhodanase إلى ثيوسيانات thiocyanate. ويعتقد أن هذه المادة تهاجم الخلايا السرطانية. ومع معرفة المتخصصين أنه يرد مستوى منخفض من السيانيد إلى مكان الورم فهناك ثلاث احتمالات لذلك منها : أن الخلايا السرطانية لا يوجد بها إنزيم rhodanase لكنها تحاط بإنزيم beta-glucuronidase التى تطلق مادة السيانيد من مركب ليتريل فى مكان الورم الخبيث وتهاجم الخلايا السرطانية وكما ذكر Cason الأستاذ بجامعة كاليفورنيا أن مادة Laetrile تمنع الخلايا السرطانية من التكاثر. وكما أشار Schweitzer أنه لاحظ لعدة عقود أنه لم يكن هناك حالة واحدة مصابة بالسرطان بين الأفارقة من قبائل الجابون Gabon الذين يستمدون ٨٠ - ٩٠٪ من الطاقة اللازمة من درنات الكاسافا cassava التى تحتوى على ٠,٥٪ من nitrilside.

- لوحظ فى مستشفى جامعة جنوب كاليفورنيا انخفاض نسبة الإصابة بما يعادل الثلثين بين النباتيين وقد ظهر أنهم يتناولون من ٦ - ٨ ملجم nitrilside / الفرد / اليوم بخلاف باقى السكان الذين يتناولون بمعدل أقل من ١ ملجم / الفرد / اليوم.


- بين سكان الهيمالايا أنه لم يلاحظ حالة وفاة واحدة خلال ١٠٠ سنة وقد أرجعت WHO ذلك إلى أن معدل تناول nitrilside / اليوم / الفرد يزيد عن ١٠٠ ملجم الذى يستمدونه من بذور المشمش.

يلاحظ أن هذه الثلاث احتمالات تشير إلى مركب laetrile يقى من الإصابة بالسرطان وليس كعلاج.

وأعراض نقصه تتمثل فى أنه قد يزيد من فرصة تعرض الإنسان لمرض السرطان. ويمكن أن يتناول الإنسان من هذه المادة من ٠,٠٢٥ - ١ جم وينبغى ألا يزيد عن ذلك. وتشير Ensminger (١٩٩٥) أنه يمكن الحصول على كمية مناسبة من تناول عدد (٥-٣٠) من بذور ثمار المشمش تقى الإنسان من السرطان. وأحسن مصادر laetrile بذور ثمار العديد من الفواكه مثل المشمش والتفاح والخوخ والبرقوق والنكتارين والكريز.

#### ١٠. فيتامين U (S-methylmethionine) : Vitamin U

يوجد هذا الفيتامين فى الخضروات الطازجة، وخصوصاً الكرنب، وهو يمنع تكوين قرحة المعدة، ولذا يسمى عامل هذه القرحة antiulcer factor ويتركب من حامض methionine بعد إضافة مجاميع الميثيل، كما فى شكل (٧-٣٥).



#### شكل (٧-٣٥) تركيب فيتامين U

ويعتبر مصدر لمجاميع الميثيل اللازمة لتكوين العديد من المركبات اللازمة لجسم الإنسان مثل الكولين والكرياتين.. وغيرها. كما أنه يعتبر عامل مهم يدخل فى حركة ونقل الدهون. ويمكن أن يستخدم فى علاج قرحة المعدة وقد أمكن تحضيره فى صورة بللورات.



الباب الثامن

## **العناصر المعدنية**

**MINERAL ELEMENTS**



# العناصر المعدنية(\*)

## MINERAL ELEMENTS

### مقدمة :

يتكون جسم الإنسان من ٦٥٪ ماء، ١٦٪ بروتين، ١٠٪ كربوهيدرات، ٥٪ دهون وهذه تشكل ٩٦٪ من وزن الجسم وهو الجزء العضوي من جسم الإنسان الذى يتكون أساساً من عناصر الكربون، الأكسجين، والأيدروجين والنيتروجين أما ٤٪ الباقية فهي العناصر المعدنية.

والعناصر المعدنية أو الجزء غير العضوي من جسم الإنسان هو الرمد المتبقى بعد تمام احتراق المواد العضوية وتوجد فى جسم الإنسان إما حرة أو متحدة مع مراد عضوية أو غير عضوية. ويحتفظ الجسم بهذه المعادن حتى بعد أكسدة المراد العضوية أو الغذاء الذى كان يحتويها.

ويوجد فى الأنسجة الحيوانية حوالى ٥٠ عضواً معدنياً وجد منها حوالى ٢١ عنصراً ضرورياً للإنسان. والمعادن الضرورية Essential elements هى المعادن اللازم وجودها فى الوجبة اليومية لضمان النمو والصيانة والتكاثر.

من الجدير بالذكر أن قدماء العالم تعرفوا على نقص المعادن وأمكنهم معالجة أعراض النقص رغم أنهم لم يكونوا يعرفون قواعد العلاج. فمثلاً الصينيون وصفوا مرض الجويتر ٣٠٠٠ سنة قبل الميلاد وكانوا يعالجون المصابين بتناول نباتات الماء والإسفننج بعد حرقه، والمعروف الآن أن هذه المواد بها آثار من عنصر اليود. وكان الإغريق حوالى القرن الرابع قبل الميلاد فى عهد Hippocrates يعالجون مرضى الأنيميا بإعطائهم ماء به حديد فكانوا يغمسون السيوف الساخنة الحماة لتبريدها فجأة فى الماء.

ولم يعرف الكثير عن المعادن إلا فى عصر النهضة Renaissance حين أسست المعامل وجهزت بالأجهزة المتاحة ووضعت طرائق التحليل الكيميائى... وقد توقع Lavoisier الفرنسى الملقب بمؤسس علم التغذية أن عنصرى الصوديوم والبوتاسيوم سيكتشفان لأنهما يوجدان فى كثير من المركبات... وبعد سنوات بسيطة اكتشف

(\*) إيزيس نوار وآخرون، ١٩٩٠، إيزيس نوار وآخرون ٢٠٠٠.

الكيميائي البريطاني ليس فقط الصوديوم والبوتاسيوم بل أيضًا الكالسيوم والكبريت، والمغنسيوم والكلورين.. وقد نال عن ذلك جائزة الأكاديمية الفرنسية **Volta Medal** ١٨٠٦ رغم أن فرنسا وإنجلترا كانتا في حالة حرب آنذاك... وقد تقدمت المعرفة بعد ذلك بمعدل أسرع.. بعد أن نشر **Berzelius** السويسرى محتوى العظام من الكالسيوم والفسفور عام ١٨٠١، كما توصل ١٨٣٨ أن الحديد الموجود فى الهيموجلوبين يمكن الدم من امتصاص الأكسجين.

ووجد الكيميائى الفرنسى **Boussingault** أن تناول القرويين فى جنوب أمريكا اللاتينية الملح المحتوى على يود كان وقاية لهم من الإصابة بالجويتر وذلك عن طريق تجارب الحيوان، وقد توصل أيضًا إلى أهمية الكالسيوم والحديد فى غذاء الحيوان. وقد نال عالم الفيزياء السويسرى **Chossal** جائزة ١٨٤٠ حيث وجد أن إضافة كربونات الكالسيوم إلى وجبة مكونة من قمح وماء قد حسنت من نمو العظام فى الحمام.

وبعد مرور حوالى نصف قرن اكتشف العالم البيوكيميائى الألماني **Baumann** ١٨٩٥ أن الغدة الدرقية تحوى على يود، كما وجد العالم الأمريكى **Marine** وزملاؤه بين ١٩٠٧ و ١٩١٨ أن إضافة كميات بسيطة من اليود كانت وقاية للحيوانات وأطفال المدارس من الجويتر.

وبنهاية القرن ١٩ اكتشف حوالى  $\frac{1}{3}$  المعادن اللازمة، وكان ذلك مصاحبًا للعمل البحثى فى الفيتامينات وكان من الصعب فى ذلك الوقت التفريق بين الأمراض الناتجة من نقص المعادن وتلك الناتجة من نقص الفيتامينات.

وفى العقدين الأولين من القرن العشرين اكتشف الكثير عن دور المعادن وأهميتها بالنسبة للفيتامينات كى تودى وظائفها وأكد ذلك أهمية المعادن بالنسبة للإنسان، وبالرغم من ذلك فكان هناك بعض الشك فى أهمية المعادن فمثلاً رغم التعرف على الكوبلت ودوره ١٩٣٥ إلا أنه لم يعرف أنه أحد مكونات فيتامين **B<sub>12</sub>** إلا عام ١٩٤٨. وتوالى بعد ذلك اكتشاف أهمية دور المعادن، حيث عرف أهمية السيلينيوم ١٩٥٧، والكروميوم ١٩٥٩ بواسطة العالم الأمريكى الألماني الأصل **Schwarz**. وفى عام ١٩٧٢ عرف الفلورين والسليكون.. وهناك الحاجة أيضًا لمعرفة



أثر هذه المعادن فى تلوث الغذاء والماء والهواء... أيضاً معرفة العلاقات بين العديد من المعادن.

### تقسيم العناصر المعدنية Classification :

تقسم العناصر المعدنية فى جسم الإنسان حسب أهمية ونسبة وجودها فى جسم الإنسان إلى:

١- عناصر معدنية ضرورية لتغذية الإنسان وتوجد بكميات كبيرة نسبياً  
Macronutrient elements وتطلق عليها المعادن الكبرى Macroelements وهى التى توجد فى جسم الإنسان بنسب تزيد عن ٠,٠٠٥٪ من وزن الجسم وتشمل هذه المجموعة الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والكبريت والصوديوم والكلورين والمغنسيوم وهذه المجموعة من المعادن يحتاجها الفرد أيضاً بكميات كبيرة نسبياً، تتراوح بين ٠,١ جم إلى ١ جم أو أكثر/ اليوم.


٢- عناصر معدنية ضرورية لتغذية الإنسان ولكن توجد بكميات قليلة  
Micronutrient elements ويطلق على هذه المجموعة المعادن الصغرى Microelements أو معادن الآثار trace elements وهى توجد فى جسم الإنسان بكميات تقل عن ٠,٠٠٥٪ من وزن الجسم وتشمل الحديد والزنك والسيلينيوم والمنجنيز والنحاس واليود والكوبلت والموليبدنم والكروميوم والفلورين والسليكون والفانديوم والنيكل ويحتاجها الإنسان فى غذائه بكميات صغيرة جداً أو آثار، فيحتاجها الإنسان من ١ ميكروجرام إلى ملليجرام / اليوم.

٣- عناصر معدنية لم يثبت ضرورتها بالنسبة لجسم الإنسان ولكن وجد لها دوراً مهماً فى بعض التفاعلات الحيوية فى الجسم مثل الباريوم والبرومين والاسترانشيم والكاديوم.

٤- عناصر معدنية لم يثبت إلى الآن أهميتها بالنسبة لجسم الإنسان مثل الذهب والفضة والنيكل والألمنيوم والزنك والرصاص وحوالى ٢٥ معدناً آخر لم يكشف إلى الآن دورهم.

ويوضح شكل (٨-١) كمية العناصر المعدنية فى جسم الإنسان ويفصل الخط المتقطع المعادن الكبرى من معادن الآثار. فالمعادن الكبرى هى التى توجد

بكميات تزيد عن ٥ جم (ملعقة صغيرة) ويلاحظ أن الشكل يوضح أربعة عناصر من معادن الآثار فقط أما عناصر الآثار الباقية فهي توجد بكميات ضئيلة جداً.



### شكل (٨-١) توزيع العناصر المعدنية في جسم الإنسان

كما تقسم المعادن التي يحتاجها الجسم حسب مقدرة الجسم على الاستفادة

بها إلى :

١- معادن سهلة الامتصاص وتفرز بسهولة خارج الجسم: بعد هضم الغذاء تمتص

الغذاء بعض العناصر من المكونات البسيطة الذائبة مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلورين. هذه العناصر تفرز أيضاً بسهولة في البول.

٢- معادن تمتص بقلّة وتفرز بسهولة: يوجد الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور في

صورة مركبات غير ذائبة صعبة الهضم والامتصاص وبالتالي فإن التحليل الكيماوي للغذاء لا يعكس كمية المعدن المتاحة للامتصاص. ولكن بعد الامتصاص تفرز بسهولة في البول أو البراز.

٣- معادن صعبة الامتصاص ويصعب إفرازها خارج الجسم: هذه المجموعة من المعادن

لا تفرز خارج الجسم بسهولة بل تتراكم داخله وتسبب تسمم للجسم مثل الكوبلت والنحاس والزنك والمنجنيز وهي عادة توجد في الأغذية بكميات ضئيلة جداً.

## أهمية العناصر المعدنية :

بالرغم من صغر نسبة المواد المعدنية فى الجسم إلا أنها ذات أهمية كبرى فى كثير من العمليات الحيوية. وعموماً تدخل المعادن فى الجسم فى وظيفتين أساسيتين إما كمواد بنائية Structural constituents أو كمواد منظمة كجزء من مكونات محاليل الجسم Components in the body fluids.

### أولاً: كمواد بنائية Structural constituents :

- ١- تدخل فى بناء الأنسجة الصلبة فى الجسم مثل العظام والأسنان والذى يدخل فى تركيبها الكالسيوم والفوسفور والفلورين مما يعطى نوعاً من الصلابة المرغوبة.
- ٢- كمكونات للأنسجة الرخوة فيحتوى بروتين العضلات على كبريت، وعموماً كل خلية تحتوى على فوسفور وحديد والأنسجة العصبية تحتوى على فوسفور.
- ٣- تدخل فى تكوين بعض المواد الضرورية للجسم فيوجد اليود فى هرمون الثيروكسين والزنك قد يوجد فى الأنسولين، والحديد فى الهيموجلوبين والكلور فى حامض الهيدروكلوريك فى العصارة المعدية. والإنزيمات المعدنية Metaloenzymes مثل السيتوكروم أكسيداز Cytochrome oxidase الذى يحتوى على الحديد والنحاس وإنزيم الراثنين أكسيداز Xanthine Oxidase الذى يحتوى على الموليبدنم Molybdenum ومن الأمثلة على الفيتامينات الثيامين Thiamin الذى يحتوى الكبريت وفيتامين B<sub>12</sub> الذى يحتوى الكوبلت.

### ثانياً: كمكونات لمحاليل الجسم Components in the body fluids :

#### ١- الحفاظ على التوازن الحامضى- القلوى :

لا تستطيع العمليات الخلوية أن تستمر إلا فى مجال ضيق جداً من رقم حموضة (pH) قريب من درجة التعادل (عادة ٧,٤)، وتلعب المعادن دوراً هاماً فى الحفاظ على التوازن الحامضى القلوى لضمان هذه الحدود من درجة الحموضة فالكلورين والكبريت والفوسفور يميل تفاعلهم للحموضة بينما الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والحديد والمغنسيوم يميل تفاعلهم للقلوية. ويوضح شكل (٨-٢) العناصر المعدنية التى ينتج منها أحماض أو قواعد فى جسم الإنسان وأهم الأغذية الموجودة بها.

مكونة للمحموضة	مكونة للقواعد
العناصر المعدنية	الكالسيوم
الكالور	الحديد
الكبريت	الماغنسيوم
الفوسفور	البوتاسيوم
	الصوديوم
الأغذية	الحبوب ومنتجاتها
	الحضروات
	والفاكهة
	اللحوم
	البيض
	الدواجن
	الأسماك

شكل (٨-٢) العناصر المعدنية المنتجة للأحماض والقواعد في جسم الإنسان  
ويلاحظ في شكل (٨-٢) أن الفاكهة والخضروات من الأغذية التي يعتبر تفاعلاتها قاعدية في الجسم. وهذا يرجع إلى أن الأحماض السائدة فيها هي أحماض عضوية والتي تدخل في التفاعلات الحيوية بجسم الإنسان تماماً بحيث لا تؤثر على الحموضة الكلية حتي بالنسبة لثمرة الليمون تعتبر من الأغذية المكونة للقواعد Base Forming لأن بعد تكسير الأحماض العضوية لدخولها في تفاعلات الجسم الحيوية يبقى الصوديوم والبوتاسيوم مكونة قواعد.

وأغلب الوجبات العادية تحتوي على زيادة طفيفة من العناصر المسببة للحموضة الزائدة عن طريق زيادة إخراج  $CO_2$  مع هواء الزفير أو زيادة حموضة البول المفرز من الجسم.

ويحافظ الجسم على درجة الحموضة بعدة طرق:

أ- يحتوى الدم على منظمات حموضة buffers مثل الكربونات والفوسفات والبروتينات والتي يمكنها أن تتفاعل مع الحموضة الزائدة أو القلوية الزائدة بحيث يحافظ على حموضة الدم والسوائل المحيطة بالأنسجة المختلفة قرب التعادل حتى لا تتأثر التفاعلات المختلفة.

- ب- يطلق العظم الفوسفات والتي تعمل كمنظم للحموضة buffers حيث ترتبط مع أيونات الأيدروجين الموجودة فى السوائل المحيطة.
- ج- إذا لم تتمكن منظمات الحموضة buffers من التخلص من القلوية الزيادة يتكون حامض الكربونيك عن طريق تفاعل ثانى أكسيد الكربون مع الماء الذائب من عمليات الميتابوليزم. وعادة يعادل حامض الكربونيك الناتج قلوية الدم الزيادة.
- د- تتعادل الحموضة الزائدة بالقواعد المخزنة فى الجسم التى تتكون من مجموعة الأمين (الناتج من نزع مجموعة الأمين Deamination من البروتينات) والماء لتكوين الأمونيا وبهذه الطريقة تمنع حالة حموضة الدم Acidosis.


#### ٢- الفعل المساعد Catalytic action :

يعمل العديد من العناصر المعدنية كعوامل مساعدة حيث أن وجودها ضرورى لإتمام تفاعل بعض الانزيمات ومادة التفاعل Substrates فبعض العناصر المعدنية تعمل كعامل مساعد فى كثير من خطوات هدم catabolism الكربوهيدرات، والدهون، والبروتين إلى ثانى أكسيد كربون ماء وطاقة وكذلك فى عمليات البناء أو تخليق الدهون والبروتين.


ويوضح شكل (٨-٣) دور العناصر المعدنية فى ميتابوليزم الكربوهيدرات والدهون والبروتين فى الجسم. ويلاحظ أن العديد من التفاعلات تعتمد على وجود بعض من العناصر وأن بعضهم يشترك فى خطوات مختلفة.

علامة على ذلك فإن تخليق بعض المكونات الحيوية فى الجسم مثل الهيموجلوبين يتوقف على وجود عدة معادن غير الداخلة فى تركيب الجزئ نفسه.

## 1- Catabolism



## 2- Anabolism



شكل (٣-٨) دور العناصر المعدنية في الميٲابوليزم<sup>(١)</sup>

٢- البناء

١- الهدم

كما يعتمد تجلط الدم على الفعل المساعد للكالسيوم.

ويعتمد مرور العناصر الغذائية المختلفة خلال الأغشية الحيوية على وجود العناصر المعدنية. فمثلاً يسهل الكالسيوم امتصاص فيتامين B<sub>12</sub> من الأمعاء كما يسهل الماغنسيوم والصوديوم امتصاص الكربوهيدرات. كما ينشط بعض العناصر المعدنية الإنزيمات الهاضمة مثل إنزيم ليباز البنكرياس pancreatic lipase الذى ينشط فى وجود الكالسيوم والماغنسيوم.

## ٣- المحافظة على التوازن المائى Maintenance of water balance :

يوجد الماء فى الجسم إما داخل الأوعية الدموية أو داخل الخلايا أو بين الخلايا

<sup>(١)</sup> لفرىس نوار وآخرون (١٩٩٠).

ويتحكم في حركة الماء الخاصية الاسموزية وبالتالي تتوقف على تركيز العناصر المعدنية داخل وخارج الخلايا. حيث يمر الماء جهة تواجد العناصر المعدنية بكمية كبيرة ويمر مع الماء العناصر الغذائية المختلفة اللازمة لسلامة الخلايا. وإذا حدث أى خلل فى المحافظة على الضغط الاسموزى ينتج إما استسقاء edema وهى تراكم السوائل فى الخلايا أو حالة جفاف dehydration .

خارج الخلايا	داخل الخلايا
العناصر كاتيونات <sup>+</sup> الصوديوم	البوتاسيوم
أنيونات <sup>-</sup> الكلورين	الفوسفات

ويعتبر الصوديوم من أهم العناصر التى لها دور فى المحافظة على الضغط الاسموزى وبالتالي على حركة السوائل فى الأنسجة. فعند انخفاض تركيز الصوديوم فى خارج الخلايا (كما فى حالة ارتفاع كمية العرق) يخرج الماء من داخل الخلايا محملاً بالبوتاسيوم للمحافظة على التوازن الكتروليتى داخل وخارج الخلايا. وهذا يسبب جفاف للخلايا ويمكن ملاحظته بالشعور بالتعب والدوخة.

أما فى حالة زيادة تركيز الصوديوم كما فى حالة ارتفاع تناول الملح يمر الماء من الخلايا إلى الأوعية الدموية. وهذا يزيد من حجم الدم وبالتالي يرتفع ضغط الدم كذلك قد يمر جزء من الماء إلى الخلايا ويتراكم مع المحاليل الداخلية intercellular fluids.

ويؤدى تراكم الماء بين الخلايا إلى انتفاخ الأنسجة ويطلق عليها edema ولإعادة ضبط التوازن يزداد الإحساس بالعطش حتى يمكن إعادة التوازن ثانياً.

#### ٤ - نقل الإشارات العصبية Transmission of nerve impulses :

تقوم أيونات الصوديوم والبوتاسيوم بنقل النبضات العصبية خلال الأعصاب Transmission of nerve impulses فعند تنبيه العصب يحدث تغير فى نفاذية الغشاء المغلف للخلايا العصبية بحيث تزداد نفاذية هذا الغشاء للصوديوم فيسهل دخول الصوديوم إلى داخل العصب وفى نفس الوقت يخرج البوتاسيوم للخارج، ويحدث ذلك تغير مؤقت فى الشحنة الكهربائية وفى نفاذية الغشاء العصبى وتمر هذه التغيرات على طول العصب ناقلة معها النبضة العصبية أو الإشارة العصبية.

والتغير الذى يحدث فى تركيز المعادن يؤثر على نقل الإشارة العصبية وينظم الكالسيوم أيضاً انطلاق Acetylcholine من الحويصلات الموجودة عند طرف العصب وهو المادة المسؤولة عن النقل الكيماوى للإشارة العصبية من نهاية طرف العصب الآخر أو العضلة عند منطقة التشابك العصبى أو الوصلة العصبية Synapses.

#### ٥ - انقباض العضلات Muscle contraction :

ثبتت تركيب السوائل البينية التى تنغمس فيها ألياف العضلات هام جداً لضمان قيام العضلات لوظائفها الانقباضية. فالكالسيوم له تأثير منشط أو منبه للانقباض بينما الصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم منبهات الاسترخاء.

٦- تلعب المعادن مع الفيتامينات دوراً مهماً فى تهذيب السلوك العدوانى وزيادة التعارن فى المجتمع كما سبق ذكره.

#### وجود العناصر المعدنية :

تعتبر التربة والماء هما المصدرين الأساسيين للعناصر المعدنية فى الأغذية وإن كان هناك مصادر أخرى متباينة وعموماً يتفاوت نسب وجود العناصر المعدنية فى الأغذية المختلفة حسب عدة عوامل:

- نسبة وجود العناصر المختلفة فى التربة.
- الموقع الجغرافى.
- اختلاف فصول السنة.
- اختلاف مصدر مياه الرى.
- استخدام الأسمدة العضوية.
- استخدام المبيدات المختلفة.
- إضافة المعادن لبعض الأغذية كمضافات للأغذية لتقريبها Supplementation أو أثناء التصنيع.
- فقد العناصر أثناء إعداد وطهى وتصنيع الغذاء.

وعموماً توجد العناصر بتركيزات مرتفعة فى الأغذية الحيوانية وكذلك فى صورة سهلة الامتصاص عن الأغذية النباتية وتوجد معادن الآثار بتركيزات مرتفعة فى النباتات فى الأجزاء الخارجية. وفى الجنين germ وهى الأجزاء التى تزال أثناء عملية الطحن.



## فقد العناصر المعدنية أثناء تصنيع الأغذية :

يرجع الفقد في العناصر المعدنية إلى سهولة فقدها من الغذاء أثناء إعداده والذي يشمل الغسيل والنقع والطهي كما هو الحال بالنسبة للفيتامينات القابلة للذوبان في الماء أو نتيجة لعملية التشذيب Trimming أثناء عملية التقشير أو إزالة الأجزاء غير المرغوبة من النبات حيث أن معظم العناصر المعدنية بقرب القشرة الخارجية للخضروات والفاكهة ولهذا ينصح دائماً بتناولها بدون تقشير كلما أمكن. كما تفقد العناصر المعدنية بكميات كبيرة أثناء عمليات طحن وتصنيع منتجات الحبوب.

وتتوقف درجة فقد العناصر المعدنية على سهولة ذوبانها في الماء فيوضح جدول (٨-١) تأثير السلق المبدئي Blanching على فقد مجموعة من العناصر المعدنية فيلاحظ أن البوتاسيوم والصوديوم أكثر العناصر فقداً في الماء بينما نجد أن الكالسيوم قد زادت كميته نسبياً نتيجة وجوده في السبانخ مرتبطاً مع مواد غير قابلة للذوبان.

### جدول (٨-١) تأثير عملية السلق والطهي

على فقد العناصر المعدنية في السبانخ

المعدن	جم/١٠٠ جم		
	طازج	بعد السلق	نسبة الفقد %
البوتاسيوم	٦,٩	٣,٠	٥٦
الصوديوم	٠,٥	٠,٣	٤٣
الكالسيوم	٢,٢	٢,٣	صفر
الماغنسيوم	٠,٣	٠,٢	٣٦
الفوسفور	٠,٦	٠,٤	٣٦

في حين نجد أن الكالسيوم يفقد عند طهي الفاصوليا الجافة بنسب تقارب نسب فقد باقي العناصر المعدنية (جدول ٨-٢).

جدول (٨-٢): تأثير الطهي على فقد بعض العناصر المعدنية في الفاصوليا

المعادن	مجم/١٠٠ جم		
	طازج	مطهى	نسبة الفقد %
كالسيوم	١٣٥	٦٩	٤٩
النحاس	٠,٨٠	٠,٣٣	٥٩
الحديد	٥,٣	٢,٦	٥١
المغنسيوم	١٦٣,٠	٥٧,٠	٦٥
المنجنيز	١,٠٠	٠,٤	٦٠
الفوسفور	٤٥٣,٠	١٥٦,٠	٦٥
البوتاسيوم	٨٢١,٠	٢٩٨,٠٠	٦٤
الزنك	٢,٢	١,١	٥٠

كما يوضح جدول (٨ - ٣) تأثير السلق والطهي بطرق مختلفة على محتوى البطاطس من النحاس، فيلاحظ زيادة محتوى قشر البطاطس من النحاس.

جدول (٨ - ٣) محتوى النحاس لبطاطس معدة بطرق مختلفة

النسوع	مجم/ ١٠٠ جم وزن رطب
طازجة	٠,١٢
مسلوقة	٠,١
بقشرها	٠,١٨
شيبسى	٠,٢٩
مهروسة	٠,١٠
قشر البطاطس	٠,٣٤

## أولاً: العناصر المعدنية الكبرى

### MACROELEMENTS

توجد بعض العناصر فى الجسم كما سبق الذكر بكميات أكبر نسبياً من البعض الآخر ولا تقل كميتها فى الجسم عن ١٠ جم والتي يطلق عليها العناصر المعدنية الكبرى ويصل عددها فى الجسم حتى الآن سبعة معادن هى: الكالسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الكبريت، والصوديوم، والكلورين، والمغنسيوم. وتهتم الدراسات الحديثة بالتركيز على الكميات اللازمة من هذه المعادن ونسبتها لبعضها لأداء وظائفها فى الجسم. حيث ظهر ضرورة وجود توازن فى الكميات المتناولة بين أزواج معينة من هذه العناصر. فمثلاً نسبة الكالسيوم: الفوسفور تؤثر على النمر السليم للعظام وعلى امتصاص الكالسيوم بينما نسبة الكالسيوم: المغنسيوم تؤثر على وظيفة الأعصاب ونسبة الصوديوم: البوتاسيوم تحافظ على التوازن المائى. وعادة توجد هذه المعادن فى أنواع محددة من الأغذية ولذا يحتاج الإنسان إلى تناول أنواع متعددة من الأغذية حتى يقابل احتياجه من هذه العناصر.

### ١- الكالسيوم Calcium

يحتوى جسم الإنسان البالغ على حوالى ١٢٠٠ جرام كالسيوم وهى تكون حوالى ٢٪ من وزن الجسم، بينما يوجد فى جسم الطفل حديث الولادة من ٢٥-٣٠ جم فقط. ويوجد ٩٩٪ من الكالسيوم فى الهيكل العظمى والأسنان، أما الباقي فيوجد فى الدم وفى السوائل خارج الخلايا وفى الأنسجة الرخوة حيث يكون له دور هام فى تنظيم الكثير من التفاعلات الحيوية الهامة.

وكان أول من اكتشف أهمية الكالسيوم العالم الفرنسى Chossat ١٨٤٢ فى تجاربه على الحمام.

### وظائف الكالسيوم Function :

يؤدى الكالسيوم وظائف عدة فى الجسم، تلخص فى بناء العظام والأسنان وكذا فى تنظيم بعض العمليات الحيوية فى الجسم:

### أولاً: بناء العظام والأسنان Calcification or Ossification :

يوجد الكالسيوم فى العظام فى صورة ملح مزدوج من فوسفات الكالسيوم

و كربونات الكالسيوم بنسب معينة ومرتبطة بتركيب بلورى معين تترسب على شبكة من المواد العضوية البروتينية (organic matrix) لتعطيها القوة والصلابة المميزة للعظام مع استمرار العمر وحتى يمكنها أن تتحمل ثقل الجسم عند البلوغ. وتتكون الشبكة فى العظام أساساً من بروتين الكولاجين Collagen.

وتتجدد أنسجة العضلات باستمرار نتيجة وجود نوعين من الخلايا العظمية:

١- خلايا الاستر بلاستات Osteoblasts وهى ترسب أملاح كالسيوم جديد أى تعمل على تكوين للعظام Bone formation.

٢- خلايا الاستير كلاستات Osteoclasts وهى تعمل على تاكل أو إزالة أملاح الكالسيوم الزائدة Bone resorption.

وهناك توازن مستمر بين الكالسيوم المضاف إلى العظام وبين الكالسيوم المزال منها ففى الشخص البالغ يتم يومياً تبادل ٧٠٠ مليجرام كالسيوم فى العظام (Whedone، ١٩٦٤) أى أن العظام، تعمل كمخزن للكالسيوم والفوسفور يتم السحب منه عند احتياج الجسم.

وتحدث هذه العملية سريعة فى مراحل النمو السريع. وتقل بعد ذلك. ويستمر حتى فى مرحلة البلوغ. ويلاحظ أنه إذا زادت عملية إزالة الكالسيوم عن العظام أكثر من الترسيب فإن ذلك يودى إلى لين العظام Osteomalatia وتظهر هذه الحالة فى فترات الحمل والرضاعة حيث تزداد احتياج الجسم من الكالسيوم لبناء الهيكل العظمى للجنين.

وتتكون الأسنان - مثل العظام - من ملح الاباتيت Hydroxapatite ولكن يزداد حجم البلورات ويقل محتواها المائى (أقل من ١٠٪) بجانب تفاوت نسب المواد العضوية وغير العضوية، فطبقة الأنامل Enamel، وهى الطبقة الخارجية فى السنة تحتوى على ٩٩,٥٪ مواد غير عضوية، وطبقة دنتين Dentin، وهى أسفل الطبقة الخارجية تحتوى على ٨٧٪ مواد غير عضوية، أما مادة الاسمنت فتحتوى على ٧٠٪ مادة عضوية وتحتوى طبقة الأنامل على ٣٦٪ كالسيوم و ١٧٪ فوسفور، وطبقة الدنتين تحتوى على ٢٧٪ كالسيوم و ١٣٪ فوسفور، ويوجد تبادل مستمر للمعادن بين الإنامل واللعاب، ولكن يعكس العظام، فإن السنة ليس لها القدرة على تجديد

أنسجتها إذا تلفت بالتسوس أو الكسر، والمادة العضوية الموجودة فى طبقة الأنامل عبارة عن بروتين أساساً كيراتين، أما بروتين الدانتين فهو عبارة عن كولاجين مثل العظام: جدول (٨-٤) يوضح الاختلاف فى تركيب العظام والأسنان من حيث نسبة الكالسيوم والفوسفور.

جدول (٨-٤) محتوى العظام من المواد العضوية وغير العضوية

العظام	الأسنان	
	الإنامل	دنتين
مواد عضوية	٣٠ - ٤٠ % كولاجين (بروتين)	١٣ % كولاجين
مواد غير عضوية	٦٠ - ٧٠ %	٨٧ %
الكالسيوم	٢٤ %	٢٧ %
الفوسفور	١٠ %	١٣ %

ويبدأ تكلس الأسنان المؤقتة أو اللبنية فى الجنين ابتداء من الأسبوع العشرين. ويكمل تكوين السنة قبل ظهورها فى التجويف الفمى بفترة قصيرة. ويبدأ تكلس الأسنان الدائمة فى عمر ٣ أشهر إلى ٣ سنوات بينما يبدأ تكلس ضرس الثالث أى ضرس العقل Wisdom tooth عند سن ١٠ سنوات وهى آخر ضروس تظهر فى الفم.

ويزداد الاحتياج للكالسيوم لبناء الأسنان فى فترة التكوين حيث أن انخفاض الدخل اليومى من الكالسيوم فى هذه الفترة يؤدى إلى ضعف فى التكوين وهشاشة الأسنان وزيادة احتمال فسادها وتسوسها وهذا التأثير غير رجعى حيث أن الأسنان غير قادرة على تجديد نفسها كما هو الحال فى العظام.

وعموماً هناك عوامل أخرى مهمة تدخل فى عملية التكلس بجانب وجود الكالسيوم والفوسفور منها تواجد البروتين الحيوانى وفيتامينات A، C، B<sub>1</sub>، D، والمغنسيوم والمنجنيز فى الوجبة الغذائية اليومية.

## ثانيًا: تنظيم بعض العمليات الحيوية:


كمية الكالسيوم الموجودة خارج العظام تشكل ١٪ من وزن الجسم، بما لا يزيد عن ١٠ جم كالسيوم توجد في الدم ومخالييل الجسم خارج الخلايا والأنسجة الرخوة.

ويوجد الكالسيوم في سیرم الدم بنسبة ١٠ ملجم/١٠٠ مل، ويوجد نصف هذه الكمية في صورة أيونية، أما الباقي فيوجد متحدًا مع البيرمين السیرم، فإذا انخفض مستوى الألبومين في الدم نتيجة سوء تغذية البروتين فينخفض مستوى مركب الكالسيوم مع البروتين، ولكن هذا ليس له تأثير واضح، أما انخفاض نسبة الكالسيوم المتأين في الدم فإن حساسية الأعصاب الحركية تزيد، وخصوصًا في الوجه والأيدي والقدمين، وتؤدي إلى التشنج Tetany وتصبح العضلات رخوة.

هذه الكمية الصغيرة من الكالسيوم الموجودة خارج العظام تقوم بدور حيوي في حياة الإنسان حيث أنها:

### ١- عامل أساس لتجلط الدم Blood - clotting :

يساعد الكالسيوم الموجود في الدم في الصورة الأيونية. انطلاق مركب من الدهون الفوسفورية يسمى Thromboplastin من صفائح الدم، هذا المركب يعمل كعامل مساعد لتحويل مركب Prothrombin وهو أحد المكونات الطبيعية الموجودة في الدم إلى مركب Thrombin. ويساعد Thrombin على تحويل Fibrinogen إلى فبرين Fibrin وهي المادة المسئولة عن تجلط الدم. ويوضح شكل (٨-٤) أن الكالسيوم ضروري وجوده لإتمام سلسلة التفاعلات اللازمة لتجلط الدم. ويعمل الكالسيوم على إيقاف نزيف إذا حدث شرج في جدر الأوعية الدموية، وقد يكون النزيف مميتًا.



### شكل (٨-٤) ميكانيزم تجلط الدم

#### ٢- عامل مساعد لكثير من التفاعلات الحيوية:

يعمل الكالسيوم على تنشيط كثير من الإنزيمات والتفاعلات الحيوية مثل:

- أ- يؤثر الكالسيوم في امتصاص فيتامين B<sub>12</sub> من القناة الهضمية.
- ب- وجود الكالسيوم في المحاليل داخل الخلايا البنكرياسية يساعد على إفراز هرمون الأنسولين.

ج- ينشط الكالسيوم إنزيم Lipase والعديد من الإنزيمات التي تعمل على انطلاق الطاقة من الكربوهيدرات مثل Succinic dehydrogenases.

د- يعتمد بناء وهدم مركب Acetylcholine على وجود الكالسيوم، وهى المادة المسؤولة عن النقل الكيميائي للنبيضات العصبية بين الأعصاب وبعضها فى منطقة التشابك العصبى أى الوصلة العصبية.

#### ٣- عامل مهم فى تنظيم نفاذية الأغشية وجدر الخلايا:

يوجد الكالسيوم فى أغشية الخلايا مرتبطاً إرتباطاً قوياً بمركب الليستين Lecithin الذى يتحكم بدوره فى نفاذية أغشية وجدر الخلايا وبالتالي فى مرور العناصر من وإلى الخلية.

#### ٤ - تنظيم عمل العضلات وانقباضها ونقل النبضات العصبية:

يعمل الكالسيوم على تنشيط انقباض العضلات وتسهيل نقل النبضات العصبية كما سبق ذكره.

#### ٥ - تنظيم ضربات القلب.

#### ٦ - يساعد الكالسيوم على منع الحموضة والقلوية الزائدة في الدم:

ولأنّ هذه التفاعلات لا بد من المحافظة على مستوى الكالسيوم في الدم بحيث لا يقل في الحالات الطبيعية عن ١٠ ملجم/١٠٠ مل دم ويتم ذلك على حساب كمية الكالسيوم المخزنة في العظام بغض النظر عن الدخل اليومي من الكالسيوم.

#### تنظيم مستوى الكالسيوم في الدم:

يتم تنظيم والمحافظة على مستوى الكالسيوم في الدم في ثلاث مواقع: القناة الهضمية، العظام، والكلى، ويساعد فيتامين D على امتصاص الكالسيوم وترسيبه في العظام والأسنان كما يساعد هرمون الغدة فوق الدرقية Parathyroid gland على نقل الكالسيوم خلال جدر القناة الهضمية.

كما يعمل هرمون الغدة فوق الدرقية على إفراز الفوسفات في البول، ويتسبب عن ذلك نقص مستوى الفوسفات في الدم، وهذا يؤدي إلى تحريك الكالسيوم من العظام وبالتالي يرتفع مستوى الكالسيوم. وبالإضافة إلى ذلك فإن هرمون الغدة فوق الدرقية يعمل على تحريك الكالسيوم من الدم إلى العظام وبالعكس، فإزالة الغدة فوق الدرقية - كما يحدث في بعض العمليات الجراحية - يؤدي إلى خفض مستوى الكالسيوم في الدم وزوال حالة التشنج وزيادة إفراز الكالسيوم في البول كما وجد Copp وزملاؤه سنة ١٩٦٤ في تجاربهم على الكلاب أنه يوجد هرمون آخر يعمل على خفض مستوى الكالسيوم المرتفع، يُفرز من خلايا خاصة تسمى C calls في الغدة فوق الدرقية وهو هرمون كالستونين Calcitonin. وقد وجد أن هذا الهرمون يؤدي إلى خفض مستوى الكالسيوم في الدم؛ إذ أنه يمنع من تحريك الكالسيوم من العظام، ويبدو أن هذا الهرمون يعمل أثناء فترات النمو وليس له أثر كبير في الشخص البالغ.



إن إفرازات هرمون الغدة فوق الدرقية وهرمون كالستونين يتوقف على مستوى الكالسيوم فى الدم، فعند انخفاض مستوى الكالسيوم فى الدم فإن هرمون الغدة فوق الدرقية يعمل على رفع مستوى الكالسيوم عن طريق زيادة امتصاصه من الأمعاء الدقيقة، زيادة إزالة الكالسيوم من العظام **resorption** كما يؤثر على الكلى بخفض إخراج الكالسيوم. أما فى حالة ارتفاع مستوى الكالسيوم فإن إفراز الغدة فوق الدرقية يقل، ويفرز هرمون كالستونين الذى يعمل على خفض الكالسيوم فى الدم.

كما أن هرمون النمو للغدة النخامية يؤثر على ميثابوليزم الكالسيوم بصورة غير مباشرة، وذلك بتأثير على نمو العظام على المدى الطويل.

وتعمل هرمونات **adrenocortical** على تنظيم حركة الكالسيوم فى ثلاث مواقع: زيادة إخراج الكالسيوم بواسطة الكلى، يقلل من امتصاص الكالسيوم من الأمعاء الدقيقة، منع ترسيب الكالسيوم **bone formation** وأيضاً إزالة الكالسيوم **bone resorption** من الجهاز العظمى. أما تأثيرات الهرمونات الجنسية فغير واضح حتى الآن.

### **امتصاص الكالسيوم : Absorption**

امتصاص الكالسيوم فى الإنسان أصعب منه فى الحيوان وعادة يمتص من ١٠-٤٠٪ فقط من الكالسيوم المتناول تحت أحسن الظروف وتختلف النسبة الممتصة حسب الكمية الموجودة فى الرجات فيزداد معدل الامتصاص كلما قلت الكمية المتناولة. ويحتاج الشخص البالغ للمحافظة على توازن الكالسيوم فى الجسم كميات تزيد عن احتياجه قد تصل إلى ١ جم يومياً وعادة إذا امتص من ٢٠٪ إلى ٣٠٪ من الكالسيوم المتناول يعتبر نسبة طبيعية بل أحياناً قد تصل إلى ١٠٪ فقط. وقد تصل إلى ٥٠٪ فى حالة الأطفال، وفى أثناء الحمل والرضاعة.

ولابد من وجود فيتامين D قبل امتصاص الكالسيوم لينشط تخليق مركب الكالسيوم - البروتين والذى يسهل امتصاص المعدن.

ويحدث الامتصاص فى الاثنى عشر ويقف فى الجزء السفلى من الأمعاء عندما تصبح محتوياتها قلوية. ولابد من خروج الكالسيوم من أى مركب معقد

موجود به ويصبح فى صورة أيونية حيث يرتبط بمركب بروتينى يسهل المرور من جدار الأمعاء إلى مجرى الدم عن طريق الانتشار بينما يمر الكالسيوم غير الممتص ويخرج مع البراز مع جزء بسيط من الكالسيوم الذى يفرز فى القناة الهضمية مع العصارة المعوية.

وتعتمد كفاءة امتصاص الكالسيوم على عدة عوامل تختلف من فرد لآخر وعمرًا يقل معدل الامتصاص مع تقدم العمر.

### **العوامل التى تؤثر على امتصاص الكالسيوم:**

#### **١- احتياج الفرد إلى الكالسيوم :**

كلما زاد احتياج الفرد من الكالسيوم كلما زادت نسبة الامتصاص ولذا يزيد امتصاص الكالسيوم أثناء فترات النمر السريع فتصل فى الأطفال الرضع إلى ٥٠-٧٠٪.

#### **٢- الصورة التى يوجد فيها الكالسيوم فى الوجبة :**

كلما كان الكالسيوم فى صورة قابلة للذوبان فى الماء كلما زادت نسبة امتصاصه.

#### **٣- النسبة بين الكالسيوم والفوسفور فى الوجبة:**

المعروف أن أحسن نسبة بين الكالسيوم والفوسفور فى الوجبة تكون ١:١ وهى النسبة التى تؤدي إلى أحسن درجة لامتصاص الكالسيوم وإن زيادة نسبة أحد العنصرين يرسب العنصر الآخر فى صورة أملاح فوسفات الكالسيوم غير الذائبة وبالتالي تكون غير قابلة للامتصاص.

وفى الرضع تكون النسبة هى ١:٥ ثم تقل خلال السنة الأولى إلى ١:١ وتستمر بعد ذلك... ويمكن للإنسان أن يتحمل نسبة ما بين ٢:١ ، ١:٢ . وإذا زادت نسبة الفوسفور كثيراً فإنه يعمل على زيادة فصل الكالسيوم من العظام resorption ويعمل على ارتفاع الفقد فى البراز.

#### **٤- درجة الحموضة:**

يحتاج الكالسيوم لامتصاصه إلى درجة من الحموضة تساعد على ذوبان

أملأه. فتعمل حموضة المعدة على زيادة امتصاص الكالسيوم الذى يتم معظمه فى  
الاثنى عشر.

وقد يفسر سوء تمثيل الكالسيوم فى حالة الكساح بأن يرجع إلى ارتفاع رقم  
حموضة المعدة pH التى تعمل على ترسيب الكالسيوم.

#### ٥- فيتامين D:

يعمل فيتامين D على زيادة وسهولة امتصاص الكالسيوم وخصوصاً فى حالة  
قلة مستوى الكالسيوم فى الغذاء. حيث يعمل مع هرمون الغدة فوق الدرقية  
Parathyroid hormone على تنظيم كمية الكالسيوم فى الدم. كما أن فيتامين D  
يساعد فى تكوين البروتين الذى يرتبط مع الكالسيوم لتسهيل نقله عبر الأمعاء الدقيقة.  
٦- سكر اللاكتوز:

وجود اللاكتوز يزيد من امتصاص الكالسيوم حيث يكون مركب معقد من  
اللاكتوز والكالسيوم فى الأمعاء الدقيقة يعمل على تسهيل مرور الكالسيوم إلى الغشاء  
المخاطى المبطن للأمعاء Mucosa ويمنع ترسيب الكالسيوم عند تغيير درجة حموضة  
الأمعاء من الحامضية إلى القلوية.

#### ٧- البروتين:

ظهر أن وجود البروتين أو الأحماض الأمينية فى الغذاء يساعد على امتصاص  
الكالسيوم وقد يرجع هذا إما إلى تكوين مركبات من الكالسيوم والأحماض الأمينية  
ذائبة فى الماء أو إلى تغيير حموضة المعدة. كما أن أحماض lysine و arginine تكون  
أملاح كالسيوم ذائبة يسهل امتصاصها. كما أن هذا قد يعرض ما يفقده الفرد عن  
طريق الإخراج.

#### ٨- الدهون:

وجود الدهن بكميات قليلة فى الأمعاء ومرورها ببطء فى القناة الهضمية  
يساعد على امتصاص الكالسيوم.

#### ٩- حامض الستريك:

يؤدى حمض الستريك والسترات إلى نتائج جيدة فى حالة الكساح الناتج  
تجريبياً كما يستعملان فى معالجة الكساح ولين العظام.

## ١٠- فيتامين C، وفيتامين A:

وجد أن فيتامينى C، A ضروريان لامتصاص الكالسيوم.  
ومن جهة أخرى هناك عوامل تتدخل وتعيق عملية امتصاص الكالسيوم:

### ١- نقص فيتامين D :

نقص فيتامين D يقلل أو يمنع امتصاص الكالسيوم وبالتالي لا يجعله متاحًا في الجسم، حيث لا يتكون البروتين الذى يساعد في نقل الكالسيوم عبر جدر الأمعاء الدقيقة.

### ٢- الدهون:

وجود الدهون بكميات كبيرة فى الوجبة أو سوء امتصاص الدهون تؤدى إلى زيادة كمية الأحماض الدهنية التى تكون مع أملاح كالسيوم (صابون الكالسيوم)، غير قابل للذوبان فى الماء، ويخرج الكالسيوم مع البراز.

### ٣- حامض الفيتيك Phytic acid (اينوسيتول حمض الفوسفوريك) :

حمض الفيتيك من العوامل المهمة التى تعيق امتصاص الكالسيوم حيث يكون فيتامين الكالسيوم غير الذائبة التى تخرج مع البراز. ويوجد حمض الفيتيك فى الحبوب. لذلك فإن التغذية على الخبز الكامل تزيد من فقد الكالسيوم فى صورة فيتامين كالسيوم. وكذلك يزيد بالتالى من نقص الفوسفور. يمكن لإنزيم phytase الموجود فى بعض الحبوب أن يحلل حامض الفيتيك، ولهذا فإن الكالسيوم فى الخبز والمخبوزات المخمرة يكون أكثر امتصاصًا من تلك غير المخمرة.

### ٤- حامض الاكساليك:

يتوقف مدى الاستفادة من الكالسيوم المتاح فى بعض الفواكه والخضروات على محتواها من حمض الاكساليك. حيث يتحد حمض الاكساليك فى القناة الهضمية مع الكالسيوم لتكوين اكسالات الكالسيوم وهى أملاح غير قابلة للذوبان وقد ترسب فى الكلى والمرارة فى صورة حصوات. وتوجد الاكسالات فى السبانخ والكاكاو.

### ٥- القلوية:

يكون الكالسيوم (والفوسفور) فى البيئة القلوية ملح فوسفات الكالسيوم غير ذائب لا يمكن امتصاص الكالسيوم منه.

## ٦- حركة الأمعاء:

يقل معدل امتصاص الكالسيوم إذا زادت سرعة مرور الغذاء فى الأمعاء كما فى حالة الإصابة بالاسهال لفترات طويلة.

## ٧- الحركة:

قلة الحركة والنشاط وزيادة الوزن يقلل القدرة على الامتصاص.

## ٨- الضغوط النفسية:

القلق والضغوط النفسية تؤثر على امتصاص الكالسيوم. والإجهاد العقلى يقلل من امتصاص الكالسيوم ويزيد من فقدته وإفرازه خارج الجسم.


## ميتابوليزم الكالسيوم Metabolism :

بمرور الكالسيوم خلال جدار الأمعاء ينقل إلى بلازما الدم وينطلق فى محاليل الجسم المختلفة. ومن هناك تمتص الخلايا كمية الكالسيوم اللازمة لنموها. جزء من الكالسيوم يدخل فى العصاراة الهاضمة ويفرز فى المعدة والأمعاء ومعظمه يعاد امتصاصه ثانياً؛ ويصل الكالسيوم غير الممتص الذى يفرز مع البراز إلى ٧٠ - ٨٠٪ (شكل ٨-٥). فى حين يفرز مع البول فى المتوسط ما بين ١٠٠-١٧٥ مجم/اليوم، وقد يزيد بارتفاع البروتين المتناول ولكن يقل بارتفاع الفوسفور. ويفرز مع العرق كمية ضئيلة من الكالسيوم (١٥-٢٠ ملجرام).

وكما سبق القول معظم الكالسيوم الممتص يستخدم فى تكلس العظام فى وجود فيتامين D وإنزيم الفسفاتاز.

وتعمل العظام كمخزن للكالسيوم. فعندما يكون مستوى الكالسيوم فى الجسم مناسباً يزن الكالسيوم فى مخازن ابرية الشكل Trabeculae فى أطراف العظام ويسهل سحب الكالسيوم من هذه المخازن عند احتياج الجسم وينظم مستوى الكالسيوم فى الدم كما سبق.

وأثناء الرضاعة يفرز مع لبن الأم كمية من الكالسيوم تصل إلى ٢٥٠ ملليجرام فى اللتر، ولذلك تحتاج دائماً الأم المرضع إلى دخل يومى زيادة من الكالسيوم.



شكل (٨-٥) ميثابوليزم الكالسيوم

### نقص الكالسيوم Deficiency :

عادة يحدث نقص الكالسيوم في الفئات الحساسة التي تزداد احتياجاتها للكالسيوم مثل الأطفال في مرحلة النمو والفتيات أثناء فترة المراهقة والسيدات في منتصف العمر ففي دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت أن ٨٧٪ من الإناث في سن من ١٥-١٨، ٨٤٪ في عمر من ٣٥-٥٠ سنة كان دخلهن اليومي من الكالسيوم منخفضاً.

وتعتبر حالات النقص الشديد من الكالسيوم حالياً نادرة ولكن المشكلة في انتشار حالات النقص المتوسطة. ومن أول علامات نقص الكالسيوم هو الشعور بالعصبية والحزن والقلق وعدم انتظام ضربات القلب وتقلص عضلات الأيدي والأرجل والتشنج وآلام المفاصل وانخفاض معدل النبض وفي حالات النقص الشديد يقف النمو ويصاب الأطفال بالكساح Rickets والكبار بلين العظام Osteomalacia. السبب الأساس للإصابة بمرض الكساح Rickets في الأطفال هو نقص فيتامين D ولو أن نقص دخل الطفل من الكالسيوم والفوسفور وعدم توازن نسبة الكالسيوم: الفوسفور في الوجبة يؤدي إلى الإصابة بهذا المرض.

يسبب نقص الكالسيوم في البالغين إلى الإصابة بمرض لين العظام Osteomalacia وهو أن تصبح العظام رخوة وفشل الشام العظام المكسورة. وهذه

الحالة عادة نتيجة لنقص فيتامين D والكالسيوم وهونادر فى البلاد المتقدمة ولكن شهود بكثرة فى الشرق الأقصى حيث يصيب الأمهات الحوامل نتيجة ازدياد احتياج الأم إلى الكالسيوم لتوفير احتياجات هيكل الجنين العظمى فإذا لم تحصل الأم على الكالسيوم الكافى فى غذائها فإنها نفى باحتياجات الجنين على حساب الأم.

عادة يتداخل أعراض مرض لين العظام Osteomalacia مع مرض ضمور أو هشاشة العظام Osteoporosis الذى يصيب كبار السن حيث تصبح العظام هشة مسامية نتيجة لعدم القدرة على التكوين الطبيعى للعظام وتكرار حدوث كسر لهذه العظام. والسبب الأصلى هو حدوث خلل فى بناء الشبكة البروتينية فى العظام. بجانب توازن سالب لميتابولزم الكالسيوم استمر لمدة طويلة بحيث يزداد فيها إزالة الكالسيوم عن ترسيبه كذلك لفشل إضافة المعادن النادرة على الشبكة البروتينية.

ومن العوامل التى تساعد على فقد الكالسيوم من العظام عدم الحركة والبقاء فى الفراش لمدة طويلة بسبب المرض أو الشيخوخة. فيزداد فقد الكالسيوم فى البول ويظهر مرض ضمور العظام خلال أشهر ولذلك فالحركة من الأشياء الضرورية لسلامة العظام. والسيدات أكثر عرضة للإصابة بضمور العظام حيث تقل الكتلة العظمية التى يفقد عنها الكالسيوم عن الرجال وفى الوقت نفسه يحدث الفقد سريعاً.

ويزداد الفقد من الكالسيوم فى السيدات بعد سن اليأس Menopause بحوالى من ١٠-٥ سنوات لانخفاض تركيز هرمون estrogen وقد تصل كمية الكالسيوم التى تفقدها بعض السيدات إلى ٥٠-٤٥٪ من كالسيوم العظام. كما يقل نسبة امتصاص الكالسيوم كلما تقدم العمر للسيدات والرجال عمومًا. وبالتالى يزداد الاحتياج كلما تقدم العمر.

كما أثبتت الدراسات الحديثة أن شرب من ٢-٣ أكواب لبن يوميًا يقى الإنسان من الإصابة بسرطان القولون حيث يؤثر الكالسيوم على أحماض الصفراء وتقليل سميتها.

كما وجد علاقة بين ارتفاع ضغط الدم وانخفاض الدخلى اليرمى من الكالسيوم.

## زيادة الكالسيوم:

تحدث إما نتيجة لزيادة كمية الكالسيوم المتناول أو الممتصة أو نتيجة لزيادة تناول فيتامين D فى الصغار ما بين ٥-٨ أشهر حيث يعانى الطفل من فقد الشهية وقىء وهزال وإمساك وترهل فى العضلات وقد يرتفع مستوى الكالسيوم فى الدم والبول ومستوى الكولسترول فى الدم كما يرتفع ضغط الدم. وقد يحدث تكلس فى القلب والكلى وتأخر عقلى وتلف فى المخ وعادة تنتهى هذه الحالة بموت الطفل وتعالج بالإقلال من تناول فيتامين D. كما أن زيادة الكالسيوم قد تؤدي لزيادة هرمون calcitonin الذى يمنع انفصال الكالسيوم من العظام.

أما فى الكبار فيحدث زيادة الكالسيوم نتيجة لزيادة نشاط الغدة فوق الدرقية Parathyroid gland أو زيادة تناول فيتامين D. وعلى أى حال فإن هذه الحالة نادرة الحدوث حيث أن الجسم يعمل على تنظيم مستوى الكالسيوم.

ويلاحظ أن زيادة الكالسيوم عن الاحتياج كثيراً فإنه يؤدي إلى تكوين ملح فوسفات ثلاثى الكالسيوم tricalcium phosphate غير الذائبة التى تتداخل مع امتصاص الفوسفور، كما أن الزيادة من الكالسيوم تقلل من امتصاص عناصر معدنية أخرى، وخصوصاً إذا كان المتناول منها يقابل فقط احتياج الجسم منها مثل المغنسيوم، الحديد، اليود، منجنيز، زنك، نحاس...

## الكميات الموصى به من الكالسيوم :

يوضح جدول (٨-٥) الكميات الموصى بها والكالسيوم / اليوم حسب

RDA (١٩٨٩).



جدول (٨-٥) الكميات الموصى بها من الكالسيوم / اليوم / الفرد

الفئة	العمر بالسنوات	كالسيوم ملجم/ اليوم
رضع	صفر - ٠,٥	٤٠٠
	٠,٥ - ١,٠	٦٠٠
أطفال	١-٣	٨٠٠
	٤-٦	٨٠٠
	٧-١٠	٨٠٠
ذكور	١١-١٤	١٢٠٠
	١٥-١٨	١٢٠٠
	١٩-٢٤	١٢٠٠
	٢٥-٥٠	٨٠٠
	٥١+	٨٠٠
إناث	١١-١٤	١٢٠٠
	١٥-١٨	١٢٠٠
	١٩-٢٤	١٢٠٠
	٢٥-٥٠	٨٠٠
	٥١+	٨٠٠
حمل رضاعة		٤٠٠+
		٤٠٠+

المصادر الغذائية Food sources :

يوجد الكالسيوم بكميات مناسبة فى أغذية قليلة (جدول ٨-٦) وأهم مصدر له هو اللبن ومنتجاته مع ملاحظة أن محتوى لبن الأم من الكالسيوم (حوالى ٣٠٠ مجم/ لتر اللبن) أقل من محتوى اللبن البقرى من الكالسيوم (٦٠٠-٧٠٠ مجم/ لتر اللبن) فى حين أن الكمية الممتصة فى جسم الطفل من لبن الأم تصل إلى ٦٦٪ من كميته بينما تصل إلى ٢٥-٣٠٪ فقط من لبن الأبقار. وكذلك تعتبر الخضراوات الورقية مصدراً جيداً، (مع ملاحظة احتواء السبانخ على أكسالات) وصفار البيض

والسردين العلب السالمون بالعظم - فول الصويا. أما اللحوم والبيض فيوجد فيها الكالسيوم بنسب بسيطة.

#### جدول (٨-٦) بعض المصادر الغذائية للكالسيوم

الغذاء	الكمية	كالسيوم (مجم)
زبادى	١ كوب	٤٥٢
جبنه شيدر	٦٠ جم	٤٠٨
سردين علب	١٢٠ جم	٣٧١
لبن فوز	١ كوب	٣٠٢
لبن ٣,٥ ٪ دهن	١ كوب	٢٨٥
سالمون محفوظ	١٢٠ جم	٢٧٤
عسل أسود	ملعقة صغيرة	١٣٧
برتقال	وحدة	٦٧
بيض	وحدة	٢٧

ولا يفقد الكالسيوم أثناء بسترة أو تجنيس أو تسخين أو تجفيف اللبن. وعادة يفقد الكالسيوم بكميات صغيرة أثناء سلق الخضروات المقلية ويمكن تقليل فقد معظم العناصر المعدنية إذا تم طهي الخضروات بدون تقشير.

#### ٢- الفوسفور Phosphorus

كان أول من اكتشف الفوسفور العالم الألماني Brand ١٦٦٩، واسمه مشتق من اللغة اليونانية for light bringing.

ويعتبر الفوسفور ثنائي عنصر في الجسم من حيث كميته وهو يوجد في جميع الخلايا ويحتوى جسم الإنسان البالغ من ٦٠٠ إلى ٩٠٠ جم فوسفور، ١٪ من وزن الجسم؛ أى يمثل  $\frac{1}{4}$  المعادن في الجسم من هذه الكمية حوالى (٨٠-٨٥٪) في صورة غير عضوية في الهيكل العظمى مع الكالسيوم. أما الباقي فيوجد في الدم وخلايا الجسم في صورة أيونات فوسفاتية ذائبة وهى التى تدخل فى التفاعلات المختلفة ويحتوى الدم على ٣٠-٤٥ ملجم / ١٠٠ مل دم فوسفور، نصفه فى كرات الدم

الحمراء وفى السروم الفرد البالغ ٢,٥ - ٤,٥ ٪ ملجم / ١٠٠ مل سروم. أما فى الأطفال فمستواه ٤-٧ ملجم / ١٠٠ مل دم.

### وظائف الفوسفور Function :

ويؤدى الفوسفور للجسم وظائف متعددة فهو يتحد مع الكالسيوم بنسبة ١ : ٢ لتكوين فوسفات كالسيوم لبناء العظام والأسنان كما أنه يلعب دوراً هاماً فى جميع تفاعلات الميتابوليزم فى الجسم، خاصة فى عمليات توليد ونقل وتخزين الطاقة الحيوية حيث يدخل فى تركيب Adenosine Triphosphate (A T P) والاستفادة منها لازم لميتابوليزم الكربوهيدرات والبروتين والدهون للنمو والحفاظة على الأنسجة المختلفة. الفوسفور لازم لميتابوليزم الأحماض الأمينية. ويدخل الفوسفور فى تركيب الإنزيمات اللازمة لكثير من العمليات الحيوية ويلزم لفسفرة الكربوهيدرات والأحماض الدهنية لامتصاصها. كما أنه مهم لبناء العضلات.

كما يدخل فى تكوين النيوكلوبروتينات Nucleoproteins وهى المادة الأساسية فى تكوين نواة الخلايا وانقسامها وهى المسئولة عن نقل العزامل الوراثية من الآباء إلى الأجيال التالية.

ويدخل فى تكوين الفوسفوليبيدات Phospholipids مثل اللستين Lecithin التى تساعد على تحليل وامتصاص ونقل الدهون ومنع تراكم الأحماض الزائدة أو القلوية الزائدة فى الدم أى تنظيم ميزان الحموضة والقلوية. وتساعد أيضاً على مرور بعض المواد خلال جدر الخلايا كذلك كثير من فيتامينات B تنشط فقط عند ارتباطها بالفوسفات.

الفوسفور مهم لتنظيم تفاعلات الجسم حيث يكرن حمض الفوسفوريك وأملاحه أحد البفرات الهامة وينشط Stimulate الفوسفور انقباض العضلات فيعمل على تنظيم انقباض عضلات القلب، كما أظهرت الأبحاث الحديثة أهمية الفوسفور للأعصاب وللنشاط العقلى.

### الامتصاص والميتابوليزم Absorption & Metabolism :

يتم امتصاص حوالى ٧٠ ٪ من فوسفور الغذاء من الأمعاء إلى مجرى الدم ويتم ذلك بعد نزعه من المركبات، ويمتص فى صورة أملاح فوسفور غير عضوية. أما

استرات الفوسفور فتحلل إلى فوسفور بواسطة إنزيمات الفوسفاتيز. ويخزن حوالى ٨٨٪ من الفوسفور المتص فى العظام والأسنان مع الكالسيوم. وعادة تنظم عملية توازن الفوسفور المتص عن طريق إفراز الكمية الزائدة مع البول. وتتوقف كمية الفوسفور فى البول على كمية الفوسفور المتص كذلك كلما زادت كمية الكربوهيدرات كلما قلت كمية الفوسفور المتص كذلك تزداد الكمية فى حالة الجوع أو فى حالة الحموضة. وجميع العوامل التى تؤثر على امتصاص وتمثيل الكالسيوم تؤثر على امتصاص وتمثيل الفوسفور. وقد يؤثر وجود كميات كبيرة من الحديد والألومنيوم والمغنسيوم على كمية الفوسفور الممتصة حيث تكون أملاح غير ذائبة للفوسفات.

وينظم الميتابوليزم بواسطة هرمون الغدة فوق الدرقية وهرمون كالستونين.

ويخرج فى البراز حوالى ٣٠٪ من فوسفور الغذاء.

وتقوم الكلى بتنظيم مستوى الفوسفور فى السيرم، فإذا انخفض مستواه تقوم الكلى بإعادة معظم الفوسفور إلى الدم. أما فى حالة الزيادة فتعمل الكلى على إخراج هذه الزيادة فى البول. وأيضاً فى حالة نقص فوسفور الغذاء فإن الكلى تعيد معظمه إلى الدم، وعادة يخرج الفرد ٠,٦ - ١ جم فوسفور / ٢٤ ساعة.

### **أثر نقص وزيادة الفوسفور:**

حالات النقص نادرة ولكن نقص الفوسفور والكالسيوم وفيتامين D تؤدي إلى وقف النمو وعدم إتمام تكلس العظام وتصبح العظام سهلة الكسر هشّة.

وقد يؤدي تناول كميات كبيرة من العقاقير المضادة للحموضة غير القابلة للامتصاص antiacids إلى ظهور أعراض نقص الفوسفور وتتميز بالاحساس بتعب جسماني وعقلي، فقدان فى الشهية، عدم انتظام فى التنفس وآلام فى العظام. وقد تكون وجبات النباتيين الخالية من اللبن منخفضة فى الفوسفور، ولا يوجد أعراض تسببها الزيادة فى كميات الفوسفور.

وفى حالة انخفاض النسبة من P : Ca يؤدي ذلك إلى ظهور أمراض التهاب المفاصل Arthritis، البيوريا Pyorrhea، والكساح Rickets وفساد الأسنان. كما أن انخفاض الفوسفور فى الغذاء لفترة طويلة يؤدي إلى الكساح ولين العظام وهشاشتها.

### مصادر الفوسفور الغذائية:

يوجد الفوسفور في كثير من الأغذية مثل اللحم والدواجن والسمك والبيض واللبن والحبوب والخميرة والشيكولاته والعسل الأسود. ولكن يلاحظ أن الحبوب والشيكولاته تحتوي على الفيتين Phitin الذى يعوق امتصاص الفوسفور نظراً لعدم تحلله بواسطة العصارات الهاضمة، أما الخضروات والفراكهة فهي فقيرة في الفوسفور. ويلاحظ أن كثرة تناول الأطفال للأغذية الغنية بالفيتين قد يؤدي إلى ظهور حالات نقص الكالسيوم والفوسفور. ولا يوجد بمستوى يذكر في الدهون والزيوت.

### الكميات المقررة يومياً:

احتياجات الفرد من الفوسفور مساوية لاحتياجاته من الكالسيوم. ولابد من توفير فيتامين D حتى يمكن الاستفادة من فوسفور الغذاء. كذلك لابد من مراعاة نسبة الكالسيوم إلى الفوسفور في الغذاء ويقترح أن هذه النسبة تكون ١ : ١,٥ عند سن سنة. عادة الوجبات المحتوية على ما يلزم الفرد من الكالسيوم والبروتين تكون محتوية على الكمية اللازمة من الفوسفور.

### ٣ - الماغنسيوم

يحتوى جسم الإنسان على ٢٠-٣٠ جم من الماغنسيوم. لذا فهو من المعادن الرئيسية والضرورية لجسم الإنسان. وهو يشكل حوالى ٠,٠٥٪ من الوزن الكلى لجسم الإنسان.

ويوجد الماغنسيوم في جميع خلايا الجسم ويتركز حوالى ٦٠٪ من الماغنسيوم في العظام متحداً مع الفوسفور والكالسيوم والكربونات. ويحتوى رماد العظام على ١٪ من الماغنسيوم. كما يوجد ٢٨٪ الباقية في أنسجة الجسم الأخرى و٢٪ فى سوائه، وغالباً يوجد بنسبة ١-٣ ملجم/ ١٠٠ مل سیرم معظمه متحداً مع البروتين. وهو يلى البوتاسيوم كاتيون فى نسبة وجوده فى الخلايا. ومعظم بوتاسيوم الأنسجة موجود فى الكبد والعضلات وكرات الدم الحمراء.

### وظائف الماغنسيوم:

يدخل الماغنسيوم فى بناء العظام والأسنان. وهو مهم للميتابوليزم فى الخلية،

وضرورى لعمل كثير من الإنزيمات المستولة عن ميتابوليزم الكربوهيدرات والأحماض  
الإمينية وكذلك الإنزيمات التى تدخل فى نقل الطاقة مثل الكربوكسيليز  
Carboxylase حيث يتركز الماغنسيوم فى الخلايا فى الميتوكوندريا Mitochondria،  
وكذلك الإنزيمات المتعلقة بالمواد المحتوية على فوسفور، ونقل الطاقة من ADP  
وATP، وإنزيمات Peptidase لهضم البروتين. كما أن الماغنسيوم يدخل فى ميتابوليزم  
الكالسيوم والفوسفور وضرورى للجهاز العصبى.

وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن وجود الماغنسيوم يزيد من كفاءة امتصاص  
بعض العناصر الأخرى مثل Ca، P، Na، K وكذلك الاستفادة من فيتامين B المركب  
وفيتامين C، D فى الجسم. وهناك ظواهر تشير أنه له علاقة بتنظيم درجة حرارة  
الجسم. وله دور فى عمل الغدد الصماء وقد وجد أنه فى حالة زيادة نشاط الغدة  
الدرقية تزيد الحاجة إلى الماغنسيوم. والماغنسيوم ضرورى لتخليق الأحماض النووية،  
وانقباض العضلات والتوازن الكهربائى للخلايا ونقل النبضات العصبية، وكذلك  
لإفراز الإنسولين.

#### الامتصاص Absorption :

يتمتص حوالى ٣٠ - ٥٠٪ من الدخلى اليومى للماغنسيوم فى الأمعاء الدقيقة  
ويزيد معدل الامتصاص بواسطة البروتين، فيتامين D، هرمون النمو، وكمية الكالسيوم  
والفوسفات وسكر اللاكتوز فى الجسم. ويعوق امتصاص الماغنسيوم ارتفاع  
الكالسيوم والفوسفور المتناول وحامض الأكساليك، حامض الفيتيك، والدهون غير  
المهضومة.

وعند انخفاض الدخلى اليومى للماغنسيوم يرتفع معدل الامتصاص وقد يصل  
إلى ٧٥٪ بينما إذا زاد الدخلى اليومى منه يقل المعدل وقد يصل إلى ٢٥٪.  
وينظم عملية إفراز الماغنسيوم فى البول هرمون من الغدة فوق الكلية  
Adrenal gland يطلق عليه Aldosterone ويزداد الفقد فى الماغنسيوم عند استخدام  
مدرات البول. أو تعاطى المشروبات الكحولية. وتزداد الكمية المفرزة فى البراز  
بقلة كمية كالسيوم الغذاء. ويخرج عادة فى البول وتعمل الكلى على إعادة امتصاص  
الماغنسيوم، وبذلك يقل الفاقد عن طريق البول.

### نقص الماغنسيوم : Deficiency :

أكثر الفئات عرضة لنقص الماغنسيوم هم المراهقون والإناث خاصة فى فترة المراهقة وكبار السن. وكذلك قد يصاحب حالات نقص الماغنسيوم فى بعض الأمراض الأخرى مثل مرض السكر والإفراط فى شرب الكحوليات وأمراض الكلى وفى حالة تناول الأدوية المدرة للبول أو القيام بعمل جسمانى شديد والكواشيوركور Kwashiorkor أو المصابين بالإسهال المستمر والقىء والسزلات المعوية وسوء الامتصاص وزيادة إفراز الغدة فوق الدرقية وتتلخص أعراض النقص فى فقد الشهية وغثيان وقىء وإسهال وتشنجات وارتعاش العضلات وتوتر الأعصاب والهلوسة.

كما أثبتت الدراسات الحديثة أن انخفاض مستوى الماغنسيوم فى الدم يعرض الفرد لعدم انتظام ضربات القلب، والإصابة بارتفاع فى ضغط الدم وارتفاع مستوى كولسترول الدم والصداع النصفى والإصابة بحصى فى الكلى وأمراض القلب والاكتئاب (Carper، ١٩٨٧). ويعتقد بعض العلماء أن هناك صلة بين زيادة المتناول من الماغنسيوم والإصابة بالسرطان ولكنه يحتاج إلى زيادة الدراسة.

### السمية : Toxicity :

لم يظهر آثار ضارة لزيادة الدخول اليومي من الماغنسيوم حيث أن تناول كميات كبيرة من أملاح الماغنسيوم له تأثير ملين (٤-٧ جم كبريتات ماغنسيوم يومياً) وزيادة الماغنسيوم يؤثر على توازن العناصر المعدنية الأخرى. وتظهر حالات التسمم عندما لا تستطيع الكلية التخلص من الماغنسيوم فيثراكم، وهذا مصحوب بصعوبة التنفس والغثوبة وقد تنتهى بالوفاة.

### المصادر الغذائية :

ينتشر الماغنسيوم فى أغذية عديدة وخاصة الخضروات الطازجة، حيث يدخل كعنصر أساسى لتكوين الكلوروفيل كما يوجد فى الشعير المجروش وفول الصويا والذرة والحبوب الغنية بالزيوت والمكسرات وخصوصاً اللوز، والتين والتفاح (جدول ٨-٦).

جدول (٦-٨) تقسيم الأغذية حسب محتواها من الماغنسيوم

مصدر غني	مصدر جيد	مصدر متوسط	مصدر فقير
كاكاو المكسرات فول الصويا الحبوب الكاملة المولاس التوابل	الكاكوريا والسبانخ	الحارثات البسلة الطازج الكبد اللحوم	لحم الأغنام اللبن البيض الدواجن معظم الفواكه

الاحتياجات :

تظهر الكميات الموصى بها من الماغنسيوم في (جدول ٨-٨) حسب ARD

(١٩٨٩).

جدول (٨-٨) الكميات الموصى بها من الماغنسيوم / اليوم / الفرد

الفئة	العمر بالسنوات	ماغنسيوم ملجم / اليوم
رضع	صفر - ٠,٥	٤٠
	٠,٥ - ١,٠	٦٠
أطفال	١-٣	٨٠
	٤-٦	١٢٠
	٧-١٠	١٧٠
ذكور	١١-١٤	٢٧٠
	١٥-١٨	٤٠٠
	١٩-٢٤	٣٥٠
	٢٥-٥٠	٣٥٠
	٥١+	٣٥٠
إناث	١١-١٤	٢٨٠
	١٥-١٨	٣٠٠
	١٩-٢٤	٢٨٠
	٢٥-٥٠	٢٨٠
	٥١+	٢٨٠
حمل رضاعة		٣٢٠
		٣٥٠



## ٤ - الكبريت

يوجد الكبريت منتشرًا في جميع الكائنات الحية. وهو من العناصر الهامة في الجسم ويوجد في كل خلية من خلايا الجسم وهو يشكل حوالى ٠,٢٥٪ من جسم الإنسان (حوالى ١٧٥ جم في جسم الإنسان البالغ)، يمثل ١٠٪ من محتوى الجسم من المعادن ويطلق عليه عنصر الجمال لأنه يعمل على لمعان الشعر وتحسين مظهر الوجه وحيويته.

واسم الكبريت مشتق من الكلمة اللاتينية *sulphurum* وكان يقال عنه اسم الحجر المحترق *brimstone* وكان يستخدم في العصور القديمة لتطهير المباني، وقد استخدمه الرومان في الطب وفي الحروب.

### وظائف الكبريت Function :

١- يدخل في تركيب بعض من الأحماض الأمينية الأساسية مثل الميثيونين *methionine* والستين *cysteine* والستين *cystine*.

٢- يدخل في بناء *thiamin* و *biotin* و *COA* ولذا فهو مهم لميتابوليزم الدهون.

٣- ضرورى لبناء الكولاجين *collagen*.

٤- يدخل في تركيب بعض المركبات ذات أهمية حيوية للجسم مثل الكيراتين *keratin* الذى يدخل في تركيب الجلد والأظافر والشعر.

ويدخل الكبريت فى بناء هرمون الأنسولين الذى ينظم ميتابولزم الكربوهيدرات وبناء الصفراء وتركيب السلسلة البيبتيدية جلوتاثيون وهى المهمة فى عمليات التأكسد والاختزال ولحماية الجسم من الأضرار أو الشوارد الحرة. ويلعب دوراً فى تنفس الأنسجة ومع الكبد فى المساعدة على إفراز الصفراء.

كما تتحد مركبات الكبريت مع المواد السامة مثل الفينول والكريزول *cresol* وتحولها إلى مواد غير سامة وتخرج فى البول.

### الامتصاص والميتابوليزم والإخراج :

يمتص معظم الكبريت فى الأمعاء الدقيقة. وفى أثناء الهضم تنفصل الأحماض الأمينية الكبريتية من البروتين وتحمل فى الوريد البابى. ويخزن الكبريت فى كل خلية من خلايا الجسم، ومعظمه يوجد بالشعر والجلد والأظافر.

يُخرج الكبريت الزائد عن حاجة الجسم فى البول والبراز. وحوالى ٨٥ - ٩٠٪ من الكبريت الذى يخرج فى البول يكون فى صورة عضوية، ويستمد من ميثابوليزم الأحماض الأمينية الكبريتية. وحيث أن الكبريت غير العضوى الموجود فى الغذاء امتصاصه ضعيف، لذا فهو يخرج فى البراز.

#### **نقص الكبريت Sulfur Deficiency :**

يؤدى نقص الكبريت إلى تأخير النمو لأن الكبريت مرتبط ببناء البروتين.

#### **المقررات الغذائية :**

لا يوجد مقررات غذائية للكبريت، والمعروف أن سد حاجات الفرد من احتياجات من الأحماض الأمينية الكبريتية يقابل احتياجات الفرد من الكبريت.

#### **السمية Toxicity :**

السمية نادرة إلا فى حالات اضطراب الميثابوليزم الخلقي حيث يكون تمثيل الأحماض الأمينية الكبريتية غير طبيعى. ولا يوجد حالات تسمم من زيادة الكبريت العضوى إلا أن زيادة الكبريت غير العضوى تكون سامة.

#### **مصادر الكبريت :**

يستمد الإنسان حاجته من الكبريت من مركبات الكبريت العضوية، وخصوصاً الأحماض الأمينية الكبريتية. ر. ت. ا. ح. محتوى الكبريت فى الأغذية البروتينية بين ٤،٦ - ١٠،٦٪ حسب نوع البروتين، وعادة تحتوى الوجبة العادية المختلطة على ١٪ كبريت، وأحسن مصادره الجبنة، الدواجن، البيض، السمك، الحبوب ومنتجاتها، البقوليات، المكسرات (جدول ٨-٩).

جدول (٨-٩) محتويات بعض الأغذية من الكبريت ملجم / ١٠٠ جم

الغذاء	الكبريت ملجم	الغذاء	الكبريت ملجم
دقيق فول الصويا	٤١٠	ردة القمح	٢٢٠
الخميرة	٣٨٠	السالمون	٢٢٠
السوداني	٣٨٠	دقيق القمح	١٩٠
العسل الأسود	٣٥٠	الأرض المبيض	١٧٠
البندق	٢٩٠	حبوب القمح	١٦٠
ديك رومي	٢٩٠	الشعير	١٥٠
السردين الملعاب	٣١٠	الذرة الرفيعة	١٥٠
اللحم الحمراء	٢٧٠	اللوز	١٥٠
الدجاج المحمر	٢٥٥	بيض الدجاج	١٤٠
الضأن	٢٤٠	حبوب الذرة	١٢٠
جنين القمح	٢٤٠	الكرنب	١١٠
الفول	٢٣٠	البسلة	٥٠
الجبن الشدر	٢٣٠	اللين الفرز	٣٠
فول الصويا	٢٢٠	الجزر	٢٠

### ٥ - الصوديوم

عرف أهمية ملح الطعام كمصدر للصوديوم منذ قديم الزمان وزاد استخدامه بغرض تحسين وإظهار طعم الغذاء ولكن لم يعرف ضرورة الصوديوم للإنسان حتى عام ١٩١٨ بواسطة Osborn و Mendel. ويحتوي جسم الإنسان على حوالي ١٠٠-١٠٥ جم صوديوم وهو العنصر الموجود في السوائل الخارجية وفي الدم ويوجد بنسبة بسيطة داخل الخلايا و ٥٠٪ من صوديوم الجسم يوجد خارج الخلايا و ١٠٪ منه يوجد داخل الخلايا بينما النسبة الباقية (٤٠٪) توجد في الهيكل العظمي مرتبطة على البلورات العظمية حيث يعمل نصف هذه الكمية كمخزن للصوديوم المتناول مع السوائل الخارجية إذا انخفضت كمية الصوديوم المتناول أو إذا زاد معدل

الفقد خارج الجسم. ومعظم صوديوم الدم يوجد فى البلازما بنسبة ٣٢٠ ملجم / ١٠٠ مل دم.

### وظائف الصوديوم : Functions

الصوديوم هو الأيون الموجب لأساسى فى السوائل الخارجية للخلية، حيث يساعد فى حفظ توازن الماء والحموضة والقلوية. ويدخل الصوديوم فى تركيب عصير البنكرياس والصفراء والعرق والدموع.

وهناك علاقة تبادل بين الصوديوم والبوتاسيوم والكلورين، حيث يقومون معاً بتنظيم الضغط الأسموزى والحموضة والقلوية وميتابوليزم الماء. ولذا يوجد الصوديوم والبوتاسيوم مرتبطين دائماً بأيون الكلوريد. كما أن حالات نقص الصوديوم والبوتاسيوم تكون دائماً مرتبطة بنقص الكلورين.

ويشارك الصوديوم مع البوتاسيوم فى تنظيم الضغط الاسموزى خارج وداخل الخلايا فإذا زاد تركيز الصوديوم داخل الخلايا نتيجة لعدم قدرة الخلية على ضخه للخارج بالسرعة المطلوبة، يمر الماء إلى الخلايا للمحافظة على التركيز الطبيعى وبالتالي يحدث انتفاخ للخلايا أو edema وتحدث هذه الحالة أيضاً إذا زاد دخل الفرد من الماء دون زيادة مناسبة من الصوديوم حيث يمر الماء خلال الغشاء الخلوى لتخفيف تركيز البوتاسيوم لإعادة توازن الألكتروليتات على جانبى الجدار الخلوى. إذا زاد الدخل من الماء يطلق على هذه الحالة بالتسمم المائى water intoxication وإذا صاحب فقد الصوديوم فقد للماء أيضاً يقل حجم السوائل الخارجية مما يسبب انخفاض فى حجم الدم وبالتالي انخفاض فى ضغط الدم وحدوث تقلص للعضلات وارتفاع تركيز خلايا الدم (الهيماتوكريت hematocrit) داخل الدم ويظهر مرض أديسون Addison's disease.

ويعمل الصوديوم على تعادل الحموضة الزائدة فى الجسم حيث ينطلق الصوديوم من مخازنه فى العظام عند وجود كميات كبيرة من حالات العناصر المشبعة للحموضة فى سوائل الجسم ومن أسباب حالات ارتفاع قلوية الدم alkalosis هو تناول الأدوية المضادة للحموضة والمحتوية على صوديوم.

ويرتبط بعمل الخلية العصبية حيث يعمل الصوديوم على نقل الإشارات

العصبية كما سبق القول عن طريق التغيير المؤقت للشحنة الكهربائية الموجودة على جدار الغشاء الخلوى. فإذا حدث أى خلل بين تركيز الصوديوم داخل وخارج الخلايا لا تنتقل هذه الإشارات أو النبضات كذلك يحافظ الصوديوم على حساسية وانقباض العضلات.

ويعتبر وجود الصوديوم ضرورياً لامتصاص الجلوكوز والأحماض الأمينية كما يساعد فى نقل العناصر الغذائية خلال الغشاء الخلوى. كما أن الصوديوم يعمل على بقاء العناصر المعدنية التى فى الدم فى صورة ذائبة ويساعد فى عملية الهضم حيث أنه ضرورى لإنتاج حامض هيدروكلوريك المعدة.

### **الامتصاص والميتابوليزم Absorption and metabolism :**

تتراوح كمية الصوديوم المتناولة فى الوجبة العادية من (٣-٧ جم) أو من (٥-١٨ جم) حسب العادات الغذائية للفرد وكمية ملح الطعام التى تضاف أثناء الطهى أو على مائدة الطعام.

يمتص جزء بسيط من الصوديوم فى المعدة ولكن معظم الصوديوم يمتص من الأمعاء الدقيقة. وينقل الصوديوم الممتص عن طريق الدم إلى الكلى حيث تقوم بترشيحه وإعادة ثانياً إلى مجرى الدم بكميات تحافظ على المستوى الطبيعى للصوديوم فى الدم ويفرز حوالى ٩٠-٩٥% من الصوديوم الممتص مع البول ويتحكم فى تنظيم ميتابوليزم الصوديوم عن طريق الكلى هرمون aldosterone وهو يفرز من الغدة فوق الكلى adrenal gland عند انخفاض تركيز الصوديوم فى الدم. فعند زيادة الاحتياج للصوديوم يزداد إفراز هرمون aldosterone الذى يعمل على تقليل فقد الصوديوم عن طريق البول وإرجاعه ثانياً إلى مجرى الدم والعكس صحيح فعند ارتفاع مستوى الصوديوم فى الدم يقل تركيز الهرمون فى الدم ويخرج الصوديوم الزائد مع البول. ويعكس تركيز الصوديوم فى البول كمية الصوديوم المتناول وجزء من الصوديوم يخزن فى العظام. ويحتوى الدم على ١٦٠ ملجم/ ١٠٠ مل والبلازما ٣٢٠ ملجم/ ١٠٠ مل والخلايا ٨/ ١٠٠ جم والنسيج العضلى ٦٠-١٦٠ ملجم/ ١٠٠ جم والنسيج العصبى ٣١٢ ملجم/ ١٠٠ جم.

وقدرة الكلى على التخلص من الصوديوم الزيادة محدودة بمجم البول الذى

يفرز الجسم. لذلك عند زيادة كمية الصوديوم المتناول عن قدرة الكلى على التخلص منه، يزداد تركيز الصوديوم فى الدم والمخاليص الخارجية. ونتيجة لذلك يحدث تنبه لمركز الاحساس بالعطش فى hypothalamus لزيادة كمية مياه الشرب المتناولة وبالتالي يمكن للكلى إفراز كمية جديدة من البول محتوية على الصوديوم الزائد فى الجسم وبالتالي يقل محتوى الدم من الصوديوم ويتبع ذلك فقد الإحساس بالعطش وعادة تظهر الإحساس بالعطش إذا زاد تركيز الصوديوم فى الدم عن ١٪.

يفرز كمية ضئيلة من الصوديوم مع العرق (أقل من ١ جم) ولكن قد تصل هذه الكمية إلى ٥-٦ جرام فى صورة كلوريد الصوديوم إذ زاد مجهود الجسمانى أو عند ارتفاع درجة حرارة الجو فى المناطق الاستوائية فإذا زاد الفقد، يحافظ هرمون aldosterone على مستوى الصوديوم فى الدم كما سبق الشرح. فى الجو الحار إخراج الصوديوم عن طريق الجلد مهم فيحتوى العرق على ٣,٠ - ٥,٠ جم / لتر. يسبب فقد الصوديوم انخفاض مستواه فى السوائل الخارجية، وللمحافظة على الضغط الاسموزي يخرج البوتاسيوم مع الماء من الخلايا وبالتالي يحدث جفاف للخلايا dehydration وفقد للبوتاسيوم الذى يسبب الشعور بالتعب.

وبعكس البوتاسيوم يدخل الصوديوم فى العصارات الهاضمة مثل إفراز الصفراء bile والبنكرياس والعصارات المعوية والتي تحتوى على ٣ جم / لتر. يفرز كميات (٢٠ جم / اليوم) يومياً فى العصارات الهاضمة ولكن يعاد امتصاصها ثانياً. لذلك فجزء طفيف جداً يخرج مع البراز إلا فى الحالات المرضية مثل الإسهال أو القيء.

### **نقص الصوديوم Deficiency :**

يرتبط نقص الصوديوم بحدوث جفاف للجسم كنتيجة لتعرضه لارتفاع فى درجة حرارة الجو مما يزيد من كمية العرق المفقودة، فينخفض حجم السوائل خارج الخلايا ويقل حجم الدم مما يؤدي إلى تصلب أو تشنج collapsed للعضلات وللأوعية الدموية ويقل ضغط الدم ويزداد النبض وينخفض وزن الجسم. وعادة لا يفرز كلوريد الصوديوم فى البول. وقد لا يشعر الفرد بالعطش ولكن يحدث جفاف فى الفم وفقدان فى الشهية وقىء وصداع وشعور بالدوار. وفى الطفل قد يؤدي إلى وقف النمو، كما يقل إفراز اللبن أثناء الرضاعة.

كما يظهر نقص الصوديوم نتيجة لانخفاض تركيز هرمون aldosterone ويسبب مرض اديسون Addison's disease وتتلخص الأعراض التشخيصية لهذا المرض فى ضعف فى العضلات وانخفاض فى ضغط الدم ويصبح الجلد لونه برونزياً. وقد يظهر حالات نقص الصوديوم دون نقص فى الماء كما فى حالة التسمم المائى water intoxication وتظهر هذه الحالة إذا عوض الفقد الزائد من العرق بشرب ماء فقط دون أملاح كذلك إذا تناول الفرد محاليل ملحية بالغم أو عن طريق الحقن لمدة طويلة، وتظهر أعراضه بانخفاض درجة حرارة الفرد، فقد الشهية والضعف وعدم التركيز الذهني وانقباضات فى العضلات والإغماء coma والتي يصعب تفريقها عن حالات ارتفاع نسبة البولينا فى الدم.

### زيادة الصوديوم Excess :

زيادة الصوديوم فى الجسم مع نقص فى ماء الشرب يؤدي إلى زيادة تركيز الصوديوم فى السوائل خارج الخلايا مما يزيد من قدرة الجسم على الاحتفاظ بالسوائل، ويسبب عادة الاستسقاء edema وعادة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة سرعة الميثابوليزم القاعدي وقد يصاحب ضغط الدم تغير فى سمك جدران الأوعية الدموية مما يؤثر على سريان الدم إلى القلب والكليتين. واستمرار هذه الحالة لمدة طويلة بدون علاج يسبب تلف لهذه الأعضاء ويؤدي إلى الوفاة. وتحدث زيادة الصوديوم إذا أعطى للأطفال الرضع، أو عندما لا تتمكن الكلى من إخراج الصوديوم الزائد.

ويعتبر زيادة ملح الطعام أحد الأسباب الرئيسية فى الإصابة بالبدانة المفرطة. وعموماً فإن لجسم الإنسان القدرة على التعامل مع الكميات الكبيرة من الصوديوم، ومن جهة أخرى فقد ذكرت (Carper ١٩٨٧) أن تناول جرعات كبيرة مركزة من ملح الطعام يسبب التسمم الحاد ونزيف حاد فى النخاع وفشل كلوى وفشل دائم للمخ وقد يؤدي للوفاة كما ذكرت أن تناول ٣ جم ملح كلوريد الصوديوم/كجم من وزن الجسم تعتبر جرعة ممته.

### تحديد كمية الصوديوم المتناول:

أدرج ملح الطعام فى لائحة الأطعمة التى تضر بالصحة العامة فى الولايات

المتحدة فى السبعينيات من القرن العشرين، حيث ثبت علميًا أن الملح أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم وأن الإفراط فى استخدامه يؤدي فى النهاية إلى أمراض القلب وتصلب الشرايين والفشل الكلوى.... إلخ من الأمراض الناتجة عن اختلال الدورة الدموية.

واجتاحت أوروبا وأمريكا فى الفترة الأخيرة من القرن العشرين حملات ضد تناول كميات كبيرة من ملح الطعام بل وصلت شدة هذا الاتجاه إلى طلب إصدار قانون يحتم وضع تحذير ينبه أن الملح ضار بالصحة (كما فى حالة السجائر) وذلك على علب الملح وعلى معلبات السردين والتونة والمخللات وغيرها من المعلبات التى تحتوى على نسبة عالية من الملح.

وكبداية لتحديد كمية الملح المتناول للشخص السليم يقلل بقدر الإمكان استخدام الملح عند طهى الطعام أو إضافته على مائدة الطعام وقد أثبتت الدراسات أن إضافة الملح على مائدة الطعام هى عادة habit تكتسب فى المراحل الأولى من العمر وكذلك من العادات المألوفة فى مصر تناول المخللات والحوادق والمشهيات مع الطعام وهى مشبعة بمحلول ملح الطعام ولذلك ينصح باستبدالها بالسلطة الخضراء والليمون الطازج.

وفى بعض الحالات المرضية مثل ارتفاع ضغط الدم والاستسقاء وتسمم الحمل toximia لابد من تحديد كمية الصوديوم المتناول بحيث لا يزيد عن (٥٠٠-٧٠٠ جم) وهذا لا يتم إلا بمنع إضافة الملح نهائياً بجانب اختيار الأغذية المحتوية على كميات منخفضة من الصوديوم (جدول ٨-١٠)، وتجنب تناول الأغذية المحفوظة. فالجدير بالذكر أن ١٠٪ من الصوديوم المتناول يومياً يوجد طبيعياً فى الغذاء و ١٥٪ منه نتيجة لإضافة ملح الطعام أثناء الطهى وعلى مائدة الطعام بينما ٧٥٪ الباقية تشكل كمية الصوديوم المضافة أثناء تصنيع الأغذية. فيضاف نترات الصوديوم لإعداد السجق واللحوم المحفوظة ويستخدم ملح فوسفات الصوديوم كمستحلب emulsifier فى صناعة الجبن وأكثر أملاح الصوديوم شيوعاً هو ملح بيكربونات الصوديوم الذى يضاف لمنتجات الخبز وملح جلوتامات الصوديوم (تحسين الطعم) وغيره.



جدول (٨-١٠) بعض المصادر الغذائية مقسمة حسب محتواها من الصوديوم  
ملجم / ١٠٠ جم غذاء

منخفض		متوسط		عالي	
الغذاء	ملجم/ ١٠٠	الغذاء	ملجم/ ١٠٠	الغذاء	ملجم/ ١٠٠
التفاح	١	اللبن	٥٠	سلمون	٥٤٠
جريب فروت	١	الدواجن :		كورن فلاكس	١٠٠٠
الأناناس	١	الصدر	٦٤	جبنه مطبوخة	١١٠٠
البطاطا	١٠	الكثف	٨٦	لحوم مدحنة	١١٠٠
زبيب	٢٥	الكرفس	١٠٠	مخلل كرنب	١٧٥٠
جزر	٥٠	البيض	١٢٢	سحق	١٧٧٠
		عصير طماطم معلب	٢٠٠	زيتون أحضر	٢٤٠٠
		جبنه قريش	٢٩٠		

#### المصادر الغذائية Food Sources :

يوجد الصوديوم فى الأغذية الحيوانية بكميات أعلى من الأغذية النباتية ويوضح جدول (٨-١١) بعض المصادر الغذائية للصوديوم. ويزداد محتوى الصوديوم فى حالة الأغذية المعدة والمصنعة حسب كمية ملح الطعام أو أملاح الصوديوم الأخرى المضاف لها. فمثلاً البطاطس النيئة تحتوى على ١ ملجم/١٠٠ جرام بينما بعد إعدادها وتحميرها ترتفع نسبة الصوديوم إلى ٣٤٠-١٠٠ ملجم/١٠٠ مل (جدول ٨-١٢ أ/ب).

جدول (٨-١١ أ) \* بعض المصادر الغذائية للصوديوم

محتوى الصوديوم ملجم / ١٠٠ جم غذاء				
٥	١٠ - ٥	٢٠ - ١٠	٤٠ - ٢٠	٦٠ - ٤٠
لوز	مشمش جاف	زيتون	خرشوف	فلفل أسود
تفاح	أبو فروة	بروكلي	سكر بني	بنجر
مشمش	خيار	كانتلوب	كرنب	جزر
موز	بصل أخضر	تين مجفف	جوز الهند	قوانص الدجاج
توت	عسل	جرجير	الثشدة	صفار البيض
كريز	خس	ثوم	فلفل شطة	لبن
بلح	نكتارين	مانجو	كرنب أحمر	بقدونس
باذنجان	سوداني	بصل	لفت	لحم الأرانب
تين	ردة القمح	عسل أسود		بذور عباد الشمس
عصير فواكه		عيش القرباب		تونة
جريب فروت		بكان		ديك رومي
عنب		قراصية		زبادى
فول أخضر		زبيب		دواجن
بسلة		بطاطا		
جوافة				
فاصوليا خضراء				
زيت				
بامية				

جدول (٨-١١ ب) \*\* بعض المصادر الغذائية الأخرى للصوديوم

الغذاء	محتوى الصوديوم ملجم / ١٠٠ جم	الغذاء	محتوى الصوديوم ملجم / ١٠٠ جم
الكرفس	١٠٠	جينة مطبوخة	١١٠٠
البيض	١٢٢	لحوم مدخنة	١١٠٠
عصير الطماطم المعب	٢٠٠	كرنب مخلل	١٧٥٠
جينة قريش	٢٩٠	سجق	١٧٧٠
سالمون	٥٤٠	زيتون أخضر مخلل	٢٤٠٠
كورن فلكس	١١٠٠		

\* Ensminger (١٩٩٥).

\*\* إيزيس نوار وآخرون (١٩٩٠).

### المقررات اليومية Requirement :

احتياجات الإنسان من هذا العنصر لا تمثل مشكلة غذائية إذا كان مقيماً في جو معتدل حيث تحتوي الرجة اليومية على كميات تفوق الاحتياج الفعلي ولكن يختلف الأمر كلياً في الأجواء الحارة وخاصة إذا كان عمل الشخص شاقاً ويتطلب جهداً عضلياً لزيادة فقد الصوديوم خارج الجسم مع العرق. فعادة ما يتناول الشخص من ٤-٦ جرام صوديوم يومياً بينما ما يحتاجه فعلاً لا يتعدى ٢٠٠-٢٥٠ ملليجرام/اليوم. كما يزداد أثناء الحمل ٦٩ ملجم، وحسب RDA يظهر في جدول (٨-١٢) المستوى الأدنى من الاحتياجات.

جدول (٨-١٢) الاحتياجات الغذائية من الصوديوم / اليوم/ الفرد

الفئة	العمر بالسنوات	صوديوم (ملجم/اليوم)
رضع	٠,٥ - ٠	١٢٠
	١ - ٠,٥	٢٠٠
أطفال	١	٢٢٥
	٢ - ٥	٣٠٠
	٦ - ٩	٤٠٠
	١٠ - ١٨	٥٠٠
بالغون	+١٨	٥٠٠

\* RDA, 1989.

## ٦ - البوتاسيوم

يحتوى جسم الإنسان على كمية من البوتاسيوم (٢٥٤ جم) تساوى ضعف ما يحتويه من الصوديوم (١٠٥ جم) ولو أن ما يتناوله الفرد من البوتاسيوم أقل منه فى حالة الصوديوم ، يدل على أن الجسم يحتفظ بالبوتاسيوم أكثر من الصوديوم. البوتاسيوم هو الكاتيون الأساسى فى السوائل الداخلية، حيث يوجد ٩٨٪ داخل الخلية، بينما الصوديوم هو الكاتيون الأساسى الموجود فى السوائل الخارجية ويحافظ الجسم على نسبة الصوديوم والبوتاسيوم فى داخل الخلية ١ : ١٠ بينما تكون هذه النسبة ٢٨ : ١ فى السوائل الخارجية ويحتوى الدم ، البوتاسيوم لا يدل على مستوى البوتاسيوم فى الجسم ، حيث أن معظمه يوجد فى الداخل الداخلية.

والبوتاسيوم معدن لونه أبيض فضى ويوجد فى الطبيعة دائماً متحداً مع غيره من العناصر. ويعبر نالوث عنصر من ناحية وجوده وانتشاره فى الجسم بعد الكالسيوم والفوسفور. ويمثل البوتاسيوم ٥٪ من محتوى معادن الجسم.

و دائماً يرتبط البوتاسيوم مع الصوديوم، وأكثر المركب احتواءً لهما هو كربونات والنترات، وقد عرفا منذ زمن بعيد، فمثلاً عند المصريين منذ القرن السادس عشر قبل الميلاد.

ولم يكن من السهل الفصل بينهما ولكنه أمكن حل هذه المشكلة سنة ١٨٠٧ بواسطة الكيميائى الإنجليزى Sir Humphry Davy وأعطاه اسم Kalium وهى كلمة لاتينية مشتقة من الكلمة العربية alkali، وعرفت أهميته فى التغذية ١٩٣٨ بواسطة تجارب McCollum على الفئران.

ومستوى البوتاسيوم فى الدم يعكس طبيعة ميثابوليزم البوتاسيوم فى الخلايا ولا يدل على الكمية المخزنة منه، فيرتفع بوتاسيوم الدم إذا حدث هدم الأنسجة وكذلك فى حالة ارتفاع حموضة الدم acidosis التى تصاحب حالات الإسهال كدليل لخروج البوتاسيوم من الخلايا للمحافظة على التوازن الحامضى - القلوى وتقل نسبة البوتاسيوم فى الدم عند زيادة معدل تخليق البروتين أو زيادة كمية الجليكوجين المخزن فى الخلية أو ارتفاع قلوية الدم alkalosis وهذا يدل على أن البوتاسيوم داخل الخلايا. إن زيادة نسبة البوتاسيوم فى الدم وبالتالى فى السوائل الخارجية عن ٥,٥

جرام/ اللتر يحدث ضعف فى العضلات وفى حالات الزيادة الشديدة يسبب توقف مفاجئ لعضلة القلب ويظهر ذلك نتيجة لفشل الكلى فى التخلص من البوتاسيوم الزيادة.

ويحتوى النسيج العضلى على ٢٥٠-٤٠٠ ملجم/ ١٠٠ جم والنسيج العصبى ٥٣ ملجم/ ١٠٠ جم والدم ٢٠٠ ملجم/ ١٠٠ مل، والبلازما ٢٠ ملجم/ ١٠٠ مل والخلية/ ٤٤٠ ملجم ١٠٠ جم.

### **وظيفة البوتاسيوم Function :**

يعمل البوتاسيوم مع الصوديوم فى المحافظة وتنظيم الضغط الاسموزى للسوائل داخل وخارج الخلايا وهو ضرورى للنمو ولحسن نقل وتوصيل المنبهات العصبية وتنظيم ضربات القلب وهذا يعتمد على التوازن بين البوتاسيوم والكالسيوم وحفظ توازن الحموضة والقلوية كما يساعد فى المحافظة على حيوية الجلد وتحويل الجلوكوز إلى جليكوجين وتخزينه فى الكبد، فهو لازم لإفراز الإنسولين من البنكرياس ويعمل كثير من الإنزيمات لاتحاد الفوسفات مع الكرياتين، ويدخل فى ميتابوليزم الكربوهيدرات وتكوين بروتينات العضلات من الأحماض الأمينية التى فى الدم وتنشيط الكلى للتخلص من سموم الجسم.

### **الامتصاص والتخزين Absorption :**

يمتص البوتاسيوم بسرعة من الأمعاء الدقيقة، ونسبة امتصاصه تصل إلى ٩٠٪ من بوتاسيوم الغذاء. ويفرز أساساً عن طريق البول أو العرق ويتم تنظيم مستوى البوتاسيوم فى الدم عن طريق الكلى التى ترشحه ثم تعاد إفرازه حسب الكمية المطلوبة ومعظم ما يخرج من البوتاسيوم يكون عن طريق البول ويعاد امتصاص البوتاسيوم إذا أفرز فى القناة الهضمية مع العصارات الأخرى، ولذا فالفقد عن طريق البراز منخفض. ويزيد البوتاسيوم فى حالة الحموضة أو فى حالة زيادة هرمون الغدة فوق الكلوية Aldosterone.

### **نقص البوتاسيوم Deficiency :**

من النادر حدوث نقص غذائى فى البوتاسيوم نظراً لانتشاره فى الأغذية الحيوانية والنباتية، ولكن يحدث نتيجة زيادة الفقد فى البول، كما قد تظهر حالات

نقص البوتاسيوم فى الأطفال الذين يصابون بالإسهال مدة طويلة حيث يمر الغذاء بسرعة لدرجة تقلل معدل الامتصاص وتزيد من الكمية التى تفقد خارج الجسم. كما يسبب القيء المستمر أو فى حالات النقص الغذائى العام أو أمراض سوء التغذية الناتجة من نقص الطاقة والبروتين وتعاطى الأدوية المدرة للبول والمضادة للإمساك والعمليات الجراحية أو الإصابة بالحروق إلى فقد للبوتاسيوم أيضًا. وأيضًا كنتيجة لزيادة الدخل من الصوديوم كذلك نقص الماغنسيوم يقلل من مقدرة الجسم على الاحتفاظ بالبوتاسيوم.

ويؤدى نقص البوتاسيوم إلى زيادة تقلص عضلات الجسم cramps&spasms والنعاس lethargy، وضعف فى العضلات ويحدث تهيج وضربات قلب غير طبيعية قد تؤدى إلى الموت المفاجئ. كما يؤدى نقص البوتاسيوم إلى صعوبة امتصاص الكالسيوم.

زيادة نسبة البوتاسيوم فى الدم hyperkalemia تؤدى إلى ضرر فى الكلى. وهذا يصاحبه ارتفاع نسبة البوتاسيوم فى الخلايا وتلك أيضًا تحدث فى حالة نقص هرمون غدة فوق الكلى عند مرض أديسون. وزيادة البوتاسيوم ضار بالعضلات وخصوصًا عضلة القلب والجهاز العصبى. كما يؤدى إلى ارتباك عضلى وضعف الأرجل وزيادة تميلها وترهل الأطراف وشلل فيها.

وزيادة البوتاسيوم المتناول له تأثير سام على الأشخاص بسرعة قد تؤدى إلى وقف القلب والكبد. وتشابه أعراض التسمم بالبوتاسيوم أعراض نقص العنصر.

#### الاحتياجات Requirements :

متوسط ما يتناوله الفرد يوميًا من البوتاسيوم ٢-٣ جم، وحيث أن البوتاسيوم واسع الانتشار فى أغذية عديدة فإن الاحتياجات الدنيا من البوتاسيوم (جدول ٨-١٣) كما أوصت بها RDA (١٩٨٩) :

جدول (٨-١٣) الاحتياجات الغذائية من البوتاسيوم / الفرد

الفئة	العمر بالسنوات	بوتاسيوم ملجم/اليوم
رضع	صفر - ٠,٥	٥٠٠
	٠,٥ - ١	٧٠٠
أطفال	١	١٠٠٠
	٢ - ٥	١٤٠٠
	٦ - ٩	١٦٠٠
	١٠ - ١٨	٢٠٠٠
	١٨ +	٢٠٠٠

ويعتقد أن زيادة البوتاسيوم فى الوجبة إلى حد ما يقلل من ضغط الدم خصوصاً فى الأفراد الذين يرتفع دخلهم من الصوديوم. فقد لوحظ أن النباتيين الذى ترتفع دخلهم من البوتاسيوم أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم. وعموماً فالمهم هى نسبة البوتاسيوم إلى الصوديوم المتناولة وقد أوصت لجنة الغذاء والتغذية بالولايات المتحدة بأن بالنسبة للفرد لابد من تناول ٠,٦ جرام صوديوم لكل واحد جرام بوتاسيوم (٠,٦ : ١) ولكن يصعب الحصول على هذه النسبة فى الوجبات العادية.

#### المصادر الغذائية Food sources :

يوضح الجدول (٨-١٤) كمية البوتاسيوم المقدمة للفرد من بعض الأغذية؛ تؤدى طرق حفظ الأغذية المختلفة إلى الإخلال بنسبة K:Na حيث تقل البوتاسيوم عن الصوديوم فمثلاً وجد أن تعليب البسلة يؤدى إلى خفض محتواها من البوتاسيوم إلى النصف وزيادة كمية الصوديوم حوالى ٢٠٠٪.

جدول (٨-١٤) كمية البوتاسيوم المقدمة للفر . من بعض الأغذية

أقل من ١٠٠ ملجم	١٠٠-٣٠٠ ملجم	٣٠٠-٥٠٠ ملجم	أكثر من ٥٠٠ ملجم
كرب لمونادة	الموز	جريب فروت	التين الجاف
بيض	الكبد	برتقال	والطازج
جبنه قريش	الدواجن	تفاح	البرقوق
خبز	سالمون	عصير برتقال	البطاطس
سكر	عسل أسود	تونه	الفاصوليا
جبنه شيدر	بطاطس	سجق	الكاتلوب
	زبدة فول	أيس كريم	الخوخ المجفف
	السوداني	جزر	
	اللبن	طماطم	
		لحم بقرى	

ويحدث فقد البوتاسيوم أثناء طهي الخضروات وكذلك يفقد مع الشرش عند تصنيع الجبنه وللمحافظة على محتوى الخضروات من البوتاسيوم يفضل عدم تقشيرها.

## ٧ - الكلورين

الكلورين غاز شديد الرائحة لونه أخضر مصفر، يوجد دائماً مع عناصر أخرى خصوصاً الصوديوم مكوناً كلوريد صوديوم.

يوجد فى جسم الإنسان البالغ ١٠٠ جرام كلورين تشكل ٠,١٥٪ من وزن جسم الإنسان وتوجد هذه الكمية موزعة فى الجسم كله ويوجد بتركيزات عالية فى صورة كلوريدات فى سوائل النخاع الشوكى وفى إفرازات العصاره المعويه. بينما توجد بكميات أقل فى العضلات والأنسجة العصبية حيث يوجد فى الجهاز العصبى ٤٤٠ ملجم/١٠٠ مل. أما فى الدم فيوجد ٢٥٠ ملجم/١٠٠ مل، والبلازما ٣٦٥ ملجم/١٠٠ مل، والخلايا ١٩٠ ملجم/١٠٠ جم وخلايا النسيج العضلى ٤٠ ملجم/١٠٠ مل وخلايا النسيج العصبى ١٧١ ملجم/١٠٠ جم والكلورين هو الأنيون الرئيسى للسوائل خارج الخلايا ويوجد دائماً فى صورة كلوريد.



## وظيفة الكلور Function :

الكلورين هو الأنيون السالب للكلوريد يحمل شحنة سالبة ويوجد معظمه فى سوائل الخلية الخارجية. ويوجد الكلوريد حيث يوجد الصوديوم. فهما متلازمان ويؤديان معاً دوراً فى التوازن المائى، وتنظيم الضغط الاسموزى وتوازن الحموضة والقلوية وفى الحالة الأخيرة يلعب الكلوريد دوراً هاماً فى الدم، كما أن الكلوريد ضرورى لتكوين حامض الهيدروكلوريك فى المعدة، وتنشيط إنزيم أميليز اللعاب الذى يحلل النشا وفى امتصاص  $B_{12}$  والحديد. كما يقوم الكلوريد بدور هام فى تنظيم إفراز الصوديوم فى حالة التهاب الكلى.

وينشط الكلوريد الكبد ليقوم بوظيفته للتخلص من السموم خارج الجسم. وأيونات الكلوريد لها القدرة على الخروج من كرات الدم الحمراء إلى بلازما الدم بسهولة، تسمى chloride shift، وهذا يسهل حمل الدم لكميات كبيرة من ثانى أكسيد الكربون إلى الرئتين حيث يتم معادلة أى تغير فى التوازن الحامضى - القلوى فى خلية الدم عن طريق سرعة وسهولة انتقال الكلوريد من وإلى خلية الدم الحمراء.

## الامتصاص والتخزين:

ويمتص الكلوريد بسرعة فى الأمعاء، وينقل بسهولة إلى السوائل خارج الخلايا عن طريق الدم واللف، وعادة يفرز أكثر من ٩٠٪ من الكلوريد الزائد عن طريق البول، وغالباً يكون متحداً مع الصوديوم، والباقي يخرج عن طريق البراز والعرق، وتعتبر هرمونات غدة فوق الكلى لازمة لمنع زيادة فقد الكلوريد حتى لا ينقص فى سوائل النخاع الشوكى والعصارة الهاضمة.

ويعتبر ملح الطعام هو مصدر الكلورين فى الوجبة ولذلك عند تقليل الملح فى الوجبة ينخفض مستوى الكلورين فى البول ثم فى الأنسجة. كذلك يظهر نقص الكلورين مصاحب لنقص الصوديوم فى حالات الإسهال والقيء والعرق الزائد.

ويؤدى نقص الكلوريد إلى وقف النمو وتقرحات فى الكلى والجهاز البولى وضعف قدرة الفرد على الاحتفاظ بالماء وعدم إفراز حامض الهيدروكلوريك وسوء الهضم وسرعة التهيج والتشنجات وزيادة الخزان القلوى alkali reserve بالجسم نتيجة لزيادة الكربونات. كما يؤدى لسقوط الشعر والأظافر وتقلص العضلات، وفقد الشهية.

ولابد من ذكر أنه يضاف الكلوريد لمياه الشرب بغرض القضاء على الميكروبات الضارة مثل الميكروبات المسببة لكوليرا والتايفويد ووباء الصفراء. ولكن لو زادت الكمية قد يؤدي إلى تكوين مركبات معقدة مع الكلورين ضارة بالصحة العامة. علاوة على ما هو معروف أن الكلورين فى مياه الشرب يهدم فيتامين E كذلك يقضى على فلورا المعدة التى تساعد على الهضم.

ولا يوجد مقررات غذائية للكلورين لأن الإنسان يتناول يومياً ٣-٩ جم من الأغذية ومن ملح الطعام، وهذا يقابل احتياجات الفرد، وكل الوجبات التى تمد الفرد باحتياجاته من الصوديوم والبوتاسيوم تكون كافية كمصدر للكلورين، وعادة يحتاج الفرد كمية تعادل نصف الاحتياجات من الصوديوم.

### ثانياً : معادن الآثار

#### MICRO ELEMENTS

يحتوى جسم الإنسان عدداً كبيراً من العناصر التى توجد بكميات أو بتركيزات شحيحة جداً وتسمى هذه بمعادن الآثار. وكثير منها له أهمية كبيرة فى الجسم مثل اليود والكوبلت حيث تدخل فى بناء مركبات معينة كالهرمونات والإنزيمات والفيتامينات والتى لا يمكن للجسم الاستغناء عنها ونقص هذه العناصر فى الغذاء يسبب ظهور أعراض مميزة يمكن التعرف عليها. وبعض هذه العناصر التى توجد باستمرار فى الجسم لم يثبت أهميتها بعد. وقد يرجع وجودها فى الجسم بصفة منتظمة إلى انتشارها الواسع فى الهواء أو مياه الشرب ومن ثم توجد فى الجسم وهى تعمل فى الميتابوليزم نفس العمل الذى تقوم به المواد الأخرى.

ومن بين معادن الآثار اليود والنحاس والكوبلت والزنك والمنجنيز والسليسيوم والموليبدنوم والكروم والالومنيوم والانتيمون والقصدير والباريوم والبرون واليرون والكادميوم والألومنيوم، والليثيوم والزنبتق، والنيكل والفضة والإستراتشيوم والتيتانيوم... إلخ.

وخلال الأربعين عاماً الأخيرة من القرن العشرين، أجريت دراسات كثيرة لمعرفة أهمية هذه المعادن بالنسبة للإنسان، وقد تقدمت هذه الدراسات بفضل تقدم وسائل التحليل الكمي والكماوى والإنزيمى، واستعمال العناصر المشعة التى سهلت

معرفة امتصاص وتمثيل وإخراج هذه العناصر، واكتشاف الإنزيمات المحتوية على معادن، كل هذا ساعد كثيراً في معرفة معادن الآثار في عمل هذه الإنزيمات.

وهناك كثير من الصعوبات لإجراء الدراسات على أهمية هذه العناصر وذلك لصعوبة تنقية الغذاء من جميع ما يحتويه من معادن آثار لتغذية الإنسان أو حيوانات التجارب لمدة طويلة وملاحظة أعراض النقص علالة على أن أعراض نقص المعدن ليست خاصة به وقد يكون هناك تداخل أكثر من عامل مثل عامل الجنس والزمن وشدة النقص وطبيعة المعدن وعلاقته بالمعادن الأخرى ووجوده بالغذاء.

إلا أنه من المسلم به هو نقص أحد أو بعض معادن الآثار يؤدي في كثير من الأحيان إلى عرقلة استمرار سريان تفاعلات حيوية معينة بالجسم عن طريق توقف بعض الإنزيمات عن القيام بعملها.

هناك الحاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة الكثير عن هذه العناصر ومحتوى الأغذية منها وتأثير طرق الإعداد والتصنيع على محتوى هذه الأغذية وكذلك على تأثير تلوث البيئة على الدخل اليومي للفرد من معادن الآثار خاصة وأن زيادة تركيز معظم هذه المعادن في الجسم له تأثيرات سلبية.

## ١- الحديد

عرف الحديد منذ قديم الزمان، وكتب عنه الكثير في كتابات القدماء منذ ١٢٠٠ سنة قبل الميلاد. وعرف اليونانيون دوره في القوة، كما عرف أنه يمكن أن يعالج الأنيميا منذ القرن السابع عشر، وفي ١٧١٣ عرف أنه أحد مكونات الجسم، ثم أهميته في التغذية بواسطة العالم الفرنسي Boussingault ١٨٦٧.

ويحتوي جسم الإنسان البالغ السليم على ٠,٠٠٤٪ من وزنه حديد بكمية تصل ما بين ٣-٥ جم حسب السن، والجنس، وحجم الجسم، والحالة التغذوية والصحية وكمية الحديد المخزن في الجسم عموماً يوجد كل الحديد في الجسم مرتبطاً مع البروتين في مركبات حيوية في الخلايا تدخل في عمليات النقل والتخزين والإنزيمات والمركبات الحيوية المسؤولة عن التنفس.

وترجع أهمية الحديد في الجسم إلى قدرته على الارتباط بجزء الأكسجين والدخول في تفاعلات الأكسدة والاختزال نتيجة للتغير في الجسم من صورة

الحديدوز إلى الحديدك وكذلك على سهولة انطلاق ثاني أكسيد الكربون. وهذه التفاعلات تعتبر حيوية لاستمرار الحياة.

### توزيع الحديد في الجسم:

يتركز الحديد أساساً في الدم ولكن يوجد أيضاً بكميات متفاوتة في جميع خلايا الجسم ويوضح جدول (٨-١٥) توزيع الحديد في أنسجة الجسم المختلفة.

جدول (٨-١٥) توزيع الحديد في الجسم

النسبة المئوية الكلية	الكمية (مجم)		
	الذكور	الإناث	
٧٥-٦٠	٢١٠٠	١٧٥٠	الهيموجلوبين
٣	١٠٠	١٠٠	الميوجلوبين حديد مخزن (الكبد والطحال ونخاع العظام)
صفر-٣٠	١٠٠٠	٤٠٠	حديد الأنسجة
١٥-٥	٣٥٠	٣٠٠	الحديد المنتقل
١	٤	٤	حديد السيرم
	٣٥٥٤,٣	٢٥٥٤,١	الإجمالي

\* Guthrie, H.A. (1979).

حوالى ٧٠٪ من الحديد في صورة فعالة وأغلبه يوجد في جزئ الهيموجلوبين hemoglobin المكون لكرات الدم الحمراء. جزء بسيط من الحديد يوجد في ميوجلوبين Myoglobin العضلات، وهو بروتين يوجد في العضلات يشابه في تركيبه الهيموجلوبين ولكن يختلف في نوع البروتين. الجزء الباقي من الحديد الفعال يوجد في إنزيمات الأنسجة مثل السيتوكروم أكسيداز Cytochrome oxidase، وإنزيم الكاتالاز Catalase وهذه الإنزيمات توجد في جموع خلايا الجسم الحية وهي ضرورية للتنفس الخلوى وانطلاق الطاقة.

الجزء الباقي من الحديد (٣٠٪) يخزن في الكبد والطحال ونخاع العظام

والذى يمد الجسم بالحديد عند الحاجة له. وعادة كمية الحديد المخزنة فى جسم المرأة أقل منها فى الرجل (جدول ٨-١٥) ويخزن الحديد فى الكبد والطحال فى صورة مركب معقد قابل للذوبان يطلق عليه الفريتين Ferritin الذى يحتوى على ٢٠٪ حديد أو فى صورة مركب معقد غير قابل للذوبان يطلق عليه هيموسيدرين Hemosiderin الذى يحتوى على ٣٥٪ حديد، وكلا المركبين لهما القدرة على اطلاق الحديد المخزن عند الحاجة له.

بالإضافة إلى حديد الهيموجلوبين فيحتوى الدم على جوالى ٤ مجم حديد توجد فى بلازما الدم تمثل الحديد المنتقل من أماكن الامتصاص أو الكبد إلى الخلايا ويرتبط هذا الحديد ارتباطاً وثيقاً ببروتين معين يسمى ترانسفيرين Transferrin ويصل معدل تغير حديد البلازما إلى ٣٥-٤٠ مجم ينقل من وإلى البلازما يومياً. كما يوجد أيضاً فى سيرم الدم مركب الفريتين Ferritin المنطلق من الكبد. كما يوجد كمية بسيطة من الحديد مرتبطة بمركبات أخرى.

وحيث أنه لا يوجد ميكانيزم خاص لإفراز الحديد خارج الجسم لذا ينظم مستوى الحديد الفعال والمخزن فى الجسم عن طريق التحكم فى معدل الامتصاص ولذا يمتص الحديد فقط عند الحاجة له.

### وظائف الحديد فى الجسم Function :

١- حمل الأكسجين وثانى أكسيد الكربون: الوظيفة الحيوية الأساسية للحديد هو قدرته على نقل الأكسجين وثانى أكسيد الكربون بين الأنسجة وبعضها. وتتم هذه العملية عن طريق كلاً من الهيموجلوبين hemoglobin والميوجلوبين myoglobin وهى المركبات البروتينية المحتوية على الحديد والموجودة فى الدم والعضلات على التوالى. كما أن الحديد يدخل فى تركيب مركبات أخرى حيوية وإنزيمات ضرورية أيضاً لسهولة ارتباط وانطلاق الأكسجين وثانى أكسيد الكربون. أى أن الحديد ضرورى لعملية التنفس وانطلاق الطاقة.

٢- تكوين الدم: يعتبر الهيموجلوبين المكون الأساسى لكرات الدم الحمراء أو erythrocytes وتتكون هذه الخلايا فى نخاع العظام فى وجود هرمون يفرز من الكلى يسمى ارثروپويتن erythropoietin. فعند انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء


وبالتالى تقل القدرة على حمل الأكسجين ،يزداد إفراز هذا الهرمون من الكلى لتنشيط إنتاج خلايا الدم.

وحيث أن خلايا الدم الحمراء لا تحتوى على نواة فلا يمكنها تخليق الإنزيمات الضرورية للحياة، وبالتالي تستمر كرة الدم الحمراء حية طالما توجد هذه الإنزيمات فعالة فعمر كرة الدم حوالى ١٢٠ يوماً (٤ أشهر) كما سبق ذكره.

٣- وظائف أخرى: الحديد له وظائف حيوية أخرى غير نقل الأكسجين وتكوين الدم فهو يقرم بتنشيط عدة تفاعلات مثل تحويل البيتا - كاروتين إلى فيتامين A وتخليق البيورين Purines وتنقية دهون الدم وتخليق الكولاجين Collagen وإنتاج الأجسام المضادة وتنقية الكبد من السموم الناتجة من العقاقير كما أثبتت الدراسات الحديثة أهمية الحديد فى الوقاية من الأمراض المختلفة.

#### الامتصاص Absorption :

يمتص الحديد أساساً من الخلايا المبطنة للغشاء المخاطى mucosa للإثنى عشر (شكل ٨-٦). وتعتمد قدرة الجسم على امتصاص الحديد إلى حد كبير على توازن الحديد فى الجسم. فيحتفظ بتركيز الحديد فى الدم وكميته المخزنة على مستوى ثابت نسبياً عن طريق قدرة خلايا الميوكوزا بتجنب امتصاص حديد الغذاء الذى لا يحتاجه الجسم (وليس عن طريق زيادة أو خفض كمية الحديد التى تفرز خارج الجسم كما سبق).



### شكل (٨ - ٦) ميتابوليزم الحديد

يتمص الحديد من الغذاء في صورة حديدوز (الصورة المختزله  $Fe^{++}$ ) وهي أكثر وأسرع من الصورة المؤكسدة (الحديديك  $Fe^{+++}$ ) ولذلك يختزل حديد الغذاء الذي يوجد في صورة حديديك بواسطة حامض هيدروكلوريك المعدة إلى الحديدوز قبل امتصاصه ويوجد في صورة نوعين من مركبات الحديد في الأغذية النوع الأول وهو الحديد الذي يوجد في حلقة البرفيرين Porphyrin المكونة لجزء الهيموجلوبين ويطلق عليه heme iron، النوع الثاني هو الحديد الموجود في الأغذية بأى صورة أخرى ويطلق عليه nonheme. وعادة يوجد ٤٠٪ من الحديد في الأنسجة الحيوانية في صورة heme iron أما الجزء الباقي وهو (٦٠٪) فيوجد في صورة nonheme، كما أن كل مركبات الحديد الموجود في الأنسجة النباتية تكون في صورة nonheme أيضًا وتصل كفاءة امتصاص الحديد الموجود في صورة heme إلى ٢٣ - ٣٠٪ بينما تقل في صورة nonheme فتكون أقل في السمك ١٥٪ وفي فول الصويا ٢٠٪ وفي

الأغذية النباتية من (٣-٨٪) حسب وجود عوامل غذائية أخرى فى الوجبة الغذائية، مثل وجود حامض الفيتيك، الثانين والإكسالات، والفوسفات الزيادة وغيرها من العوامل التى تقلل من امتصاص الحديد، ولذا يقسم الحديد حسب مصادره إلى ثلاثة أقسام : حديد هيمى، حديد غير هيمى من مصادر حيوانية، وحديد غير هيمى من مصادر نباتية.

إن معدل امتصاص الحديد من الوجبة العادية منخفض، فيصل فى الإنسان السليم إلى من ٢-١٠٪ من حديد الوجبة فقط وقد يرتفع فى حالة احتياج الجسم إلى ٢٠-٣٠٪ ويحدث الامتصاص عادة فى الجزء الأمامى من الأمعاء الدقيقة كما يتم امتصاص جزء ضئيل جدًا فى المعدة. وعمومًا تحسب نسبة امتصاص الحديد على أساس ١٠٪ فى المتوسط.

### **العوامل التى تؤثر على امتصاص الحديد :**

- ١- احتياج الجسم للحديد: كلما زاد احتياج الفرد كلما زاد معدل الامتصاص ويدل وجود مركب Transferrin فى الدم ودرجة تشبعه بالحديد على مدى احتياج الفرد. وعادة يزداد معدل الامتصاص فى الأطفال وأثناء فترة الحمل والرضاعة وحالات الأنيميا وبعد العمليات الجراحية وكذلك بعد مجهود جسمانى شديد أو انخفاض كمية الأكسجين التى تصل للمخ حيث يزداد تخليق كرات الدم الحمراء.
- ٢- صورة ومصدر الحديد: يمتص بكفاءة أعلى فى صورة حديدوز عن الحديدك ولذلك وجود أى مواد مختزلة مثل الأحماض تساعد على تحويل الحديدك إلى حديدوز (تم هذه الخطوة المعدة بواسطة حامض الهيدروكلوريك. كذلك وجود بعض الأحماض العضوية فى الغذاء مثل حامض الاسكوربيك (فيتامين C، فى المراحل الذى يزيد من كفاءة الامتصاص نتيجة اختزال الحديدك إلى حديدوز. كذلك تؤثر الأحماض الأمينية وخاصة السستين Cysteine على زيادة معدل الامتصاص لحد ما وكذلك مركبات السلفا هيدريل Sulfhydryl Compounds.
- ٣- تركيب الوجبة: يمتص حوالى ٥٪ فقط من الحديد الموجود فى الأغذية النباتية مثل الأرز والذرة والسبانخ والقمح بينما تصل هذه النسبة إلى ٣٠٪ فى اللحوم و ١٥٪ فى الأسماك.



وعند تناول وجبة تحتوي على لحوم وخضروات يزداد معدل امتصاص الحديد الموجود في المصدر النباتي ضعفين أو ثلاث أضعاف نتيجة لارتباط الحديد غير العضوي مع الحمض الأميني السستين (Cysteine) الذي يتفرد أثناء هضم بروتينات اللحم ويكون مركب مع الحديد ذائب.

كما أن لابد من توفر مصدر لفيتامين C عند تناول كل وجبة لزيادة الكمية المتاحة من الحديد.

ويرجع أهمية فيتامين C ليس فقط لقدرته الاختزالية ولكن أيضًا لتكوينه مركب معقد مع الحديد يبقى في صورة ذائبة في الأمعاء الدقيقة حيث ترتفع بها القلوية نسبيًا.

ويوضح جدول (٨-١٦) اختلاف كفاءة امتصاص الحديد حسب نوع الوجبة ووجود مصدر لفيتامين. ويلاحظ من الجدول أن الحديد الموجود في البروتينات الحيوانية أكثر سهولة في الامتصاص من الحديد الموجود في المصادر النباتية.

جدول (٨-١٦) الحديد المتاح في الوجبات المختلفة\*

نوع الوجبة		نسبة امتصاص الحديد من الوجبة	
		Nonheme %	Heme Iron %
١- وجبة منخفضة في محتواها من الحديد: كمية اللحوم والدواجن والأسماك أقل من ٣٠ جم كمية فيتامين C في الوجبة أقل من ٢٥٤ جم.		٣	٢٣
٢- وجبة متوسطة في محتواها من الحديد: كمية اللحوم والدواجن والأسماك ٣٠-٩٠ جم أو كمية فيتامين C ٢٥-٧٥ جم.		٥	٢٣
٣- وجبة عالية في محتواها: كمية لحوم ودواجن وأسماك أكثر من ٩٠ جم أو كمية فيتامين C أكثر من ٧٥ جم أو كمية لحوم ودواجن وأسماك ٣٠-٩٠ جم بجانب ٢٥-٧٥ جم فيتامين C.		٨	٢٣

\* Monsen et al., 1978

- ٤ - زيادة الألياف والمواد السليولوزية فى الوجبة تقلل من معدل الامتصاص.
- ٥ - وجود حمض الفيتيك Phytic acid يعيق من امتصاص الحديد حيث يرتبط مع الحديد. ويكون مركبات غير ذائبة وهذا مرتبط بسوء امتصاص حديد القمح.
- وكذلك وجود حامض التانيك Tannic acid يعيق من امتصاص الحديد وهو موجود فى الشاي وفى دراسة حديثة وجد أن تناول كوب شاي مع وجبة الإفطار انخفض معدل امتصاص الحديد من ١٦٪ إلى ٣٪ ويرجع ذلك إلى تكوين مركب معقد غير ذائب مع الحديد الموجود فى صورة nonheme وليس للشاي تأثير على الحديد فى صورة heme ويمكن لفيتامين C التقليل من تأثير الشاي كذلك زيادة أملاح الكالسيوم والفوسفات والمنجنيز تعيق من الامتصاص.
- ويعتمد قدرة الجسم على امتصاص الحديد إلى حد كبير على توازن الحديد فى الجسم حيث يحتفظ الجسم بتركيز الحديد فى الدم وكميته المخزنة ثابتة عن طريق قدرة خلايا الميكروز Mucosa وهى الخلايا المبطنة للأمعاء، بتجنب امتصاص حديد الغذاء لا يحتاجه الجسم وليس عن طريق زيادة أو خفض كمية الحديد التى تفرز خارج الجسم.
- والعمليات التنظيمية لامتصاص الحديد غير معروفة تماماً الآن. ولكن فسر ذلك بنظرية أطلق عليها Mucosal blockage أى انسداد الميكوزا. فى هذه النظرية يعتقد أن الحديد يمتص خلال الغشاء المخاطى للأمعاء، حيث يندمج مع بروتين معين يطلق عليه (apoferritin) لتكوين مركب معقد من الحديد - البروتين يسمى Ferritin يخزن الحديد الممتص فى صورة Ferritin فى الخلايا الطلائية وينطلق منه الحديد إلى مجرى الدم للارتباط بمركب يسمى Transferrin فى حالة انخفاض نسبة تشبعه بالحديد عن الحد الطبيعى (٣٠-٤٠٪) أى عند احتياج الجسم إلى حديد جديد. ويبقى بروتين apoferritin الخالى من الحديد فى خلايا الميكوزا للارتباط مع حديد جديد ممتص من الأمعاء. ولكن لا يحدث امتصاص طالما كانت خلايا الميكوزا مشبعة بمركب الحديد - البروتين (Ferritin) وهكذا فإن انطلق حديد جديد ثانياً من هذا المركب لتخليق الهيموجلوبين أو لاستعماله فى الأنسجة الأخرى (عند حاجة الجسم) يبدأ ثانياً فى امتصاص الحديد حتى يحدث التشبع الذى يقف عنده الامتصاص.

## النقل والميتابوليزم : Transportation and metabolism :

أيونات الحديد سامة، ولذا يوجد الحديد في بلازما الدم في صورة حديدك مرتبطاً بجلوبولين معين (beta - globulin) مكوناً مركب حديد - بروتين معقد يسمى Transferrin وهذا المركب له القدرة على الارتباط بـ ٢ جزئ حديد وهو يمثل الحديد المتنقل حيث يحمل مركب Transferrin الحديد إلى الأنسجة ونخاع العظام وأماكن تخزين الحديد في الجسم وجزء يذهب لخلايا الجسم لتكوين الإنزيمات التي يدخل في تركيبها الحديد ووجود كميات صغيرة من النحاس ضرورى لتخليق الهيموجلوبين وإنزيمات السيوكروم وتصل الكمية المتبادلة يومياً بين الدم ونخاع العظام ٢٥ ملجم حديد يومياً. وهذه تكفى لتخليق من ٥-٦ جرام هيموجلوبين يومياً من نخاع العظام في صورة كرات دم حمراء جديدة.

### التخزين :

يخزن في الجسم ١٠٠٠ ملجم حديد (١جم) موزعة كالاتى: ٣٠٪ فى الكبد، ٣٠٪ فى نخاع العظام والباقي فى الطحال والعضلات. ويخزن الحديد فى الكبد والطحال ونخاع العظام وخاصة فى reticula - endothelial والأنسجة البارنشيمية liver - parenchyma فى صورتين:

- أ- مركب الفيرتين ferretin ويحتوى على ٢٣٪ حديد.
- ب- مركب Hemosiderin ويتكون من الفيرتين إذا زادت كميته وهو أكثر ثباتاً منه يحتوى على ٨٪ حديد فقط.

ويعتبر هذان المصدران للتكوين السريع للهيموجلوبين يومياً حيث يصل معدل حركة الحديد يومياً ٣٥-٤٠ جم/اليوم.

وإذا زادت كمية الحديد المخزنة فى صورة Hemosiderin ينتج حالة مرضية Siderosis وهذه الحالة أحد العوامل التى تسبب تليف الكبد وتلفه. وقد تحدث هذه الحالة نتيجة زيادة تناول الحديد أو زيادة سرعة تحلل كرات الدم الحمراء أو بعد كثرة حالات نقص الدم أو فشل فى تنظيم مستوى الحديد.

ويمثل الحديد الخارج عن طريق البراز الحديد غير الممتص من الغذاء والذى يخرج مع البول كمية ضئيلة جداً لا تتعدى ٠,٥-١ جم/اليوم. أما معظم الحديد

الناتج من انحلال كرات الدم الحمراء فإنه يمتص نهائياً ثانياً ويستعمل فى بناء كرات الدم الحمراء الجديدة.

### الفقد :

يحدث فقد طبيعى يومى لحديد الجسم عن طريق العرق والشعر وانحلال خلايا الجسم وخلايا الدم البيضاء والصفراء والبول والبراز. ويبلغ الفقد فى الرجال ١ مجم يومياً وفى النساء ١-٢ مجم يزداد الفقد فى النساء نتيجة الحيض (الدورة الشهرية) يبلغ (١٤-٢٨ ملجم حديد) وفرة الحمل وبعدها مباشرة حيث يبلغ الفقد (٣٠٠-٥٠٠ ملجم حديد) يشمل حديد الجنين وحديد الأم الذى فقد أثناء النزيف والإصابة بالجروح وفقد الدم نتيجة لإصابة الجهاز الهضمى بجروح أو قرح كلها عوامل تزيد من الفقد.

### نقص الحديد Deficiencies :

نقص الحديد فى الإنسان يوصف أنه الإصابة بالأنيميا Hypochromic anemia وفيه يكون عدد كرات الدم الحمراء فى الدورة الدموية أو التى تسيح فى تيار الدم إما عادياً أو قليلاً ولكن تكون الكمية الإجمالية للهيموجلوبين بالدم منخفضة تحت الحد الطبيعى (جدول ٨-١٧) لأن كل كرة دم يقل محتواها من الهيموجلوبين وتصبح كرات الدم باهتة اللون وتنخفض قدرة الدم على حمل الأكسجين ويؤثر ذلك على أداء معظم أجهزة الجسم.

وأعراض الأنيميا بالدم والسابق ذكرها يصحبها عادة أعراض مرضية كبهتان لون الجلد والأنسجة والضعف العام والإسهال والصداع والشعور المستمر بالتعب والإجهاد.

والأنيميا الراجعة لنقص الحديد قد تنشأ لأسباب غذائية بحته كتناول غذاء ينقصه الحديد أو نتيجة سوء امتصاص الحديد من الغذاء وفقد الدم الناتج من نزيف ظاهر أو خفى يسرع من استنزاف مخزون الجسم من الحديد. فمهما كان الغذاء مناسباً وكذلك درجة امتصاص الحديد من الغذاء فإن الأسباب التى تؤدى إلى الفقد المزمن من الدم تؤدى بالتبعية إلى استنزاف الحديد المخزون بالجسم وبالتالي الإصابة بالأنيميا Hypochromic anemia فمثلاً الأفراد المصابون بطفيليات فى أمعائهم أو

الذين يعانون من نزيف داخلي مزمن مثل القرحة المعدية وتكرار النزيف نجدهم عرضة لنقص الحديد وكذلك السيدات في سنوات الإنجاب تعانين من نقص الحديد إذا كن يتعرضن للحيض الشديد أو إذا كانت فترات الحمل متقاربة ومتكررة. ويزيد من ذلك فقر الغذاء في الحديد وسوء امتصاصه ولذا ففى السيدات ١٠-٦٠٪ من الحوامل مصابات بالأنيميا. ويلاحظ أن تكرين الهيموجلوبين يحتاج أيضاً بجانب الحديد عناصر البروتين، النحاس، فيتامين C، B<sub>12</sub>، حامض الفوليك.

جدول (٨-١٧) تقسيم مستويات الهيموجلوبين في الدم جم / ١٠٠ مل دم\*

الفئات	منخفض	مقبول	على
أطفال ١-٥ سنوات	١٠	١١-١٠	١١
٦-١١ سنة	١١,٥	١٢,٥-١١,٥	١٢,٥
١٢-١٧ سنة ذكور	١٣	١٤-١٣	١٤
١٢-١٧ سنة إناث	١١,٥	١٢,٥-١١,٥	١٢,٥
١٨ سنة فأكثر ذكور	١٤	١٦,٥-١٤	١٦,٥
١٨ سنة فأكثر إناث	١٢	١٤,٥-١٢	١٤,٥
السيدات الحوامل		١٢-١١	

\* Arlin, M (1977) The Science of nutrition. 2<sup>nd</sup> Macmillan Publishing Co.

ويعتبر الأطفال مجموعة أخرى من المجموعة المعرضة لنقص الحديد وبالتالى الإصابة بالأنيميا (١٠-٦٠٪ من الأطفال مصابين بالأنيميا).

ومن المهم أن نتذكر أن توافر الحديد في الغذاء لا يعتبر العامل الوحيد المحدد لمستوى الهيموجلوبين في الفرد لأن هناك عوامل أخرى على نفس الأهمية مثل توازن الغذاء ككل خاصة من ناحية توافر البروتين وتوافر الفيتامينات B<sub>12</sub> وحامض الفوليك، و C.

واستكمالاً لهذا الموضوع فإن أى نقص في الحديد عادة ما يصحبه الميل لأكل أغذية غير مألوفة (الروح pica).

### وهناك ٣ درجات لنقص الحديد:

١- نقص أو استنفاد الحديد المخزون فقط Iron storage depletion. ويشخص بنقص أو غياب Hemosiderin في خلايا reticulo-endothelial cells الموجودة في النخاع، ويكون تركيز Ferritin في السرم أقل من ١٢ ng نوجرام/ ١ مل (١٠٠-١ جم) سريم. أى انخفاض الحديد في البلازما أو الحديد المخزون ولا تتغير نسبة تشبع الترانسفيرين بالحديد. ولا تظهر أعراض خارجية في بادئ الأمر.

٢- نقص الحديد دون ظهور الأنيميا Latent anemia ينقص الحديد المخزون وتنخفض نسبة تشبع الترانسفيرين بالحديد (حديد البلازما/ كمية الحديد الكلية الممكن الارتباط بها) إلى ١٥٪ أو أقل ولا تظهر الأنيميا. ويشخص بقلّة نسبة الهيموجلوبين دون التأثير على حجم الخلايا والأعراض طفيفة جدًا.

٣- مرحلة أنيميا مبكرة early anemia : ينخفض الهيموجلوبين إلى ١٠ - ١١ جم / ١٠٠ مل دم مع وجود تغيير في شكل وحجم كرات الدم الحمراء ونقص بسيط مستمر في حديد السرم وعدم تشبع البروتين الناقل بالحديد.

٤- نقص الحديد مع أعراض واضحة للأنيميا Obvious anemia: يضاف إلى التغيرات السابقة انخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم وظهور جميع أعراض الأنيميا وهي شحوب الوجه وصداع وسرعة الشعور بالتعب.

والواقع فإن الإصابة بالأنيميا هي المرحلة النهائية من نقص الحديد في الجسم وقد أظهرت التجارب أن النقص المتوسط في الحديد له أعراض واضحة على الفرد تنعكس على حالته الصحية من هذه الأعراض زيادة احتمال العدوى، وفقد المناعة وارتفاع معدل وفيات الأمهات الحوامل وموت الأجنة وانخفاض القدرة على العمل وانخفاض إفراز العصارة المعدية وانخفاض النشاط الإنزيمى في الجسم، وانخفاض معدل النمو، وضعف في العضلات، والشعور بالتعب، والدوخة والتهجان وزيادة ضربات القلب وفقد القدرة على التذكر وفي الأطفال يؤثر نقص الحديد على درجة استيعاب الأطفال وانخفاض القدرة على التركيز وزيادة الحركة والقلق.

### زيادة الحديد :

قد تؤدي زيادة تركيز الحديد لظهور حالات من التسمم زاجعة إلى عوامل

وراثية تؤدي إلى خطأ في الميتابوليزم أو نتيجة لزيادة تناول الحديد لمدة طويلة ويظهر ذلك في زيادة صبغات الجلد أو زيادة ترسيب أو تخزين الحديد في الكبد والطحال مما يؤدي إلى تليف الكبد أو تلفه Siderosis أو لإصابة عضلة القلب أو الإصابة بمرض السكر Diabetes أو قلة إفراز البنكرياس إذا زادت كمية الحديد عن ٣٠ ملجم/ اليوم. وقد تحدث أعراض تسمم لزيادة الدخول من الحديد عن ١٠٠ ملجم/ اليوم ناتجة من تناول أغذية مدعمة بالحديد بكميات كبيرة. وقد ظهر في قبائل Bantu في جنوب إفريقيا الذين كانوا يعدون غذاءهم وشرابهم في أواني من الحديد (Ensminger وآخرون ١٩٩٥). ويلاحظ أن زيادة الحديد تكون مع الفوسفور مركب معقد غير قابل للذوبان في الماء مما يؤدي إلى نقص الفوسفور.

#### الاحتياجات :

الكمية الموصى بها حسب RDA (١٩٨٩) تظهر في جدول (٨-١٨).

جدول (٨-١٨) الكميات الموصى بها من الحديد / اليوم / الفرد

الفئة	العمر بالسنوات	حديد ملجم/ اليوم/ الفرد
رضع	صفر - ٠,٥	٦
	٠,٥ - ١,٠	١٠
أطفال	١ - ١٠	١٠
ذكور	١٤ - ١٨	١٢
	١٩ - ٥١ +	١١
إناث	١٤ - ٥٠	١٥
	٥١ +	١٠
حمل		٣ +
رضاعة		٣ +

وكما يلاحظ فإن الاحتياج للحديد يزداد في فترات النمو السريع (المراهقة) وللستيدات أثناء الحيض والتزيف. وعموماً في جميع حالات فقد كميات من الدم وفترة الحمل.

#### مصادر الحديد:

يعتبر الكبد واللحوم وصفار البيض والبقول الجافة والفواكه المجففة

والخضروات الورقية والحبوب الكامل والمولاس والعسل الأسود من الأغذية الغنية بالحديد. أما اللبن ومنتجاته فهي مصادر فقيرة في الحديد (جدول ٨-١٩) ولابد من توفر كميات تزيد عن ٢٥ مجم من فيتامين ج حتى يمكن الاستفادة من الحديد من المصادر النباتية.

ويوجد الحديد في لبن الأم في صورة سهلة الامتصاص حيث يمتص الرضيع منه حوالي ٥٠٪ وهذه النسبة تعتبر من أكبر معدلات الامتصاص للحديد فقط وعادة يكفي لبن الأم لتغطية احتياجات الجنين من الحديد لمدة ٦ أشهر فقط حتى يستنفذ الحديد المخزن في جسمه ويتحتم بعد ذلك إعطاء الطفل مصدراً غنياً بالحديد مثل صفار البيض أو الحبوب المدعمة.

جدول (٨-١٩) محتوى بعض الأغذية من الحديد

أغذية حيوانية	مليجرام / ١٠٠ جم	أغذية نباتية	مليجرام / ١٠٠ جم
الكبد	٨,٢	خبيزة	١٢,٧
كلى	٦,٠	جرجير	٩,٥
قلب	٤,٥	نعناع	٨,٠
مخ	٣,٢	فاصوليا جافة	٧,٦
لحم ضان	٣,٢	ملوخية	٥,٦
بيض	٢,٧	بققدونس	٥,١
لحم بقرى	٢,٥	تين مجفف	٣,٠
لحم أرانب	١,٦	زبيب	٢,٨
لحم دجاج	١,٥	بلح مجفف	٢,١
سمك	١,١	خرشوف	١,٠
لبن جاموسى	٠,٢	شمام	١,٢
زبادى	٠,١	عنب	٠,٩
		جروافة	٠,٧



## ٢ - الزنك (الخارصين)

### ZINK

عرفت أهمية الزنك وضروريته لنمو الحيوان سنة ١٩٣٤ فقط. ومع تقدم طرق تقدير الزنك تم عزله سنة ١٩٤٠ من إنزيم كربونيك انهيدريز Carbonic Anhydrase كما وجد الزنك فى كثير من الإنزيمات التى تدخل فى ميتابوليزم البروتين والكربوهيدرات وكذا قد يكون فى التركيب البلورى للإنسولين. وفى عام ١٩٦١ تأكد ضرورة الزنك للإنسان. وفى عام ١٩٧٤ تم التعرف على الدور الحيوى الذى يقوم به الزنك فى تغذية الإنسان ومع تقدم طرق التقدير الكيماوى تمكن تقدير محتوى الأغذية من العنصر وبالتالي تم تحديد الاحتياجات اليومية من الزنك.


### توزيع الزنك فى جسم الإنسان : Distribution

يعتبر الزنك أكثر معادن الآثار كمية فى جسم الإنسان بعد الحديد حيث يتراوح كميته من ١,٤ إلى ٢,٣ جم يوجد ٧٠٪ من زنك الجسم (حوالى ١ جم) فى الهيكل العظمى حيث يصل مستواه إلى ٠,٢ ملليجرام/جرام. ويوجد بنسب عالية فى الجلد (٢٠٪ من الزنك) والشعر والكبد والخصيتين Testes وهى أكثر الأجزاء التى تتأثر بنقص الزنك.

ومعظم الزنك فى الدم يوجد فى خلايا الدم الحمراء (من ٧٥٪ - ٨٥٪ من زنك الدم) بينما يوجد ٣٪ من زنك الدم فى الكرات الدموية البيضاء والصفائح الدموية Platelets والباقي يوجد فى سیرم الدم. ويرتبط حوالى ثلث زنك الموجود فى سیرم الدم فى ارتباطاً قوياً ببروتين Macroglobulin بينما يرتبط الجزء الباقي ارتباطاً خفيفاً ببروتين الالبومين Albumin ما عدا جزء بسيط جداً يرتبط مع الأحماض الأمينية هستدين Histidine والسستين Cysteine وعادة يبقى مستوى الزنك فى سیرم الدم بين ٧٠ إلى ١٢٥ ميكروجرام/١٠٠ مل فى الإنسان طول حياته وينخفض فى حالات الأنيميا الخبيثة Pernicious anemia وزيادة إفراز الغدة الدرقية hyperthyroidism وأثناء فترة الحمل وفى السيدات اللاتى يتناولن حبوب منع الحمل.

## وظائف الزنك : Function :

يلعب الزنك دوراً هاماً فى امتصاص وفعل الفيتامينات خاصة مجموعة B المركبة ويدخل فى تركيب حوالى ٢٥ إنزيم يعملون فى الميتابوليزم عامة والهضم خاصة منهم إنزيم كربونيك انهيدراز Carbonic anhydrase اللازم لتنفس الأنسجة ويوجد فى كرات الدم الحمراء ويعمل على التخلص من CO<sub>2</sub> بالسرعة المناسبة للمحافظة على الحياة.



كما أن الزنك مهم لعمل الإنسولين Insulin. ويلعب دوراً هاماً فى هضم المواد الكربوهيدراتية وميتابوليزم الفوسفور وبناء الأحماض النووية RNA, DNA التى تتحكم فى بناء البروتينات المختلفة ولها دخل فى نقل الصفات الوراثية كما أنه ضرورى للنمو والتطور، كذلك لنضج الأعضاء التناسلية وكذلك يساعد غدة البروستاتا للقيام بوظائفها، وله أهمية فى التئام الجروح والحروق وهو مهم للتكلس الطبيعي للعظام، وللشعر فيكسبه لمعاناً، وهو مهم لبناء الأظافر ولتخليق البيوتين والأحماض النووية. وله دور فى الإحساس بالتذوق Taste acuity ووجوده مهم بجانب أنه ضرورى للمحافظة على مستوى فيتامين A فى الدم حيث يسهل انطلاقه من أماكن تخزينه فى الكبد.

## الامتصاص والتخزين :

يتمص الزنك بسهولة من الجزء العلوى من الأمعاء الدقيقة، ويتوقف معدل الامتصاص على كميته والصورة الموجود بها الزنك فى الوجبة وكذلك على وجود مواد تعيق من امتصاص الزنك مثل حمض الفيتيك Phytic acid، الكاديوم ومركبات أخرى لها القدرة على ربط المعادن chelating أو زيادة تناول الكالسيوم والنحاس. عادة تتفاوت كفاءة الامتصاص بين ١٠-٤٠٪. وتزداد الكفاءة عندما يكون مصدر الزنك مصدر حيوانى أو عند زيادة الكمية المتناولة أو عند انخفاض مستوى الزنك فى الدم. وأثناء الحمل والرضاعة لزيادة حاجة الجسم له. ويتساوى امتصاص الزنك فى صورة كربونات أو سلفات أو أكسيد.

يخزن الزنك أساساً فى الكبد أولاً ثم البنكرياس والكلى والعضلات الإرادية

Voluntary muscles وأيضا العظام بنسبة كبيرة ولكن لا يمكن سحبه لعمليات الميتابوليزم ويوجد بوفرة فى النسيج المكون لخلايا لانجرهانز Langerhans حتى يمكن إفراز هرمون الإنسولين. وتحتوى خلايا لانجرهانز على ١٠٠-١٠٠٠ ميكروجرام زنك/ جم من النسيج الرطب.

كذلك يخزن الزنك بكميات أقل فى العين وغدد البروستاتا والسيرم والجلد والشعر والأظافر. ودورة الزنك turn over قصيرة حيث تظهر أعراض النقص سريعا فى الحيوان.

ويفرز الزنك فى القناة الهضمية خلال إفرازات الأمعاء والعصارة البنكرياسية Pancreatic juice جزء منه يعاد امتصاصه إلى بلازما الدم حيث يوجد مرتبطا مع بروتينات الدم. والكمية المرتبطة مع الألبومين ضعف الكمية المرتبطة مع الجلوبيولين لكن الأخيرة تكون شدة الارتباط أكثر.

يفقد الزنك خارج الجسم أساسا مع البراز (١٥ مجم/ اليوم) ومع إفراز البنكرياس والصفراء والأمعاء وكميات قليلة مع البول (٣-٧ مجم/ اليوم) ومع العرق (١-٢ مجم/ اليوم).

### نقص الزنك :

ترجع أسباب ظهور حالات نقص الزنك إلى:

- ١- وجود عوامل تساعد على إعاقه امتصاص الزنك مثل تناول خبز غير متخمّر يحتوى على نسبة عالية من الفيتات أو فى حالة أكلى التراب geophagia.
  - ٢- زيادة الفقد فى الزنك من الجسم مثل حالات النزيف المزمن والإصابة بالطفيليات.
  - ٣- تناول وجبات غير متوازنة وخاصة إذا انخفض نسبة البروتين الحيوانى، أو مصاحبا لبعض الأمراض.
- أسباب النقص عموما هى انخفاض معدل الامتصاص - زيادة الفقد - انخفاض دخل البروتينات و لم يلاحظ حالات نقص الزنك فى البلاد ذات الجو البارد. ولكن وجد أنها قد تصاحب بعض الأمراض حيث لوحظ مستوى الزنك فى بلازما الدم مثل التهاب وتليف الكبد وخاصة فى حالة مدمنى الخمر ومرض ولسون

(Wilson's disease) (خلل وراثي في ميثابوليزم النحاس) والإصابة بالقرحة وهبوط القلب وأمراض الكلى، وبعض الأمراض العصبية والسيكولوجية، وأمراض سوء الامتصاص.

وقد ظهرت حالات نقص الزنك في الشرق الوسط وخاصة في مصر والعراق وإيران ويعزى له تأخر النمو وتأخر النضج الجنسي وضمور الخصية في الأطفال من سن ١٢-١٨ سنة والمصابين بسوء تغذية. وقد صاحب ذلك انخفاض في مستوى الزنك في الدم والبراز والبول أيضاً.

وقد وجد أن ذلك راجع أساساً لانخفاض مستوى الوجبة الغذائية كمّاً ونوعاً من جهة ومن جهة أخرى إلى ارتفاع الفيتات Phytates والألياف Fibers وكذلك الإصابة بالطفيليات. كما لوحظ في بعض المناطق الريفية في الوطن العربي أنهم يستهلكون خبزاً غير متخمّر. فقد وجد أخيراً أن تخمير الخبز يساعد على زيادة ذوبان الزنك وامتصاصه، كما ظهرت أعراض نقص الزنك نتيجة لوجود قبائل تأكل التراب Geophagia في بعض بلدان آسيا.

عموماً نقص الزنك يؤدي إلى: فقد في الشهية وتأخير في النمو والبلوغ والقزمية وتغيرات في الجلد والشعر وظهور بقع في الأظافر وعدم التئام الجروح وانخفاض القدرة على الإحساس بالتذوق - والشعور بالتعب وزيادة القابلية للإصابة بالأمراض، وتأخير في النضج الجنسي للذكور، وبالتالي ضمور الخصيتين Hypogonadism والعقم. وقد يحدث تغير في تشكيل الجنين، واضطراب سلام المولود.

#### السمية :

تؤدي الزيادة إلى تأثير سام (أكثر من ٥٠ مجم) حيث يتداخل الكميات الكبيرة من الزنك مع النحاس والحديد وأي معادن آثار في الجسم مما يؤدي إلى نقص ميثابوليزم الحديد والإصابة بالأنيميا. وتظهر في حالة الطهي أو حفظ الأغذية لمدة طويلة في آنية من الحديد غير المجلفن ويسبب الزيادة بالإصابة بالحمى والغثيان والإسهال كما يحدث تسمم من زيادة استنشاق كلوريد الزنك كملوث للبيئة في الأماكن الصناعية.

ويمكن لزيادة الزنك في الغذاء أن تعرض النقص في امتصاصه نتيجة وجود الكالسيوم والفوسفور والنحاس بكميات كبيرة، كما أن هذه الزيادة قد تسمى من التسمم الذى قد يحدث نتيجة ارتفاع الكاديوم.

### الكميات الموصى بها :

يوضح جدول (٨-٢٠) حسب RDA (١٩٨٩) :

جدول (٨-٢٠) الكميات الموصى بها من الزنك / الفرد / اليوم

الفترة	العمر بالسنوات	زنك ملجم/ اليوم
رضع	١ - ٠	٥
أطفال	١ - ١٠	١٠
ذكور	١٤ - ١٥ +	١٥
إناث	١٤ - ١٥ +	١٢
حمل		١٥
رضاعة		١٩

### المصادر الغذائية:

يوضح جدول (٨-٢١) محتوى الأغذية من الزنك ويلاحظ أن أعلى مصادر هي الرنجة والمحار مثل أم الخلول والجندوفلى والتي تحتوى على ١٠٠ جم أو أكثر/ ١٠٠ جم. بليها اللحوم واللبن والكبد والأسماك والبيض والمكسرات والبقوليات. عادة الرنجات المحتوية على بروتينات حيوانية عالية فى محتواها من الزنك. أما المحتوية على بروتينات نباتية ومرتفعة فى محتواها من المواد الكربوهيدراتية فهى تحتوى على كمية منخفضة من الزنك.

جدول (٨-٢١) بعض المصادر الغذائية للزنك

المصادر الغذائية	مجم/ ١٠٠ جم	المصادر الغذائية	مجم/ ١٠٠ جم
اللحوم	٣,١	الحبوب ومنتجاتها	١,٨
لحم بقرى	٥,٧	جنين القمح	١٦,٧
لحم ضان	٥,٣	حبوب كاملة	٣,٦
دواجن	٢,٩	خبز شعير	١,٣
البيض	٢,١	خبز، بيض	٠,٥
الأسماك	١,٧٥	الخضروات	١,١
المحار	١٤٨,٧	فاصوليا خضراء	٤,٢
الكابوريا	٧,٩	لوريا	٣,٥
الثونا	١,٧	اسبرجس	١,٠
الجمبرى	١,٥	بطاطس	٠,٩
منتجات الألبان	٠,٨٦	بسله	٠,٧
لبن جاف منزوع الدسم	٣,٥١	سبانخ	٠,٢
لبن مجنس	٠,٠١ - ٠,٠٥	كرنب	٠,٢
دهون وزيت	٠,٨٤	المكسرات	٣,٤

### ٣- اليود

#### Iodine

يعتبر أول العناصر الغذائية التى عرفت أهميتها بالنسبة للإنسان منذ ٣٠٠٠ سنة قبل الميلاد كما سبق.

اكتشف اليود بواسطة Courtols سنة ١٨١١ الذى كان يعمل فى باريس مع نابليون لكى يمد الجيش بالمفرقات، وقد اكتشف هذا العنصر عندما كان يستعمل بعض الأعشاب البحرية لاستخراج بعض المواد الكيماوية بها. وقد اكتشف وجوده فى جسم الحيوان سنة ١٨١٩، وفى سنة ١٩٢٠ نجح أحد الأطباء فى إيطاليا فى معالجة مرض الجويتر Goiter بواسطة اليود، وبعد اكتشاف اليود فى الجسم توالى الدراسات على اليود وأماكن وجوده الجغرافية، وفى سنة ١٨٩٥ اكتشف العلماء

وجود اليود فى الغدة الدرقية، وعزل هرمون من الغدة الدرقية سنة ١٩١٤ بواسطة Kendal الأمريكى وسمى الثيروكسين وقد نال جائزة نوبل. وعرف التركيب الكيميائى لهذا الهرمون ١٩٢٦، ثم حضر معملياً سنة ١٩٢٧، ثم عرف وجود هرمون آخر من إفرازات الغدة الدرقية سنة ١٩٥٢ ويسمى تيروسين ثلاثى اليود Tri-Iodo-Thyronine واشتق اسمه من الكلمة اليونانية iodes معناها اللون البنفسجى وهى لون أبخرته.

### توزيع اليود فى جسم الإنسان Distribution :

يحتوى اليود فى جسم الإنسان البالغ على كمية ضئيلة من عنصر اليود تشكل حوالى ٠,٠٠٠٠٤٪ من وزن الجسم (٢٥ ملجم) منها ١٠ ملجم موجودة فى الغدة الدرقية Thyroid gland يوجد اليود فى الواقع منتشرًا فى جميع أنسجة الجسم وإفرازته، ويلي الغدة الدرقية من حيث محتواها من اليود المبيضين والعضلات والدم.

### وظائف اليود Function :

يدخل اليود أساساً فى بناء هرمون الثيروكسين الذى تفرزه الغدة الدرقية والهيكل الكربونى لهذا الهرمون متعلق بالحامض الأمينى تيروسين، وبه أربع ذرات من اليود ومعظم اليود الموجود فى الجسم مصدره الغذاء وبنسبة أقل من الماء وقد يدخل جسم الإنسان اليود عن طريق التنفس فى الأماكن المجاورة للبحر، ولكن نسبة اليود عن هذا الطريق تكون قليلة، وتتوقف على مدى تشييع الهواء باليود.

ويقوم هذا الهرمون أساساً بتنظيم سرعة عمليات الأكسدة فى خلايا الجسم، فزيادة هذا الهرمون تودى إلى إسراع عمليات ميتابوليزم الطاقة، كما أن هذا الهرمون لازم لتنظيم النمو، ونضج الخلايا بصورة طبيعية، وتوازن الماء، ونشاط كل من الجهاز العصبى والدورى والتناسلى ونشاط العضلات، وتساعد على امتصاص الكربوهيدرات من الأمعاء كما أن إفرازات الغدة الدرقية لها دور فى صيانة الأنسجة الضامة وتخليق البروتينات عن طريق Ribosomes وتحويل الكاروتين Carotene إلى فيتامين A، ويؤثر على النمو العقلى وتطور الكلام فى الأطفال وعلى الحالة الصحية للشعر والأظافر والجلد والأسنان... كما يتأثر مستوى كولسترول الدم بالهرمون فيزداد عن المتوسط فى حالة نقص نشاط الغدة، وهو مهم لميتابوليزم كل العناصر الغذائية.


## الامتصاص والميتابوليزم Absorption and metabolism :

يمتص اليود من الأمعاء الدقيقة بسرعة إما فى صورة غير عضوية أو مرتبطاً مع بروتين فى صورة عضوية. عادة يمتص فى صورة iodide ويظهر فى الدم بعد فترة وجيزة من امتصاصه ثم ينقل ٣٠٪ من اليود الممتص إلى الغدة الدرقية Thyroid gland حيث يتأكسد سريعاً إلى عنصر اليود Iodine ويرتبط بالحامض الأمينى تيروسين Tyrosine الذى يوجد فى مركب بروتينى-يود معقد Protein-binding iodine (PBI) يطلق عليه Thyroglobulin وهو ذو وزن جزيئى مرتفع (٦٧٠٠٠) ويحتوى على ١٢٠ جزيئ من التيروسين Tyrosine يرتبط اليود الممتص بحوالى ثلثي هذه الكمية لتكوين مركبات أيودية مثل :

Monoiodotyrosine (MIT), Diiodotyrosine (DIT), Triiodotyrosine (T<sub>3</sub>), (Thyronine), Tetraiodo tyrosine (Thyroxine, T<sub>4</sub>).

ويوضح شكل (٧-٨) التركيب الكيماوى للمركبات الأيودية التى توجد فى

الغدة الدرقية ويعتبر T<sub>3</sub>، T<sub>4</sub> هى الصورة النشطة للهرمون.



شكل (٨ - ٧) التركيب الكيماوى للمركبات الأيودية



يخزن المركب البروتينى Thyroglobulin فى الغدة وينطلق هرمونات  $T_3$  ،  $T_4$  إلى مجرى الدم عند الحاجة لهم بفعل إنزيمات محللة للبروتينات التى تنشط بفعل هرمون من الغدة النخامية Pituitary gland منشط للغدة الدرقية Thyroid-stimulating hormone (T S H) يسمى Thyrotrophin ويعتبر هرمون  $T_3$  (Tri-iodo tyrosine) هو الصورة الأكثر نشاطاً من هرمون  $T_4$  (Thyroxine) ولكن يوجد فى الدم بكميات أقل فتصل نسبة  $T_3$  :  $T_4$  فى الدم إلى ١ : ٤ وهناك نتائج تؤكد تحول هرمون  $T_4$  (Thyroxine) إلى  $T_3$  (Thyronine) عند دخوله الخلية وتحوله إلى صورة الأكثر نشاطاً.

ويتحكم فى انطلاق هرمون  $T_4$  (Thyroxine) فى الدم هرمون (T S H) كما سبق القول بنظام التغذية الإرجاعية Feedback mechanism حيث يتأثر بمستوى هرمون (T S H) الغدة الدرقية لزيادة تخليق وانطلاق المركبات الأيضية وبالتالي يسبب تضخم فى الغدة الدرقية ويطلق على هذه الحالة المرضية Simple goiter.

ويعاد امتصاص جزء من اليود الناتج من انحلال هرمون الثيروكسين ( $T_4$ ) لاستعماله ثانياً مع اليود الممتص، ويخرج معظم اليود من الجسم عن طريق البول فى مدة قصيرة بعد امتصاصه (١٢ ساعة) ويفرز جزء لا يتعدى ٢٪ من اليود المتناول وغير الممتص عن طريق البراز، وجزء ضئيل جداً مع العرق.

ويتحكم عمل الغدة الدرقية وإفراز الثيروكسين وميتابوليزم اليود عدة عوامل أهمها:

- ١- الغدة النخامية: يؤثر «هرمون الثيروتروبين Thyrotrophin الذى تفرزه الغدة النخامية على نمو ميتابوليزم الغدة الدرقية. فتفرز هرمون الثيروكسين الذى يقلل بدوره من إفراز هرمون الثيروتروبين.
- ٢- ينظم الهيبوثالاميس Hypothalamus إفراز الهرمون كسين فتلف أجزاء معينة فى الهيبوثالاميس يؤدى إلى خفض إفراز الغدة النخامية لهرمون الثيروتروبين.
- ٣- يؤثر اليود نفسه على إفراز الهرمون: فيقل الإفراز عندما تصل نسبة اليود فى السرم لحوالى ٢٥ ميكروجرام/ ١٠٠ مل. ولو أنه يرجح أن تركيز اليود الذى فى الغدة الدرقية هو الذى يؤثر وليس تركيز اليود فى الدم.

٤- هناك بعض المواد الكيميائية التى تستعمل لعلاج بعض الأمراض تعوق من ميثابوليزم اليود مثل الثيوريوريا Thiourea والثيوراسيل Thiouracil حيث تمنع تأكسد iodide إلى iodine فى الغدة الدرقية.

٥- كذلك يحتوى الكرنب والفجل وبعض أفراد عائلة Brassice الصليبية على مواد مثبطة للهرمون Goitrogenic Substance مثل Thiooxazolidone (goitrin) والتى تعمل على إعاقة تكوين الهرمون وعادة لا تظهر علامات النقص إلا لو استمر تناوله لمدة طويلة بكميات كبيرة، ولكن يقف مفعول هذه المادة بواسطة حرارة الطهى.

### نقص اليود Deficiency :

يؤدى غياب اليود إلى زيادة النشاط الإفرازى للغدة الدرقية بغرض تعويض النقص مما يؤدى إلى تضخم الغدة (شكل ٨-٨) وتصبح صلبة لا تفرز الهرمونات المميزة بها. هذه الحالة يطلق عليها Simple Goiter ويؤدى انخفاض معدل إفراز الغدة الدرقية إلى انخفاض الميثابوليزم القاعدى وانخفاض معدل الدورة الدموية. وتقل سرعة النبض والتنفس وانخفاض حرارة الفرد وينخفض المستوى الصحى العام للمريض. وقد يظهر مرض الجويتر بصورة متوطنة Simple Endemic فى جهات معينة نتيجة لنقص اليود فى كل من التربة والمياه والنباتات فيها مثل - مناطق الهملايا والألب ومنطقة البحيرات العظمى ومناطق الواحات بجمهورية مصر العربية. كذلك تؤدى انخفاض معدل إفراز الغدة إلى زيادة تراكم وتغلظ الأنسجة الضامة تحت الجلد مما يعطى للجلد مظهرًا أخشن وتسبب زيادة وزن الجسم وجفاف الجلد وعدم القدرة على تحمل البرد وتغير فى الصوت.



شكل (٨-٨) تضخم الغدة الدرقية

أما إذا حدث نقص اليود فى الأطفال فتنشأ حالة Cretinism وهو مرض يتج عنه تنشوه خلقى حيث يتوقف النمو البدنى والعقلى كلية ويصبح المريض فى حالة أقرب إلى البلاهة ويتضخم أجزاء الوجه ويخف الجلد ويزيد سمكه وتظهر تجاعيد عميقة ويتضخم اللسان والشفة. وعادة تظهر هذه الحالات لأطفال ولدوا من أمهات عندهن نقص فى اليود فى مرحلة النمو والمراهقة وفترة الحمل. ويظهر فى الأطفال بعد فترة من الميلاد يمكن علاجها فى المراحل الأولى. وتكثر حالات نقص اليود أثناء فترات النمو والمراهقة وبين السيدات أثناء الحمل، ويظهر فى البالغين مرض مشابه نتيجة نقص اليود يسمى myxedema.

### السمية:

لا توجد أعراض مرضية لزيادة اليود فى الجسم ولو أنه لا بد من الاحتراس عند تناول أدوية تحتوي على كميات كبيرة من اليود حيث تؤدي إلى الخلل فى النظام الهرمونى فى الجسم ولكن زيادة تركيز هرمون الثيروكسين (T4) فى الجسم نتيجة لزيادة نشاط الغدة الدرقية تنتج حالة مرضية، ويتميز بتضاعف معدل الميتابوليزم القاعدى وزيادة معدل ضربات القلب وزيادة الحالة الانفعالية والعصبية للفرد وفقد للشهية ورعشة الأيدي وإذا صاحب هذه الحالة حدوث تضخم فى الغدة تؤدي إلى ضغط على إنسان العين وبروزه للخارج. ويؤدي زيادة معدل الميتابوليزم إلى زيادة إجهاد الجهاز الدورى.

### الاحتياجات:

تظهر الكميات الموصى بها من اليود فى جدول (٨-٢٢) حسب RDA (١٩٨٩).

جدول (٢٢-٨) الكميات الموصى بها من اليود (ميكروجرام / اليوم / الفرد)

اليود ملجم/ اليوم	العمر بالسنوات	الفئة
٤٠	صفر - ٠,٥	رضع
٥٠	٠,٥ - ١,٠	
٦٠	١-٣	أطفال
٩٠	٤-٦	
١٢٠	٧-١٠	
١٥٠	١١ - ٥١ +	ذكور
١٥٠	١١ - ٥١ +	إناث
١٧٥		حمل
٢٠٠		رضاعة

#### المصادر الغذائية:

يوجد اليود فى الأغذية بكميات بسيطة، وتختلف هذه الكميات باختلاف التربة والسماد وماء الرى وتحتوى الأجزاء الورقية والزهرية فى النباتات على اليود أكثر من الجذور (جدول ٢٣-٨).

وتعتبر الأسماك من أحسن المصادر لليود ولكن أغناها أسماك البحار المالحة والقشريات وتليها الأسماك التى تعيش فى كل من المياه المالحة والعذبة، ثم أسماك المياه العذبة.

ويضاف اليود إلى ملح الطعام بنسبة ٠,٠١٪ وفى صورة يوديد البوتاسيوم حيث وجد أن استخدامه فى الغذاء يمنع ويعالج حالات الجربز المتوطنة.

جدول (٨-٢٣) بعض المصادر الغذائية لليود

الميكروجرام/ ١٠٠ جم على أساس وزن رطب	الغذاء	الميكروجرام/ ١٠٠ جم على أساس وزن رطب	الغذاء
٢٢	أرز	٢٥	لبن ومنتجاته
٢٧	ذرة	٥١	جبنه
٣٧	قمح	٥٦	زبد
٥٨	عيش	٩٣	بيض
٢٢	البصل	٢٧	لحم ضان
٢٥	الخيار	٢٨	لحم بقرى
٢٦	الحس	٥٨٤	سردين
٣٨	الجندر	٢١٨٠-٧٤٢	سمك
٤٠	البطاطس		
٥٢	الكرنب	٥٢٠	رغمة
٢٠١	السبانخ	٣٢٠	سمك
١٧	الطماطم	٣٤١	الموز
٢٣	البسلة	٤٠-٢٠	سمك
٣٦	الفول	٣٠٠	زيت السمك
١٠	الكُمثرى	١٣٠٠	الجمبرى
		٣٠٨	الكابوريا

ويلاحظ أن ما يتناوله الفرد من اليود يتوقف على مدى وجود اليود فى غذائه، وهذا يتوقف على محتوى التربة من اليود، ومحتوى غذاء الحيوان، واستخدام الملح المضاف له اليود.

#### ٤ = المنجنيز

#### Manganese

عرف المنجنيز ١٧٧٤ بواسطة العالم الذمركى Scheele. وأعطى الاسم خطأً منجنيز وهو مستمد من الكلمة اللاتينية magnesia وهو صورة من الأحجار المغناطيسية، وحوالى ٩٥٪ من إنتاج العالم يستخدم فى صناعة الصلب. وفى عام ١٩٣١ عرف أنه مهم لنمو الفيران والدواجن وغيره من الحيوانات، وهو بلاشك عنصر أساسى للإنسان.

يعتبر المنجنيز من معادن الآثار الضرورية للجسم ولو أنه لم يظهر له أعراض نقص فى الإنسان. وترجع أهميته إلى ضرورة تواجده لإتمام الكثير من التفاعلات الحيوية الهامة فى الجسم. ويوجد فى جسم الإنسان حوالى ١٢-٢٠ ملليجرام، ومعظمه موجود فى العظام والغدة النخامية والكبد والعضلات والرئة والأنسجة الضامة كما يوجد نسبة من المنجنيز فى نواة وسيتوبلازم الخلية، وسرعة تجدد المنجنيز فى الميتوكوندريا سريع ولكنه بطئ فى النواة.

### وظائف المنجنيز:

يدخل المنجنيز فى تركيب وتنشيط كثير من الإنزيمات التى تلعب دوراً هاماً فى ميتابوليزم البروتينات مثل *arginase* وهو الإنزيم اللازم لتكوين اليوريا *urea* وميتابوليزم الطاقة مثل *Phosphotrans Ferases* والإنزيمات اللازمة لتكوين الأحماض النووية وبناء السكريات العديدة البروتينية *Mucopolysaccharides* وتلعب دوراً فى إنتاج الكربوهيدرات والأحماض الدهنية والكوليسترول، وهو ضرورى لبناء العظام وغمر وتطور الغضاريف وإنتاج الهرمونات الجنسية وإنتاج اللبن والمساعدة على تغذية الأعصاب والمخ. علاوة على ذلك فهو مهم لتجلط الدم وفى مفعول الإنسولين، كما توجد علاقات بينه وبين النحاس والزنك والحديد فى بعض أنظمة الإنزيمات.

### الامتصاص والميتابوليزم:

يمتص المنجنيز بصعوبة (٤٥٪) من الأمعاء الدقيقة، حيث يتحد مع بروتين الجلوبيولين *globulin* مكوناً مركب *Transmanganin* حيث ينتقل فى البلازما، وتركيزه فى البلازما ٢,٥ ميكروجرام/ ١٠٠ مل موزعة بالتساوى بين الخلايا والبلازما، حيث يوجد فى العظام والعضلات والكبد والجلد، ويفرز المنجنيز عن طريق القناة الهضمية خلال الصفراء وإفرازات البنكرياس للخارج ويعاد امتصاص جزء كبير وجزء بسيط يخرج عن طريق البول.

ويزداد معدل الامتصاص فى حالات نقص الحديد بينما زيادة الكالسيوم والفسفور المتناول يقلل من امتصاصه.

### نقص المنجنيز:

نقص المنجنيز فى الإنسان نادر الحدوث. عموماً يظهر النقص فى صورة

انخفاض القدرة على التكاث - وتأخر النمو وأحياناً يحدث شلل بطيء، وقد يحدث تغيرات خلقية وعدم انتظام الحركة (Ataxia) كما يؤدي النقص إلى تكوين غير طبيعي للعظام والغضاريف وتشنجات وصمم وعمى فى الأطفال وفقد القدرة على التخلص من السكريات. والنقص الذى ثبت فى الإنسان هو المتعلق بنقص فيتامين K حيث إن إضافة الفيتامين لم تصحح من التجلط غير الطبيعى للدم إلا مع إضافة المنجنيز. كما أظهرت تحليلات الدم والشعر فى الإنسان أن نقص المنجنيز يزيد من اضطرابات النمو وفى ميثابوليزم الكربوهيدرات شبيهاً بحدوث مرض السكر، ويغير فى ميثابوليزم الأحماض الدهنية والكولين والكولسترول. كما ظهر أن حدوث التشنجات فى الأطفال كانت مصحوبة بنقص المنجنيز فى الدم.

### السببية:

زيادة تناول المنجنيز عن ١٠ مجم/ اليوم تسبب حالات من التسمم أعراضها فقدان الشهية والصداع واضطراب فى الكلام واضطراب فى عضلات الحركة (المشى). وزيادة المتناول من البروتين اليومى يقى الفرد من أعراض التسمم بالمنجنيز وعادة تظهر حالات التسمم فى عمال المناجم نتيجة لاستنشاقهم كميات كبيرة من المنجنيز وترسيبها فى الرئتين. كما يترسب فى الكبد والجهاز العصبى المركزى.

### الكميات المقررة اليومية:

لا توجد توصية معينة بالنسبة لتحديد الاحتياجات اليومية. وعادة تحوى الوجبات العادية حوالى من ٢-٩ مجم/ اليوم، وهذه تغطى احتياجات الفرد البالغ ونظراً للتأثير السام لكميات الزيادة من المنجنيز بفضل عدم زيادة الكمية المتناولة عن ٥-٢٥ مجم. وينصح بتناول وجبات متزنة فى محتواها من العناصر كمّاً ونوعاً حتى لا يزيد المتناول منه عن الحد المناسب. ويعرض جدول (٨-٢٤) الكميات الموصى بها حسب RDA (١٩٨٩).

جدول (٨-٢٤) الكميات الموصى بها من المنجنيز / اليوم

الفئة	العمر بالسنوات	منجنيز ملجم / اليوم / الفرد
رضع	٠,٥ - صفر	٠,٣ - ٠,٦
	١ - ٠,٥	١,٠ - ٠,٦
أطفال ومراهقون	٣ - ١	١,٥ - ١,٠
	٦ - ٤	٢,٠ - ١,٥
	١٠ - ٧	٣,٠ - ٢,٠
	+١١	٥,٠ - ٢,٠
البالغون		٥,٠ - ٢,٠

#### المصادر الغذائية:

تعتبر الحبوب الكاملة وجنين القمح ومح البيض والخضروات الورقية والبقول الجافة من الأغذية الغنية بالمنجنيز باقى الخضروات والفاكهة تحتوى على كميات متوسطة بينما منتجات الألبان واللحوم واللبن منخفضة فى محتواها للمنجنيز (جدول

(٢٥-٨



جدول (٨-٢٥) بعض المصادر الغذائية للمنجنيز ملجم / ١٠٠ جم

الغذاء	المنجنيز ملجم/١٠٠ جم	الغذاء	المنجنيز ملجم/١٠٠ جم
الأرز الأبيض	١٧,١	البطاطس	١,٠
الجنزيل	١٧,٨	التوت	١,٠
عين الجمل	١٥,٢	السبانخ	٠,٨
جنين القمح	١٣,٣	البنجر	٠,٧
ردة القمح	١١,٠	الذرة	٠,٥
الأرز قبل التبييض	٩,٦	الموز	٠,٥
العسل الأسود	٤,٣	الجزر	٠,٤
حبوب القمح الكامل	٣,٧	اللفت	٠,٤
دقيق فول الصويا	٣,٢	الكريز	٠,٤
فول الصويا	٣,٠	الفاصوليا الخضراء	٠,٣
السوداني	٢,٥	التفاح	٠,٣
الفول	٢,١	الخيز	٠,٣
الذرة الرفيعة	١,٦	البطاطا	٠,٣
الخميرة	١,٣	الكرنب	٠,٣
دقيق القمح	١,٠	الفراولة	٠,٣
الخس	١,٠	الكبد	٠,٢

## ٥ - النحاس

### COPPER

يرجع اكتشافه إلى أكثر من ٨٠٠٠ قبل الميلاد. وقد سميت الفترة من ١٠٠٠ - ٣٠٠٠ سنة قبل الميلاد بالعصر البرونزي وهو سبيكة من النحاس والقصدير التي كورت وابتدأ استخدامها منذ ذلك الزمن. وتعتبر جزيرة قبرص Cyprus هي المصدر الرئيسي للنحاس لدول حوض البحر المتوسط، ولذا يسمى cyprian metal. وكلمة copper وأيضاً الرمز الكيميائي Cu مشتق من cuprum وهو الاسم الروماني لمصطلح cyprian metal.

وقد قامت العديد من الدراسات فى جامعة Wisconsin الأمريكية منذ ١٩٢٥ - ١٩٢٨ تحت إشراف Hart الذى اكتشف أن النحاس ضرورى مع الحديد لتكوين الهيموجلوبين.

اكتشفت أهمية النحاس فى التغذية سنة ١٩٢٨ أثناء سلسلة التجارب التى كانت تجرى على الفيران والأرانب، وقد كانت نتيجة تغذيتها على اللبن أنها أصيبت بأنيميا ولم يمكن علاجها بالحديد، وأمكن علاجها فقط بواسطة أغذية محتوية على رماد نحاس ومنذ ذلك الحين عرف أهمية النحاس ولكن صعب تحديد دوره بالضبط لتداخله مع عناصر آثار أخرى مثل الزنك والموليبدينم. وكان العالم Josephs (١٩٣١) هو الذى توصل أن النحاس أقدر على علاج أنيميا الرضع التى تصيبهم أثناء الرضاعة الطبيعية على اللبن فقط.

### **وجوده فى الجسم:**

يحتوى جسم الإنسان البالغ على ١٠٠ - ١٥٠ ملجم نحاس تتركز حوالى ٥٠٪ من هذه الكمية فى العظام والعضلات و ١٠٪ توجد فى الكبد ويعتبر أكثر أعضاء الجسم محتوية على نحاس يليه المخ والقلب والكلى على التوالى. ويصل محتوى النحاس فى كبد الجنين إلى حوالى ٥-١٠ مرات مثل محتواه فى كبد الشخص البالغ. هذه الكمية الزيادة تغطى احتياجات الطفل حديث الولادة من النحاس فى الفترة التى يتغذى فيها على اللبن فقط حيث أن اللبن يحتوى على نسبة ضئيلة من النحاس، وتنخفض تدريجياً إلى أن تصل لمستوى الشخص البالغ فى عمر ثلاث شهور.

### **وظائف النحاس Function :**

النحاس عنصر غذائى هام يدخل فى عملية الأكسدة وغيرها من العمليات الهامة التى تتم فى الخلية فهو يساعد فى تكوين الهيموجلوبين وكرات الدم الحمراء حيث أنه يسهل من امتصاص الحديد ويدخل النحاس فى تركيب كثير من الإنزيمات التى تحلل أو تبني أنسجة الجسم مثل الإنزيمات المؤكسدة Oxidases (أو أكسيداز حمض الاسكوربيك والسيتوكروم أكسيداز). والإنزيمات اللازمة لميتابوليزم الطاقة واستخدمناها المختلفة، وأيضاً الإنزيمات اللازمة لميتابوليزم الحديد طبيعياً.

ويساعد على تحويل الحمض الأميني التيروسين Tyrosine إلى Melanin pigment وهى صبغة داكنة اللون مسئولة عن لون الشعر والجلد حيث يدخل فى تركيب إنزيم Tyrosinase ويدخل النحاس فى ميتابوليزم البروتين وفى عمليات الالتئام السليم للعظام بجانب ضرورة النحاس لبناء الفسفوليبيدات التى تلزم لتكوين الأغلفة الواقية الميلينية Myelin التى تحيط بالألياف العصبية. ويساعد النحاس الجسم على أكسدة فيتامين C ليكون الإيلاستين elastin وهو من المكونات الأساسية للأنسجة الضامة والألياف العضلية المرنة الموجودة فى الأورطى والأوعية الدموية، وكل الألياف الموجودة كل أنحاء الجسم. والنحاس ضرورى للتكوين السليم للعظام والمحافظة عليها ولتكوين RNA. كما أن النحاس لازم لبناء وعمل خلايا المخ والحبلى الشوكى.

### امتصاص وميتابوليزم النحاس:

نسبة امتصاص النحاس منخفضة لا تتعدى ٣٠٪ من المتناول يمتص يوميًا. ويحدث الامتصاص من المعدة أو الجزء العلوى من الأمعاء أو كليهما. ويمر النحاس من الأمعاء إلى الدم فترة قصيرة لا تتعدى ١٥ دقيقة من هضمه حيث يوجد فى صورتين:

- ١- نسبة بسيطة منه حوالى ٧٪ من نحاس البلازما تتحد مع اليومين الدم Albumin أو بعض الأحماض الأمينية ارتباطاً ضعيفاً وهذه النسبة هى التى يتم عن طريقها نقل وتبادل النحاس من مجرى القناة الهضمية والأنسجة وبين الأنسجة وبعضها.
- ٢- نسبة كبيرة منه أكثر من ٨٠٪ من نحاس البلازما تتحد مع جلوبيولين الدم مكونة مركب برتئينى معقد Ceruloplasmin (٢٥مجم/ ١٠٠مل دم) يخزن فى الكبد والذى يصعب إفرازه خارج الجسم عن طريق البول. ويظن أن هذا المركب يمنع تراكم النحاس حتى لا يصل إلى المستوى السام. كذلك يساعد على تشييع مركب الحديد والبروتين فى الدم Transferrin بالحديد.

يبلغ مستوى النحاس فى سیرم الدم إلى ٩٠-١٥٠مجم/ ١٠٠مل ويزداد المستوى فى السيدات عن الرجال. ويتضاعف مستوى النحاس فى سیرم الدم أثناء فترة الحمل أو فى حالة تناول حبوب منع الحمل، وكذلك الأفراد المصابين بمرض

البلاجرا الناتج من نقص فيتامين النياسين niacin وفى حالات أمراض الكبد المزمنة والحادة.

وتتحكم الغدة فوق الكلية Adrenal gland فى انطلاق النحاس من الكبد إلى مجرى الدم عن طريق التأثير على معدل تكوين المركب البروتينى المعقد. جزء من نحاس السيرم يدخل نخاع العظام حيث يستخدم لتخليق مركب آخر منه يطلق عليه erythrocupreine يحتوى على ٦٠٪ من نحاس كرات الدم الحمراء ويعمل كإنزيم. ويسحب النحاس من سيرم الدم عن طريق الكبد حيث إما يدخل المرارة ويخزن فى صورة مركب بروتينى معقد يحتوى على ٢٪ نحاس أو يستخدم لتخليق مركب سريولوبلازمين ceruloplasmin والذى يعاد إفرازه ثانيًا لمجرى الدم.

ويخزن النحاس أساساً فى الكبد وفى نفس الوقت نفسه يعمل الكبد كمصدر للنحاس ويخرج النحاس غير الممتص عن طريق البراز. أما النحاس الممتص ٨٠٪ منه يخرج عن طريق إفرازات الصفراء وبالتالى مع البراز خارج الجسم، ١٦٪ يعاد انتشاره ثانيًا خلال القناة الهضمية لتكوين المركب البروتينى المعقد المكون من النحاس والاليومين فى سيرم الدم والجزء الباقى (٤٪) يفرز مع البول. ويلاحظ أن ارتفاع الكادميوم والكالسيوم والحديد والرصاص والموليبدوم والزنك والفضة يقلل من الاستفادة من النحاس.

### **نقص النحاس Deficiency :**

حالات ظهور الأنيميا نتيجة لنقص النحاس نادرة ولكن تظهر حالات نقص النحاس فى الأطفال غير الكاملى النضج "المبتسرين" بسبب إسهال مزمن. بعد ذلك يظهر أعراض الأنيميا التى لا تستجيب للعلاج بالحديد. وعادة فإن كبد المولود يحتوى على نحاس بما يعادل من ٥-١٠ مرات من ذلك فى كبد البالغ ويستحتاجها خلال السنة الأولى من العمر.

يظهر كذلك انخفاض مستوى النحاس فى دم الأطفال الذين يعانون من نقص الحديد والأنيميا نتيجة لاستمرار تغذيتهم على ألبان فقط لمدة تزيد عن ١٠ أشهر ويطلق على هذه الحالة Hypocupremia. وتظهر الأعراض فى صورة ضعف عام وضيق فى التنفس وقرح جلدية كذلك قد يؤثر على لون الشعر.

كما يؤدي النقص إلى انخفاض نسبة الإلستين elastin والكولاجين Collagen في جدر الأورطة مما يؤدي إلى خفض درجة مرونتها والتسبب في نزيف داخلي نتيجة لانفجارها وتشويه الجهاز العظمي وتدهور الجهاز العصبي وعدم تكوين mylin وفشل الجهاز التناسلي وأضرار بالقلب والأوعية الدموية وقد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول وخصوصاً مع ارتفاع الزنك.

ويقل محتوى النحاس كلما تقدم العمر وقد يعكس الحالة التغذوية لبعض الفئات.

### السمية Toxicity :

احتمال التسمم بالنحاس قائم طالما يوجد في صورة أيونات غير مرتبطة، حيث يثبط فعل كثير من الإنزيمات الضرورية. ولم تظهر حالات من التسمم ناتجة من تلوث البيئة ولكن إذا زاد دخل الفرد من أملاح النحاس عن ١٠ مرات الكمية الموجودة في الوجبة العادية يسبب غثيان وقئ والمعروف أن كبريتات النحاس تستخدم لتطهير مياه حمامات السباحة.

التسمم المزمن Chronic نادراً ما ينتج نتيجة لتلوث المياه بالنحاس عن طريق أنابيب المياه أو أواني الطهي. كما يحدث تسمم مزمن من النحاس نتيجة لحالة وراثية تؤدي إلى حالة مرضية يطلق عليها Wilson's disease وهو عبارة عن اضطراب وراثي ناتج من ميتابوليزم غير طبيعي للنحاس نتيجة لنقص الإنزيم اللازم لتكوين مركب Ceruloplasmin يؤدي إلى زيادة النحاس مع استمرار امتصاص النحاس من الغذاء وتخزينه في أنسجة معينة خصوصاً الكبد. وينخفض تركيز المركب من ٢٥ مجم/١٠٠ مل إلى صفر-٥ مجم/١٠٠ مل في سیرم الدم. إن تراكم النحاس يؤدي إلى عدم قدرة الأنسجة والخلايا على القيام بوظيفتها وخاصة نسي الكبد والمخ حيث يتأثر الجهاز العصبي المركزي ويحدث تليف الكبد. وزيادة إفراز الأحماض الأمينية والفوسفات ونتيجة لترسيب النحاس في قرنية العين تتكون حلقة خضراء، أو بنية مخيلية.

العلاج إضافة مواد تسحب المعدن من الأنسجة وتقليل النحاس من الوجبة أو تناول أحد مشتقات البنسلين يسمى penicillamine عن طريق الفم الذي يساعد

على سرعة إفراز النحاس الزائد خارج الجسم ويصاحب زيادة الدخول اليومي من النحاس إنخفاض في مستوى الريتينول retinol في بلازما الدم.

### الاحتياجات Requirement :

يعتبر النحاس من المعادن الضرورية وإن لم يتمكن من تحديد احتياجات فعلية. فقد وجد أن النحاس منتشر بكميات معقولة في أغذية متعددة كما أن الوجبة اليومية العادية للبالغين تحتوى على من ٢-٣ ملجم نحاس وهذه كافية لتغطية احتياجات الفرد.

ويوضح جدول (٨-٢٦) الاحتياجات الغذائية من النحاس حسب RDA

(١٩٨٩) :

جدول (٨-٢٦) الاحتياجات الغذائية من النحاس / اليوم

الفئة	العمر بالسنوات	النحاس ملجم / اليوم / الفرد
رضع	٠,٥ - ١	٠,٤ - ٠,٦ ٠,٦ - ٠,٧
أطفال ومراهقون	١ - ٣ ٤ - ٦ ٧ - ١٠ ١١ +	٠,٧ - ١,٠ ١,٠ - ١,٥ ١,٠ - ٢,٠ ١,٥ - ٢,٥
البالغون		١,٥ - ٣

### المصادر الغذائية Food sources :

الكبد - الحبوب الكاملة ومنتجاتها، اللوز، الخضروات الورقية، البقوليات المجففة، والعنب Grapes، والمحارات Shellfish. كذلك المصادر النباتية الأخرى. بينما اللبن والخضروات تعين مصادر فقيرة في النحاس (جدول ٨-٢٧).

جدول (٨-٢٧) بعض المصادر الغذائية للنحاس

أغذية محتوية على النحاس بكميات		
مرتفعة أكثر من ٨ جزء في المليون	متوسطة ٢-٨ جزء في المليون	منخفضة أقل من ٢ جزء في المليون
الكبد	الخضروات الورقية	اللبن
المحار	البيض	الزبد
المكسرات	اللحوم	الجبن
الكاكاو	الأسماك	بعض الخضروات والفراكه
عيش الغراب	الدواجن	
الحبوب الكاملة	البسلة والفاصوليا	
الجيلاتين	العنب	

### ٦- الكوبلت

#### COBALT

ترجع أهمية الكوبلت إلى أنه يدخل في تركيب فيتامين ب<sub>١٢</sub> (B<sub>12</sub>)، ويتنشر الكوبلت في الطبيعة والأغذية حتى في الجو وليس من السهل حدوث حالة نقص غذائي في الإنسان.

واشتقت كلمة cobalt من الكلمة الألمانية kobold ومعناها جلوبين globin. وقد ظهر هذا المصطلح منذ القرن السادس عشر عندما كانت توضع بعض المعادن النفيسة المحتوية على زرنيخ وكوبلت في مناجم الفضة في جبال Harz وكان يعتقد العاملون في المناجم أن هذه المعادن النفيسة تحتوي على نحاس، وعندما سخنها العاملون تعرضوا للتسمم من شحم أبخرة ثلاثي أكسيد الزرنيخ المنبعثة، وظنوا أن هذا مبعثه أرواح شريرة وكانوا يعتقدون أن مصدرها الجلوبيين.

وفي عام ١٧٤٢ عزل George Brandt السويدي معدن الكوبلت وكان يستخدم لقرون عدة في تزيين الزجاج والأواني الفخارية باللون الأزرق. اكتشف ١٩٤٨ أن فيتامين B<sub>12</sub> يحتوي على كوبلت بنسبة ٤٪ واعتبر منذ ذلك الوقت أنه عنصر أساسي للإنسان.

## وظائف الكوبلت Function :

بالإضافة إلى كونه يدخل فى تركيب فيتامين B<sub>12</sub>، فهو يعمل على تنشيط عدد من الإنزيمات مثل الفوسفوترانسفيراز Phosphotransferases، ويدخل بطريقة غير مباشرة فى تكوين كرات الدم الحمراء حيث أنه جزء من Vitamin B<sub>12</sub>.

## الامتصاص والتمثيليزم Absorption and metabolism :

نسبة امتصاص الكوبلت منخفضة وتتم فى الأمعاء الدقيقة. ومعظم ما يمتص يخرج مع البول. ويخزن معظمه فى خلايا الدم الحمراء والبلازما ويخزن الباقي فى الكبد والكلى والبنكرياس والطحال. ويلاحظ أن الكوبلت المخزن لا يستفيد منه الإنسان لأنه لا يقدر أن يكون فيتامين B<sub>12</sub>. ولكن بكتيريا E coli الموجودة فى قولون الإنسان يمكنها تخليق B<sub>12</sub> ولكن بكمية لا تكفى حاجات الإنسان علاوة على أن امتصاصه منخفض.

## تأثير النقص والزيادة :

يؤدى نقص الكوبلت إلى انخفاض معدل النمو وظهور أعراض الأنيميا الخبيثة Pernicious anemia وإذا لم يعالج النقص يؤدى إلى خلل فى الأعصاب.

زيادة الكوبلت فى الإنسان والحيوان تنشط عملية بناء كرات الدم الحمراء وتولد حالة يزداد فيها عدد كرات الدم الحمراء فى الدم عن العدد الطبيعى ويطلق عليها Polycythemia وقد تودى إلى تضخم الغدة الدرقية وتقليل نسبة الكوبلت ترجع إلى حجمها الأصلى.

وعادة لا يتعرض الإنسان لزيادة الكوبلت إذا كان معتمداً على مصادره من الغذاء والماء.

## الاحتياجات Requirements :

احتياجات الإنسان من الكوبلت غير معروفة. إلا أنه وجد أن ١ ميكروجرام يومياً يكفى للإنسان. وعادة فإن الوجبات العادية تمد الفرد فى المتوسط من ٥-٨ ميكروجرام / اليوم.

## المصادر الغذائية Food sources :

للحوم خاصة الكبد والكلى والمحار. وينقص أو ينعدم فى الخضروات



الأرضية. وأى جدول يوضح محتوى الأغذية من الكوبالت لا يفيد لأن الإنسان لا يستخدمه فى بناء  $B_{12}$  إذ لابد أن يتناول الإنسان  $B_{12}$ ، ولهذا يستفيد الإنسان من التعرف على مصادر  $B_{12}$  الغنية كما يوضحها جدول (٨-٢٨).

جدول (٨-٢٨) بعض المصادر الغنية فى فيتامين  $B_{12}$

الغذاء	$B_{12}$ ميكروجرام/١٠٠ جم	الغذاء	$B_{12}$ ميكروجرام/١٠٠ جم
كبد البقر	١١١	المحاريات	١٥
الرغويات	٩٨	كابوريا	١٠
كللى الخروف	٦٣	سردين	١٠
كبد الديك الرومى	٤٨	جبنه موزاريللى	٨
كللى البقر	٢٥	سمك	٨
كبد الدجاج	١٩	سالمون	٧

#### ٧ - الموليبدنم

#### Molybdenum

ابتدأ الاهتمام بالموليبدنم منذ حوالى ٦٠ سنة خلال العقد الرابع من القرن العشرين عندما عرف أهميته للنبات. ولكن تأكد أخيراً ضروريته لتغذية الإنسان وهو يوجد فى معظم الأنسجة النباتية والحيوانية ويوجد بجسم الإنسان البالغ ٩ مجم معظمه يوجد فى الكبد والكللى والعظام وخلايا الدم.

اكتشف العالم السويسرى Scheele ١٧٧٨ أن الموليبدنم عنصر جديد. وعزله Hjelms ١٧٨٢. والاسم مشتق من الكلمة اليونانية molybdos ومعناها رصاص. وعرف أنه أساس للنبات، وفي ١٩٥٩ اكتشف أنه يوجد فى إنزيم xanthine dehydrogenase.

#### الامتصاص Absorblion :

يمتص الموليبدنم بسهولة من الأمعاء الدقيقة و١٠٪ يحدث بعض امتصاص فى القناة الهضمية، ويفرز أساساً مع البول. وجزء بسيط يخرج مع البراز وتتوقف الكمية الممتصة والمفرزة إلى حد كبير على كمية الكبريت الموجودة فى الوجبة، فزيادة

الكبريت فى الوجبة يزيد من كمية الموليبدنم التى تفرز مع البول ويخزن فى الكبد والكلى والعظام والجلد.

#### **وظائف الموليبدنم Function :**

يدخل الموليبدنم فى تكوين اثنين من الإنزيمات فلانينية Flavin - enzymes الأول وهو إنزيم الراتئين أكسيديز Xanthine oxidase الذى يساعد على تكوين حامض اليوريك من هيبوزاتئين البيورين Purines hypoxanthine ويساعد على نقل الحديد من مخزنه فى الكبد إلى البلازما. أما الإنزيم الثانى فهو Aldehyde oxidase وهو لازم لأكسدة الألدهيدات إلى أحماض كربوكسيلية فى ميتابوليزم الدهون. وهو عموماً يدخل فى ثلاثة أنظمة إنزيمية متعلقة بميتابوليزم الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والأحماض الأمينية الكبريتية والأحماض النووية والحديد، كما يوجد فى إنامل الأسنان ويعمل مع الفلورين لمنع تسوسها.

#### **علاقة الموليبدنم بباقى العناصر المعدنية:**

ترجع أهمية التغذية للموليبدنم بعلاقته بعناصر معدنية أخرى خاصة النحاس والكبريت فالسمية الناتجة من زيادة الموليبدنم فى الحيوانات يمكن أن تعالج بإضافة النحاس للعليقة. كما أن زيادة الموليبدنم يزيد من ظهور حالات نقص النحاس والإصابة بالأنيميا وكذلك زيادة كمية الموليبدنم المتناول يتداخل مع نشاط إنزيم alkaline phosphatase مما يسبب نمو غير طبيعى للعظام.

#### **نقص الموليبدنم Deficiency :**

لا يوجد أعراض معينة لنقص الموليبدنم إلا أنه يؤدى إلى انخفاض فى نشاط إنزيم Xanthine oxidase وقد وجد أن زيادة تناول النحاس يؤدى إلى انخفاض مستوى الموليبدنم فى الدم والأنسجة مع زيادة إخراجها فى البول. وتظهر حالات النقص فى الأفراد النباتيين أو الذين يتناولون وجبات مكونة من أغذية مصنعة.

كما أن نقص الموليبدنم يعرض الحيوان للسمية الناتجة من زيادة مركب ثنائى السلفيت bisulfite الذى قد يكون من مضافات الأغذية أو ناتجاً من ميتابوليزم الأحماض الأمينية الكبريتية، وتظهر أعراض هذه السمية فى صورة صعوبة فى التنفس واضطراب الأعصاب.

## السمية Toxicity :

أما زيادة الموليبدنم فتسبب سمية للحيوان (molybdenosis) وخصوصاً الماشية والفيضان والأرانب وفيها يحدث إسهال وتأخر فى النمو ونقص الوزن وانخفاض مستوى الهيموجلوبين وعدد كرات الدم الحمراء وتشوه عظام الأرجل وزوال لون الشعر، وأيضاً أمراض نقص النحاس، ويمكن أن تقلل السمية بزيادة الكبريتات التى تسبب زيادة إخراج الموليبدنم.

وتسبب زيادة المتناول والموليبدنم الإصابة بما يشبه النقرس goutlike syndrome مرتبط بارتفاع الموليبدنم وحامض اليوريك وإنزيم xanthine oxidase فى الدم ولذا ينصح بالآ يزيد المتناول منه عن ١٠ - ١٥ ملجم / اليوم.

## الاحتياجات اليومية Requirement :

توصى RDA ١٩٨٩ أن يتناول الفرد الكميات الموضحة فى جدول (٨-٢٩) وهى مبنية على أساس الحد الأدنى من الاحتياجات.

جدول (٨-٢٩) الاحتياجات اليومية من الموليبدنم

الفترة	العمر بالسنوات	موليبدنم ميكروجرام / الفرد / اليوم
رضع	صفر - ٠,٥	١٥ - ٣٠
	٠,٥ - ١	٢٠ - ٤٠
أطفال	١ - ٣	٢٥ - ٥٠
	٤ - ٦	٣٠ - ٧٥
	٧ - ١٠	٥٠ - ١٥٠
مراهقون وبالغون	١١ +	٧٥ - ٢٥٠

## المصادر الغذائية Food sources :

تختلف نسبة الموليبدنم فى الأغذية حسب محتوى التربة منه. وعموماً معظم موليبدنم الغذاء يستمد الإنسان من أعضاء الحيوان، الحبوب الكاملة، جنين القمح، البقوليات، الخضروات الورقية، الخميرة (جدول ٨ - ٣٠).

جدول (٨-٣٠) محتوى بعض الأغذية من الموليبدنم ملجم / ١٠٠ جم

المولينديم ميكروجرام	الغذاء	المولينديم ميكروجرام	الغذاء
٠,٠١٧	الكرنب	٠,٣٢٣	الفول
٠,٠١٦	البطاطس	٠,٢١٠	جنين القمح
٠,٠١٦	الكاتلوب	٠,١٥٠	الكبد
٠,٠١١	المشمش	٠,٠٦٧	الفاصوليا الخضراء
٠,٠١٠	الجزر	٠,٠٥٠	البيض
٠,٠٠٣	الموز	٠,٠٤٨	الدقيق الكامل
٠,٠٠٣	اللبن	٠,٠٤٠	الدواجن
٠,٠٠٢	الخس	٠,٠٢٥	الدقيق الأبيض
٠,٠٠٢	الكرفس	٠,٠٢٥	السمبانخ

#### ٨ - الكروميوم

#### CHROMIUM

الكروميوم عنصر كيميائي يستخدم فى الصناعة مثل تصنيع وطلاء الألواح التى تستخدم فى إعداد بعض الهياكل والأجهزة والسيارات. وقد وجد بعد ذلك أنه عنصر أساسى للجسم، فقد اكتشفه العالم الفرنسى Vauquel ١٧٩٧ عندما كان يفحص خامة crocite الغنية بمادة كرومات الرصاص. وكلمة كروميوم مستمدة من الكلمة اليونانية chroma والتى تعنى اللون color، وهو يوجد فى مركبات ملونة كثيرة تستخدم فى الصبغات وديج الجلود.

وفى سنة ١٩٠٠ استخدم فى الصناعة، ولذا فإن الناس الذين يقطنون فى مساكن قريبة من هذه الأماكن معرضون للتلوث الهوائى والمائى والغذائى.

وفى عام ١٩٥٩ توصل العالمان الألمانىان Schwarz و Mertz عندما كانا يعملان أستاذان زائران فى الولايات المتحدة أن إضافة الكروميوم إلى الخميرة المستخدمة فى غذاء الفيران أدت إلى تحسن الاستفادة من السكر... وبعدها توصل Schroeder أن الكروميوم يعمل كعامل مساعد للإنتسولين cofactor ولازم لميتابوليزم الجلوكوز ونمو وإطالة عمر الفيران.

ثم اكتشف بعد ذلك أن للكروميوم صورتان: الصورة غير العضوية ودرجة استفادة الإنسان والحيوان منها أقل من الصورة العضوية الموجودة في الخميرة، وسمى الكروميوم في الصورة العضوية معامل تحمل الجلوكوز **Glucose Tolerance Factor (GTF)** وذلك لأنه يحافظ على مستوى السكر طبيعياً في الفرد إذا تعرض إلى بعض ضغوط أو حالات تؤدي إلى أعراض مشابهة لمرض السكر **diabeticlike**. ويعرف **GTF** بأنه قدرة الفرد على إدخال السكر في الأنسجة للاستفادة منه، ويقاس هذا العامل بنسبة انخفاض مستوى جلوكوز الدم ووصوله للمستوى الطبيعي عند حقن الفرد بالجلوكوز.

### **الامتصاص :**

يمتص الكروميوم غير العضوى بنسبة منخفضة (١، ٠٪)، أما في الصورة العضوية (**GTF**) فيصل الامتصاص إلى ١٠ - ٢٥٪ ويتأثر الامتصاص بعدة عوامل منها:

**- العمر :** حيث يقل الامتصاص بتقدم الفرد في العمر.

### **- القلوية alkalinity :**

تعمل قلوية الأمعاء الدقيقة إلى تقليل الاستفادة من الكروميوم غير العضوى لأنه يتحول إلى أيونات ثلاثية الشحنة تتفاعل مع الأيونات القلوية، فيتكون مواد غير ذائبة وغير فعالة.

أما في الدم فإن الوسط خفيف القلوية.. وهنا يتحد الكروميوم غير العضوى مع الإكسالات (السبانخ) أو الفيتامين (بعض الأغذية) أو طرطرات (العنب والفواكه) أو يكتسج بودر، وهذا يمنع تكوين مواد غير ذائبة، ويبقى الكروميوم ذائباً مما يزيد الاستفادة منه.

### **- الأنيما :**

تزيد الاستفادة من الكروميوم غير العضوى في حالة إصابة الفرد بأنيميا نقص الحديد لأن كلا العنصرين الحديد والكروميوم ينتقلان في الدم بواسطة **transferrin** ففي حالة نقص الحديد تنجح الفرصة أكثر لنقل الكروميوم غير العضوى بواسطة **transferrin**.

### - تكوين مركبات معقدة :

تكون الفيتات الموجودة فى الحبوب والبقول مركبات معقدة غير ذائبة مما يقلل الاستفادة من الكروميوم.

### - الإصابة بمرض السكر : يزيد الامتصاص.

### - زيادة الكربوهيدرات فى الغذاء :

زيادة الأغذية الكربوهيدراتية مثل الدقيق الأبيض أو السكر فإنها تقلل المخزون من الكروميوم ويزيد إخراجة فى البول.

### - الدهون :

تقلل من الامتصاص لأنها تثير إفراز الصفراء القلوية التأثير منتجة مركبات غير ذائبة يصعب امتصاصها.

### - سوء تغذية الأطفال :

يصاب الأطفال بحالة شبيهة بأعراض مرض السكر، ولهذا يمكن العلاج بواسطة الكروميوم كما ظهر فى دراسات على الأطفال فى نيجريا وتركيا والأردن.

### - الكائنات الدقيقة فى الأمعاء :

وجود هذه الكائنات مثل *Aerobacter aerogene* فى الأمعاء كما توجد فى الحبوب والألياف وبعض الفواكه، كما توجد فى أمعاء الإنسان. وهذه تعمل على تحويل الكروميوم غير العضوى إلى GTF.

### - فترة الحمل :

يستمد الجنين الكروميوم من الأم، وخصوصاً خلال الثلاث شهور الأولى لتكوين الشعر... ولهذا لابد من تناول كميات كافية من الكروميوم حتى لا تتعرض إلى حالات نقص.

### - تخزين الكروميوم Storage :

يخزن الكروميوم فى الكبد والكلية، وهذا يفيد الجسم فى تكوين GTF. ويلاحظ أن الضغوط تقلل الاستفادة من الكروميوم.

### - الإخراج Excretion :

يخرج فى البول ٧-١٠ ميكروجرام / اليوم.

## وظائف الكروميوم : Functions

يدخل الكروميوم فى وظائف كثيرة، إلا أنه من الصعب تحديد وظائف هذا العنصر لأنه يعمل مع غيره من العناصر التى تنظم الميتابوليزم مثل الهرمونات (الإنسولين) وإنزيمات مختلفة، أحماض نووية.

### ومن وظائف الكروميوم :

- ١- يدخل فى تكوين عامل تحمل الجلوكوز (GTF) Glucose Tolerance Factor.
- ٢- منشط لعديد من الإنزيمات التى تدخل فى عمليات توليد الطاقة من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات.
- ٣- يحافظ على سلامة وثبات الأحماض النووية RNA, DNA.
- ٤- يشجع بناء الأحماض الدهنية والكوليسترول.

ويدخل الكروميوم فى تكوين عامل تحمل الجلوكوز، وهو مشابه هرمون *hormonelike* ويحتوى على كروميوم ونياسين، والأحماض الأمينية *Cysteine, glutamic, glycine* ويفرز من الكبد أو الكلى أو أى نسيج آخر وذلك عند ارتفاع مستوى جلوكوز الدم حيث يعمل مع الإنسولين فى انتقال منتجات الهضم التى تشمل الجلوكوز والأحماض الأمينية والدهنية من الدم إلى داخل الخلايا لتمثيلها. وعند نقص هذا العامل يزيد الاحتياج إلى الإنسولين، ولكن لا يعمل GTF فى غياب الإنسولين.

والعمليات التى تحتاج لعمل مشترك من الإنسولين و GTF هى :

- بناء البروتين من الأحماض الأمينية.
- زيادة فاعلية *phagocytes* وهى كرات الدم البيضاء البالغة للميكروبات الضارة، ويلاحظ فشل هذه العملية عند مرضى السكر.
- تمثيل الجلوكوز فى عدسة العين.

وعملية تحويل الكروميوم إلى GTF يقل بتقدم العمر وفى حالة سوء التغذية. وقد يكون نقص الكروميوم هو أحد أسباب إصابة الحوامل بمرض السكر لعدم كفاية الكروميوم فى غذائهن علاوة على زيادة الاحتياج لهذا العنصر نظراً لدخوله فى بناء شعر الجنين ولهذا لا يتكون GTF بكمية كافية. أى أن الكروميوم

يساعد فى الحماية من مرض السكر diabetes وفى علاج حالات انخفاض السكر فى الدم hypoglycemia.

كما يدخل الكروميوم فى تنشيط العديد من الإنزيمات الداخلة فى توليد الطاقة من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، إلا أنه يلاحظ أن هذه الإنزيمات تنشط أيضًا بواسطة معادن أخرى مثل الألومنيوم، الحديد، المنجنيز، القصدير، وكذلك ينشط الكروميوم إنزيم التريسين الذى ينظم أيضًا معادن أخرى ولهذا فإن نقص الكروميوم قد لا يحدث تأثير واضح فى نشاط هذه الإنزيمات.

والكروميوم أيضًا يعمل على صيانة الأحماض النووية DNA, RNA ويحفظها من التشويه، وعلى هذا فهو يمنع من ظهور طفرات فى المادة الوراثية داخل الخلايا كما أنه قد يمنع الإصابة بالسرطان وغيره من الأمراض.

والكروميوم يشجع بناء الأحماض الدهنية والكوليسترول فى الكبد، كما وجد أن الكروميوم قد يساعد فى حماية الفرد من بعض الحالات المرضية، حيث لوحظ أن نقص الكروميوم المزمن قد يسبب انسداد الشرايين وإصابة العين بالمياه البيضاء cataract وارتفاع ضغط الدم.

### **نقص الكروميوم : Deficiency**

يعمل نقص الكروميوم على اختلال تحمل الجلوكوز والذى قد يكون مصحوبًا بارتفاع سكر الدم، ونزوله فى البول، وقد يظهر ذلك عند كبار السن أو فى المراحل الأولى للإصابة بمرض السكر أو فى حالة إصابة الأطفال بحالات نقص البروتين والطاقة الشديدة Protein Energy Malnutrition (PEM) وقد يرجع ذلك إلى عدم قدرة الفرد على تكوين عامل تحمل الجلوكوز Glucose Tolerance Factor (GTF) كما يحدث اضطراب فى ميثابوليزم الدهون والبروتينات.

وقد لا تظهر أعراض النقص فى بادئ الأمر لأن الفرد يعتمد على المحزون فى أنسجته، وقد يودى ذلك إلى زيادة إفراز الإنسولين، وهذه الزيادة غير مفضلة لأنها تعمل على خفض جلوكوز الدم، كما تؤدى إلى البدانة، وقد تؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب، أو إلى تلف جلايا بيتا فى البنكرياس التى تفرز الإنسولين والإصابة بمرض السكر، وهذه قد تكون مصحوبة بفشل النمو عند الأطفال ونزول السكر فى



البول وكثرة مرات التبول ونقص الوزن والشعور بالتعب وتزداد هذه الحالة بازدياد نقص الكروميوم، كما يحدث نقص مفاجئ في الوزن. كما قد ينتج من نقص الكروميوم ارتفاع مستوى الأحماض الدهنية والكوليسترول وضعف المقاومة للعدوى واضطرابات عصبية.

### السمية Toxicity:

من النادر حدوث حالة تسمم من الكروميوم لأنه يوجد بكميات بسيطة في الغذاء ودرجة الاستفادة منه منخفضة. ويلاحظ أنه تكون الزيادة في الكروميوم غير العضوي أكثر من GTF. وقد يستنشق الفرد الكروميوم من مخلفات المصانع كما قد يزيد دخل الفرد من الكروميوم الموجود في مياه الشرب.

### الاحتياجات الغذائية Nutrient Requirements :

يوصى بأن يتناول الفرد الحد الأدنى من احتياجات الكروميوم كما يظهرها جدول (٨-٣١).

جدول (٨-٣١) الكميات الموصى بها من الكروميوم / اليوم\*

الفئة	العمر بالسنوات	كروميوم ميكروجرام / فرد / اليوم
رضع	صفر - ٠,٥	١٠ - ٤٠
	٠,٥ - ١	٢٠ - ٦٠
أطفال	١ - ٣	٢٠ - ٨٠
	٤ - ٦	٣٠ - ١٢٠
	٧ - ١٠	٥٠ - ٢٠٠
مراهقون والبالغون	١١ +	٥٠ - ٢٠٠

\* RDA, 1989.

### المصادر الغذائية Food sources :

من المصادر الغنية الجبنه والبيض والكبد والعسل الأسود وأيضًا التفاح والموز والخبز والزبدة والدجاج والمحاريات والبطاطس وحبوب القمح الكامل، ردة القمح. ومن المصادر المتوسطة : الجزر، الفاصوليا الخضراء، البرتقال، الفراولة، السبانخ. ومن المصادر الفقيرة : اللبن، معظم الخضروات والفواكه، السكر.

ويتوقف محتوى الكروميوم فى الاغذية على محتوى التربة، وطعم بن الغلال،  
وتكرير السكر... ويوضح جدول (٨-٣٢) محتوى بعض الأغذية من الكروميوم.  
جدول (٨-٣٢) محتوى بعض الأغذية من الكروميوم ميكروجرام / ١٠٠ جم

المغذء	ميكروجرام	المغذء	ميكروجرام
الخميرة	١١٨	السكر البنى	١٨
العسل	١١٥	الزبدة	١٥
البىض	٥٢	الدجاج	١٤
الجينة	٥١	الزيت	١٣
الكبد	٥٠	الموز	١١
ردة القمح	٤٠	السبانخ	٩
لحم البقر	٣٢	الجزر	٨
القمح الكامل	٢٩	البرتقال	٥
جنين القمح	٢٥	الفاصوليا الخضراء	٤
البطاطس	٢٤	الفراولة	٣
الدقيق الأبيض	٢٣	عيش الغراب	٢
الخبز الأبيض	٢٠	السكر المكرر	٢
المحاريات	١٨	اللبن	١

#### ٩ - الفلورين (الفلور)

##### FLUORINE

يوجد الفلور بكمية بسيطة فى كل أنواع التغذية والمياه والنباتات  
والحيوانات، ولذا فهو موجود فى كل أغذية الإنسان. ويحتوى الجسم على ١,٤٠  
ملجم معظمها فى العظام والأسنان، ولكن بكميات بسيطة.

وقد اكتشفه العالم الفرنسى Moissan ١٨٨٦ وعزله، واسمه مشتق من  
الكلمة اللاتينية fluو ومعناه تدفق، لأنه حتى عام ١٥٠٠ كان يستخدم فى صهر  
المعادن flux.

لاحظ جاك لوساك Gack-Luasec سنة ١٨٠٥ وجود الفلورين فى جسم

الحيوان وتوجد آثار من هذا العنصر فى أنسجة الجسم المختلفة وخصوصاً فى العظام والأسنان والغدة الدرقية والجلد، ولا يوجد شك الآن فى أن آثار منه تحمى الأسنان من التسوس والمصدر الأساسى للفلورين هو ماء الشرب، وإذا وجد الفلورين فى الماء بنسبة جزء فى المليون فإنه يمد الجسم بحوالى ١-٢ مليجرام - والماء العذب لا يحتوى على فلورين، بينما يحتوى الماء العسر على ١٠ أجزاء فى المليون، أما الأغذية فقليل منها يحتوى على كميات ضئيلة لا تتعدى جزء فى المليون باستثناء الأسماك البحرية، حيث تحتوى على كميات أكبر نسبياً تتراوح بين ٥، ١٠ أجزاء فى المليون، كما يحتوى الشاى الجاف على كميات كبيرة من الفلور تصل إلى ١٠٠ جزء فى المليون، ويلاحظ أن الخضراوات والفواكه يضاف إليها الفلور إذا رشت بمبيدات حشرية محتوية على فلور.

#### وظائف الفلورين Function:

يوجد الفلور فى العظام والأسنان بنسبة ٢، ٠ - ٥، ٠٪، وهو لازم لقوة وسلامة العظام والأسنان، وهو يزيد من ترسيب الكالسيوم وبالتالي يزيد من قوة العظام، ويساعد على تقليل تكوين الحموضة الناتجة من المواد الكربوهيدراتية فى الفم وبالتالي، يزيد من مقاومة الأسنان للتلف decay أو التسوس وقد يكون ذلك راجع إلى أن الفلور يمنع من نمو وتكاثر البكتريا المنتجة للحموضة وقد أظهرت الدراسات حول العالم أن وجود الفلور فى ماء الشرب بنسبة واحد فى المليون يقلل من حالات تسوس الأسنان حيث يترسب الفلور على سطح أنامل الأسنان النامية للأطفال. هذا يزيد من مقاومة الأسنان للتسوس لأسباب غير معروفة إلى الآن. وقد يكون ذلك بأن بلورات من فلوروأباتيت fluoroapatite تحل محل بلورات فوسفات الكالسيوم فى مركبات هيدروكسى أباتيت hydroxyapatite الذى يترسب أثناء تكوين الأسنان، كما أنها تحل أيضاً محل الكربونات carbonate الموجودة طبيعياً فى الأسنان. ويدور أن هذه المواد fluorides أكثر مقاومة للحموضة فى الفم، كما أن الفلورين يكون أمحاضاً من الكربوهيدرات.

قد يعمل الفلور على تقوية الأسنان، ويقلل من درجة ذوبان معادن الأسنان وقد يمنع الفلور من نمو وتكاثر البكتريا المنتجة للحموضة ولا يترسب الفلور على

أسنان البالغين المكتملة النمو فلا منفعة من شربهم ماء به فلور، وتقوم الدول المتقدمة بإضافة الفلور في ماء الشرب. والفلور مهم لمنع هشاشة العظام في الأسنان.  
كما أظهرت محاولات Milane و Schwarz (١٩٧٢) أن الفلورين لازم للنمو، كما أن نقصه يسبب أنيميا وعدم القدرة على الإنجاب (Messer وآخرون، ١٩٧٣).

#### **امتصاصه وتخزينه :**

يمتص الفلور بسرعة (٩٠٪). ويمتص أساساً من الأمعاء إلا أن جزءاً صغيراً جداً قد يمتص في المعدة ويمر ٩٠٪ من الفلور الممتص إلى مجرى الدم. ويتم لإخراج نصفه عن طريق الكلى مع البول والنصف الآخر يمتص ويخزن في الأسنان والعظام، وجزء بسيط يخرج في العرق والبراز. وقد وجد أن زيادة الألومنيوم والكالسيوم والدهن يعيق عملية الامتصاص.

#### **تأثير النقص والزيادة :**

يؤدي نقص الفلور في الرجات إلى ضعف نمو الأسنان وفسادها وتؤدي زيادة الفلور إلى حالة تسمم فلوروسيز Fluorosis عندما تزيد نسبة الفلور في الماء عن ٣-٥ جزء في المليون. وتتميز هذه الأعراض بظهور البقع الطباشيرية في أنامل الأسنان (مرض تبقع الأنامل Mottling of enamel) ويفقد الإنامل لمعانه ويصبح خشناً ثم يعقب ذلك ظهور بقع مصفرة أو بنية أو سوداء يصحبها تكوين حفر وقد يتأثر كل الأسنان إلا أن هذه الحالة تظهر بوضوح على قواطع الفك العلوى وهذه الحالة لا يصحبها تغير في الهيكل العظمى أو اضطراب في الصحة العامة كذلك تؤدي زيادة الفلور إلى تغلظ العظام skeletal fluorosis.

كذلك زيادة الفلور في الجسم تؤدي إلى تثبيط بعض الإنزيمات المهمة في الجسم مثل Enolase, phosphatase حيث يتكون مركب معقد من الماغنسيوم والفلور والفسفات وتظهر حالة التسمم الفلورى في الحيوان حيث تؤدي إلى تبقع أنامل الأسنان وتخشن وتغلظ ويصبح الحيوان ضعيفاً ويقل إنتاج اللبن.

وتسبب حالة التسمم مشكلة بين عمال المصانع الذين يعملون بالمعادن الاحترية على الفلور مثل كربوليت Carbolite وقد أدت إلى فقد الشهية وتغلظ عظام العمود

الفقرى والحوض والأطراف، بالإضافة إلى ذلك ظهرت حالة تكلس لأربطة العمود الفقرى، وكذا بين العضلات وقد تظهر اضطرابات عصبية وقد ظهرت حالة تسمم من زيادة الفلور متوطنة فى بعض جهات الهند والصين والأرجنتين حيث احتوت مياه الشرب على أكثر من ١٠ أجزاء فى المليون فلور.

وتظهر حالة التسمم إذا زاد الفلور فى الماء عن ٢,٥ جزء فى المليون ppm، أو إذا زاد المتناول فى الغذاء عن ٢٠ ملجم / اليود لمدة طويلة أو إذا زاد تعداد الفلور فى الجزء الجاف من الغذاء عن ٣٠-٤٠ جزء من المليون ppm.

وتظهر حالة التسمم الفلورى فى الحيوان حيث تودى إلى تبقع إنامل الأسنان وتخشن وتغلظ ويصبح الحيوان ضعيفاً ويقل إنتاج اللبن.

### الاحتياجات اليومية :

يوضح جدول (٨-٣٣) الكميات الموصى بها حسب RDA (١٩٨٩) وهى مبنية على أساس الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية.

جدول (٨-٣٣) الكميات الموصى بها من الفلورين / اليوم

الفئة	العمر بالسنوات	الفلورين ملجم / اليوم / الفرد
رضع	صفر - ٠,٥	٠,١ - ٠,٥
	٠,٥ - ١	٠,٢ - ١,٠
أطفال ومراهقون	١ - ٣	٠,٥ - ١,٥
	٤ - ٦	١,٠ - ٢,٥
	٧ - ١٠	١,٥ - ٢,٥
	١١+	١,٥ - ٢,٥
البالغون		١,٥ - ٤,٠

وعادة تمد الوجبة العادية الفرد بحوالى ٠,٢٥ - ٠,٣٥ ملجم من الفلورين يومياً بجانب مياه الشرب المحتوية على ١ جزء فى المليون من الفلورين الذى يمد الجسم يومياً بحوالى ١ - ٢ ملجم.

## المصادر الغذائية Food sources :

يعتبر المصدر الأساسي للفلور في الوجبة هو الماء ويعتبر الشاي والقهوة من أعلى مصادر الفلور في الغذاء يليه الأسماك ثم بعض الخضروات.

ويوضح جدول (٨-٣٤) بعض المصادر الغذائية للفلورين

جدول (٨-٣٤) بعض المصادر الغذائية للفلورين جزء في المليون

الغذاء	الفلورين	الغذاء	الفلورين
الشاي	٣٢,٠	الدجاج	١,٥
سمك الماكاريل	١٩,٠	الزبدة	١,٥
سردين	١١,٠	فول الصويا	١,٤
سالمون	٦,٠	البيض	١,٣
جمبرى	٤,٥	لحم البقر	١,٢
رنجة مدخنة	٣,٨	لحم الضأن	١,٢
جنين القمح	٢,٤	سبانخ	١,٠
كابوريا	٢,٢	بقلمونس	٠,٩
جبنه	١,٧	القمح الكامل	٠,٨

## ١٠- الكاديوم

### Cadmium

يعتبر الكاديوم من معادن الآثار السامة في الجسم، ويوجد في الهواء والماء والغذاء، وهو يرتبط بميتابوليزم الزنك حيث أن التوازن بينه وبين الزنك في الجسم يحدد مدى سميته. وتؤثر عمليات التنقية للمواد الغذائية على التوازن بين المعدنين. فقد وجد النسبة بين الكاديوم : الزنك في الحبوب الكاملة ١ : ١٢ فإذا تغيرت هذه النسبة تؤثر على التوازن وبالتالي قد تؤدي إلى ظهور حالات التسمم.

يوجد الكاديوم في أنسجة وسوائل الجسم بنسبة بسيطة، ولكن يوجد في الكلى والكبد بتركيزات مرتفعة - يتصل مع بروتين وتزيد كمية الكاديوم في جسم الإنسان بتقدم العمر، كما يختلف كميته باختلاف الجهات الجغرافية ولم يلاحظ لآن وجود الكاديوم في الدم ولا تعرف وظيفته لآن للجسم إنما تم عزل بروتين محتوى

على كادميوم فى كلى الإنسان والأرانب والحصان؛ مما يرجح قيام الكادميوم بوظيفة الجسم.

وقد وجد أن هذا البروتين فى الحصان يسمى ميتالوثيونين Metallothionein ويحتوى على ٥,٩% كادميوم، ٢,٢% زنك، ٩٥% كبريت، كما يوجد به الحامض الأمينى cysteine الذى يكون ٣٠% من الأحماض الأمينية الموجودة ويتصل الكادميوم أو الزنك بثلاث مجموعات سالفهيدريل Sulfhydryl، وقد يقوم هذا بدور فى بعض الأعمال والتفاعلات الحيوية فى الجسم مثل: عامل مساعد، كمخزن، تكوين مناعة مادة مضادة للتسمم، والكادميوم ينشط الإنزيمات، وقد يحمل الكادميوم محل الزنك فى بعض الإنزيمات.

### **الامتصاص والتخزين :**

يخزن الكادميوم مع الزنك أساساً فى الكبد والكلى وتزيد كمية الكادميوم فى جسم الإنسان بتقدم العمر كما يختلف كميته باختلاف الجهات الجغرافية. وعند نقص الزنك فى الوجبات يخزن الكادميوم بدلاً منه. أما إذا زاد الزنك فى الوجبات فيخزن الزنك ويفرز الكادميوم خارج الجسم.

### **تأثير النقص والزيادة :**

يتراوح دخل الفرد من الكادميوم بين ٠,٢ إلى ٠,٥ مليجرام وتختلف حسب مصدر ونوع الغذاء. والزيادة منه تسبب ارتفاع ضغط الدم لأن الكادميوم يسبب فشل الكلى. ولوحظ ارتفاع الكادميوم فى بول المرضى المصابين بضغط الدم، إلا أن الزنك والسليينيرم يقللان أو يمنعان من تأثيره الضار.

ويرجع تأثير الكادميوم السام أساساً نتيجة لتخزينه فى الجسم بدلاً من الزنك عندما تختلف النسبة بين المعدنين فى الغذاء. ويعتبر الزنك مضاد سميى للكادميوم. وقد يرجع ضرر الكادميوم للجسم هو أنه يتحد مع مجموعة السلفهيدرول لبعض الإنزيمات فيعوق نشاطها.

### **المصادر :**

يوجد أساساً فى الأغذية النقية مثل الدقيق والأرز والسكر والبيض ويوجد فى الهواء كملوث من الصناعة كذلك يحتوى الماء اليسر أكثر من الماء العسر كذلك القهوة والشاي.

## ١١- السلينيوم

### Selenium

يعتبر السلينيوم من أقل المعادن احتياجاً للإنسان وفي الوقت نفسه أكثرها سمية ولقد عرف السلينيوم كعنصر أساسى لبعض الكائنات الحية خلال العشرين الأخيرة من القرن العشرين حيث لوحظ ظهور حالات من ضمور للعضلات وتليف الكبد فى الغنم والماشية والكاكيت مرتبطة بمحتوى العلف من السلينيوم.

يوجد السلينيوم كأحد العناصر التى تلوث المركبات التى تحتوى على كبريت، وهذان العنصران متشابهان فى بعض الخصائص. وفى عام ١٨١٧ اكتشف العالم السويسرى Berzilius السلينيوم عندما كان يبحث عن المتبقى من الكبريت بعد حرق الكبريت لعمل حامض كبريتيك. وفى عقد الخمسينيات من القرن العشرين اكتشفت فوائد السلينيوم عندما كان العلماء الألمان فى أوربا يحاولون استخدام الخميرة كمدمم للبروتين. وقد أصيبت الفيران بتلف الكبد إلا أنه تماثلت للشفاء بعد تناول جنين القمح أو أى مصدر لفيتامين E. ثم لاحظ العالم الألمانى Schwarz أثناء وجوده فى الولايات المتحدة كأستاذ زائر أن الخميرة الموجودة هناك كانت تحتوى على عامل ٣ (Factor 3) الذى يعمل مع فيتامين E وحامض أمينى كبريتى فى حماية الكبد من التلف الناتج عن تناول أغذية معينة. وفى عام ١٩٥٧ وجد Schwarz وزملاؤه أن هذا (العامل ٣) هو السلينيوم. وفى عام ١٩٧٣ أشار Rotruck وزملاؤه فى الولايات المتحدة أن السلينيوم يعمل كمرافق لانزيم glutathior peroxidase الذى يهدم المواد البيروكسيدية الضارة التى ينتج معظمها من أكسدة الأحماض الدهنية غير المشبعة.

### امتصاص وميتابوليزم والإخراج :

#### Absorption, Metabolism and Excretion :

يمتص السلينيوم فى الاثنى عشر أساساً، ويرتبط بعدها إلى بروتين حيث يحمل فى الدم إلى جميع أجزاء الجسم، ويكون فى الخلايا فى صورة مركب سيلينوسستين selenocysteine وسيلينومثيونين selenomethionine حيث يحمل السلينيوم محل الكبريت فى هذه الأحماض الأمينية. ومعظم الإخراج عن طريق الكلى وجزء بسيط يخرج عن طريق العرق والبراز.



ويتأثر امتصاص السلينيوم بعدة عوامل منها مدى الإتاحة الحيوية للسلينيوم،  
فهو فى الأغذية النباتية مثل القمح أكثر إتاحة من الأغذية الحيوانية مثل السمك  
والتونة والرنجة، حيث يوجد معظمه مرتبطاً كيميائياً مع عناصر أخرى مثل الزئبق.  
كما وجد أن وجود البروتين فى الغذاء يسهل امتصاص السلينيوم بعكس الدهون.  
كما أن الضغوط العصبية التى يعانى منها الفرد تقلل من نسبة الامتصاص.

يوجد السلينيوم فى أنسجة الجسم المختلفة وخصوصاً فى الكرات الدموية  
الحمرء والدم، كما يوجد فى الكبد والطحال والكلى والقلب، ووجوده فى الكبد  
والكلى يعادل من ٤-٥ مرات أكثر من باقى العضلات والأنسجة. ولكن لا يوجد  
فى الدهون. ويبقى مستوى الدم من السلينيوم ثابتاً باستمرار وعندما يقل الدخل يرتفع  
محتوى كرات الدم الحمرء من السلينيوم ثلاث أضعاف الكمية الموجودة فى السيرم  
ويفرز السلينيوم فى الدم.

#### **وظائف السلينيوم Function:**

للسلينيوم علاقة دقيقة بأداء فيتامين E فى بعض التفاعلات الحيوية وفى  
المحافظة على معدلات النمو الطبيعى فى الجسم وزيادة الخصوبة وفى منع تليف الكبد  
وتلف وضمور العضلات. والسلينيوم يعتبر مضاد للأكسدة Antioxidant فيمنع  
أكسدة الأحماض الدهنية غير المشبعة التى قد تسبب تصلب الأنسجة البروتينية وبالتالي  
يحافظ على مرونتها. وتقوية الذاكرة ومقاومة الإصابة بالأمراض. كما يوجد علاقة  
بين السلينيوم وتخليق كرات الدم الحمرء.

وإن كان السلينيوم يشترك مع فيتامين E فى حماية الجسم من نواتج الأكسدة  
البيروكسيدية إلا أن كل عنصر يعمل بميكانيكية مختلفة، حيث يعمل السلينيوم على  
هدم المواد البيروكسيدية فى سيتوبلازم الخلية، أما فيتامين E فيمنع تكوين المواد  
البيروكسيدية فى جدار الخلية (Ensminger وآخرون ١٩٩٥).

وللسلينيوم دور فى حماية الغشاء الخلوى والنواة والكروموسومات من تأثير  
المواد السرطانية carcinogenic والمسببة للطفرات mutagenic. ويفسر التأثير الوقائى  
للسلينيوم من الإصابة بالسرطان أنه قد يبطئ من نمو الخلايا السرطانية دون أن يؤثر  
على الخلايا السليمة، وبالتالي يؤخر انقسام الخلايا بالمدة الكافية لإصلاح التلف الذى  
حدث لكروموسومات الخلية المصابة.

كما ظهر أن السيلينيوم يقي الأفراد المعرضين فى حياتهم اليومية بتركيزات عالية من المواد السرطانية من الإصابة بسرطان الأمعاء والمستقيم والصدر والمبايض والبروستاتا والرئة والبنكرياس والكلى والمثانة وبعض أنواع سرطان الدم. والمناعة التى يعطيها السيلينيوم لخلايا الجسم ليست راجعة فقط لتأخيره لانقسام الخلايا بل ونتيجة لأنه جزء ضرورى لانتاج إنزيم glutathione peroxidase الذى يعمل على تكسير البيروكسيدات الناتجة من أكسدة الدهون وهى مركبات تسبب هدم الخلايا كذلك يساعد السيلينيوم على إنتاج مادة interferon وهو مركب مضاد للفيروسات anticancer ومضاد للسرطان. كما أن السيلينيوم له دور فى تخليق كرات الدم الحمراء.

والسيلينيوم يحمى الجسم من تأثير المواد الضارة مثل الزرنيخ والكاديوم والزرنيق، ولو أن هذا يكون على حساب السيلينيوم الذى يحتاجه الجسم، وهذا يكون مرغوباً فى حالة زيادة السيلينيوم.

### **نقص السيلينيوم : Deficiency**

لا تظهر أعراض النقص ولكن محتوى الدم والأنسجة يعكس مدى كفاية السيلينيوم؛ إذ إن محتوى كرات الدم الحمراء أو البلازما أعلى من غيره من الأنسجة نظراً لارتفاع وجود إنزيم glutathione peroxidase فى هذه الأنسجة.

إن تركيز السيلينيوم فى كرات الدم الحمراء فى الطفل السليم ٠,٤ ميكروجرام/مل وفى الطفل سىء التغذية ٠,٢ ميكروجرام /مل. كما يمكن التعرف على نقص السيلينيوم أيضاً من تحليل الشعر والأظافر، ولكنها تعطى نتائج تقريبية علاوة على أن الشامبو والمستحضرات الكيميائية المستعملة يستخدم السيلينيوم فى تحضيرها.

### **ارتباط السيلينيوم ببعض الأمراض :**

أظهرت الدراسات المختلفة أن بعض أمراض يقل انتشارها فى الأماكن التى يرتفع فى محاصيلها وأغذيتها المختلفة عنصر السيلينيوم. هذا لا يدل على أن السيلينيوم يمنع المرض أو أن انتشار المرض يعكس نقص السيلينيوم، ولكن هذا يثير إجراء دراسات للتعرف على مدى العلاقة بين نقص السيلينيوم وحدوث المرض. وتبعاً للدراسات

يمكن للفرد أن يفترض أن للسلينيوم دور فى كثير من الأمراض مثل السرطان والمياه البيضاء فى العين cataract وأمراض الكبد، والأوعية الدموية والقلب، وضعف العضلات، والشيخوخة.

إن السلينيوم يدخل فى كثير من العمليات المتأصلة التى تحدث فى معظم أنسجة الجسم ولهذا فإنه يتوقع الفرد أن نقص السلينيوم يعمل على تغيير هذه العمليات الحيوية مما قد يؤدى إلى حدوث بعض الاضطرابات إذا لم يعالج نقص السلينيوم فوراً. ليس معنى هذا أن نقص السلينيوم هو العامل الوحيد لحدوث هذه الاضطرابات ولكن معناها أن نقص السلينيوم يؤخذ فى الاعتبار عند معالجة هذه الاضطرابات أيضاً الوقاية منها.

### ومن هذه الأمراض :

مرض السرطان cancer فكما هو معروف أن السرطان يحدث نتيجة تأثير بعض المواد السرطانية وضعف مناعة الجسم نتيجة نقص بعض العناصر الغذائية، وقد يكون من بينها السلينيوم، فقد يكون له تأثير وقائى مضاد لحدوث السرطان حيث يمنع التأثير الضار للمواد السرطانية المسببة للطفرات، كما أنه يبطئ من نمو الخلايا السرطانية دون أن يؤثر على الخلايا السليمة كما أنه يحفز الجسم لمقاومة الخلايا غير الطبيعية. ويشير Schwarz (١٩٧٨) أن السرطان ينتشر فى الأماكن الصناعية وفى الأماكن المزدحمة بالسكان. كما ظهر أن انتشار بعض حالات السرطان مرتبط بانخفاض مستوى السلينيوم.

وكذلك انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية كما ظهر من الدراسات أنه مرتبط بنقص السلينيوم، ويعتقد كثير من الباحثين أن هذا قد يرجع إلى نقص السلينيوم مع نقص فيتامين E لأن هذين العنصرين يعملان معاً على حفظ مستوى مناسب من مرافق إنزيم Q فى عضلة القلب، وهو عامل مهم فى ميتابوليزم الطاقة، فعند نقص هذا العامل المساعد فإن الأنسجة تعجز عن توليد الطاقة اللازمة لعملها. وتشير هيئة NAS (١٩٧٦) أن نقص السلينيوم و/ أو فيتامين E يعمل على تلف الأوعية الدموية التى تسبب ترسيع فى الأنسجة، ويمكن منع هذه الحالة بإعطاء السلينيوم الذى يسير فى الدم كجزء من إنزيم glutathione peroxidase وأيضاً فيتامين E الذى يحمى

حدر الأوعية الدموية. وإن كانت هذه الحالة لم تظهر فى الإنسان، ولكن كما ظهر أن نقص السلينيوم يسرع من الإصابة بانسداد الشرايين لأن الإنزيمات التى يدخل فى تركيبها السلينيوم تعمل على هدم الكولسترول، وبهذا لا يتراكم على حدر الأوعية الدموية. كما تهدم البيروكسيدات التى تعمل على تلف عضلة القلب، كما ظهر أن وفيات أمراض القلب تكثر فى المناطق التى ينقص السلينيوم فى محاصيلها. كما لوحظ أن نقص السلينيوم فى غذاء الأطفال أدى إلى إصابتهم بمرض تضخم القلب **Kishan** نى الصين وكذلك أمراض القلب فى الكبار.

كما يعمل أيضاً إنزيم **glutathione peroxidase** على حماية العين من مرض **cataract** حيث يتم هدم البيروكسيدات، وقد ظهر أن السلينيوم ينخفض مستواه بتقدم العمر كما أن نقصه يسبب الشيخوخة المبكرة لأنه يحافظ على مرونة الأنسجة. كما أن السلينيوم يساعد فى وقاية الأطفال حديثى الولادة من الإصابة بالأنيميا، وذلك لأن الأطفال حديثى الولادة معرضون لقصر حياة كرت الدم الحمراء لأن السلينيوم مع فيتامين E يحميان حدر الأوعية الدموية والكرات الدموية الحمراء أثناء التضخم من التحلل ويلاحظ أن السلينيوم منخفض فى لبن الأم وأكثر انخفاضاً فى لبن البقر حيث يعادل  $\frac{1}{4}$  لبن الأم.

كما أن إنزيم **glutathione peroxidase** قد يحمى من أمراض البنكرياس وإن ارتباط نقص السلينيوم مع تلف البنكرياس قد يكون معروفاً للآن وقد يكون مرتبطاً بنشاط هذا الإنزيم. وقد ظهر أن وجود فيتامين E مع نقص السلينيوم لم يعالج هذه الحالة ولكن قد يكون ذلك التلف راجعاً إلى نقص فيتامين E مع نواتج مواد دهنية غير طبيعية قد تسبب فى تلف البنكرياس، ولم يتمكن من إفراز الإنزيمات اللازمة لهضم دهون الغذاء.

وقد يساهم هذا الإنزيم أيضاً فى حماية الكبد من التلف الناتج من البيروكسيدات الناتجة من هضم الدهون، وذلك عند توافر السلينيوم وفيتامين E و/أو الأحماض الأمينية الكبريتية.

كما أن نقص السلينيوم يسبب حالات التسمم بواسطة كميات ضئيلة من السموم حيث يقوم السلينيوم غير العضوى فى إبطال المفعول السام لبعض العناصر

مثل الزرنيخ والكاديوم والزرنيق. كما أن السلينيوم فى إنزيم glutathione peroxidase يقى من الفعل الضار للمواد العضوية مثل رابع كلوريد الكربون carbon tetrachloride وهو مادة تستخدم فى إعداد بعض العقاقير وفى التنظيف الجاف.

كما ظهر أن نقص السلينيوم يسبب العقم فى الحيوانات نتيجة تراكم السائل المنوى فى الخصيتين مع ضعف الحيوانات المنوية، وفى الإناث يسبب الإجهاض المبكر. وإن لم تظهر حالات مشابهة فى الإنسان ولكن المعروف أن الإنسان معرض لحالات اضطراب الخصوبة التى يتعرض لها الحيوان.

كما لوحظ أن نقص السلينيوم قد ساعد فى زيادة التعرض للعدوى phagocytes والمعروف أن خلايا الدم Increased susceptibility to infection البالغة أحد وسائل الجسم الدفاعية ضد المرض، حيث تقوم هذه الخلايا بابتلاع الميكروب أو الجسم الضار، وتدخله فى تجريف داخله يعرف بحجرة القتل killing chamber وتقتله بواسطة الشوارد أو الأصول الحرة.

والمعروف أن إنزيم glutathione peroxidase يحمى جدر هذه الخلايا البالغة يعمل على إطالة عمر هذه الخلايا النافعة عن طريق هدم البيروكسيدات، وقد ظهر من تجارب الفيران التى تعاني من نقص فى السلينيوم قد انخفضت قدرتها على قتل خلايا الخميرة مع أن الفيران ابتلعت الخميرة. لم تثبت هذه الحالة فى الإنسان وقد تدخّل عوامل أخرى مع نقص السلينيوم لانخفاض المناعة.

وقد يساهم نقص السلينيوم فى فشل نمو الأطفال growth failure المصابين بحالة نقص البروتين والطاقة (PEM) أثناء علاجهم وكان السلينيوم منخفضاً فى دمهم. والمعروف أن السلينيوم والبروتين يوجدان معاً فى الغذاء وأيضاً فى جسم الإنسان، وقد لوحظ أن إعطاء الأطفال الوجبة العلاجية المكونة من لبن منزوع الدسم وجلو كوز أو دهن وبعض فيتامينات ومعادن أنه لم يحدث تحسن فى نمو الأطفال إلا بعد إعطائهم سلينيوم.

كما لوحظ حالات الموت الفجائى للرضيع sudden infant death syndrome (crib or cot death)، وهو يتمتع ظاهرياً بحالة صحية جيدة. والمعروف

أن الرضيع يتناول سلينيوم وفيتامين E من لبن البقر أقل من لبن الأم. وقد أرجع الأطباء ذلك إلى أن الطفل أثناء رضاعته اللبن قد يُكوّن أجساماً مضادة للبن عند شمه، وتصل هذه الأجسام إلى الرثة وبتكرار هذه العملية قد تتكون حساسية شديدة مؤدية إلى صدمة مميتة، وقد يزيد من أثر هذه الصدمة وجود مواد مسببة للحساسية مثل allergens أو فيروس. تسبب هذه الصدمة اتساع الأوعية الدموية وزيادة ضربات القلب كمحاولة لتنظيم الدورة الدموية. وهنا فإن نقص السلينيوم وفيتامين E يضعف من عضلة القلب فلا تتحمل هذا الجهد المتزايد.

### **زيادة السلينيوم :**

زيادة السلينيوم المتناول عن (٥-١٠ جزء فى المليون) يسبب تسمم نتيجة منعه نشاط بعض الإنزيمات وتداخله فى ميثابوليزم الكبريت. وتظهر حالات التسمم بالسلينيوم للأفراد المعرضين لتلوث الهواء بمخلفات الصناعة المحتوية على سلينيوم ويمكن منع فاعلية سمية السلينيوم بواسطة زيادة البروتين أو الكبريت. وظهر فى بعض المناطق الغنية بالسلينيوم تغير فى لون الأسنان وهشاشة الأظافر وتقشر الجلد وزيادة فى أمراض الجهاز الهضمى وسقوط الشعر جزئياً أو كلياً فى الإنسان وظهور رائحة الثوم فى هواء الزفير. أما فى حالة الأطفال فقد لوحظ أن زيادة السلينيوم تؤدى إلى ظهور حالة تسوس الأسنان الدائمة.

### **الاحتياجات الغذائية Requirements :**

وضعت RDA (١٩٨٩) الكميات (جدول ٨-٣٤) الموصى بها من السلينيوم بناء على الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية للفرد.

جدول (٨-٣٤) الكميات الموصى بها من السلينيوم / اليوم / الفرد

الفئة	العمر بالسنوات	سلينيوم ميكروجرام
رضع	صفر - ٠,٥	١٠
	٠,٥ - ١,٠	١٥
أطفال	١ - ٣	٢٠
	٤ - ٦	٢٠
	٧ - ١٠	٣٠
ذكور	١١ - ١٤	٤٠
	١٥ - ١٨	٥٠
	١٩ - ٢٤	٧٠
	٢٥ - ٥٠	٧٠
	+ ٥٠	٧٠
إناث	١١ - ١٤	٤٥
	١٥ - ١٨	٥٠
	١٩ - ٢٤	٥٥
	٢٥ - ٥٠	٥٥
	+ ٥٠	٥٥
حمل رضاعة		٦٥
		٧٥

ويلاحظ الاحتياجات الغذائية تزيد في حالة نقص البروتين والأحماض الأمينية الكبريتية أو نقص فيتامين E أو زيادة الأحماض الدهنية والدهون، وكذلك مدى إتاحة السلينيوم في الغذاء وحالة الفرد الصحية النفسية.

#### المصادر الغذائية Food sources :

يتأثر محتوى الغذاء من السلينيوم على حسب وجوده في التربة، ويفقد السلينيوم بسرعة أثناء الطهي، ويوضح جدول (٨-٣٥) بعض مصادر السلينيوم.

جدول (٨-٣٥) بعض مصادر السلينيوم

السلينيوم ميكروجرام/١٠٠ جم	الغذاء	السلينيوم ميكروجرام/١٠٠ جم	الغذاء
١٦	بيض	١٤٦	زبدة
١٣	لبن خالي الدسم	١١١	جنين القمح
١٣	عيش الغراب	١٠٤	استاكوزا
١١	فول الصويا	٩١	حميرة
٨	حبنة	٦٣	حبوب القمح
٧	ذرة	٦٣	ردة القمح
٦	عصير برتقال	٥٥	المحاريات
٤	عصير عنب	٥٣	دقيق القمح الكامل
٣	لبن بقرى كامل	٥١	كابوريا
٣	بيكان	٤٩	ام الخلول
٢	بندق	٣٦	فاصوليا جافة
٢	لوز	٣٠	لحم الضأن
٢	جزر	٢٧	لفت
٢	كرنب	٢٦	العسل
		٢٥	ثوم

## ١٢- الألومنيوم

### Aluminium

يوجد في الطبيعة، وهو ثالث عنصر انتشاراً في الأرض بعد الأكسجين والسليكون، ويوجد في الأغذية والماء.

ورغم أن الإنسان يتعرض للألومنيوم بصورة أو بأخرى إلا أن كمية بسيطة تتراكم في الإنسان نظراً لانخفاض نسبة امتصاصه، وهو يوجد في الجسم حوالي ٣٥ ملجم/ كجم، ولا يزيد بتقدم العمر. وقد قام كل من Tipton و Cook بقياس



مستوى عدد من العناصر من بينها الألومنيوم في الأنسجة والسوائل لحوالى ١٥٠ فرداً تعرضوا للموت الفجائى، ووجد أن مستوى الألومنيوم منخفضاً فى جميع الأنسجة ما عدا الرئة (جدول ٨-٣٦).

جدول (٨-٣٦) مستوى الألومنيوم فى الأنسجة\*

الأنسجة البيولوجية	ميكرومول / كجم وزن جاف
المخ	$81 \pm 48$
القلب	$37 \pm 30$
العضلات	$44 \pm 44$
الكبد	$152 \pm 63$
الطحال	$96 \pm 7$
الرئة	$1092 \pm 1629$
السوائل البيولوجية	نامل / لتر
البلازما	$88 \pm 48$
المخ والنخاع الشوكى	$111 \pm 37$
الصفراء	$252 \pm 167$
البول	$263 \pm 37$ (لكل ٢٤ ساعة)

\* Source : Zatta & Alfroy, 1997.

ويوجد الألومنيوم متحداً مع السيرات فى البلازما وسوائل المخ والنخاع الشوكى، واللبن، واللعاب والبول. ويوجد ٨٩٪ من الألومنيوم فى السيرم مرتبطاً مع transferrin و ١١٪ مرتبطاً مع السيرات.

#### الامتصاص Absorption :

يمتص الألومنيوم بصعوبة من خلال الرئتين والجلد والجهاز العظمى، ولا يمتص الألومنيوم إلا إذا كان فى صورة قابلة للذوبان فى الماء.

ويدخل الألومنيوم مع هواء الشهيق، كما يحدث مع عمال المصانع الذين يتعرضون لدخان الألومنيوم. ولا يمتص الألومنيوم من خلال الجلد إذا كان طبيعياً، أما الجهاز الهضمى فيعتبر المنفذ الرئيسى لدخول الألومنيوم إلى جسم الإنسان من

خلال الغذاء. ويضاف إلى المواد الرافعة وفى المستحلبات ومثبتات القوام، وحفظ درجة الحموضة pH. ومن المأكولات المحتوية على الألمنيوم بنسب أكثر من غيرها من الأغذية: المخللات وبعض المحبوزات، وتناول هذه الأغذية يزيد المتناول من الألمنيوم بما يعاد ٢٠ ملجم/ اليوم، كما أن استخدام الأواني الألمنيوم فى غلى الماء وطهى الأغذية، خصوصاً المرتفعة الحموضة، وأيضاً حفظ الأغذية يزيد دخل الإنسان من الألمنيوم. كما أن ماء الشرب مصدر للألمنيوم.

وقد ظهر أن متوسط دخل الإنسان من الألمنيوم فى اليوم حوالى ١٢ - ١٤ ملجم للذكور، ٩ ملجم للإناث، ٦ ملجم للطفل، ٢ ملجم للرضيع. وتصل نسبة امتصاص الألمنيوم فى الإنسان حوالى ١٠٪، ولكن يزيد الامتصاص بزيادة المتناول من الألمنيوم وخصوصاً مع تناول مضادات الحموضة. ويزيد امتصاص الألمنيوم عند تناوله مع السزات أو سترات الكالسيوم.

ويقلل الفلوريد من امتصاص الألمنيوم، حيث يكون معقداً يصعب امتصاصه كما أن الألمنيوم يقلل امتصاص الفلورين، ولذا يستعمل الألمنيوم كعلاج عند الأفراد الذين يعانون من زيادة الفلورين fluorosis. ويعمل السليكون على خفض امتصاص الألمنيوم، ويزيد امتصاص الألمنيوم فى حالة Down's Syndrome.

وهناك بعض دراسات تشير أن امتصاص الألمنيوم يزيد فى الأطفال. تشير الدراسات أن الألمنيوم لا ينتقل مباشرة من البلازما إلى كرات الدم الحمراء، كما أنه لا يرتبط بالأحماض النووية DNA و RNA ولكنه يحجز فى بروتينات النواة وسوائلها.

### الإخراج Excretion :

يخرج معظم الألمنيوم من جسم الإنسان عن طريق الكلى فى البول، وجزء بسيط يخرج عن طريق الصفراء.

### أضرار الألمنيوم :

لوحظ أن هناك علاقة بين الألمنيوم وتغير فى صورة الدم فى بعض الأشخاص والإصابة بالأنيميا microcytic، ويتراكم بالعظام وفى خلايا كرات الدم البيضاء macropages ولين العظام osteomalacia واضطرابات الجهاز العصبي.

وقد ظهر فى حيوانات التجارب أن الألومنيوم بسبب انخفاض كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين والهيماتوكريت، ويغير من نفاذية جدر الخلايا. وفى الأرناب أدى إلى هشاشة كرات الدم الحمراء. كما ظهر فى التجارب *in vivo / in vitro* أن زيادة الألومنيوم تغير من نشاط بعض الإنزيمات مثل إنزيم Kinase وعملية الفسفرة phosphorylation كما يؤثر على شكل الخلايا العصبية ونشاط الإنزيمات وتكوين الناقلات العصبية.

كما أن هناك تنافس بين الألومنيوم والحديد للارتباط بالبروتين transferrin وزيادة الدهون تعترض امتصاص الحديد. وعلى أى حال، لم يعرف بعد أهميته بالنسبة للإنسان.

### ١٣- السليكون

#### Silicon

يتنشر السليكون فى الطبيعة، ويوجد فى جسم الحيوان وخصوصاً فى الجلد، أو فى ريش الدواجن. ويذكر Lavoisier ١٨٧٨ أنه قد يظهر للسليكون وظائف للجسم فيما بعد. واسم سليكون مشتق من الكلمة اللاتينية Silex ومعناه Flint أى حجر صوان، ليشير إلى صلابته. وقد أشار Carlisle ١٩٧٢ إلى أن الآثار البسيطة من عنصر السليكون مفيدة لنمو وتطور الهيكل العظمى فى الكنايت والفيان. ولا يوجد السليكون منفرداً فى الطبيعة بل يوجد فى صورة أكسيد سليكا فى صورة رمل أو كوارتز أو فى صورة سليكات، كما فى الجرانيت. وهو مهم لنمو النبات والحيوان، ويؤدى نقصه إلى تغير ناء الهيكل العظمى والدماغ. ويوجد آثار منه فى جسم الإنسان فى الهيكل العظمى والجلد والأورطى والغدة التيموسية thymus.

و لم تظهر آثار نقص على الإنسان، ولكن ظهر انخفاض فى محتواه فى بعض أجزاء الجسم بتقدم العمر. وقد يكون هذا متعلقاً بنقص إمكانية ارتباط الميوكوسكريات العديدة مع الماء لتكوين المادة الجيلاتينية؛ اللاصقة بين الخلايا وأيضاً لتشجيع المفاصل.

ويبدو أن السليكون يدخل فى تكوين الميوكوسكريات العديدة وفى تكوين الأنسجة الضامة.

وإخراج السليكون فى الحيوان يتم بكفاءة، إلا أن زيادته فى غذاء الحيوان مميتة لأسباب غير معروفة، قد يرجع جزء منها إلى ترسيبه فى الكلى والمثانة. ويوجد حالة تسمم سليكونى silicosis وهى حالة سمية فى الرئة نتيجة استنشاق هواء ملوث بالسليكون، وهذه الحالة غير مرتبطة بسبب غذائى، وفيه يرتفع مستوى السليكون فى الدم والبول، ولا يوجد مقررات أو احتياجات غذائية منه، والمصادر الغنية فيه الأجزاء الخارجية فى الحبوب، بلبها أعضاء الحيوان مثل الكبد والرئة والمخ والكلى والأنسجة الضامة، ومعظم سليكون البرب يفقد نتيجة الطحن.

الباب التاسع

**الماء**

**WATER**




## الماء Water

### مقدمة :

يعتبر الماء من العناصر الغذائية الهامة للحياة، ولا تستمر معيشة الإنسان بدون ماء إلا لعدة أيام بسيطة في حين يمكنه أن يعيش عدة أسابيع بدون طعام، ويتعرض الإنسان للموت إذا فقد ٢٠٪ من ماء الجسم بدون تعريض في حين يمكن للإنسان أن يعيش لو فقد كل الجليكوجين والدهون ونصف البروتين الموجود في جسمه.

### توزيع الماء في الجسم:

يحتوى جسم الإنسان البالغ على حوالى ٦٠ - ٦٥ ٪ من وزنه ماء وتقل بزيادة العمر حيث يكون الماء ٨٤٪ من الجسم فى الأطفال حديثى الولادة و٩٨٪ فى الجنين وتقل بتقدم العمر. ويوجد الماء فى كل خلية. ويوضح شكل (٩-١) محتوى الماء فى أنسجة الجسم المختلفة.




شكل (٩-١) محتوى الماء فى أنسجة الجسم المختلفة

ويلاحظ تفاوت فى الماء الموجود فى الأنسجة المختلفة حيث تحتوى العضلات على ٧٢٪ بينما تحتوى الأنسجة الدهنية من ٢٠-٣٥٪ وتحتوى الأسنان على ١٠٪ بينما تحتوى العظام على ٢٥٪.

ويوجد الماء فى الجسم فى صورتين: داخل الخلايا intracellular وهذا يكون ثلثى ماء الجسم وخارج الخلايا extracellular وهذا يكون الثلث الباقي من ماء الجسم ويوضح شكل (٩-٢) أقسام الماء فى الجسم. فتوزع كمية الماء الموجودة فى جسم الإنسان والتي تبلغ ٤٥ لتر على الوجه التالى:

٣٠ لتر توجد داخل الغشاء الخلوى لكل خلية أما ١٥ لتر الباقية فيوجد منها ٣ لتر فى مجرى الدم وهذه الكمية تشكل ٤,٥ ٪ من وزن الجسم و ٧,٥ ٪ من كمية الماء الكلية فى الجسم و ١٢ لتر توجد فى السوائل المحيطة بالخلايا. ويحتفظ الجسم بالماء فى حالة ثابتة.



شكل (٩-٢) أقسام الماء فى الجسم

وتتحكم عدة عوامل فى حركة ماء وسوائل الجسم ومرورها بين الخلية والسوائل المحيطة بها أيضاً وبين السوائل المحيطة والأوعية الدموية (والتي يفصل بينهم أغشية نصف منفذة أى ذات نفاذية اختيارية) ومن أهم هذه العوامل تركيز البروتين والإلكتروليتات. فيلاحظ أن الجسم يستقبل من البيئة باستمرار أكسجين ومواد



عضوية فى الغذاء والى التى تدخل فى تفاعلات الجسم المختلفة والى ينتج عنها نواتج الميتابوليزم التى إما تتوزع نى الأنسجة المختلفة أو تخرج خارج الجسم أى أن هذا يتطلب حركة ماء وسوائل الجسم باستمرار خلال جدر الخلايا والحواجز وتصل كمية الماء المتبادلة يومياً من وإلى الخلايا ٤٨ لتراً. ويتحكم فى هذه الحركة قوى الضغط الأسموزى وتعتبر المواد الذائبة فى السوائل والناجثة من الميتابوليزم هى المسئولة عن الضغط الأسموزى لهذه السوائل فإذا كانت هذه المواد مركبات عضوية صغيرة مثل الجلوكوز واليوريا والأحماض الأمينية، وهذه تتحرك بسهولة وتنفذ خلال جدر الخلايا، ولذا فهى قليلة التأثير على حركة الماء، ولكن إذا وجدت بكميات كبيرة فإنها تساعد على الاحتفاظ بالماء، مما يؤثر فى وزن الجسم، وإذا كانت المواد الذائبة ذات وزن جزئى كبير مثل البروتينات، وهذه تؤثر بدرجة كبيرة على توزيع السوائل فى أجزاء الجسم المختلفة، ولكن هذا لا يؤثر على وزن الجسم، أما إذا كانت المواد الذائبة اليكروالينات غير عضوية وهى ذات أثر كبير على توزيع السوائل فى أجزاء الجسم المختلفة، وكذا على احتفاظ الجسم بمائه - فإن هذا قد يؤثر فى زيادة وزن الجسم ويعتبر الصوديوم والبوتاسيوم من أكثر الإليكتروالينات تأثيراً فى ميتابوليزم الماء من حيث تنظيم الضغط الأسموزى وحركة الماء فى الجسم، وكذا فى تنظيم الجسم للماء (كما سبق ذكره) يوجد الصوديوم فى سوائل الجسم الخارجية، أما البوتاسيوم فيوجد بسوائل الجسم الداخلية ولذا فإن نقص الصوديوم فى سوائل الجسم الخارجية يؤدى إلى انتقال الماء داخل الخلايا وحدوث استسقاء Edema ويقل حجم الدم، وينخفض ضغطه، وتبطؤ الدورة الدموية، وتفشل الكلى ويضعف المريض ولكنه لا يشكو من ظمأ.

### وظائف الماء فى الجسم:

- ١- الماء مهم للحياة ويشكل كل خلية ويدخل فى تركيب جميع سوائل الجسم.
- ٢- يدخل الماء فى تركيب جميع أنسجة الجسم وسوائله خاصة فى العصارات الهاضمة وجميع إفرازات الجسم وتختلف نسبة المياه بين الأنسجة وبعضها حسب طبيعة تركيبها ووظيفتها كالاتى:

بلازما الدم	٩٢٪
العضلات الإرادية	٨٠٪
كرات الدم الحمراء	٧٠٪
العظام	٢٥٪
الأنسجة الدهنية	٢٠٪

- ٣- عامل مهم فى تشحيم المفاصل ويحيط بالجهاز العصبى ويحميه من الصدمات وهو يحمل الصوت إلى الأذن كما أنه يقوم بتشحيم العين.
- ٤- يساعد فى تبادل الغازات أثناء التنفس ويحافظ على الشعب الهوائية رطبة.
- ٥- يذيب مواد النكهة والطعم الكيميائية فيمكن تذوقها فى اللسان.
- ٦- يعمل الماء كوسيط لحمل المواد الغذائية وأكسجين الهواء إلى جميع خلايا الجسم كما يحمل ثانى أكسيد الكربون إلى الرئتين للتخلص منه فى هواء الزفير.
- ٧- يساعد الماء فى الجسم على التخلص من نواتج الميتابوليزم إلى خارج الجسم عن طريق البول والبراز والعرق.
- ٨- الماء هو الوسط الذى يتم فيه جميع التفاعلات الكيميائية والحرارية فى الجسم كعمليات الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائى.
- ٩- يساعد الماء على تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق بخار الماء الذى يخرج فى عملية التنفس وفى العرق، وهما وسيطان لخفض درجة حرارة الجسم، وترطبيه عندما ترتفع درجة حرارة الجو عن حرارة الجسم.
- ١٠- يعمل الماء على حفظ مرونة الأنسجة وليونتها، ويحميها من أضرار الصدمات والرضوض.

### التوازن المائى فى الجسم Water Balance :

لكى يحدث التوازن المائى فى الجسم لابد من أن يتساوى دخل الفرد اليومى من المياه مع كمية المياه التى تفرز خارج الجسم. وهذا يتطلب معرفة مصادر الماء للجسم وكيفية فقده.

### أولاً: المصادر التى يحصل بها الجسم على الماء:

#### ١- ماء الشرب والسوائل:

ويعتبر ماء الشرب من أهم مصادر المياه فى الجسم فهو الماء النقى الذى

يشربه الإنسان، أو المشروبات الأخرى كالشاي والقهوة والمياه الغازية واللبن والحساء..... إلخ وعادة تتوقف هذه الكمية حسب العادات الاجتماعية والغذائية للفرد وتقدر فى الأحوال العادية بحوالى (١,٥ - ٢ لتر) يوميًا. وتعتبر الكلى العضو الأساسى الذى يقوم بتنظيم كمية الماء فى الجسم بجانب حاسة العطش.

## ٢- ماء الأغذية والأطعمة:

وهو الماء الذى يحصل عليه الإنسان من تناول الأطعمة المختلفة وخاصة الفاكهة والخضروات وتختلف نسبة الماء فى الأغذية المختلفة من صفر% إلى ٩٥% يوضح جدول (٩-١) محتوى بعض الأغذية الصلبة من الماء.

جدول (٩-١) محتوى بعض الأغذية من الماء

الأغذية	الرطوبة (%)
الخضروات والفاكهة	٧٠-٩٥%
اللبن	٨٧%
البيض	٧٤%
اللحوم المطهية المتوسطة	٥٠-٧٠%
اللحوم المطهية جيدًا	٤٠-٥٠%
الخبز	٣٥%
الجبن الجاف	٣٥-٤٠%
الحلويات والدهون	١٠-٠%

وتقدر كمية الماء التى يحصل عليها من الأطعمة بحوالى ٥٠٠ إلى ٨٠٠ سم<sup>٣</sup>

(٢-٣ أكواب).

## ٣- ماء الأكسدة Metabolic water :

وهو ماء تمثيل الأطعمة وهو الماء المتكون نتيجة أكسدة هيدروجين المواد الغذائية مثل الكربوهيدرات والبروتين والدهون فى داخل جسم الإنسان. فعند تمثيل هذه المواد فى الجسم ينتج الكمية التالية من الماء لكل ١٠٠ جم:

١٠٠ جم من المواد الكربوهيدراتية تعطى ٦٥ جم ماء

١٠٠ جم من البروتين	تعطى ٤١ جم ماء
١٠٠ جم من الدهن	تعطى ١٠٧ جم ماء
١٠٠ جم من الكحول	تعطى ١١٧ جم ماء

وعلى ذلك تصل كمية الماء التى يحصل عليها الفرد من تمثيل الأطعمة (أكسدة الأطعمة) إلى حوالى ٣٠٠ إلى ٥٠٠ سم<sup>٣</sup> فى اليوم.

## ثانيًا: فقد الماء من الجسم :

### ١- البول:

يمر خلال الكليتين عدة لترات من السوائل، ولكن الذى يفرز منها فى البول ١,٥ لتر (١٥٠٠ ملليمتر)، والباقي يعاد امتصاصه ثانية بواسطة مرشحات الكلية، ويقل إفراز البول فى حالة انخفاض الدخل من الماء أو زيادة الفقد منه.

### ٢- البراز:

يخرج الماء مع البراز بعد هضم الأطعمة، وتقدر كميته فى الحالات الطبيعية بحوالى ١٠٠-١٥٠ سم<sup>٣</sup> يوميًا.

### ٣- العرق وهواء الزفير:

يخرج الماء من الرئة على هيئة بخار فى هواء الزفير، كما يخرج من سطح الجلد على هيئة بخار غير ظاهر أو منظور كما يفقد الجسم الماء عن طريق العرق ويقل إفراز البول كلما زاد إفراز العرق. وتختلف كمية ما يفقده الجسم عن هذا الطريق تبعًا للجهد الذى يقوم به الشخص ودرجة حرارة الجو ورطوبته، وفى الجو الحار الجاف يزيد التنفس ويتبخر العرق من الجسم، ولكن عندما ترتفع الرطوبة فى الجو فإن العرق لا يتبخر بنفس السرعة، ولذلك يمكن تحمل الجو الحار الجاف عن الجو الرطب قرب البحر.

ويوضح جدول (٩-٢) توازن الماء فى الجسم للفرد البالغ

جدول (٩-٢) التوازن للماء في الجسم لفرد بالغ

مصادر المياه اليومية	الكمية بالملليمتر	صور فقد الماء من الجسم	الكمية بالملليمتر
ماء الشرب والسوائل	١٣٠٠-١٥٠٠	البول	١٠٨٠-١٦١٠
ماء الأطعمة	٨٠٠-٥٠٠	البراز	١٠٠-١٥٠
ماء الأكسدة	٣٠٠-٥٠٠	العرق	٥٥٠-٦٠٠
		هواء الزفير	٣٧٠-٤٠٠
المجموع	٢٨٠٠-٢١٠٠	المجموع	٢٨٠٠-٢١٠٠
المتوسط	٢٤٥٠	المتوسط	٢٤٥٠

### كيفية تنظيم الجسم للماء، والإليكتروليات: أولاً: حاسة العطش:

وهي أول علامة لنقص المياه من الجسم. حيث أن الإحساس بالعطش يظهر عندما يفقد الجسم حوالي ٢٪ من وزنه عن طريق فقد المياه عن طريق الجفاف. أو بمعنى آخر إذا زاد تركيز الصوديوم في الدم عن ١٪ ويرتبط مركز الإحساس بالعطش في Hypothalamus مع مركز الإحساس بالشهية أو الإحساس بالجوع (العطش نتيجة جفاف الخلايا المخاطية المبطنة للفم).

ولكن حاسة العطش ترتبط بنقص الماء فقط ولا ترتبط بنقص الأملاح Salt- Depletion كما يحدث للأفراد في المناطق الحارة أو الذين يبذلون مجهوداً جسمانياً كبيراً مما يزيد من كمية العرق التي تفقد يومياً وبالتالي زيادة كمية الأملاح التي تفقد يومياً من جسمهم. لذلك يصابون بالجفاف Dehydration ونقص الأملاح دون إحساسهم بالعطش ولذلك لابد أن يضاف لهم الأملاح في ماء الشرب.

### ثانياً: عن طريق الكلى:

ينظم حجم البول عن طريق خلايا مستقبلية Osmoreceptor Cell في الهيبوثالمس Hypothalamus والتي تكون حساسة جداً لتغير تركيز المواد الذائبة Solute في البلازما. فتعطى هذه الخلايا إشارات عصبية إلى الفص الخلفي من الغدة

النخامية Posterior pituitary لمنع إفراز الهرمون المضاد لإفراز البول (ADH) Antidiuretic hormone وبالتالي يبدأ إدرار البول والعكس فى حالة الجفاف.

إن الماء فى حركة دائمة يدخل الجسم ويتحرك داخل الخلايا وحولها ثم يخرج خارج الجسم. إن حياة الفرد تتوقف على حركة الماء وما به من مواد ذائبة توجد حول الخلايا فالماء صورة من المواد الكيميائية غير العضوية التى توجد فى صورة سائلة على درجة الحرارة المناسبة للقيام بوظائف الحياة ويطلق عليه أنه كيمياء الحياة chemistry of life. ويذوب فى الماء العديد من المواد العضوية وغير العضوية. ومن المواد غير العضوية: الأحماض والقلويات والأملاح وتتأين عند ذوبانها فى الماء إلى أيونات تحمل شحنات كهربية موجبة أو سالبة تسمى إليكتروليات ويطلق على التى تحمل شحنة موجبة Cations مثل أيونات  $Na^+$ ,  $K^+$ ,  $Ca^{++}$ ,  $Mg^{++}$  وتلك التى تحمل شحنة سالبة anions مثل  $SO_4^{--}$ ,  $HPO_4^{--}$ ,  $HCO_3^-$ ,  $Cl^-$ .

ويتحرك الماء والليكتروليات فى الجسم عبر جدار الخلية بواسطة واحدة أو أكثر من خمسة عمليات هى الاسموزية Osmosis الانتشار diffusion الانتقال المنشط active transport، الترشيح filtration، التشرب أو الامتصاص pinocytosis.

وبناء على هذا فإن الجسم فى نظام ديناميكى، يدخل الماء الجسم كسائل وكأحد مكونات الغذاء بما فيها ماء الأكسدة الناتج من هدم الغذاء، وفى الجهاز الهضمى وينتقل الماء وما به من إليكتروليات إلى الدم. وتعمل البلازما المحتوية على نسبة كبيرة من الماء وما به من إليكتروليات على نقل العناصر الغذائية لكل خلية وتحمل من الخلية الفضلات. وتعمل الكلى على تنظيم ماء الجسم بواسطة الاحتفاظ ببعض العناصر وإخراج البعض الآخر فى البول. كما تنظم الكلى عملية فقد الماء من الجسم. كما يفقد الجسم جزءاً من الماء عن طريق الجلد والرئتين والبراز.

وخلال هذه العمليات فإن انتقال الماء وما به من مواد ذائبة يتم بواسطة العمليات الخمس السابقة الذكر وهى الاسموزية والانتشار والانتقال المنشط والترشيح والتشرب وذلك لحفظ توازن الماء.

وعندما يزيد نسبة تركيز سوائل الجسم فى أحد الأماكن فإن الماء يتحرك إلى هذه المنطقة لتخفيف التركيز.

## نقص الماء :

يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء والأملاح الذائبة فى حالات القي المستمر والإسهال الحاد ومرض السكر والتزيف والحروق والارتفاع الشديد فى درجة الحرارة والعرق الغزير فيختل التوازن، ويحدث الجفاف الذى يؤدى إلى توقف الكلية وهبوط فى القلب وفشل فى الدورة الدموية إذا لم تعالج الحالة بإمداد الجسم بالسوائل والأملاح بالطرق العلاجية المناسبة وهذا ما يحدث للأطفال الرضع فى حالة إصابتهم بالإسهال حيث يعالجون بمحلول ملح الجفاف وهو ملح مكون من جلوكوز وأملاح الصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم.

كما يحدث نقص المياه فى حالات القيام بأعمال شاقة كالتى يقوم بها عمال المناجم أو العمل أمام الأفران الشديدة الحرارة يفقد الشخص من (١٠-١٥ لتر) من الماء فى العرق ومعها ملح الطعام (حوالى ٣٠ إلى ٤٥ جرام) يجب أن يعوضها عن طريق الغذاء أو بشرب الماء، والمحتوى على ملح الطعام، وإلا أصيب بالصداع والضعف وعدم القدرة على العمل وتعرضت حياته للخطر.

## الجفاف Dehydration :

ينتج من نقص الماء داخل الجسم نتيجة:

- ١- انخفاض الدخل من الماء أو الطعام لسبب ما.
- ٢- زيادة فقد الماء نتيجة لأسباب غير طبيعية.
- ٣- زيادة فقد العرق نتيجة لزيادة المجهود أو فى الجو الحار.
- ٤- الإسهال الشديد.
- ٥- القيء.

- ٦- الإصابة بالحمى وزيادة فقد خلال الجلد.
- ٧- الإصابة بمرض السكر وزيادة كمية البول.
- ولا بد من تعويض فقد الأملاح.

## زيادة الماء فى الجسم:

نتيجة للإفراط الشديد فى شرب الماء حيث تنخفض نسبة الإلكتروليتات فى الجسم ويحدث انخفاض فى درجة حرارة الجسم، صداع وكثرة التبول والقيء والإرتعاش والضعف العام.

وقد يحدث الزيادة فى ماء الجسم نتيجة لخلل فى وظائف الكلى أو خلل فى النظام الهرمونى الخاص بالهرمون المضاد لإفراز البول Antidiuretic hormone (ADH).

#### الاستسقاء:

هو تراكم الماء فى أنسجة الجسم نتيجة عدم قدرة الجسم على إفراز الصوديوم إلى الخارج بالكميات الكافية. وهذه عادة تكون مصاحبة لأمراض القلب عندما تكون الدورة الدموية ضعيفة أو إذا فشلت الكلى فى قدرتها على إفراز البول طبيعياً كذلك يظهر الاستسقاء edema بعد فترات طويلة من نقص البروتين لفقد الأنسجة قدرتها على المحافظة على التوازن المائى كما يحدث فى حالة تليف الكبد أو الحروق الشديدة أو الجوع الشديد أو انسداد الأوعية الليمفاوية بواسطة طفيل filariae أو زيادة نفاذية الشعيرات الدموية نتيجة لإفراز histamine فى حالات الحساسية. وتتطلب الإديما أو الاستسقاء تحديد المتناول من الصوديوم أو مدرات البول.

#### التسمم المائى Water intoxication :

تحدث هذه الحالة عندما يكون تناول الماء يفوق تكوين البول وهنا يحدث تخفيف للسوائل الخارجية وتنقل الماء إلى داخل الخلية وهو ما يعرف بالإديما كما سبق وإذا حدثت هذه الحالة فى خلايا المخ فإن الفرد يشعر بصداع ودوخة وتشنجات وغيبوبة.

#### احتياجات الماء Water Requirement :

تتوقف احتياجات الجسم للماء على العمر، النشاط، درجة الحرارة، نوع الغذاء المتناول، الحالة الصحية، أو وجود أى إصابة.  
ومعدل احتياج الطفل أكثر منه عند الشخص البالغ فإذا كان معدل دورة الماء فى اليوم تعادل ٦٪ من ماء الجسم فى الشخص البالغ فهى تعادل ١٥٪ من ماء جسم الطفل ويوضح جدول (٩-٣) الكميات الموصى بها حسب RDA (١٩٨٩).



جدول (٩-٣) الكميات الموصى بها من الماء في اليوم

الفترة	العمر	الوزن كم	الاحتياج للطاقة كالورى	الاحتياج للماء	
				مل/ كالورى	مل/ اليوم
رضع	صفر- ٠,٥	٦	٦٥٠	١,٥	٩٧٥
	١,٠-٠,٥	٩	٨٥٠	١,٥	١٢٧٥
ذكور	٢٥- ٥٠	٧٩	٢٩٠٠	١,٠	٢٩٠٠
إناث	٢٥- ٥٠	٦٣	٢٢٠٠	١,٠	٢٢٠٠
مرضع			٢٥٠٠	٣٠٠ + مل	٢٥٣٠
حامل			٢٧٠٠	٧٥٠ + مل	٣٤٥٠

يزداد احتياج الفرد للماء كلما ازداد نشاط الفرد حتى فى الأجواء المعتدلة وذلك لزيادة الفقد عن طريق الجلد والرئتين. مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك فقد فى الصوديوم وإن كان بدرجة أقل من فقد الماء.

ويزيد فقد الماء كلما ارتفعت درجة حرارة الجو عن طريق الجلد أو الرئتين ويزيد احتياج الفرد للماء فى الأجواء الحارة الجافة حيث يزيد فقد الماء عن طريق الجلد والرئتين بما يعادل من ٥٠ - ١٠٠ ٪. ولهذا لابد أن يعوض هذا الماء المفقود مع تعريض الصوديوم أيضاً ويؤثر نوع الرجة حيث تعمل زيادة البروتين على زيادة الماء وذلك لإخراج اليوريا فى البول ويلاحظ أن زيادة البروتين فى غذاء الطفل تتطلب زيادة الماء اللازم ولكن يؤخذ فى الاعتبار أن قدرة الطفل على تركيز الماء ليست تامة.

كما أن، المرض وخصوصاً المصحوب بقاء أو إسهال أو إرتفاع فى درجة الحرارة يزيد من الاحتياج للماء. وإذا لم يعوض ذلك فإن الفرد يضاب بالجفاف. ومن جهة أخرى هناك حالات مرضية تزيد من الاحتفاظ بالماء وبالتالى يقل إخراج الصوديوم مثل حالات الأديما الناتج من فشل القلب، الكلى، تليف الكبد، فشل الكلى.



الباب العاشر

## تغذية الفئات الخاصة

NUTRITION FOR SPECIAL GROUPS



## تغذية الفئات الخاصة

### NUTRITION FOR SPECIAL GROUPS

تشمل تغذية الفئات الخاصة التغذية أثناء فترات الحمل والرضاعة والطفولة والمراهقة كما تشمل التغذية للمسنين، بالإضافة إلى ذلك فإنها تشمل التغذية فى حالة النحافة والبدانة والمعاقين.

#### أولاً : التغذية أثناء الحمل Nutrition During Pregnancy :

##### مقدمة :

ينبغي العناية بالأم قبل دخولها فى مرحلة الحمل لأن هذا يعطى نتائج إيجابية بالنسبة للأم وبالنسبة للجنين والطفل فيما بعد فتمر مرحلة الحمل دون التعرض لأى مشاكل. ويولد الطفل بعد إتمام مرحلة الحمل وهو متمتعاً بحالة تغذوية جيدة.

ابتدأ الاهتمام بتغذية الأم أثناء فترة الحمل منذ العصور القديمة وكان يعطى للأم غذاءاً خاصاً مختلفاً عن باقى أفراد الأسرة على الأقل فى الكمية. إلا أن زيادة السكان فى بعض جهات العالم وانخفاض إنتاج المحاصيل أدى إلى انخفاض وجبات الأم بل وكل أفراد الأسرة ولكن كانت وجبة الأم الحامل مميزة لحد ما وابتدأ عهد جديد فى التغذية منذ أوائل القرن العشرين واكتشف العديد من الفيتامينات إلا أن الاعتقاد كان أن توفير الكربوهيدرات والدهون والبروتينات فى غذاء الأم كان يشكل أسس الوجبة الصحية. بالإضافة إلى أن العناية بتغذية الأم أثناء الحمل أو الرضاعة تختلف كثيراً عن الاكتشافات الكثيرة فى التغذية التى توصل إليها العلماء خلال النصف الأول من القرن العشرين.

وأثناء عشرينيات القرن العشرين اعتقد الأطباء أن تحديد كمية الطاقة فى وجبة الأم قد يحميها من بعض حالات تسمم حمل التى كانت تظهر فى ذلك فى استراليا والنمسا وألمانيا. وكان نقص الدهون فى ذلك الوقت أدى إلى خفض وزن الأم أثناء الحمل. ثم اهتموا بعد ذلك بأثر الوجبات المحددة التغذية على الطفل بعد ميلاده. وفى خلال العقد الثالث أشار العلماء إلى حدوث حالات تسمم حمل التى قد ترجع إلى نقص البروتين. وفى أثناء العقد الرابع من القرن العشرين استمرت العناية بغذاء الحمل وتوصل العلماء إلى وجود علاقات بين تغذية الأم أثناء الحمل

وحالة الطفل. إلا أن النتائج كانت متعارضة وذلك لأنه كان من الصعب آن ذاك التعرف على نمط غذاء الأم الحامل إلا أنه ثبت لهم بالدليل القاطع أن الأم التى تتمتع بحالة تغذوية جيدة قبل دخولها فى مرحلة الأم يكون لديها مخزون من العناصر التغذوية فى أنسجة الجسم تقيدها أثناء فترة الحمل.

ثم توجه الاهتمام بعد ذلك إلى الفيتامينات والمعادن وتقليل ملح الطعام مع تتبع وزن الحامل على أن تكون الزيادة فى حدود ٩ - ١٠ كجم.

### الاحتياجات الغذائية :

يراعى فى تغذية الأم أثناء الحمل أن تتوفر العناصر الغذائية بمستوى مناسب لمد الجنين بما يلزمه وللاستعداد الأم للدخول فى مرحلة الرضاعة مع حدوث نفاذ مستمر للعناصر الغذائية.

فلا بد أن تعطى عناية كبرى للتغذية أثناء فترات الحمل حتى لا تكون الوجبة الغذائية عاملاً محدداً لصحة الأم.. وقد أظهرت الدراسات أن سوء التغذية أثناء الحمل يؤدي إلى بعض حالات التسمم، وفى ولادة الطفل غير تام النمر Pre-term وقد لوحظ أن حالة الأم التغذوية ووزن الطفل عند الولادة كان أقل بين سيدات الأسر ذات المستوى المنخفض عنه فى الأسر ذات المستوى الاقتصادى المرتفع، فغذاء الأم فى المستوى الاقتصادى المرتفع يحتوى على كميات كافية من الطاقة والبروتين والمعادن والفيتامينات عنه فى حالة الأمهات ذات المستوى الاقتصادى المنخفض، فمتوسط وزن الطفل ٣,١٨ كجم فى الأسر ذات المستوى المرتفع بعكس الأطفال فى الأسر الفقيرة حيث يصل وزن الطفل إلى ٢,٧٨ كجم، ويزيد وزن الأم عادة طوال فترة الحمل فى المتوسط ١٧,٥ كجم والجداول رقم (١٠ - ١) يوضح وزن الأم خلال شهور الحمل.

ويلاحظ أنه إذا كانت الزيادة فى وزن الجسم أقل من نصف هذه الزيادة فيكون ذلك راجعاً إلى سوء التغذية أو إلى زيادة النشاط، أما إذا كانت الزيادة أكثر من المعتاد بما يوازى ٥٠ ٪ فإن هذا يرجع إلى زيادة ترسيب الدهون فى الجسم أو تراكم الماء (استسقاء) أو كليهما، والسمنة أثناء الحمل قد تؤدي إلى حالات شديدة مثل حالات التسمم، وقد ذكر Thomson & Billenxey (١٩٥٧) أن

متوسط وزن الزيادة الأسبوعية أثناء النصف الثانى من الحمل إذا كان أقل من رطل فيكون ذلك مصحوباً بعدم اكتمال نمو الجنين وزيادة وفيات الأطفال ولا بد أن تقابل احتياجات الأم والجنين من الغذاء.

#### جدول (١٠ - ١) زيادة وزن الأم خلال شهور الحمل\*

الزيادة فى الوزن بالجرام				المادة البيان
حتى الأسبوع الأربعين	حتى الأسبوع الثلاثين	حتى الأسبوع العشرين	حتى الأسبوع العاشر	
٤٧٥٠	٢٣٥٠	٧٢٠	٥٥	الجنين والمشيمة
١٣٠٠	١١٧٠	٧٦٥	١٧٠	الرحم
١٢٥٠	١٣٠٠	٦٠٠	١٠٠	الدم
١٢٠٠	-	-	-	سوائل الجسم الخارجية
٤٠٠٠	٢٥٠٠	١٩١٥	٢٣٥	الدهن

\* المصدر : إيزيس نوار، ١٩٧٥.

#### الطاقة :

يجب أن يعطى اهتمام بدخول الأم من الطاقة حيث أن هذا مرتبط بوزن الجسم، كما أن نمط الزيادة فى الوزن ومقدار صحة الأم أثناء الثلث الأول من أشهر الحمل ولو أن الزيادة فى الوزن بسيط إلا أنه يجب الاهتمام بهذا المقدار حيث أنه أثناء هذه المدة يتكون الجنين والمشيمة، فإذا لم تحدث زيادة فى الوزن فى الثلث الأول من الحمل، وتستمر على هذه الحالة أثناء الثلث الثانى من الحمل فإن هذا يؤدى إلى ميلاد الجنين قبل اكتماله Premature Birth ويلاحظ أن حجم الجنين يتأثر بوزن الأم خصوصاً قبل الحمل فالأم البدنية تلد أطفالاً سماناً، حتى ولو كانت الزيادة صغيرة فى وزن الأم أثناء الحمل، وهكذا بالنسبة للمرأة النحيفة إذا أنها تلد أطفالاً يتميزون بال نحافة حتى ولو كانت الزيادة كبيرة فى وزن الأم أثناء الحمل.

وعدم كفاية الطاقة تؤدى إلى عدم احتجاز النيتروجين فى جسم الأم فقد

وجد Oldham وآخرون سنة ١٩٥١ عند دراسة النيتروجين المحتجز فى جسم الأمهات أثناء الحمل أن كمية النيتروجين المحتجز فى الجسم -عندما كان الدخول من الطاقة أكثر من ٢١٠٠ سعراً ومن البروتين ٥٠ جم، كان ضعف كمية النيتروجين المحتجزة عندما كان الدخول من الطاقة أقل من ٢١٠٠ كالورى ومن البروتين ٧٠ جم. إن الاحتياج للطاقة يكون مرتفعاً خلال النصف الثانى من الحمل لأن الدهن يتركب فى جسم الجنين كمخزن يستخدمه بعد الولادة. كما أن الدهن يزيد فى جسم الأم حتى تتمكن من توفير الطاقة اللازمة لتكوين اللبن.

عادة تحتاج الأم أثناء الحمل إلى زيادة الطاقة لمقابلة احتياج الأم والجنين مع ملاحظة أن يكون هناك توازن بين دخل الأم من الطاقة وبين المستهلك وقد أوصى المختصون فى التغذية أن متوسط ما تحتاجه الأم أثناء فترة الحمل يعادل ما تحتاجه الأم فى الظروف العادية مضافاً إليه ٣٠٠ كالورى يومياً أثناء الثلثين الثانى والثالث من الحمل ويوضح جدول (١٠ - ٢) الاحتياجات الغذائية للأم أثناء الحمل.

ولابد أن يكون الاهتمام بنوعية وكمية الدهون التى تقدم فى غذاء الأم الحامل وذلك لأن الدهون المخزنة هى التى تصبح متاحة للمشيمة والجنين لتكوين الخلايا وانقسامها فى الثلث الأول من الحمل كما يمكن الأم من تخزين كميات كافية منها لتلبية احتياجات نمو الجنين فى الثلث الأخير من الحمل والمراحل الأولى من الرضاعة (WHO / FAO ١٩٩٧).

كما يحتاج تكون ونمو المشيمة والجنين خلال الحمل إلى الأحماض الدهنية الطويلة عديدة عدم التشبع ويشير Socini, Galli (١٩٨٣) أن نقص الأحماض الدهنية غير المشبعة ( $w_3$ ) فى غذاء الحيوان يؤثر على تكامل الجهاز العصبى وسلامته وعلى التعلم وحدة الأبصار (Boure وآخرون ١٩٨٩) ويحد من اكتمال الشبكية (Neuringer وآخرون ١٩٨٨).

وقد تأكد ذلك من خلال التجارب على الأطفال الرضع من خلال البراهين المبينة على نتائج هذه الدراسات أن هناك علاقة بين انخفاض الأحماض الدهنية من عائلة  $w_3$  (DHA) وبطء نمو الأطفال بعد الولادة (Carlson وآخرون ١٩٩٢).



جدول (١٠-٢) الكميات الموصى بها من العناصر الغذائية للأبقار أثناء الحمل حسب العمر والوزن والطول\*

العمر بالسنوات					البيان	العمر بالسنوات					البيان
٥٠-٢٥	٢٤-١٩	١٨-١٥	١٤-١١	٥٠-٢٥		٢٤-١٩	١٨-١٥	١٤-١١			
١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	كالسيوم ملجم	٦٣	٥٨	٥٥	٤٩	الوزن - كجم		
١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	فلوئور ملجم	١٦٣	١٦٤	١٦٣	١٥٧	الطول سم		
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	صوديوم ملجم	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	الطاقة كالوري		
٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	كلوريد ملجم	٧٤	٧٤	٧٦	٧٦	البروتين سم		
٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	ماغنسيوم ملجم	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	فيتامين A ميكروجرام رتبول		
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	بوراكسيوم ملجم	١٠	١٠	١٠	١٠	فيتامين D ميكروجرام		
٢٠٠٠-٥٠	٢٠٠٠-٥٠	٢٠٠٠-٥٠	٢٠٠٠-٥٠	كروميوم ميكروجرام	١٠	١٠	١٠	١٠	فيتامين E ملجم		
٣-١,٥	٣-١,٥	٣-١,٥	٣-١,٥	نحاس ملجم	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	فيتامين K ميكروجرام		
٤-١,٥	٤-١,٥	٢,٥-١,٥	٢,٥-١,٥	فلوريد ملجم	١٠٠-٣٠	١٠٠-٣٠	١٠٠-٣٠	١٠٠-٣٠	بيوتين ميكروجرام		
١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	يود ميكروجرام	١٧	١٧	١٧	١٧	نياسين ملجم		
٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	حديد ملجم	٧-٤	٧-٤	٧-٤	٧-٤	حامض بيتريك ملجم		
٥-٢,٥	٥-٢,٥	٥-٢,٥	٥-٢,٥	منجنيز ملجم	١,٦	١,٦	١,٦	١,٦	ريبولافين ملجم		
٢٥٠-٧٥	٢٥٠-٧٥	٢٥٠-٧٥	٢٥٠-٧٥	موليبدينوم ميكروجرام	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	ثيامين ملجم		
٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	سليسيوم ميكروجرام	٢,٢	٢,٢	٢,٢	٢,٢	فيتامين B6 ملجم		
١٥	١٥	١٥	١٥	زنك ملجم	٢,٢	٢,٢	٢,٢	٢,٢	فيتامين B12 ميكروجرام		
					٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	حامض الفوليك ميكروجرام		
					٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	فيتامين C ملجم		


كما أن حامض الأراكيدونيك عنصرًا أساسيًا أيضًا خلال فترة التكوين المبكر للجنين فهو يوجد فى لبن الأم (Koletzko وآخرون ١٩٩٢) لأهميته فى وظائف الأعصاب والأوعية الدموية بالإضافة إلى دوره فى تكوين الأيكوزانويدات اللازمة لتنظيم عمل الخلية.

ويلاحظ أنه يجب أن يحافظ على التوازن بين حامض لينولييك والفا لينولينك عند نسبة ١: ٥ حتى ١: ١٠ (WHO ١٩٨٥)، (WHO / FAO ١٩٩٧).

### البروتين :

يزيد احتياج الأم للبروتين أثناء الحمل وخصوصًا فى النصف الثانى من الحمل وتتكون معظم الأنسجة البروتينية فى جسم الجنين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة قبل ولادته (شكل ١٠ - ١) وتكون سرعة ترسيب البروتين فى جسم الجنين ٠,٤ جم / اليوم خلال شهور الحمل وتزيد السرعة إلى ٣,٦ جم / اليوم خلال الثلاث شهور الأخيرة، وتصل فى الشهر الأخير إلى ٦,٤ جم / اليوم مضافًا إلى هذا احتياجات الأم خلال هذه الفترة، لزيادة حجم الرحم والغدد اللبنية وكل الأنسجة اللازمة للحمل والرضاعة ويوصى علماء التغذية أن يضاف ٧٤ - ٧٦ جم بروتين يوميًا (جدول ١٠ - ٢) خصوصًا خلال الثلثين الثانى والثالث من الحمل على أن يكون البروتين المتناول أثناء الحمل ذا قيمة تغذوية عالية كما يزيد احتياج الأم أثناء الحمل للأحماض الأمينية الأساسية وخاصة فى الأحماض الأمينية *tryptophan, threonine* وليهما *lysine* (Wertzel ١٩٥٩) ويلاحظ أن نقص البروتين يؤدي إلى هدم أنسجة الأم لتوليد الأحماض الأمينية للجنين ويؤدي ذلك إلى متاعب أثناء الحمل والوضع وأنييميا واستسقاء غذائى وضعف القدرة على إفراز اللبن بعد الوضع.


ولا بد من الاهتمام بوجود الأحماض الدهنية الأساسية فى غذاء الحامل لأهميتها فى نمو وتطور مخ الجنين (Petridou وآخرون ١٩٩٨).



شكل (١٠-١) تراكم البروتين في الجنين خلال أشهر الحمل

الكالسيوم :

يزيد احتياج الأم للكالسيوم وترجع هذه الزيادة إلى احتياج الجنين والأم للكالسيوم فعند الميلاد يحتوي جسم المولود على ٢٢ جم كالسيوم معظمها ترسب في جسم الجنين خلال الشهر الأخير من الحمل (شكل ١٠-٢).



شكل (١٠-٢) تراكم الكالسيوم والفوسفور أثناء أشهر الحمل

إن ترسيب الكالسيوم في جسم الجنين خلال الشهر الثالث هي ٥٠ مجم / اليوم، وفي نهاية الشهر السابع ١٢٠ مجم / اليوم. وتصل إلى ٤٥٠ مجم / اليوم خلال الشهر الأخير، وقد أثبت الباحثون أن عملية التكلس في الجنين تستمر دون توقف مهما اختلفت حالة الأم التغذوية، فإذا ساءت الحالة التغذوية فإن عملية التكلس تستمر على حساب انسجة الأم نفسها، ولذا توصى بأن تتناول الأم ١٢٠٠ مجم كالسيوم يوميًا (جدول ١٠-٢). ولابد من الاهتمام بتوفير الكالسيوم منذ ابتداء الحمل حتى بعد نهاية فترة الرضاعة لأن تراكم الكالسيوم المبكر في أنسجة الدم يعمل كمخزن يسحب منه فيما بعد ولابد من توافر فيتامين D والفسفور.

### الحديد :

تعتبر الأنيميا من حالات سوء التغذية المنتشرة بين السيدات أثناء الحمل نظرًا لزيادة الاحتياج إلى الحديد من الأم والجنين ويحتوى المولود عند الوضع على ٢٧٥ مجم ويحدث ترسيب الحديد في جسم الجنين بمعدل ٤,٠ ملجم / يوم أثناء الثلثين الأول والثاني للحمل، ٤,٤ ملجم / يوميًا أثناء الثلث الأخير من الحمل. وتحتاج الأم الحديد للحفاظ على مستوى الهيموجلوبين في جسمها وكذلك المخزن في جسمها ويعد احتياج الجنين منه وليتمكن من تخزين الحديد لاستخدامه فيما بعد.

وتقترح لجان التغذية أن تعطى الأم من ٣٠ ملجم / يوميًا حديد (جدول ١٠-٢)، وهذا يلزم أن تهتم الأم بتناول الأغذية الغنية بالحديد وفي حالات النقص في الحديد ينصح بتناول الحديد في صورة أملاح حديدوز.

### اليود :

يزيد الاحتياج لليود أثناء فترات الحمل، وقد أظهرت الدراسات أن إصابة الأم بمرض الجويتر نتيجة عدم تناول كميات كافية من اليود يؤدي إلى زيادة احتمال إصابة المولود بالجويتر، وفي حالات انتشار نقص اليود تزيد حالات القصر مما يؤدي إلى زيادة المواليد من الأقزام، ولذا يوصى بأن تتناول الأم ١٧٥ ميكروجرام يوميًا كما ينصح بتناول ملح الطعام اليودي (جدول ١٠-٢).

## الفيتامينات:

يزيد احتياج الأم للفيتامينات أثناء الحمل، فيصل احتياج الأم لفيتامين A إلى ٨٠٠ ميكروجرام ويتناول يومياً أثناء الثلثين الثاني والثالث من الحمل، ويلاحظ أن نقص فيتامين A يؤدي إلى تشوهات فى الجسم، كما تحتاج الأم إلى فيتامين D للاستفادة من الكالسيوم، والفوسفور، وينصح أن تتناول الأم منه ١٠ ميكروجرام يومياً، هذا بالإضافة إلى تعريض الجلد لأشعة الشمس، كما يزيد الاحتياج إلى فيتامين C حيث يصل إلى ٧٠ ملليجرام/ يوم وتظهر زيادة حاجة الأم أثناء الحمل لفيتامين C من دراسة تركيز هذا الفيتامين فى الدم حيث يقل تركيزه أثناء الحمل، ولكن بزيادة تناول هذا الفيتامين فإن تركيز الفيتامين يرجع إلى المستوى الطبيعى.

ويتشتر نقص الثيامين بين الأمهات الحوامل، ولذا ينصح بأن يزيد تناول الأم فى أثناء فترة الحمل ١,٥ ملجم ثيامين يومياً، وهذا يمكن تحقيقه بتناول الأم الحبوب الكاملة ويزيد احتياج الأم من الريبوفلافين إلى ١,٦ مجم / يوم، وهذا يمكن الحصول عليه من تناول اللبن والعيش ويؤدى نقص الريبوفلافين فى الفيران إلى تشوهات فى الهيكل العظمى حيث يدخل فى تكوين الغضاريف.

أما بخصوص فيتامين E ظهر أن هذا الفيتامين مفيد بالنسبة للسيدات اللاتى يعانين من الإجهاض وينصح بتناول ١٠ ميكروجرام ويعتبر تناول فيتامين K مهم لتقليل حالات النزيف التى تحدث فى بعض الأطفال وينصح بتناول ٦٥ ميكروجرام يومياً.

## ثانياً : تغذية الأم أثناء الرضاعة Nutrition During Lactation :

### الاحتياجات الغذائية:

تلعب تغذية الأم المرضع دوراً هاماً بالنسبة للأم والطفل. فالأم تحتاج إلى المحافظة على محتوى الأنسجة من العناصر الغذائية وتعويض ما قد تكون فقدته أثناء الحمل وأيضاً لزيادة قدرتها على إنتاج اللبن وهو أكثر الأغذية تميزاً وأنسبها بالنسبة لنمو الطفل وتطوره.

ويزيد احتياج الطفل من العناصر الغذائية (جدول ١٠-٣) كما يزيد احتياجها لشرب الماء والسوائل بما يعادل ١,٩ - ٢,٨ لتر لمقابلة احتياجات الأم وأيضاً لإنتاج اللبن بالكمية المناسبة.

جدول (١٠-٣) الكميات الموصى بها من العناصر الغذائية للأكم أثناء الرضاعة حسب العمر والوزن والطول \*

العمر بالسنوات				اليان		اليان	العمر بالسنوات				اليان
٥-٢٥	٢٤-١٩	١٨-١٥	١٤-١١	١٢٠٠	١٢٠٠		٥-٢٥	٢٤-١٩	١٨-١٥	١٤-١١	
١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	كالبسيوم ملجم	كالبسيوم ملجم	الوزن كجم	١٢٠٠	٥٨	٥٥	٤٦	الوزن كجم
١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	فوسفور ملجم	فوسفور ملجم	الطول سم	١٢٠٠	١٦٤	١٦٣	١٥٧	الطول سم
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	صوديوم ملجم	صوديوم ملجم	الطاقة كالورى	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠	الطاقة كالورى
٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	كلوريد ملجم	كلوريد ملجم	البروتين جم	٦٤	٦٤	٦٤	٦٤	البروتين جم
٣٥٥	٣٥٥	٣٥٥	٣٥٥	ماغنسيوم ملجم	ماغنسيوم ملجم	فيتامين A ميكروجيم ريتول	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	فيتامين A ميكروجيم ريتول
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	بوتاسيوم ملجم	بوتاسيوم ملجم	فيتامين D ميكروجيم	١٠	١٠	١٠	١٠	فيتامين D ميكروجيم
٢٠٠-٥٠	٢٠٠-٥٠	٢٠٠-٥٠	٢٠٠-٥٠	كروميوم ميكروجيم	كروميوم ميكروجيم	فيتامين E ملجم	١٢	١٢	١٢	١٢	فيتامين E ملجم
٣-١,٥	٣-١,٥	٣-١,٥	٣-١,٥	نحاس ملجم	نحاس ملجم	فيتامين K ميكروجيم	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	فيتامين K ميكروجيم
٤-١,٥	٤-١,٥	٢,٥-١,٥	٢,٥-١,٥	فلوريد ملجم	فلوريد ملجم	نيوتين ميكروجيم	١٠٠-٣٠	١٠٠-٣٠	١٠٠-٣٠	١٠٠-٣٠	نيوتين ميكروجيم
٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	يود ميكروجيم	يود ميكروجيم	نياسين ملجم	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	نياسين ملجم
١٥	١٥	١٥	١٥	حديد ملجم	حديد ملجم	حامض بنزويك ملجم	٧-٤	٧-٤	٧-٤	٧-٤	حامض بنزويك ملجم
٥-٢	٥-٢	٥-٢	٥-٢	منجنيز ملجم	منجنيز ملجم	ريبوفلافين ملجم	١,٨	١,٨	١,٨	١,٨	ريبوفلافين ملجم
٢٥٠-٧٥	٢٥٠-٧٥	٢٥٠-٧٥	٢٥٠-٧٥	موليبديوم ميكروجيم	موليبديوم ميكروجيم	فيتامين B <sub>6</sub> ملجم	١,٦	١,٦	١,٦	١,٦	فيتامين B <sub>6</sub> ملجم
٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	سليسيوم ميكروجيم	سليسيوم ميكروجيم	فيتامين B <sub>12</sub> ميكروجيم	٢,١	٢,١	٢,١	٢,١	فيتامين B <sub>12</sub> ميكروجيم
١٩-١٦	١٩-١٦	١٩-١٦	١٩-١٦	زنك ملجم	زنك ملجم	حامض الفوليك ميكروجيم	٢,٦	٢,٦	٢,٦	٢,٦	حامض الفوليك ميكروجيم
						فيتامين C ملجم	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	فيتامين C ملجم
							٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	

\* RDA, 1989.

ويصل احتياج الأم للمواد الغذائية أثناء الرضاعة فى اليوم من الطاقة إلى ٢٧٠٠ كالورى، البروتين ٦٤-٦٦ جم، والكالسيوم ١٢٠٠ ملجم، وفيتامين C إلى ٩٥ ملجم، والريبوفلافين ١,٨ ملجم، فيتامين A ١٣٠٠ ميكروجم ورتينول، ١,٨ ملجم ثيامين، ١٦-١٩ ملجم حديد.

إن نقص العناصر الغذائية يودى إلى خفض كفاءة الأم فى إفراز اللبن. ويجب العناية بتناول الغذاء الذى يمد الجسم بالطاقة المصحوبة بالكميات المناسبة من العناصر الغذائية الأخرى من البروتين والطاقة والفيتامينات والمعادن مع الاهتمام بتناول الدهون غير المشبعة وخصوصاً الأحماض الدهنية عديدة عدم التشبع لدورها فى بناء الجهاز العصبى والمخ.

وينبغى الاهتمام بنوعية الدهون فى غذاء الأم المرضع حتى تتمكن من إمداد طفلها بالأحماض الدهنية الأساسية اللازمة له وهذا يتوقف على وجود الدهون فى غذائها وعلى المخزن لديها. وهذا المخزون فى جسمها يلبي احتياجات الطفل الرضيع من الأحماض الدهنية الأساسية والطاقة خلال فترة الشهور الأولى من الرضاعة. وينبغى أن يكون غذاء الأم كافياً لتزويدها بكمية إضافية من الأحماض الدهنية الأساسية تعادل ٣-٤ جم (Koletzko وآخرون ١٩٩٢).

ويوضح جدول (١٠-٤) محتوى لبن الأم المرضع من أحماض دهنية والتي تعتمد فى غذائها على أغذية متنوعة نباتية وحيوانية فى أوربا وأفريقيا ويمكن زيادة هذا المحتوى بزيادة المتناول من الطعام العادى.

**جدول (١٠-٤) معدل النسبة المئوية من الأحماض الدهنية في لبن الأمهات  
في أوروبا وإفريقيا**

المتوسط والمدى		إجمالي الأحماض الدهنية (% وزن / وزن)
أفريقيا (١٠ دراسات)	أوروبا (١٤ دراسة)	
٥٣,٥ (١٢,٣-٣٥,٥)	٤٥,٢ (٥١,٣-٣٩,٠)	مشبعة
٢٨,٢ (٤٩,٠ - ٢٢,٨)	٣٨,٨ (٤٤,٩- ٣٤,٢)	غير مشبعة وحيدة الرابطة المزدوجة
١٦,٦ (٢٤,٧ - ٦,٣)	١٣,٦ (١٩,٦ - ٨,٥)	٦-ن + ٣-ن غير مشبعة متعددة الروابط المزدوجة
		٦-ن غير مشبعة متعددة الروابط المزدوجة (% وزن/وزن)
١٢,٠ (١٧,٢-٥,٧)	١١,٠ (١٦,٤-٦,٩)	ك ١٨ : ٦-٢٢
٠,٣ (٠,٨ - ٠,٣)	٠,٣ (٠,٥ - ٠,٢)	ك ٢٠ : ٦-٢٢
٠,٤ (٠,٥ - ٠,٢)	٠,٣ (٠,٧ - ٠,٢)	ك ٢٠ : ٦-٢٣
٠,٦ (١,٠ - ٠,٣)	٠,٥ (١,٢ - ٠,٢)	ك ٢٠ : ٦-٢٤
٠,١ (٠,١ - ٠,٠)	٠,١ (٠,٢ - ٠,١)	ك ٢٢ : ٦-٢٤
٠,١ (٠,٣ - ٠,١)	٠,١ (٠,٢ - ٠,٠)	ك ٢٢ : ٦-٢٥
١,٥ (٢,٠ - ٠,٩)	١,٢ (٢,٢ - ٠,٤)	إجمالي ٦-ن *LCP
		٣-ن غير مشبعة متعددة الروابط المزدوجة (% وزن/وزن)
٠,٨ (١,٤٤ - ٠,١)	٠,٩ (١,٣ - ٠,٧)	ك ١٨ : ٣-٢٣
٠,١ (٠,٥ - ٠,١)	٠,٢ (٠,٦ - ٠,٠)	ك ٢٠ : ٣-٢٥
٠,٢ (٠,٤ - ٠,١)	٠,٢ (٠,٥ - ٠,١)	ك ٢٢ : ٣-٢٥
٠,٣ (٠,٩ - ٠,١)	٠,٣ (٠,٦ - ٠,١)	ك ٢٢ : ٣-٢٦
٠,٦ (٢,٩ - ٠,٣)	٠,٦ (١,٨ - ٠,٣)	إجمالي ٣-ن *LCP

\* LCP أحماض دهنية غير مشبعة متعددة الروابط المزدوجة (٢-٦ روابط مزدوجة) ذات سلاسل كربونية طويلة  
(٢٠-٢٢) ذرة كربون).

المصدر : Koletzko, Thiel and Abiodun, 1992

**بعض العوامل التي تؤثر في تغذية الأم أثناء فترة الإنجاب**

ترتبط تغذية الأم بعدة عوامل منها لعل من بين أهمها هو عمر الأم. ويفضل أن تكون الأم في عمر يتراوح بين ٢٠ - ٣٠ سنة لأن الأم بدخولها في العقد الثاني من العمر تكون قد أنهت فترة المراهقة، بمتطلباتها المختلفة ويكون قد اكتمل نضجها الفسيولوجي وتكون على درجة من الإدراك بأهمية هذه المرحلة فقد ظهر من دراسات كثيرة حول العالم أن الأم صغيرة السن تكون عرضة لإنجاب أطفال ناقصي الوزن وهؤلاء يكونون معرضين لحالات سوء التغذية والمعدية وأيضاً الوفاة. كما أن تقارب مرات الحمل يجهد الأم ولا يعطيها وقتاً كافياً لاستعادة ما



فقدته أثناء الحمل من عناصر غذائية وما يعرضها إلى حالات سوء التغذية وخصوصاً الأنيميا وإصابتها بالأمراض وقد يعرضها للوفاة.

قد وجدت إيزيس نوار أن الأنيميا كانت منتشرة بنسبة ١١٪ بين الأمهات اللواتي أنجبن أطفالهن على فترات زمنية متقاربة (أقل من عام) وكانت نسبة المواليد ناقص الوزن ٩٪. وتشير منظمة WHO أن هؤلاء الأطفال ناقص الوزن يمثلون ١٧,٤٪ وهذا له تأثير بعيد المدى على صحتهم وقدراتهم (FAO, WHO, ١٩٩٢).

### **المستوى الاقتصادي:**

للمستوى الاقتصادي دور كبير في تحديد نوع الأغذية التي تتناولها الأم فكلما ارتفع المستوى الاقتصادي كلما ازدادت فرص تناول أغذية ذات قيمة تغذوية مرتفعة مثل اللبن والبيض واللحوم والدواجن والأسماك. وفي دراسة في إحدى قرى المنوفية أن معظم الأمهات من أسر ذوى دخل منخفض كان يغلب على طعامهن الأغذية الكربوهيدراتية والنشوية وكان متوسط زيادة الوزن أثناء فترة الحمل من ٤-٦ كجم في حين كانت زيادة الوزن بين الأمهات لأسر ذوى دخل مرتفع ما بين ١١-١٤ كجم.

### **مستوى الوعي التغذوي :**

يؤثر الوعي التغذوي على اختيار الأم لنوع الغذاء الذي تتناوله وإن كان الوعي يرتبط ارتباطاً إيجابياً بالتعليم إلا أنه أكثر ارتباطاً بالخبرة. كما ظهر في بعض الدراسات أن الخبرة كانت لها دور إيجابي في تحسين نوع الأغذية المتناولة. فالأم صغيرة السن تكون قليلة الخبرة ولا تهتم بنوع الغذاء فلا تتناول الأغذية المفيدة لها من الخضروات والفواكه واللبن والبيض ولكن المهم عندها هو امتلاء المعدة والشعور بالشبع.

### **الحالة الصحية للأم :**

تؤثر الحالة الصحية للأم على الحمل وصحة الجنين فإذا كانت الأم تعاني من أى حالة صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكر فلا بد من العناية بغذائها على أن يكون تحت إشراف الطبيب حتى لا تتعرض الأم أو المولود لأى مخاطر. وإذا كانت تعاني من النحافة فعليها أن تزيد من كميات الأغذية الغنية فى الطاقة مع الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والأغذية الغنية بالحديد.

## بعض الممارسات والمعتقدات الخاطئة :

هناك بعض الممارسات التي تتبعها بعض الأمهات أثناء الحمل اعتقاداً منهن أنها مفيدة للأطفال. فقد ظهر في دراسة في بعض المناطق الريفية أن الأمهات الحوامل يتناولن الطباشير والجير لأنه يجعل لون بشرة الطفل فاتحه، وبعضهن يتناولن الطين حتى يزيد من كثافة شعر الجنين حسب اعتقادهن.

ولهذا لابد من زيادة وعي الأمهات لتجنب مثل هذه الممارسات وخصوصاً وأن مثل هذه الممارسات قد تعرضهن لكثير من الأضرار الصحية.

## فقد الشهية:

تنخفض شهية الأم عند إبتداء الحمل وهذه قد تعرض الأم والجنين لحالات سوء التغذية. ونصح الأم بتناول كميات بسيطة من الغذاء وزيادة عدد الوجبات وتقليل شرب السوائل مع الوجبة ويفضل تناول السوائل بين الوجبات وتجنب شرب المكيفات والامتناع عن التدخين.

## ثالثاً : التغذية أثناء الطفولة Nutrition During Childhood :

### ١- الرضيع infant feeding :

#### مقدمة :

يتوقف مستقبل الشعوب لحد كبير على حالة أطفالهم وكيفية العناية بهم منذ فترة الرضاعة وخصوصاً الرعاية التغذوية لأن حدوث تغيرات في أثناء هذه الفترة يصعب علاج الكثير منها في فترات تالية ولهذا فإنه يوجد اهتمام عام بتغذية الطفولة حول العالم.

يحتاج الطفل إلى عناية خاصة في تغذيته أثناء مرحلة الطفولة ويلاحظ أن التاريخ الغذائي للفرد لا يبدأ منذ ولادته ولكن قبل ذلك بتسعة شهور، كما أن الحالة التغذوية للطفل لا تتأثر فقط بحالة الأم التغذوية قبل الحمل، بل بحالتها التغذوية قبل هذه المرحلة.

ويزيد احتياج الطفل إلى العناصر الغذائية، حيث يزيد معدل الاحتياج بالنسبة لوحدة وزن الجسم، وذلك نظراً لسرعة النمو التي تتميز بها هذه المرحلة، ويجب أن يكون لدى المسؤولين عن تغذية الطفل ولدى الآباء معلومات سليمة عن قواعد تغذية الطفل حتى لا يتعرض الأطفال إلى حالات سوء التغذية التي تؤدي إلى عواقب وخيمة.

وظاهرة النمو ليست فقط زيادة فى الحجم، ولكنها تتضمن تغيراً فى وظائف الجسم وتركيبه، التى تنعكس فى المتطلبات الغذائية، وهذه الاختلافات فى الاحتياجات الغذائية تظهر بوضوح فى مرحلة الطفولة المبكرة حيث، النمو أسرع من أى مرحلة أخرى، وحيث يتم معظم النضج الكيميائى Chemical Maturation ويحتاج الطفل للعناصر الغذائية بدرجة كبيرة لتغطية الزيادة فى سرعة النمو، ولسرعة عمليات الميوليزم ولسرعة استهلاك العناصر الغذائية ولصحة الأنسجة وتكوين الهيكل العظمى وكذا لزيادة الفقد فى الحرارة والماء عن طريق الجلد نظراً لزيادة مساحة سطح الجلد بالنسبة لحجم الجسم، وبالإضافة إلى ذلك فإن غياب الأسنان يتطلب إعداد الطعام إعداداً خاصاً للطفل، ولكن من الناحية الأخرى، فإنه يوجد فى جسم الطفل بعض العناصر الغذائية التى خزنها فى الكبد أثناء المرحلة الأولى (الجنين) مثل الحديد والنحاس وفيتامين A.

### الاحتياجات الغذائية :

#### احتياجات الطاقة :

تعتبر احتياجات الطاقة للطفل حديث الولادة من ٢ - ٣ أمثال احتياجات الفرد البالغ هذا بالنسبة لوزن الجسم. فيحتاج الطفل فى السنة الأولى إلى حوالى (١١٥ - ١٢٠) كالورى لكل كجم موزعة كالتالى:

الميتابوليزم القاعدى	٤٠ كالورى / كجم
الفعل الديناميكى الخاص	١٠ كالورى / كجم
النشاط العضلى	٢٥ / ٣٠ كالورى / كجم
النمو	٣٠ كالورى / كجم
الغذاء غير المستعمل (إفراز)	١٥ كالورى / كجم
	<u>١٢٠ - ١٢٥ كالورى / كجم</u>

ويلاحظ أن طاقة الميتابوليزم القاعدى مرتفعة، ويقل معدل احتياج الطفل بدرجة سريعة خلال السنة الأولى، ثم تدريجياً بعد ذلك حتى مرحلة المراهقة، ويختلف كثيراً الاحتياج لطاقة النشاط بين الأطفال، فالبكاء مثلاً يضاعف الاحتياج، وقد وجد أن الطفل الهادئ يكون احتياجه للطاقة قليلاً يصل إلى أقل من ١٠٠ كالورى سعراً بينما يصل احتياج الطفل كثير البكاء إلى أكثر ١٣٠ كالورى / كجم. ويوضح جدول (١٠ - ٥) الكميات الموصى بها من العناصر الغذائية ومقارنتها بمحتوى لبن الأم (٤ كوب)، لبن البقر (٤ كوب).

جدول (١٠-٥) الكميات الموصى بها<sup>(١)</sup> من العناصر الغذائية للرضيع من الميلاد حتى ٦ شهور/ اليوم ومقارنتها بلبن الأم ولبن البقرى

العناصر الغذائية الموجودة فى ٤ أكواب		الكميات الموصى بها/ اليوم	العناصر الغذائية
لبن الأم	اللبن البقرى		
٨٢٣	٨٢٤	٦٥٠	الطاقة
٦٦	٤٥	-	كربوهيدرات
٣٦	٣٦	-	دهن
١١	٣١	١٣	بروتين
٣٢٢	١١٩٢	٤٠٠	العناصر الكبرى
١٥١	٩٢٦	٣٠٠	كالكسيوم
١٤٢	٥٤٨	١٢٠	فوسفور
٣٨	١٢٣	٤٠	صوديوم
٤٧٣	١٣٠٣	٥٠٠	ماغنسيوم
			بوتاسيوم
٠,٤	٠,٣	٠,٦-٠,٤	العناصر الصغرى
٢,٠	١,٢	٦	نحاس
٦,٠	٣,٢	٥	حديد
-	-	٥-٤	زنك
-	-	١٠-١٥	ميكروجرام
			يود
			سليسيوم
٥٣٧	٢٩١	٣٧٥,٠	الفيتامينات الذائبة فى الدهن
٠,٥	٠,٣	٧,٥	فيتامين A ميكروجرام
١,٧	٠,٤	٣,٠	فيتامين D ميكروجرام
-	-	٥,٠	فيتامين E <sup>(٢)</sup> ميكروجرام
			فيتامين K ميكروجرام
٣,٨	٣٣,٠	١٠,٠	الفيتامينات الذائبة فى الماء
٢,١	٢,٧	٢٥,٠	بيوتين
١,٦	٠,٨	٥,٠	حامض فوليك
١,٩	٣,٣	٢,٠	نياسين
٠,٥	١,٥	٠,٤	حامض بنتوثيك
٠,١	٠,٤	٠,٣	ريوفلافين
٠,١	٠,٤	٠,٣	ثيامين
٠,٣	٣,٨	٠,٣	فيتامين B <sub>6</sub> ميكروجرام
٣٠,٠	١٧,٠	٣٠,٠	فيتامين B <sub>12</sub> ميكروجرام
			فيتامين C ميكروجرام

١- RDA (١٩٨٩). ٢- الفاتو كوفريال

يلاحظ أن لبن الأم واللبن البقرى منخفضان في محتواه من بعض المعادن والفيتامينات. كما يلاحظ أيضاً أن اللبن البقرى مرتفع جداً في محتواه من البروتين وبعض المعادن مما قد يؤثر على الكلى للتخلص من الفضلات.

### **احتياجات البروتين :**

يحتاج الطفل إلى بروتين للنمو والصيانة والنضج، وعند الميلاد يكون نسبة النيتروجين في الجسم تمثل ٢ ٪، بينما تصل هذه النسبة في الشخص البالغ أكثر قليلاً من ٣ ٪. ويحدث معظم التغير خلال السنة الأولى، ويحتاج الطفل إلى بروتين بنسبة ٢ جم/ كجم في السنة الأولى، ثم يقل سريعاً في السنة الثانية بعدها يقل تدريجياً حتى مرحلة البلوغ وينصح بأن يعطى البروتين ١٥ ٪ من الطاقة على أن يكون البروتين ذا قيمة تغذوية عالية، ولو أن لبن البقر يحتوى على بروتين بنسبة أعلى من لبن الإنسان، إلا أن قيمته بالنسبة للطفل أقل منه في لبن الإنسان ولذا ينصح برفع دخل الطفل من البروتين في حالة لبن البقر.

### **احتياجات الدهن :**

هناك بعض الأدلة التي تبين أهمية تناول الأحماض الدهنية غير المشبعة بالنسبة للإنسان فقد وجد (Hansen وآخرون ١٩٦٣) أن تناول الأطفال غذاء خال من الدهن أدى إلى خشونة الجلد وظهور إكزيما، وقد أمكن علاج ذلك بواسطة الأحماض الدهنية الأساسية، ويذكر Makrides وآخرون (١٩٩٤)، و Crawford وآخرون (١٩٩٧) أن الأحماض الدهنية الأساسية لازمة لنمو المخ وتطوره وأن نقصها يؤدي إلى اضطرابات عصبية.

إن الدهون تشكل ٦٠ ٪ من بناء المخ والتي غالباً تكون في جدر الخلايا وتتكون الدهون من أحماض دهنية أساسية أما الأحماض الدهنية المشبعة فتدخل في تكون الجدار الأكثر صلابة مثل غمد الميلين (myelin sheath Crawford ١٩٩٧ وآخرون). وينصح بأن تكون كمية الدهون ٣٠ ٪ ولا تقل عن ذلك ولا تزيد عن ٥٠ ٪ من الطاقة.

### **احتياجات الكربوهيدرات :**

تقوم الكربوهيدرات بإمداد الطفل بما يحتاجه من الطاقة السريعة، ويفضل أن تمد الكربوهيدرات بحوالى ٥٠ ٪ من السرعات الكلية.

### احتياجات المعادن :

تمثل المعادن من ٣- ٤٪ من وزن الجسم، ويحصل الطفل على احتياجاته من المعادن باستثناء الحديد إذا تناول المقدار اللازم من لبن الأم أو لبن البقر، والمعروف أن لبن الإنسان أو البقر فقير في الحديد وحيث أن الوليد عند الوضع يحتوى على مقدار من الحديد مخزن في جسمه بما يكفيه من ٣ - ٦ شهور، ولذا ينصح بتعاطيه بعد الشهر الثالث أغذية غنية بالحديد مثل مع البيض والحبوب الكاملة.

ويزيد احتياج الطفل إلى الكالسيوم والفوسفور في هذه الفترة لاتمام نمو الجهاز الهضمي والأسنان واللبن يمد الطفل بما يكفيه من هذين العنصرين بشرط وجود فيتامين D.

### احتياجات الفيتامينات :

يحتاج الطفل إلى الفيتامينات المختلفة ويلاحظ أن الاحتياج للنياسين يتوقف على وجود tryptophan في الوجبة الغذائية حيث أنه في حالة وفرة فإنه يمكن تحويله إلى نياسين، كما أنه في حالة كفاية methionine يمكن أن تكون الحاجة إلى الكولين أقل، بينما تزيد الحاجة إليه في حالة نقص methionine، كما يحتاج الطفل إلى كميات من B<sub>12</sub> وحمض الفوليك، ولو أن هذين الفيتامينين يكونان في الأمعاء الغليظة إلا أن هناك شك في امتصاصها بكميات كبيرة، وتكون الحاجة إليهما بسيطة في حالة وجود حامض الاسكوربيك مع عدم تعاطى المواد المضادة الحيوية Antibiotics.

ولابد من الاهتمام بحامض الاسكوربيك وفيتامين D بالنسبة لتغذية الطفل حيث أن اللبن يحتوى على كميات بسيطة منهما، ومعظم فيتامين C سريع التلف، ولذا ينصح بتعاطى الطفل عصير طماطم كما ينصح بتدعيم اللبن بهذا الفيتامين. وقد لوحظ حالات نقص فيتامين A في الأطفال وخصوصاً الذين يتعاطون لبن فرز. أما بالنسبة لفيتامين E فننصح بتعاطى ٧,٥ ميكروجرام، وبخصوص فيتامين K فإنه ينصح بتعاطى الطفل عند الميلاد ٥ ميكروجرام / يوم.

### احتياجات الماء :

يحتاج الطفل إلى الماء حيث أنه معرض لنقصه، ويلاحظ أن معدل فقد الماء عن طريق الجلد أو الكلى أعلى منه في حالة الفرد البالغ، وقد وجد أن الطفل يحتاج

للماء بمعدل ٧٥ مل / كجم، ولكنه لمواجهة التغيرات الجوية والفردية ينصح برفعها إلى ١٥٠ مل / كجم، ويلاحظ أن جزءاً من الماء يتناوله الطفل مع اللبن. ويمكن إعطاء الرضيع فى نهاية الشهر الأول عصير برتقال الغنى بفيتامين C لضمان تكوين اللثة وأيضاً جدر الأوعية الدموية.

وبالنسبة إلى تغذية الطفل منذ مرحلة الرضاعة حتى بلوغه سن دخول المدرسة فليس هناك شك أن هذه المرحلة من أهم مراحل بنية جسم الطفل، بل هى الأساس الذى يمكن أن تجعل من الطفل إنساناً قوياً سليماً فى مراحل حياته المقبلة إذا ما وجهت الرعاية الكاملة لتغذيته بأسلوب صحى ليقوم على أسس علمية ويمكن أن يصبح إنساناً ضعيفاً إذا ما أهملت تغذيته.

والرضيع يواجه عالماً يختلف عن العالم الذى كان يعيش فيه منذ أن كان جنيناً فهو بعد ميلاده يصبح يعتمداً على نفسه فى الحصول على ما يحتاجه جسمه من غذاء، ويزيد استقلاله واعتماده على نفسه كلما تقدم به العمر، حتى تظهر أسنانه ويصبح قادراً على إطعام نفسه بنفسه، وفى هذا كله يجب أن تقدم له كل احتياجاته من الطعام الذى يشمل كل احتياجات الجسم السليم الذى لا يعانى من الأمراض بسبب نقص أو سوء التغذية.

### **أسلوب تغذية الرضيع Infant Feeding :**

#### **الرضاعة :**

لا تختلف أسس تغذية الطفل المولود عن تلك الأسس المتبعة فى تغذية الأفراد فى أى عمر ولكن ينحصر الخلاف بين تغذية الأطفال الرضع وغيرهم بأن الأطفال فى هذه الحالة لا يستطيعون تعاطي الأغذية المعتادة التى يتناولها غيرهم فى الأعمار المختلفة حيث لا يستطيعون هضم وامتصاص الأطعمة المعتادة والطرق المتبعة فى تغذية الطفل إما رضاعة طبيعية أو غير طبيعية أو مختلطة.

#### **١- الرضاعة الطبيعية Breast Feeding :**

وتعتبر الرضاعة الطبيعية هى الطريقة المعتادة لإطعام المولود، ولذا يجب على الأم الاهتمام بتغذيتها قبل وأثناء و بعد فترة الحمل كما سبقت الإشارة إليه. وبعد أن يبدأ إفراز اللبن من ثدى الأم لابد من إرضاع الطفل لبن السرسوب الغنى بالعناصر الغذائية ويوضح جدول (١٠-٦) مقارنة بين لبن الأم ولبن السرسوب Colostrum ولبن البقر ويجب تطهير وتدليك حلمات الثدي قبل الرضاعة مع تشجيع

الطفل على رضاعة الثدي بعد ولادته بمدة ١٢ - ١٤ ساعة وعلى الأم أن تعطى طفلها الثديين بالتبادل في فترات منتظمة كل ٣ ساعات بانتظام حتى يحصل الوليد على السرسوب.

جدول (١٠-٦) مقارنة بين لبن السرسوب ولبن الأم في مراحل مختلفة  
ولبن البقر / ١٠٠ مل\*

العنصر الغذائي	لبن الأم			لبن البقر الناضج
	كولستروم ٥-١ يوم	فترة التحويل ٦-١٠	الناضج	
الطاقة	٥٨,٠	٧٤,٠	٧١,٠	٦٩,٠
دهن	٢,٩	٣,٦	٣,٨	٣,٧
سكر اللاكتوز	٥,٣	٦,٦	٧,٠	٤,٨
بروتين	٢,٧	١,٦	١,٢	٣,٣
كازين	١,٢	٠,٧	٠,٤	٢,٨
لاكتايومين	٠,٨	٠,٣	٠,٤	٠,٤
معادن	٠,٣٣	٠,٢٤	٠,٢١	٠,٧٢
كالمسيوم	٣١,٠	٣٤,٠٠	٣٣,٠	١٢٥,٠
فوسفور	١٤,٠	١٧,٠	١٥,٠	٩٦,٠
حديد	٠,٠٩	٠,٠٤	٠,١٥	٠,١٠
فيتامينات				
A	٨٩,٠	٨٨,٠	٥٣,٠	٣٤,٠
كاروتينويدات	١١٢,٠	٣٨,٠	٢٧,٠	٣٨,٠
D	١,٢٨	١,٣٢	٠,٤٢	٢,٣٦
E	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦
K	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦
C	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦
بيوتين	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦
كولين	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦
حامض الفوليك	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦
اينوسيتول	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦	٠,٠٦
حامض نيكوتينيك	٧٥,٠	١٧٥,٠	١٧٢,٠	٨٥,٠
حامض بنتوثيك	١٨٣,٠	٢٨٨,٠	١٩٦,٠	٣٥٠,٠
B6	٢٩,٦	٣٣,٢	٤٢,٠	٤٨,٠
ريبوفلافين	١٥,٠	٦,٠	١٦,٠	٥٧,٠
ثيامين	٠,٠٤٥	٠,٠٣٦	٠,٠٣٦	٤٢,٠
B12	٠,٠٤٥	٠,٠٣٦	٠,٠٣٦	٠,٠٥٦

\* Chaney & Ross, 1966.



يرضع الطفل لبن أمه مدة ١٥ - ٢٠ دقيقة وغالبًا ينام بعدها وإذا استمر الطفل على مص ثدى الأم كان دليلاً على عدم كفاية لبن الأم للرضاعة وغالبًا ما ينام الطفل طوال الليل إذا تعود ذلك وفي معظم الحالات لا يرضع الأطفال من لبن الأم من الساعة العاشرة مساءً حتى السادسة صباحًا تقريبًا وإن كان بعض الأطفال يرضعون حوالى الساعة ٢ صباحًا وبعد كل رضعة وأيضًا خلالها ترفع الأم الطفل قليلاً مسندة بظهره ورقبته وترت على ظهره حتى يتخلص من الهواء الذى ابتلعه (يتكرغ).

وقبل إفراز لبن الأم يعطى الطفل ملعقة صغيرة من محلول الكراوية أو الينسون المحلى قليلاً بالسكر كل عدة ساعات وتزداد إلى ملعقة كبيرة ثانية وثالث يوم تزداد تدريجيًا حتى تصل إلى فنجان قهوة صغيرة حتى يبدأ بعدها إفراز اللبن فى الثديين. تتدرج عدد الرضعات من حوالى ٩ رضعات فى اليوم خلال الشهر الأول إلى خمس- ستة رضعات حتى الشهر التاسع ثم ٤ رضعات خلال الشهور الأربعة التالية، ثم إلى ثلاث رضعات خلال الشهور الأربعة التى تليها.

#### ٢- الرضاعة غير الطبيعية Artificial Feeding :

تلجأ بعض الأمهات إلى تغذية الطفل المولود عن طريق الرضاعة غير الطبيعية فى حالة نقص إفراز اللبن بالقدر الكافى لتغذية الطفل المولود، أو يكون بسبب سوء الحالة الصحية للأم أو حالة مرضية بالثدى.

ومن الممكن أن تكون الرضاعة غير الطبيعية كافية وناجحة طالما كان المخلوط المعد جيد التحضير نظيفًا وأعطى بطريقة صحيحة صحية ويجب على الأم أثناء عملية الرضاعة غير الطبيعية أن توفر للطفل حاجاته السيكولوجية والعاطفية باحتضان وليدها فى حنان وحب وعطف

ويجب أن تتأكد الأم من نظافة الزجاجاة والحلمة المستعملة فى الرضاعة بتعقيمها أولاً وقبل كل شئ كما يمكن استخدام اللبن المحفّف باتباع كافة التعليمات المكتوبة على العلبة أو تحت إشراف الطبيب وتعليماته. ويمكن استعمال اللبن البقرى المغلى بعد تخفيفه بالماء وإضافة قليل من السكر إليه.

### فى الشهر الثالث :

يبدأ بإعطاء الطفل عصير فاكهة مثل عصير البرتقال أو الليمون الحلو أو الطماطم أو عصير العنب خصوصاً فى حالة الرضاعة غير الطبيعية. ويكتفى بماء وملعقة شاي (مخففة ونظيفة) من العصير تخفف بقليل من الماء .لمى أن تعطى هذه الكمية قبل إحدى الرضعات.

### فى الشهر السادس :

يمكن إعطاء الطفل مهلبية وعادة ما تحل هذه الوجبة محل رضعة الظهر ومن الضروري أن تكون المهلبية مخففة بحيث يسهل إعطاؤها فى زجاجة الرضاعة لأن الأطفال يرفضون أى طعام فى صورة غير سائلة.

وتنحصر طريقة التحضير فى إضافة ملعقة شاي من النشا أو الدقيق على نصف كوب من اللبن وإضافة قطعة من السكر لتحليلها ثم تطهى قليلاً على النار. ويمكن بعد ذلك زيادة تركيز المهلبية بالتدريج مع عمر الطفل بإضافة ملعقة كبيرة من النشا إلى كوب من اللبن مع قطعتين من السكر وفى هذه الحالة يمكن للطفل أن يتعاطى هذا بالملعقة.

توجد فى الصيدليات مستحضرات جاهزة سهلة التحضير يمكن استخدامها بعد استشارة الطبيب. كما يمكن إعطاء الطفل صفار بيضة طازجة مسلوقة جيداً حتى لا يتعفن فى أمعائه بسرعة مع ،ملاحظة التدرج فى إعطائه ذلك باليد بكمية قليلة أولاً ثم تزداد بعد التأكد من عدم الإضرار بحساسية خاصة كالالتهابات الجلدية أو اضطرابات معدية أو معوية.

وفى الأحوال العادية يجب ألا يزيد إعطاء الطفل أكثر من صفار بيضة واحدة بأكملها ٣ مرات فى الأسبوع.

### التغذية المختلطة Mixed Feeding :

وفىها يجمع بين الرضاعة الطبيعية والتغذية غير الطبيعية. وتستخدم فيها الحالات التالية:

### - التغذية التكميلية Supplementary :

وفىها تكمل كل رضعة من الثدي بلبن خارجى حتى يحصل الطفل على

كفايته ويجب ألا يترك الطفل أكثر من ١٥ - ٢٠ دقيقة فى الرضاعة من ثدى الأم، يعطى بعدها غذاءً تكميلياً بعد الرضعة (لا قبلها) وبشرط ألا تكون الرضعة التكميلية زائدة الحرارة حتى لا يفضلها على لبن أمه فيرفض بسببها رضاعة الثديين.

#### **- التغذية الإبدالية Substituling :**

وهى عملية استبدال رضعة أو رضعتين من الثدي بأخرى خارجية. ومن عيوب التغذية الإبدالية الإقلال من إفراز اللبن غير أن هذه الحالة تلائم الأم العاملة. وخصوصاً إذا كانت تعمل معظم اليوم.

#### **الأطعمة التى تعطى للطفل أثناء فترة الرضاعة :**

ينبغي أن يكون الطعام مصدر سعادة الطفل ويلاحظ أن تقبل الطعام طعاماً يستغرق وقتاً طويلاً وينصح بأن تعطى كمية صغيرة أولاً على طرف ملعقة ليتذوقها وإذا أدار رأسه أو أخرج الغذاء من فمه فعلى الأم ألا تنزعج فهو شيء طبيعى ويفضل أن يقدم الغذاء للطفل فى غير وقت تغذية الأسرة حتى تنفرغ الأم لإطعام الطفل وحتى لا يشتت انتباه الطفل بالضوضاء والحركة. وفيما يلى أمثلة لبعض الأطعمة التى يمكن إعطائها للطفل كما اقترحها الديوانى (١٩٦٦)<sup>(١)</sup>.

#### **فى الشهر السابع :**

يمكن إعطاء الطفل كمية من حساء (شربة) الخضراوات وتحضر هذه الخضضر كالتى : تقشر كمية من البطاطس والكوسة والبسلة والعدس ثم توضع فى لتر ماء وتغلى حتى يقل الماء إلى مقدار النصف يصفى ويحلى قليلاً ويعطى للطفل وإذا لم يرغب الطفل تحليته بالسكر فيمكن إضافة قليل من الملح حسب رغبته. وبعد شهر (أى فى الشهر الثامن) يمكن زيادة قوام الحساء بهرس الخضصار جيداً ثم يصفى.

#### **فى الشهر العاشر :**

يمكن إعطاء الطفل كمية من البطاطس المدهوكة والفاكهة الناضجة كالموز والكرشى المطبوخة والمربات وعادة ما يكون الطفل فى هذا العمر قد أخرج حوالى ٤

<sup>(١)</sup> إلفيس نوار وآخرون (١٩٩٠).

أسنان وبذلك يمكن إعطائه قطعة من البسكويت أو الخبز الجاف حتى يتمرن الطفل على عملية المضغ بجانب مساعدته على خروج الأسنان، يعطى الطفل مرة يوميًا ثم تزداد إلى ثلاثة مرات فيما بعد قبل ميعاد الأكل بربع ساعة:

### **فى الشهر الثانى عشر :**

يمكن إعطاء الطفل كمية من الأرز والشعيرة والمكرونة بعد طبخها فى ماء الخضراوات أو فى شوربة الطيور أو اللحم. كذلك يسمح له بقطعة من جبن اللبن الطازجة (الحنوم) ومراعاة عدم تقديم أى جبن رومى أو مستوردة حتى لا ننشر بالجهاز الهضمى للطفل.

يمكن إعطاء الطفل كمية من شوربة اللحم البيضاء كالدجاج والأرنب فهى تعمل على تنبيه الجهاز الهضمى ويجب أن تكون هذه الطيور صغيرة السن حتى لا تسبب اضطرابات هضمية ويمكن تحضيرها بغلى نصف الدجاجة أو الأرنب فى لتر ماء لمدة ساعتين كما يمكن استخدام هذا الحساء فى طهى الخضراوات والأرز والشعيرة ويعطى الطفل فى نهاية السنة الأولى كبد الطيور بعد دهكها دهكًا مناسبًا ليستطيع تناولها بسهولة.

### **فى الشهر الخامس عشر :**

يبدأ الطفل بتناول اللحم البيضاء والسّمك بشرط أن تكون مفرومة فى بادئ الأمر ثم تقطع قطعًا صغيرة يستطيع بلعها يمكن بعد ذلك إعطائه اللحم الحمراء تحت استشارة الطبيب ويحسن تأجيل تقديمها للطفل حتى نهاية الستين.

ويجب الاهتمام بتغذية الطفل من الأحماض الدهنية الأساسية. وتشير FAO/WHO (١٩٩٧) أنه من المناسب تزويد تركيبة لبن الأطفال الذين يولدون فى مرعدهم الطبيعى بحامض الراكيدونيك وحامض دوكوزا هكسائينيك DHA بنسب مماثلة لتلك الموجودة فى لبن الأم التى تتغذى على مختلف أنواع الأطعمة. وتبلغ المقادير التى يحصل عليها هؤلاء الأطفال بالنسبة لكل كجم من وزنهم: ٦٠٠ ملجم حامض لينولييك linoleic، ٥٠ ملجم حامض الفالينولينيك linolenic، ٤٠ ملجم حامض اركيدونيك arachidonic وما يتبعه من أحماض عائة w٦، بالإضافة إلى ٢٠ ملجم حامض DHA. وتقرّح المنظمة إضافة هذه المقادير ومع هذا فهى تشير إلى الحاجة إلى المزيد من إجراء الدراسات والبحوث.

## فوائد الرضاعة الطبيعية:

يتميز لبن الأم باحتوائه على عناصر الرقاية مثل الأجسام المضادة والزانسفرين transferrin والانتروفون interferon وخلايا الدم البيضاء macrophages، والبروتين الذى يحلل حدر خلايا الجراثيم وهذه كلها مهمة لوقاية المولود وخصوصاً لعدم اكتمال جهازه المناعى. علاوة على ذلك فإن لبن الأم هو الغذاء الطبيعى للطفل ومحتوياته تناسب مكونات أنسجة الطفل وسرعة نموه وتطوره وتجنبه البدانة وتحميه من الحساسية التى قد يتعرض لها عند تناوله غذاء غير لبن الأم ويساعد على تكوين أسنانه سليمة. علاوة على أنه وسيلة ليتمتع الطفل بحنان الأم كما أن الرضاعة تشبع رغبات الأمومة وفرصة للأم تسترجع حجمها الطبيعى ويمكن أن يكون وسيلة طبيعية لمنع الحمل ولكن لا بد أن يعتمد الطفل على الرضاعة بشكل كامل ومتكرر. علاوة على أن الرضاعة الطبيعية لا تحتاج إلى إعداد وجبات وتعقيم زجاجات وغلى اللبن...

## الفطام Weaning :

الفطام يعنى تعويد الطفل على تناول الأطعمة بجانب لبن الأم ثم إيقاف لبن الأم تدريجياً، وتبدأ هذه الفترة فيما بين اعتماد الطفل كلية على لبن الأم حتى تناول الطعام الذى يحل محل لبن الأم كلية.

وتختلف فترة الرضاعة من طفل لآخر فقد تستمر لفترة سنة وقد تطول إلى سنتين إذا أمكن ذلك ولكن حيث أن لبن الأم لا يمد الطفل بكل احتياجاته من العناصر الغذائية اللازمة للنمو فيجب أن يعطى الطفل أغذية خارجية بجانب لبن الأم كما سبق ذكره.

ويمكن إعداد الطفل للفطام بأن يعطى كميات صغيرة من الغذاء الخارجى وأحسن بديل للبن الأم هو لبن الحيوان المغلى والمنزوع الدسم وكذلك اللبن المخفف كما يمكن استعمال السوبرامين فى إعداد غذاء الطفل وتزداد الكميات المعطاه من اللبن الخارجى تدريجياً مع كل وجبة. ويراعى عدم إبعاد الطفل مرة واحدة من صدر أمه بل يجرى ذلك تدريجياً وهذا قد يستغرق عدة أسابيع، ويجب أن تكون زجاجات الرضاعة والحلمات نظيفة معقمة حتى لا يصاب الطفل بأى نزلات معوية أو إسهال أو أى أمراض أخرى.

وقد ظهر أنه يمكن بدء الفطام بإيقاف رضعة المساء وبعد ٢ - ٣ أسابيع أخرى إيقاف رضعة الصباح الباكر - وهذا الفطام التدريجي ليس فى صالح الطفل فقط ولكنه أيضاً أكثر راحة للأم حيث يقل إفراز اللبن تدريجياً. أحياناً تتبع بعض الأمهات أسلوباً غير صحى فى الفطام وهو وضع مسحوق المذاق على حلمات الصدر أو إبعاد الطفل عن المنزل ولكن هذا الأسلوب سىء إذ أنه يشعر الطفل بأنه غير مرغوب فيه.

### **إعداد الطعام وتقييمه للطفل :**

ينبغى أن يعطى الطفل الطعام نظيفاً تماماً، فتغلى الأوعية المستعملة له على حدة لأنه من السهل أن يصاب الطفل بنزلات معوية أو إسهال نتيجة عدم نظافة الطعام.

وعند إطعام الطفل تجلسه الأم على رجلها وتطعمه بمعلقة نظيفة وسوف يتعود الطفل تناول الطعام بالمعلقة والشرب بالكوب - وإذا حاول الطفل أن يعلم نفسه فعلى الأم أن تساعد على ذلك - ويراعى أن يكون الطعام المقدم للطفل ليئاً وسهل الهضم حتى لا يسبب للطفل اضطرابات معوية، وبعد أن ينمو الطفل يمكن إطعام الطفل من غذاء الأسرة قبل وضع التوابل عليها وهذا أمر يقلل الجهد بالنسبة للأم كما أنه يساعد الطفل على تناول أنواعاً مختلفة من الطعام.

### **كيف نتأكد أن الطفل فى صحة جيدة وأن التغذية سليمة :**

توجد علامات تمكن الأم من الحكم على سلامة صحة الطفل منها :

- ١- اضطراب نمو الجسم وزناً وطولاً مع اعتدال القامة بسبب صحة العضلات والعظام.
- ٢- يزيد وزن الطفل إلى الضعف تقريباً (٦ - ٦,٥ كجم) عند نهاية الشهر الرابع ثم يصبح ثلاثة أمثاله عند نهاية السنة الأولى من العمر (حوالى ٩ كجم).
- ٣- حيوية الطفل ويقظته وحبه للاستطلاع لما حوله.
- ٤- بريق العينين وعدم وجود دوائر سوداء تحتها.
- ٥- لمعان الشعر.
- ٦- ميل لون الجلد إلى الاحمرار.
- ٧- التمتع بشهية جيدة وسلامة الهضم.

## ٢- تغذية الطفل الرضيع ناقص الوزن Low Birth Weight Children :

الطفل ناقص الوزن هو الطفل الذى يولد بوزن أقل من ٢٥٠٠ جم وهذا يستخدم كمؤشر على صحة الأم وحالتها التغذوية قبل وخلال الحمل وكذلك صحة الطفل. والوزن الطبيعي للطفل يتراوح بين ٣ - ٤ كجم عند الميلاد. وعادة يولد الأطفال بعد اكتمال ٣٧ - ٤٠ أسبوع، ولكن الأطفال ناقصى الوزن يولدون قبل اكتمال ٣٧ أسبوع من الحمل. ويوجد نوعان من الأطفال ناقصى الوزن : الطفل المبترس Premature وهو الذى ولد قبل تمام فترة الحمل ولكن وزنه مناسب مع عمر الحمل gestational age، والطفل المتأخر فى نموه داخل الرحم intra-uterine growth retardation (IUGR) وهو الذى يولد قبل إتمام فترة الحمل وقد يولد بعد إتمام فترة الحمل.

ويكون هؤلاء الأطفال عرضة للإصابة بحالات سوء التغذية malnutrition وأيضاً بالعدوى وخصوصاً أنه يكتسب المناعة ضد الأمراض من الأجسام المضادة التى تصل إليه عن طريق الأم، والمعروف أن المناعة تزيد كلما طالت فترة الحمل. يواجه الطفل غير مكتمل النمو مشكلات غذائية، فاحتياجاته من الطاقة مرتفعة، وأيضاً من بعض العناصر الغذائية خصوصاً فيتامين C، وامتصاصه ضعيف للدهون والفيتامينات الذائبة فيها، ومعدل طاقة الميثابوليزم القاعدى مرتفعة، وسرعة نموه عالية، ومعدل فقد الحرارة عن طريق الإخراج مرتفعة نظراً لضعف امتصاص الدهون.

ويعتبر لبن الأم الغذاء الأمثل للطفل غير مكتمل النمو، وإن كان يعتبر البعض أن نسبة بروتين لبن الأم منخفضة، والمعروف أنه يزيد احتجاز النيتروجين بارتفاع نسبة بروتين الغذاء ولكن مدى استفادة الطفل من هذه الزيادة غير معروف. يمكن تعويض ضعف امتصاص الدهون والفيتامينات القابلة للذوبان فى الماء بزيادة الدخل من هذه العناصر ويحتاج الطفل إلى فيتامين C بكميات أكبر من الطفل العادى، وخصوصاً مع زيادة البروتين، وقد أظهر Levene و Gordon (١٩٧٧) أن نقص فيتامين C يقلل من ميثابوليزم بعض الأحماض الأمينية مثل phenylalanine و tyrosine كما لوحظ احتياج الطفل إلى فيتامين D، ويحتاج إلى إعطائه حديد ابتداء من الشهر الثانى.

وعموماً يحتاج هذا الطفل إلى الطاقة بمعدل يزيد عن ١٢٥ طاقة / كجم، ولكن يجب ألا تزيد عن ذلك حيث أنها قد تسبب آثاراً جانبية. ويكون احتياجاته من البروتين تصل إلى ٢,٨ جم / ١٠٠ كالورى أى أنها احتياجات مرتفعة وذلك بالنسبة للطفل الذى وزنه ١٥٠٠ جم إلى ٢٥٠٠ جم. فى حين يكون الاحتياج بمعدل ٢,١ جم بروتين / ١٠٠ كالورى لمن يصل وزن أعلى من ذلك وعادة تصل نسبة الدهون المتناولة إلى ما يعادل ٥٠ ٪ من الطاقة وحوالى ٤٠ ٪ فى صورة سكريات ثنائية إذا تحملها وإلا فيعطى سكريات أحادية.

يلاحظ أن هؤلاء الأطفال يولدون وليس لديهم إلا قدر ضئيل من احتياطي الدهن فى جسمهم، ولهذا فهم يعتمدون كلياً على ما يقدم لهم فى طعامهم، ولابد من الاهتمام بتناولهم الأحماض الدهنية عديدة عدم التشبع، وينصح WHO / FAO (١٩٩٧) أن يحتوى تركيب لبن الأطفال المبتسرين على أحماض دهنية طويلة عديدة عدم التشبع الأساسية بما يعادل ٥,٦ ٪ من إجمالى طاقة الغذاء. ويمكن تحقيق ذلك بأن يحتوى غذاء الطفل بالنسبة لكل كجم من وزنه : ٧٠٠ ملجم حامض لينوليك linoleic، ٥٠ ملجم حامض الفا لينولينك  $\alpha$ -linolenic، و ٦٠ ملجم من حامض أراكيدونيك arachidonic وما يتبعه من أحماض من عائلة w-6 و ٤٠ ملجم من DHA.

وعلى أى حال فهناك حاجة للمزيد من الدراسات فى هذا الموضوع.

### ٣- تغذية الطفل فى مرحلة ما قبل المدرسة :

#### Pre-School Child Nutrition :

##### مقدمة :

تبدأ هذه المرحلة من بعد الفطام حتى سن ٦ سنوات سن الالتحاق بالمدرسة وعادة يكون الطفل أكثر أفراد الأسرة سوءاً فى التغذية حيث أنه لا يعطى العناية الكافية التى كان يحصل عليها وهو طفل رضيع كما أنه أصغر من أن يطعم نفسه بنفسه، يجب أن يأخذ الطفل كفايته من الأغذية البروتينية وخاصة البروتين الحيوانى اللازم لنموه طبيعياً وخصوصاً هذه الفترة القصيرة التى هى فترة نمو سريع وحتى لا يكون الطفل معرضاً للإصابة بأمراض البرد والسعال وأمراض سوء التغذية.



وتنقسم هذه الفترة إلى مرحلتين :

- مرحلة الطفولة المبكرة toddler stage من سن ١ - ٣.

- مرحلة ما قبل المدرسة preschool stage من ٤ - ٦ سنة.

ولكى تكون تغذية الطفل سليمة وصحية لابد أن تناسب سرعة نموه حيث أن سرعة نمو الطفل خلال السنة الثانية أقل منه في السنة الأولى وبناء عليه يحتاج الطفل إلى كميات أقل / كجم من وزنه وتقل شهيته ومع ذلك فلا بد من التركيز والاهتمام بعناصر البروتين والكالسيوم والفوسفور والمغنسيوم والزنك، مع الاعتماد على اللبن كمادة غذائية أساسية ولابد من العناية بتغذية الطفل حتى يكون المخزون في جسمه مناسباً مع التركيز على عدم زيادة السكريات والحلوى عن الحد اللازم لأن ذلك يكون على حساب العناصر الغذائية الأخرى وخصوصاً وكما سبق فإن السكريات مصدر للسعرات الجوفاء. وحتى لا يكون هناك إفراط في تناول الطاقة مما يؤدي إلى البدانة وما يليها من مخاطر.

### **الاحتياجات الغذائية :**

ويوضح المتخصصون في التغذية أن تكون العناصر الغذائية المتناولة كما يلي :

#### **الطاقة :**

يحصل ١٠٢ كالورى / كجم من وزن الطفل عمره ١-٣ سنة (١٨٠٠ كالورى/ اليوم)، ٩٠ كالورى للمرحلة التالية ٤ - ٦ سنة (٢٠٠٠ كالورى / يوم). البروتين: ١٦ جم للطفل عمر ١-٣ سنة، ٢٤ جم للطفل في عمر ٤-٦ سنة. بمعدل ١,٦ جم / كجم وزن، ولابد أن يكون عالى القيمة التغذوية مع توافر العناصر الغذائية الأخرى.

#### **الدهون:**

تكون الدهون بما يعادل من ٣٠-٤٠٪، وقد تصل إلى ٥٠ ٪ من السعرات ويفضل ألا تزيد عن ذلك حتى لا يتعرض للبدانة، كما يفضل ألا يقل عن ٣٠٪ كما سبق، وحتى يكون طعم الغذاء مستساغاً.

#### **الفيتامينات والمعادن :**

تعتبر هذه العناصر هامة أيضاً ومعدل احتياج الطفل لها مرتفعاً حتى يكون نموه وتطوره طبيعياً والاحتياجات من الفيتامينات والمعادن (جدول ١٠ - ٧).

جدول (٧-١٠) الكميات الموصى بها من الفيتامينات والمعادن للطفل حتى نهاية مرحلة الطفولة (١٩٨٩ RDA)

المعادن										الفيثامينات التي تلوث في الماء					الفيثامينات التي تلوث في الدهن				
سليسيوم	براد	زنك	حديد	مغنسيوم	فوسفور	كالكسيوم	C	B <sub>12</sub>	فولامين	B <sub>6</sub>	مليج	ثيامين	ريبوللاين	ثاين	k	E	D	A	الطرر
ميكرو	جرام	مليج	مليج	مليج	مليج	مليج	مليج	ميكرو	جرام	مليج	مليج	مليج	مليج	مليج	مليج	مليج	مليج	مليج	مليج
١٥	٥٠	٥	١٠	٦٠	٥٠٠	٦٠٠	٣٥	٠,٥	٣٥	٠,٦	٦	٠,٥	٠,٥	٠,٤	١٠	٤	١٠	٣٧٥	١
٢٠	٧٠	١٠	١٠	٨٠	٨٠٠	٨٠٠	٤٠	٠,٧	٥٠	١,٠	٩	٠,٨	٠,٧	١٥	١٥	٦	١٠	٤٠٠	٣-١
٢٠	٩٠	١٠	١٠	١٢٠	٨٠٠	٨٠٠	٤٥	١,٠	٧٥	١,١	١٢	١,١	٠,٩	٢٠	٢٠	٧	١٠	٥٠٠	٦-٤
٣٠	١٢٠	١٠	١٠	١٧٠	٨٠٠	٨٠٠	٤٥	١,٤	١٠٠	١,٤	١٣	١,٢	١,٠	٣٠	٣٠	٧	١٠	٧٠٠	١٠-٧

#### ٤ - تغذية الطفل فى عمر ٧ - ١٠ سنوات :

##### الاحتياجات الغذائية :

##### احتياجات الطاقة :

يحتاج الطفل فى هذه المرحلة إلى الطاقة بمعدل ٧٠ كالورى / كجم وزن الجسم (٢٠٠٠ كالورى / يوم).

##### احتياجات البروتين :

تبدأ احتياجات البروتين بمعدل ١,٦ جم / كجم من الوزن ثم تقل تدريجياً إلى ٠,٨ جم / كجم للأنثى، و ٠,٩ جم / كجم للذكر. على أن يكون عالى القيمة التغذوية مع توافر العناصر الغذائية الأخرى.

##### احتياجات الدهون :

تكون الدهون بمعدل ٣٠ ٪ من الطاقة الكلية وينبغى ألا تقل أو تزيد عن ذلك.

##### الفيتامينات والمعادن :

تلعب المعادن دوراً هاماً للجسم رغم أن نسبتها ضئيلة فى الجسم لا تزيد عن ٣-٤ ٪ ولا بد أن يعطى الطفل احتياجاته من الفيتامينات والمعادن كما هو موضح فى جدول (١٠-٥).

#### العوامل المؤثرة فى تغذية الطفل :

عند تقييم تغذية الطفل لابد من الأخذ فى الاعتبار جميع العوامل المؤثرة فى ذلك، ليس فقط كمية الغذاء ونوعيته بل أيضاً العوامل المحيطة بذلك لأنها تؤثر تأثيراً كبيراً فيما يأكله الطفل، فالعوامل الأسرية التى تتضمن المستوى الاقتصادى ودورها الكبير فى تحديد نوعية وكمية الغذاء المقدم، بل أيضاً مستوى وعى الأم بأهمية الغذاء وما به من عناصر غذائية مختلفة بجانب الاهتمام بالعادات والتقاليد المنتشرة، وأنواع الأغذية المفضلة والمتجنبة، وخصوصاً بواسطة الأم؛ لأن الأم تقدم ما تحبه من أغذية وأطعمة وتجنب تلك الأغذية التى لا تحبها رغم أنها قد تكون عالية القيمة التغذوية، وكذلك المناخ الأسرى وأسلوب معاملة الطفل عند تقديم الطعام له، فقد يكون هذا الأسلوب فيه من المعاملة السيئة ما يجعل الطفل يربط بين تناول الطعام وهذه المعاملة، فيكره الطفل الطعام. ولهذا لابد أن يحاط الطفل بحور من السعادة تجعله يقبل على الطعام بشهية.. علاوة على أن حالة الطفل من جوع أو شبع وقت تقديم الطعام لابد أن تؤخذ فى الاعتبار، ولذا يفضل أن تقدم أغذية بين الوجبات (تصبيرة) قبل ميعاد الوجبة بوقت كاف.. وينصح الآباء بتعليم أطفالهم كيفية اختيار الأغذية حتى تكون

عندهم عادات سليمة، خصوصاً وأنه يقضى يومه الدراسى فى المدرسة ويأخذ مصروفه اليومى ويشترى بحرية تامة من مطعم المدرسة.. فإذا لم يتعلم أسس اختيار الأغذية فقد يركز فى اختيار الأطعمة ذات السعرات الجوفاء الخالية من العناصر الغذائية الأخرى، ويتكرر ذلك يومياً فإنه يتعرض لنقص فى الفيتامينات والمعادن، وخصوصاً إذا لم يعرضه فى المنزل، مع ملاحظة أن نسبة كبيرة من الأطفال لا تفضل تناول الخضروات.. كما أن هذا السلوك المتكرر يعرض الطفل لزيادة الوزن تدريجياً، إما بزيادة ترسيب الدهن الناتج من السعرات الزائدة عن الحاجة فى الخلايا الدهنية الموجودة hypertrophy، وهذا هو الأرجح، أو بزيادة فى عدد الخلايا الدهنية hyperplasia، وغالباً ما يتعرض هؤلاء الأطفال للسمنة وما يتبعها من متاعب صحية. علاوة على أن زيادة تناول الحلوى والمشروبات الغازية دون زيادة فى الفم يعرض الأسنان للتسوس.

كما يتعرض الأطفال للإصابة بالأنيميا نظراً لأنهم فى مرحلة نمو ويحتاجون إلى العناية فى غذائهم على أن يكون غنياً بالعناصر التى تنمى من الأنيميا مثل الحديد والنحاس والبروتين وبعض الفيتامينات... وقد تكون وجباتهم ناقصة فى واحد أو أكثر من هذه العناصر مما يؤدي إلى إصابتهم بالأنيميا وخصوصاً فى حالة إصابتهم بحالات إسهال أو أمراض معدية مزمنة أو الإصابة بالطفيليات أو إلى حالات فقدان الدم المتكرر.

وكثير من الأطفال لا يجدون الوقت الكافى صباحاً لتناول وجبة الإفطار، والبعض منهم لا يجد أى شهية لتناول الطعام، وهذا الإجراء سئ للغاية، إذ أن وجبة الإفطار تأتى بعد انقضاء حوالى عشرة ساعات على آخر وجبة تناوله، وهى وجبة العشاء فى اليوم السابق... فلا يستطيع الطفل التركيز فى الفصل أو متابعة شرح المدرس وفهمه كما ظهر من الدراسات العديدة، كما أن الجوع يجعل الطفل قلقاً... ولهذا لابد من الاهتمام بهذه الوجبة حتى يمكن إعطاء الطاقة اللازمة لعمل المخ وتشغيله وإشباع حاجة الطفل من العناصر الغذائية، فيمكن قضاء اليوم المدرسى دون التعرض لأى مشكلات.

ولابد من العناية بنوعية الأغذية التى يتناولها الطفل بين الوجبت لأنها لابد أن تكون ذات قيمة تغذوية عالية دون الاعتماد على الأغذية السريعة ذات المحتوى العالى من السعرات الجوفاء أو ما بها من ألوان صناعية ضارة بالصحة.

## رابعاً : التغذية فى مرحلة المراهقة (١١ - ١٨ سنة)

### Nutrition For Adolescents :

**مقدمة :** تعتبر فترة المراهقة امتداد لفترة الطفولة وهى الفترة الثانية للنمو السريع ويرافقها تغيرات جسمية تودى فى النهاية إلى البلوغ adulthood. وليس من السهل التمييز بين مراحل النمو فهى متداخلة ودائماً يوصف المراهقون بأنهم ذوو عادات غذائية سيئة.

وخلال هذه المرحلة يزداد وزن المراهق. ولذا فهناك احتياجات لا بد من سدها حتى لا يدخل فى مشاكل سوء التغذية.

وبصفة عامة تنقسم فترة المراهقة إلى قسمين: المراهقة المبكرة early adolescence (١١-١٤ سنة) والمراهقة المتأخرة late adolescence (١٥ - ١٨ سنة).

### الاحتياجات الغذائية :

#### الاحتياج للطاقة :

يحتاج الذكور بمعدل ٥٥ كالورى / كجم من الوزن (٢٥٠٠ كالورى / اليوم) للمرحلة الأولى من المراهقة و٤٥ كالورى / كجم من الوزن (٣٠٠٠ كالورى اليوم) للمرحلة الثانية أما الإناث فالاحتياج بمعدل ٤٧/كجم وزن الجسم (٢٢٠٠ كالورى / يوم) للمرحلة الأولى من المراهقة و٤٠ كالورى / كجم من الوزن (٢٢٠٠ كالورى / يوم) للمرحلة الثانية.

#### الاحتياج للبروتين :

يعتبر احتياج البروتين من الاحتياجات المرتفعة لهذه المرحلة وتكون فى المتوسط ٥٠ - ٦٠ جم / اليوم ولو أن الدراسات الحالية توصى ٤٥ - ٧٢ جم / اليوم.

#### الاحتياجات للفيتمينات والمعادن :

تعتبر هذه العناصر من العوامل المهمة للتغذية السليمة وخصوصاً وأن المراهق يستمر جسمه فى الزيادة كما أن عمليات الميتابوليزم نشطة ولا بد من توفير متطلبات هذه الأنشطة. ويوضح جدول (١٠-٨) الكميات الموصى بها من الفيتامينات والمعادن.



ويوضح جدول (٩-١٠) تطور تركيب الجسم من بعض العناصر الغذائية من الطفولة إلى البلوغ وهذا يعكس تغير الاحتياجات الغذائية خلال مراحل العمر المختلفة.

جدول (٩-١٠) تطور تركيب جسم الإنسان  
من بعض العناصر الغذائية خلال مراحل العمر المختلفة<sup>(١)</sup>

البيان	الطفل المكتمل النمو عند الميلاد	طفل ذكر عمره ٤,٥ سنة	شخص بالغ
وزن الجسم كجم تركيب الجسم <sup>(٢)</sup>	٣,٥	١٤,٠	٦٥,٠
ماء جم	٨٢٣,٠	٦٩٥,٠	٣٢٠,٠
N كلى جم	٢٢,٦	٣٨,٢	٣٤,٠
Na مليمكافئ	٨٢,٠	-	٨٠,٠
K مليمكافئ	٥٣,٠	٦٥,٠	٦٩,٠
Cl مليمكافئ	٥٥,٠	-	٥٠,٠
Ca جم	٩,٦	٢١,١	٢٢,٤
P جم	٥,٦	١٠,٥	١٢,٠
Mg جم	٠,٢٦	٠,٣٦	٠,٤٧
Fe ملجم	٩٣,٩	٦٤,٢	٧٤,٠
Cu ملجم	٤,٧	٣,٣	١,٧
Zn ملجم	١٩,٢	٢٢,٣	٢٨,٠

(١) المصدر : Pike و Brown (١٩٧٥).

(٢) تم الحساب لكل كجم من وزن الجسم الخالي من الدهن.

### المشاكل الغذائية التي يتعرض لها الفرد خلال فترة المراهقة :

يتعرض المراهقون إلى بعض المشاكل الناتجة عن سوء التغذية، من بينها الإصابة بالأنيميا، وخصوصاً المراهقات، لأسباب متعددة منها نقص الحديد فقد

أظهرت العديد من الدراسات أن متوسط ما تتناوله الفتاة فى هذا العمر يعادل تقريباً ٥٠٪ من الاحتياجات الغذائية، ويرجع هذا إلى تقليل عدد الوجبات اليومية بغرض خفض الوزن وتجنب البدانة، أو إلى اتباع أسلوب غير سليم فى اختيار الوجبات، أو انخفاض الرعى بأهمية التغذية السليمة أو إلى انخفاض المستوى الاقتصادى للأسرة مما لا يتيح فرصة لتناول الأغذية ذات القيمة التغذوية المرتفعة، هذا علاوة على فقد الدم أثناء الدورة الشهرية، ولذا تنتشر الأنيميا بين الإناث أكثر من الذكور.

كما يتعرض المراهقون إلى زيادة الوزن والبدانة، وخصوصاً بين الذكور، هذا يرجع لأسباب عدة، منها انخفاض الرعى التغذوى نظراً لعدم تدريبهم التدريب الصحيح لاختيار الأطعمة والأغذية المناسبة.

ويكثر الشباب من الجنسين على تناول الوجبات السريعة مثل همبرجر hamburger، الدجاج المحمر، البطاطس المقلية chips، وهى وجبات تقدم سريعاً دون فترة انتظار طويلة، كما أن بعضها يلائم مصروفهم اليومى ويعتبرها البعض منهم مظهراً حضارياً.

ولكن هذه الوجبات مرتفعة فى محتواها من الطاقة والأحماض الدهنية المشبعة، فمثلاً قطعتين من الدجاج المحمر تحتوى على ٦٧٥ كالورى، قطعة كبيرة من الهمبرجر hamburger تعطى ٦٣٠ كالورى، كارب لبن محلى بالشيكولاتة يعطى ٣٨٣ كالورى. علاوة على أن هذه الوجبات منخفضة فى محتواها من فيتامين A ومن الألياف، وقد تكون مرتفعة فى ملح الطعام.

كما أن الفرد قد يتعرض لمشاكل حياتية أو مشاكل متعلقة بدراسته أو تعامله مع زملائه أو أفراد أسرته الذين ينظرون إليه على أنه مازال طفلاً إلا أن تطلعاته تجعله ينظر لنفسه على أنه شخص ناضج مسئول، ومن ثم يتعرض لصراع نفسى، وقد يدفعه ذلك إلى زيادة تناوله للأكل... كما أن هذه الظروف تؤدى إلى عدم قدرة الفرد على صنع القرار الصائب وإصداره...

ولهذا من الضروري توعية الأسرة بدور التغذية فى تجنب الوقوع فى مشكلات صحية لها أبعاد نفسية، سلوكية وعقلية.

وتجدر الإشارة إلى أهمية التغذية بالنسبة لجميع الفئات من بينها تلاميذ



وطلاب المدارس والجامعات وذلك لأهميتها ليس فقط للنمو والتطور بل أيضًا في الأداء التفكيرى لأن الفرد يحتاج إمداده بالتغذية الصحية التى يحتاجها المخ البشرى فيتمكن من أداء أنشطته العقلية من تفكير وإصدار القرار الصائب وحلرل المشكلات إذ أن سوء التغذية يؤدى إلى اضطراب فى التفكير وفى أداء وظائف المخ. إن المخ هو العضو الذى يوجد فى تجويف الرأس، ويمثل بعد اكتمال نضجه ٢٪ تقريبًا من وزن الإنسان البالغ.

ورغم صغر حجم المخ إلا أنه يعتبر من أهم أعضاء الجسم إن لم يكن الأهم وذلك لأنه يعتبر جهاز التحكم والتشغيل لكل أعضاء الجسم بكافة وظائفها بالإضافة إلى ذلك فالمخ لا تتجدد خلاياه بمعنى إذ تلفت خلية من خلاياه بعد أن يصل حجمه النهائى فإن هذه الخلية لا تنمو بدلاً منها. فإذا علمنا أن للتغذية أثر كبير على المخ من حيث تركيبه ووظائفه فإننا يجب أن نهتم بتغذية المخ حتى نحافظ عليه وعلى وظائفه وبالتالي نحافظ على جسم الإنسان فى حالة صحية ووظيفية جيدة.

ويتتركب المخ من نصفين كرويين يُعَن وأيسر ومن ١٠-١٠٠ مليون خلية عصبية دائمة الشحن. ويتصل بكل خلية من ١٠-١٠٠ ألف من الشعيرات العصبية التى تعمل كوصلات ولجمع المعلومات.

وتلعب التغذية دورًا هامًا فى بناء المخ وتطوره وفى أداء المخ لوظائفه ومن بينها التعليم والتحصي. ومعروف أن سوء التغذية فى المراحل الأولى من الحياة يؤدى إلى تأخير النمو الجسمى وبطء المخ وتعثر التعلم واضطراب وعدم القدرة على التركيز وتغير السلوك وهذا يصاحبه صغر حجم المخ وخفض عدد خلاياه وتغير فى وضع وشكل الخلايا العصبية وهذه التغيرات من الصعب تصحيحها وخصوصًا إذا كانت فى مرحلة مبكرة من العمر وكانت مصحوبة بنقص شديد فى البروتين والطاقة (Scrimshaw ١٩٦٨) و (Coursin ١٩٧٢).

ويتوقف تشغيل المخ بصفة أساسية على التغذية ونوعيتها فهى مصدر المواد العصبية الناقلة neurotransmitters وحاملة المعلومة فى صورة نبضة عصبية فى الاتجاه الصحيح والتشغيل المطلوب.

وتبرز أهمية التغذية لكل نصف كروى للمخ فى تشغيل استراتيجيات تشغيل

المعلومات التي تستخدمها فالنصف الكروى الأيسر للمخ البشرى مسئول عن التفكير الخطىى التابعى والتفكير التحليلى والتفكير المنطقى والفروض المجردة وتشغيل المعلومات فى أجزاء صغيرة متتابعة والتعليم اللفظى، أما وظائف النصف الكروى الأيمن للمخ تتضمن نطاق التفكير الفرضى والتفكير المكاني والمثيرات غير المألوفة والتخيل والإبداع والعاطفة واستقبال الصور (فؤاد قلادة ١٩٩٢).

وقد ذكر Trevathen (١٩٩٠) أن الاختلاف فى وظائف كل نصف كروى ترجع إلى نوع المرصل العصبى neurotransmitter وأن المواد العصبية الناقلة هى عناصر غذائية مرتبطة بالتغذية والعمليات التغذوية أى أن التغذية وأنواع الأغذية المتناولة تشكل الحجر الأساسى فى عملية تعليم الفرد وتساعد التغذية على التحصيل الجيد وقيام المخ بوظائفه على الوجه الأكمل ومن المواد العصبية الناقلة السيروتونين serotonin الذى يتكون من الحامض الأمينى تريبتوفان tryptophan الكاتكولامين catecholamine ويتكون من الحامض الأمينى تيروسين tyrosine والاستيل كولين acetylcholine ويتكون من الكولين choline.

كما تلعب المواد المعدنية دوراً فى التعلم، حيث يعمل التبادل الأيونى لكل من الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم فى الخلايا والموصلات العصبية على إفراز المواد العصبية الناقلة كما أن نشاط الإنزيمات اللازمة يتوقف على وجود أيونات الكالسيوم والمغنسيوم (Brown و Pike ١٩٧٥). كما يساعد النياسين فى ورود الدم إلى المخ ولذا فهناك حاجة ماسة إلى دراسة العلاقة بين التغذية وغط التفكير والتعليم.

وفى الدراسات الخاصة بالغذاء ودوره فى تكوين المواد العصبية الناقلة، أشار Rawls (١٩٧٨)<sup>(٦)</sup> إلى ضرورة وجود المولدات العصبية الناقلة فى الغذاء حتى يستطيع المخ تأدية وظائفه فى التحصيل والتفكير وإصدار القرار وتوجيه السلوك توجيهاً سليماً وحل المشكلات والإبداع.

ولتوضيح العلاقة الوثيقة بين السلوك الغذائى للفرد وتعلمه، فمثلاً الاستيل كولين له دور فى قدرة الفرد على التعلم بحيث إذا نقص هذا المرصل نتيجة تناول

(٦) ليفيس نوار وآخرون.

مضاداته تعرض الفرد إلى مشكلات وصعوبات تؤدي إلى انخفاض قدرته على التعلم واضطرابات وتعثّر في الحركة.

ومن الجانب الآخر إن للعوامل الاقتصادية والاجتماعية دور ليس قليلاً في نمو الفرد وتغذيته وتعلمه. فليس من قبيل الحديث المعاد توضيح العلاقة الوثيقة بين تأثير العوامل الاقتصادية على اختيار وتخطيط الوجبات الغذائية ونوعيتها ودور تلك العوامل على إشباع حاجات الفرد البيولوجية والنفسية والاجتماعية وعدم تعرض الفرد إلى احباطات تؤثر على تعلمه.

وبنفس الحديث عن العوامل الاقتصادية تتناول العوامل الاجتماعية ودورها في تهيئة المناخ النفسي الصحي السليم وانطلاق قدرات الفرد في حرية بعيدة عن القهر والكبت والاحباطات.

ولا يختلف الحديث عن أثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية عن ضرورة تهيئة المناخ التربوي الصالح في المدرسة بحيث يعنى بتربية الدارس بعيداً عن الاحباطات بل توفير كل المتطلبات التي يحتاجها وظائف المخ البشرى في التحصيل والإبداع والتفكير الابتكارى.

إن النظرة المعاصرة لتربية الإنسان تقتضى تخطيط متكامل فى التغذية والتنشئة والتحصيل والتعلم، وأوضح Shenour و Elie (١٩٧٧)<sup>٦</sup> تأثير البيئة والتغذية فى البناء الكيميائى الفسيولوجى للجهاز العصبى الذى يشكل سلوك الإنسان فى المواقف التى تصادفه فى الحياة، وقد أشار فؤاد قلادة (١٩٩٣) عن Clark إلى علاقة المثيرات البيئية بزيادة عدد خلايا الجليا Gilia التى تحيط بالخلايا العصبية والتى يكون لها دور كبير فى تغذية المخ البشرى بالمعلومات كما تستخدم كغلاف يضم المخ وفى تشكيل الخلية العصبية ومحورها لتصبح موصلًا جيدًا وسريعًا لضخ الإشارات الخارجة من الخلية العصبية بسهولة ويسر وبدون هذا التغليف للخلايا ومحورها تسرب المعلومات الواردة وتنتشر دون أن يتم لها الوصول إلى جسم الخلية أو تخزينها فى الذاكرة. إن زيادة عدد خلايا الجليا Gilia تزيد من قوة الشحن العصبى للخلايا وخروج النبضات العصبية من وإلى المحور والخلايا المجاورة.

<sup>٦</sup> إيزيس نوار وآخرون.

غير أن زيادة تلك الخلايا مرهون بتوفير العوامل البيئية المناسبة والمواقف التعليمية التي يوجد بها الدارس. فالبيئة الثرية المشوقة والمرغوبة للدارس والبعيدة عن الإحباطات تزيد الدافعية لاكتساب المعلومات التي يحملها المثير بحيث تتحول عن طريق الأعصاب الحسية إلى منبهات عصبية تزيد من خلايا الجلياء، وبالتالي تزداد سرعة نشاط الأصلة العصبية، ويزداد تبادل النبضة العصبية الواردة من خلية إلى أخرى فتسمح لأنماط معقدة للتفكير من العمل بسرعة لإتمام عملية التعلم.

وقد أوضح جونسون Johnson (١٩٨٥) في دراسته بأن المخ البشرى يشير العضلات في كونها تعمل بأقصى مستوياتها عندما تعطى المهام المطلوبة، فإذا ما كانت تلك المهام شاقة ومعقدة ولكنها مقدمة للدارس بدافعية مشوقة، فإن تلك الاستراتيجيات في التدريس التي تتوفر فيها تلك الدافعية والتشويق تنشط النصفين الكرويين الأيسر والأيمن للمخ ويحدث التفاعل بينهما. أما التدريبات المملة غير السارة للتلاميذ تؤدي إلى غلق البوابات التي تصل بين النصفين الكرويين. ومن ثم فإن العوامل النفسية السارة لا تؤدي فقط إلى توفير متطلبات تشغيل وظائف المخ في التعلم ولكن أيضاً تزيد من قدرة الفرد على الاستفادة من الغذاء الصالح وتمثيله وظيفياً ويؤدي إلى إتمام أداء الغذاء لوظائفه للجسم وللمخ البشرى على وجه الخصوص.

إن عملية بناء الإنسان تتطلب الآن تخطيطاً متكاملأ في التخطيط التغذوي مصححاً بتخطيط المناهج والبرامج التعليمية على اعتبارها تغذية معرفية موجهة إلى برجة المخ بالمعلومات المفيدة. وكذا بتوفير المناخ الاقتصادي والاجتماعي الصالح والمناسب لتشغيل وظائف الأجهزة المختلف في جسم الإنسان والمخ خصوصاً.

وعند الحديث عن عملية محتوى التغذية المعلوماتية المتعلقة بالمنهج والبرامج التعليمية التي تهيم التعلم السليم يجب إتاحة الفرصة للمتخصصين في تخطيط عملية التعلم بحيث تكون في صورة محتوى متوازن ومتكامل مع وظائف النصفين الكرويين الأيسر والأيمن للمخ البشرى. إذ ثبت أنه بالرغم من كون كل نصف كروي له وظائف المتخصصة، فإنه توجد علاقة بين جانبي المخ، بمعنى أن كل نصف كروي يشارك في الوظائف للنصف الكروي الآخر، كما أن كلاً من النصفين الكرويين يشارك بعضهما البعض في معظم الأنشطة بصورة متكاملة. وكما يشير فؤاد قلادة

(١٩٩٣) أنه بالرغم من هذه المشاركة الثنائية، إلا أن كل نصف كروى يقوم بتشغيل المعلومات تشغيلاً مختلفاً عن النصف الآخر إذا توافرت عناصر التغذية والغذاء الصالح المناسب.

تقود المناقشة السابقة إلى مسألة هامة وهى ضرورة تخطيط البرامج التغذوية والتعليمية والبيئية تخطيطاً سليماً يودى إلى تعلم سليم وتفكير مبدع بناء وسلوك سوى ويغير هذه النظرة التكاملية فى بناء الإنسان يكون النمر العقلى والنفسى عشوائياً أحياناً، ومتضارباً أحياناً أخرى.

إن قدرة الفرد على تكوين المواد العصبية الناقلة واللازمة لتشغيل المخ تختلف باختلاف نوعية الغذاء ومحتوى الوجبة. فمثلاً تناول البروتين يقلل من وصول الحمض الأميني تريبتوفان إلى المخ فينخفض مستوى serotonin فى المخ نظراً لأن البروتين يمد الدم بأحماض أمينية أخرى تعطل من وصول tryptophan للمخ ولكن تناول الكربوهيدرات يعمل على إفراز البنكريات للأنسولين الذى يعمل على سحب الأحماض الأمينية المنافسة إلى tryptophan إلى العضلات. وكذا يعمل على انفصال الأحماض الدهنية الحرة عن الألبومين مما يساعد على وصول tryptophan إلى المخ. ويزيد تأثير المواد النشوية عن المواد السكرية Wurtman (١٩٨٧) وخصوصاً وجبة الإفطار (Ashly ١٩٨٦).

ومن جهة أخرى فإن تأثير البروتين على tryptophan يختلف باختلاف نوعية البروتين والأحماض الأمينية فقد وجد Wurtman (١٩٨٧) أن الكازين وهو غنى فى tryptophan لا يقلل من وصول tryptophan إلى المخ مثل غيره من البروتينات لأن الكازين لا يقلل من تأثير الكربوهيدرات بالنسبة لوصول tryptophan إلى المخ بعكس الجيلاتين وهو فقير فى tryptophan فإنه يوقف فعل الكربوهيدرات وهذا يوضح أهمية تناول اللبن.

كما تختلف قدرة الفرد على تكوين المواد العصبية الناقلة حسب قوام الجسم فالشخص البدين تقل قدرته على تكوين المواد العصبية الناقلة مثل serotonin وذلك لأن مستوى tryptophan فى الفرد البدين منخفض مما يعكس ارتفاع مستوى الأحماض الأمينية الأخرى نتيجة لمقاومة فعل الأنسولين وخصوصاً إذا تناول الفرد وجبة غنية فى البروتين ومنخفضة فى الكربوهيدرات.

وتتأثر قدرة المخ على تكوين المواد العصبية الناقلة حسب درجة توازن الأحماض الأمينية حيث وجد Dalal وآخرون (١٩٨٧) أن زيادة الحمض الأميني leucine خصوصاً في وجة منخفضة في البروتين يقلل من قدرة المخ على تكوين المواد العصبية الناقلة كما ظهر في الفئران أن التغذية على نشا الذرة أدت إلى انخفاض المواد العصبية المتكونة. أما زيادة الحامض الأميني lysine لا يقلل من قدرة المخ على تكوين المواد العصبية (Yokogoshi وآخرون ١٩٨٦).

وتقوم الناقلات العصبية بدور هام في التعلم والتذكر فوجود المثير يعمل على إفراز المواد العصبية الناقلة مثل سيروتونين serotonin وهذا يؤدي إلى تكوين الأدينين الدائر أحادى الفورسفات CAMP وكذا أيونات بوتاسيوم كما يزيد حساسية جدار الخلية وينتج عن ذلك دخول أيونات الكالسيوم لداخل الخلية فيفرز الموصل العصبى وينشط الأعصاب (Byrne وآخرون ١٩٩١).

وذكر Richer و Segal (١٩٩٣)، أن المرصلين العصبيين الاستيل كولين acetylcholine وسيروتونين serotonin يتفاعلان معاً فيسهل للمخ القيام بوظائفه المعرفية وأن انخفاض مستواه يقلل من القدرة على التعلم وإخلال بوظيفة التذكر إلا أن Stecker و Sahgal (١٩٩٥) وجدوا أن الاستيل كولين مع الجلوتاميت glutamate يلعبان معاً دوراً كبيراً في التذكر.

إن عملية الميتابوليزم التي تتم بصورة مستمرة غير منقطعة في الجسم ينتج عنها نواتج ميتابوليزمية ومواد حرة تعيق التعلم وتقلل نشاط المخ والقدرة على التذكر إلا أن الوسط ينقى من هذه المواد بواسطة Dopamine و noreinephrine و CAMP (Cai وآخرون ١٩٩٤).

وعند تعلم خيرة أو معلومة جديدة فإن خبرات أو معلومات سابقة قد يتذكرها الإنسان وتحدث تشويشاً على ما يتعلمه ولكن Hasselmo (١٩٩٥) وجد أن المرصلات العصبية تعمل على زيادة إثارة المرصلات العصبية أحياناً وتقلل أو تمنع الإثارة أحياناً أخرى وهذا يمنع تذكر الخبرات السابقة فيمنع التشوش.

وعند التعلم في حالة التعب أو عدم كفاية نوم الإنسان فإن الموصل العصبى كاتكرلامين Catecholamine يحسن من القدرة على التعلم (Branes و Branes ١٩٩٢).

وبالنسبة للنصفين الكرويين فقد وجد Kruglikov وآخرون (١٩٩١) أن noradrenaline أكثر تركيزاً في النصف الكروي الأيمن في الفئران.

وفي دراسة أجريت في جاميكا على الأطفال مختلفى الأطوال (Mcgrcor وآخرون ١٩٩١) ظهر أن الأطفال ذوى الطول الطبيعي كانوا يتمتعون بذكاء أعلى من المتقزمين، وأن التغذية الجيدة كان لها أثر إيجابي ذى دلالة على الأطفال وخصوصاً إذا كان مصحوباً بمثيرات اجتماعية.

كما قامت إيزيس نوار وآخرون (١٩٩٦) بدراسة دور التغذية في التحصيل الدراسي ونمط التفكير والتعليم باستخدام اختبار Torrance (صلاح مراد ومحمد مصطفى ١٩٨٢) وذلك لمعرفة استخدام كل نصف كروي على حدة وكليهما معاً - وذلك على عيتين عشوائيتين من تلاميذ وتلميذات المرحلة الإعدادية بمدينتي الإسكندرية وجدة.

وقد أظهرت النتائج علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين التغذية الجيدة والتحصيل الجيد وبالنسبة للعلاقة الارتباطية بين التغذية ونمط التفكير فكانت هناك علاقة ولكنها لم تكن دالة إحصائية، وقد يرجع ذلك إلى صغر حجم العينة وقصر المدة علاوة على عوامل أخرى عديدة منها كما ذكرت Richie (١٩٦٧) أن استفادة الفرد من الغذاء تتوقف على حالته النفسية بجانب العوامل الأخرى المرتبطة.

ولذلك فأوصى البحث بأهمية التوسع في دراسة دور التغذية وعمل المخ.

#### **خامساً: تغذية المسنين Nutrition For The Aged (Geriatric nutrition):**

##### **مقدمة :**

إن تقدم عمر الإنسان aging عملية مستمرة تبدأ من وقت الإخصاب وتنتهى بالموت، ويقصد بتقدم العمر هو تعديل في العمليات الكيميائية الحيوية التي تحدد التغير في التركيب البنائي والوظيفي للخلية وللأنسجة باطراد العمر، والشخص المتقدم في السن هو الشخص الذى يحدث فيه هذا التغير بنسبة حوالى ٦٥٪، ويعدل المرض من هذا التغير، ولكن هذا يحتاج للمزيد من الدراسة. وحيث أن الغذاء عامل ييشى، وأن الإنسان يمكنه التحكم فيه، فيمكن للإنسان أن يستعمل الغذاء كوسيلة لتقليل هذا التغير أو منعه نتيجة مرض، ولكن على أى حال فمطلوب مزيد من الدراسات لمعرفة دور التغذية فى طبيعة وسرعة هذا التغير.

والمرحوظ الآن أن متوسط عمر الإنسان قد ارتفع فى العالم، خصوصاً فى الدول المتقدمة خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، وهذا يرجع إلى عدة عوامل : بها التغذية السليمة وتحسن صحة البيئة وحالة المرافق المنزلية وتقديم وسائل العلاج... الخ.

وهناك مشاكل قد يتعرض لها الفرد نتيجة تغيير فى الجهاز الهضمى مثل نقص إفرازات الغدد المعوية، زيادة رقة جدار الأمعاء أو حدوث إمساك أو فقد أسنان، كما تحدث تغيرات فى تركيب الجسم حيث تقل نسبة العضلات وتزيد نسبة الدهون، وبنائك مشكلات البدانة أو الإصابة بأمراض القلب، وأيضاً سرعة الإصابة بالأمراض المبدئية نتيجة لانخفاض المناعة الطبيعية كما يتأثر حجم الجهاز الهيكلى ومشاشة العظام osteoporosis وبناء على ذلك فللمسنين احتياجات غذائية ولربما أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات فى هذا المجال.

#### **خصائص هذه المرحلة والاحتياجات الغذائية :**

وتختلف متطلبات الفرد أثناء الشيخوخة منه أثناء فترات العمر الأخرى، انخفاض نشاط الفرد يقلل من احتياجاته للسرعات وهى (٢٣٠٠، ١٩٠٠ كالورى / يوم) للذكور والإناث على التوالى. وجد فى الحيوان أن التغذية لفترة طويلة على رجات منخفضة من الطاقة أدى إلى خفض تصلب الكولاجين مما يساعد على مرونة جدر الأوعية الدموية والأربطة والجلد.

أما بالنسبة للبروتين، فإنه لا يوجد فرق كبير بين متطلبات الفرد للبروتين فى هذه المرحلة عن المرحلة السابقة لها، ومن جهة أخرى فقد أظهرت الدراسات أنه بتغذية خمسة من الأفراد فى سن (٥٢ - ٦٨ سنة) مخلوطاً من الأحماض الأمينية الأساسية بمستوى أعلى من المطلوب للتوازن النيتروجينى للشخص البالغ الأصغر سناً مع استعمال glycine لرفع نسبة النيتروجين إلى المستوى الطبيعى فى الغذاء (٧ جم نيتروجين / اليوم) وبعد ١٢ يوماً كان التوازن النيتروجينى فى الخمسة أفراد سالباً (Tuttle وآخرون ١٩٦٧) ويرجع ذلك إما إلى زيادة احتياج المسنين للأحماض الأمينية الأساسية أو لنقص قدرتهم على الاستفادة من glycine. وعموماً فإن قدرة الشخص على الاستفادة من البروتين تقل مما يشير إلى زيادة حاجة البروتين عنه.



المسنين. ولكن من جهة أخرى فقد وجد في الحيوان أن ارتفاع الارجبة فى البروتين أدى إلى اضطراب المناعة.

ويفضل أن يقلل من تناول الدهون، على أن يكون معظم ما يتناوله يحتوى على أحماض دهنية غير مشبعة، ويلاحظ أنه يحدث كثيراً اضطرابات فى ميثابوليزم الكولسترول وارتفاع نسبته فى الدم، مما يؤدى إلى حالة تصلب الشرايين، أما من حيث الكربوهيدرات فقد لوحظ أنه هناك ميل لدى المسنين لزيادة تناول الكربوهيدرات والحلوى، ولكن ينصح بتلافى زيادة الخبز والحلوى نظراً لأن قدرة الفرد على الاستفادة من الكربوهيدرات تقل بتقدم العمر، علاوة على أن كثرة السكريات وخصوصاً السكروز، تعمل على زيادة مستوى الكوليسترول والجلسريدات الثلاثية فى الدم مع قلة نشاط الفرد المسن.

ينبغى عدم زيادة تناول الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، لأن زيادتها تكون الدهونات تعمل على ارتباطات متقاطعة بين الجزيئات الكبيرة مثل البروتينات والأحماض النووية مما يؤدى إلى زيادة الصلابة التى تعوق من أنشطة الخلية، كما أن DNA والكولاجين يكرتان مثل هذه الارتباطات، ولابد من العناية بتناول الأغذية الغنية بفيتامينى E, C لدورهما فى زيادة مناعة الجسم ودورهما كمضادات للأكسدة antioxidants التى تقلل من تأثير الأصول أو الشوارد الحرة التى تتلف جدر الخلايا وتضر بنشاطها. كما يمكن التقليل من تأثير الأصول أو الشوارد الحرة عن طريق أن تحتوى الوجبة على الأحماض الأمينية الكبريتية، والسليينوم مع الفيتامينات E, C وكذلك تقليل تناول من الكميات الزائدة من الأحماض الدهنية عديدة عدم التشيع وتقليل التعرض للإشعاعات.

وتشير الدلائل إلى أنه لا يوجد فرق كبير فى متطلبات الكالسيوم بين الفرد المسن السليم صحياً والفرد العادى. ولكن وجد أن هناك صعوبة فى الحصول على توازن موجب للكالسيوم بتقدم العمر وانتشار حالة هشاشة العظام osteoporosis وسهولة كسرها بسبب فقد الكالسيوم، ويرجع ضعف امتصاص الكالسيوم لدى المسنين إلى نقص حموضة المعدة وضعف وظائف الكبد والبنكرياس، ولذا يفضل زيادة تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم وخصوصاً اللبن ومنتجاته، وتهتم الدراسات الحديثة

بالفوسفور وأثر زيادة تناوله فى الغذاء حيث أنه يجب أن يؤخذ فى الاعتبار أن الكلى يقل نشاطها بتقدم العمر.

ويجب أن يتناول الشخص المسن الأغذية الغنية بالحديد يوميًا لأن الشخص المسن سهل الإصابة بحالة الأنيميا. وتنتشر حالات نقص الفيتامينات أيضًا، وخصوصًا القابلة للذوبان فى الماء، ولذا يجب الاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة، لأنها غنية بالفيتامينات وأيضًا العناصر المعدنية.

ويجب الاهتمام بتناول الألياف الغذائية، ولكن بدرجة معتدلة حتى لا تحدث إثارة للجهاز الهضمى وحتى لا يعوق امتصاص الحديد، مع تناول كميات وافرة من الماء والسوائل لمنع حدوث الإمساك ولمساعدة عمليات الهضم الضعيفة نسبيًا فى هذا السن ولمساعدة إفراز البول.

إن التغذية الجيدة تقلل من هدم الخلايا وتلفها وموتها وتشجع على تجديد الخلايا... كما أنها مطلوبة لسلامة الجهاز العصبى، وأيضًا تعديل حساسية الأنسجة ومستقبلات الهرمونات نظرًا لأن هذه الحساسية تقل بتقدم العمر ولهذا فلا يضطر الجسم إلى زيادة التفاعلات الحيوية لتعويض هذا النقص، وذلك لأن هذه الزيادة تضر بالجسم. ويوضح جدول (١٠-١) الاحتياجات الغذائية للمسنين.

جدول (١٠-١٠) الاحتياجات الغذائية للمساكين (RDA ١٩٨٩)

حسب السن والجنس

إناث		ذكور		العناصر الغذائية
+ ٥١ سنة	- ٢٥ سنة ٥٠ سنة	+ ٥١ سنة	- ٢٥ سنة ٥٠ سنة	
١٩٠٠	١٩٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	الطاقة (كالوري)
٥٠	٥٠	٦٣	٦٣	بروتين (جم)
٨٠٠	٨٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	فيتامين A (ميكروجرام)
٥	٥	٥	٥	فيتامين D (ميكروجرام)
٨	٨	١٠	١٠	فيتامين E (ميكروجرام)
٦٥	٦٥	٨٠	٨٠	فيتامين K (ميكروجرام)
١,٠	١,١	١,٢	١,٥	ثيامين (ملجم)
١,٢	١,٣	١,٤	١,٧	ريبوفلافين (ملجم)
١٣	١٥	١٥	١٩	نياسين (ملجم)
١,٦	١,٦	٢	٢	فيتامين B <sub>6</sub> (ميكروجرام)
١٨٠	١٨٠	٢٠٠	٢٠٠	حامض الفوليك (ميكروجرام)
٢	٢	٢	٢	فيتامين B <sub>12</sub> (ميكروجرام)
٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	فيتامين C (ملجم)
٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	كالسيوم (ملجم)
٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	فوسفور (ملجم)
٢٨٠	٢٨٠	٣٥٠	٣٥٠	ماغنسيوم (ملجم)
١٠	١٥	١٠	١٠	حديد (ملجم)
١٢	١٢	١٥	١٥	زنك (ملجم)
١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	يود (ميكروجرام)
٥٥	٥٥	٧٠	٧٠	سليينيوم (ميكروجرام)

## سادساً : وجبات النباتيين vegetarians :

### تعريفها :

تشمل وجبات النباتيين على :

(١) وجبات تحتوي على أغذية نباتية فقط Vegan (أو ٢) لدى البعض يمكنه تناول اللبن مع هذه الوجبات Lactovegan (أو ٣) تناول البيض واللبن Lacto-ovo vegan أى أن يتجنب اللحوم والدواجن والأسماك (٤) تناول الفاكهة فقط Fruitarians والفاكهة إما طازجة أو مجففة ويؤكل معها مكسرات/ عسل/ زيت زيتون وقد يؤكل معها حبوب ومكسرات.

### خصائص هذه الوجبات:

ويمكن أن يقال أن هذه الوجبات ينقصها البروتين الحيوانى بصفة عامة أى بعض الأحماض الأمينية الأساسية مثل sulfur-containing amino acids, lysine وقد يكون tryptophan كما ينقصها أيضاً بعض الفيتامينات مثل B<sub>12</sub> الذى يوجد فى الأغذية الحيوانية.

ولكن باتباع قواعد التغذية السليمة يمكن خلط البروتينات النباتية علم، أساساً محتملاً من الأحماض الأمينية وقدرتها التكميلية supplementary value، فمثلاً بروتين الحبوب ينقصها الحامض الأميني lysine، بروتين البقول ينقصها الأحماض الأمينية الكبريتية methionine cysteine، وبعمل خلطات محتوية على الحبوب والبقول يمكن الوصول إلى بروتين متكامل مثل الكشرى الذى يتكون من أرز وعدس، والمعروف أن الأرز من الحبوب التى ينقصها lysine والعدس من البقول التى ينقصها الأحماض الأمينية الكبريتية، وبذا يمكن تعويض النقص بخلطهما معاً والوصول إلى بروتين أعلى فى قيمته التغذوية عن كل بروتين على حدة ولا ننسى الفول المدمس مع الخبز والطعمية مع الخبز.

وباستخدام اللبن الغنى فى الحامض الأميني lysine فى وجبات النباتيين الذين يتناولون اللبن يمكن تعويض النقص فى بروتين الحبوب مثل عمل البليلة من أرز ولبن أو بعض المخبوزات التى تجهز من لبن ودقيق أو شرب اللبن أو تناول الزبادى مع الوجبة النباتية أو تناول البيض مع الوجبة وهكذا.

وقد اهتم العالم منذ قديم الأزل بعمل خلطات نباتية عالية القيمة الغذائية مثل الصينيين القدماء - إلا أنه لم يعرف أهميتها إلا في أوائل القرن العشرين - وقد قامت محاولات كثيرة في العالم بإنتاج أغذية يحتوى كل منها على خلطات نباتية فقط، أو قد يضاف لها جزء من بروتينات اللبن أو البيض، وذلك كان بهدف التغلب على نقص البروتينات الحيوانية عالية الثمن وأيضاً يمكن للنباتين استخدامها كما سبق، ففى جواتيمالا عمل Scrimshaw وآخرون (١٩٦١) بروتين INCAP وأيضاً فى الهند (Panemangalor وآخرون ١٩٦٥) وفى مصر SUPERAMINE كما استخدم التحسين الوراثي لإنتاج محاصيل محسنة مثل صنف الذرة Opaue-2 (Bates و Mertz) ١٩٦١ Bressani ١٩٦١، و Clark ١٩٦٦ و Nawar وآخرون ١٩٧٠)، أو التدعيم بإضافة الأحماض الأمينية (Harper ١٩٦٨) أى أنه لا توجد مشاكل فى البروتين ولكن يؤخراً. فى الاعتبار سرعة امتصاص هذه الأحماض مع تلك المنطلقة من الغذاء وبالنسبة للفيتامينات والأملاح المعدنية فكما هو معروف فإن الفواكه والخضروات من أحسن المصادر لها. وبالنسبة لفيتامين B<sub>12</sub> فيمكن عن طريق استخدام الخميرة وهى غنية فى مجموعة فيتامين B ومن بينها B<sub>12</sub> يمكن تعويض النقص، هذا بالإضافة إلى تخليق مثل هذه الفيتامينات فى القناة الهضمية للإنسان بواسطة الكائنات الدقيقة مع تجنب أو تقليل من تناول المضادات الحيوية إلا عند اللزوم لأنها تؤثر على نمو هذه الكائنات الدقيقة.

ويشيد العلماء والمتخصصون فى التغذية بأهمية هذه الوجبات فى الحماية من العديد من أمراض العصر كما سبق وخصوصاً محتواها من الألياف النباتية والأحماض الدهنية الأساسية وخلوها من الكوليسترول، وينصحون بأنه من حين لآخر يفكر الفرد فى تناول الوجبات النباتية وإن كان مرة أو مرتين أسبوعياً فإنه يكون ذلك عظيم الفائدة بالنسبة للإنسان.

علاوة على ذلك، فإن هذه الوجبات لها بها من وجود الصبغات النباتية بألوانها البهيجة التى تثير إفرازات الجهاز الهضمي من جهة والتى يستفيد الفرد منها كمضادات للأكسدة مثل صبغات بتاكاروتين، الصفراء وليكوبين الحمراء، والاثروسياتين، وهى تحمى جدر الخلايا إلخ، كما سبق، علاوة على حماية الفرد من

أمراض العصر مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع الضغط والسمنة ومرض السكر والسرطان... إلخ.

## **سابعاً: تغذية المعاقين أو ذوي الحاجات الخاصة Handicapped :**

### **مقدمة :**

تعتبر الإعاقة والتخلف العقلي من بين المشكلات الهامة في المجتمع سواء في الدول المتقدمة أو النامية فهي مشكلة فريدة ذات أبعاد طبية اجتماعية تربوية تعليمية نفسية مهنية تأهيلية.. وهذه الأبعاد تتداخل مع بعضها البعض مما يزيد المشكلة تعقيداً. ويتزايد حجم هذه المشكلة بزيادة أعداد هذه الفئة، فتشير بعض الإحصاءات إلى أن نسبة التخلفين عقلياً تصل إلى حوالي ٣٪ من أفراد المجتمع. ترجع الإعاقة إلى أسباب وراثية أو بيئية.

ويشكل ترايدهم على المجتمع والأسرة من نزيف مستمر في الدخل القومي.. كما أنهم مثار تعب للأسرة وشوكة تؤرق حياتها مما يهدد من كيان الأسرة والمجتمع (نجوى غراب ١٩٨٨). فالتخلف العقلي يصاحبه سلوك سيء غير متكيف نظراً لتوقف نمو المخ قبل اكتمال نضجه. ولهذا فنجد أن هذا الطفل يكون دائماً ثائراً، عدوانياً، محبطاً، يشعر بالنقص أمام زملائه، منعزلاً، ومما لاشك فيه أن عدوان هذا الطفل لا يناله وحده بالأذى بل يمتد أثره السلبي على الأسرة بأكملها -وقد تكون الإعاقة جسدية أو عقلية في الكلام، اللغة، الحركة...

إن حل هذه المشكلة ليس بالعلاج فقط، ولكن بتخطيط برامج متكاملة علاجية تغذوية تربوية فالبرامج التربوية تهدف إلى دمج غير الأسرياء والتخلفين في الأنشطة مع أفراد المجتمع وإحداث التكيف الاجتماعي والنفسي لهم، ولا تفرد البرامج التربوية فقط لهذا الهدف، ولكن تساعد البرامج التغذوية بالتفاعل مع البرامج التربوية في تحقيق التكيف الاجتماعي لأن أحدهما لا يكفي.. فالتغذية فقط تصلح من النمو البدني ويصير الفرد أكثر خطراً بالعدوانية لأنه يعاني من سوء التكيف الاجتماعي... كما أن التربية فقط لا تجدي ثمارها في حالات سوء التغذية، ولذلك يجب أن يتلائم العاملان ويعملان مع بعضهما البعض في تفاعل مستمر (فؤاد قلادة ١٩٩٣).

للتغذية دور كبير فى التعلم.. حيث أنها المسئولة عن بناء الموصلات العصبية الحاملة للمعلومة داخل المخ وكذلك الخارجة إلى مكان الاستجابة، كما سبق. كما أن التغذية مسئولة عن نشاط الإنزيمات الداخلة فى تفاعلات الجسم.. وبذا يكون الفرد مهيباً للتعلم. وتعتبر المخرجات التى تعلم الخبرة التى تقاس بتغير السلوك. إن الاهتمام برعاية هذه الفئة من الأطفال المتخلفين عقلياً رعاية متكاملة تشمل النواحي التغذوية والتربوية، أصبح هدفاً قومياً ودولياً فى الآونة الأخيرة وخصوصاً وأن طفولة الإنسان أطول من مثلتها فى صغار الكائنات الحيوانية الأخرى. هذا بالإضافة إلى تأثر القدرات العقلية للطفل بالبيئة الاجتماعية العامة التى ينمو فيها، وبنوع التعليم الذى يتعرض له، وبخبرات الحياة العامة، كما أن الرعاية المتكاملة تغذوياً وتربوياً لهذه الفئة من الأطفال تساعد فى تنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات.

### **الاحتياجات الغذائية :**

إن احتياجات الشخص المعوق إلى العناصر الغذائية لا تختلف عن الشخص الطبيعى ولكن يوجد عوامل خاصة بهم تؤدي إلى اختلاف فى هذه المتطلبات مثل تركيب الجسم فقد يكون منخفضاً فى الكتلة الخلوية أو ضئولاً فى العضلات، انخفاض فى نشاطهم، تغير نسبة الدهون، تغير الطول والوزن، وقد يؤدي هذا إلى خفض الاحتياجات.. ويلاحظ أن تناول الأدوية قد يؤثر على الشهية وقد يغير من الاستفادة من العناصر الغذائية.

ويعانى الشخص المعاق من مشاكل سوء التغذية أو من زيادة أو نقص الوزن بالنسبة للطول والأنيميا وانخفاض الشهية ومشاكل فى الأسنان كما يوجد فرضى عند تناول الطعام وعدم استقلالية.


### **احتياجات الطاقة :**

نظراً لأن معظم المعاقين قصيرو القامة وقليلو الحركة والنشاط فإن احتياجاتهم للطاقة تكون أقل من الأسوياء. كما أن السلوك غير اللائق أثناء تناول الطعام يجعل من الأفضل إعطائهم وجبات صغيرة وعديدة مع السيطرة القاسية عليهم. ويفضل بل يحسن أن يحتوى طعامهم على ألياف غذائية كافية لمنع أى إمساك مع عدم الإفراط فى تناولها حتى لا تسبب متاعب فى الجهاز الهضمى.


ويراعى استخدام أدوات خاصة تساعد على الاعتماد على نفسه وإجلالته  
فى وضع صحيح حتى تخفف من بعض الحركات الشاذة ويمكنه من زيادة السيطرة  
عليه.

وإذا كانت هذه الرعاية التغذوية متبوعة برعاية تربوية خاصة لهم تكون  
الاستفادة أكبر فى تحقيق نمو الطفل وتكيفه. وقد أجرت إيزيس نوار وآخرون  
(١٩٩٦) دراسة ميدانية على عينة من الأطفال المعاقين عقلياً وقدم برنامجاً تغذوياً  
متكاملاً لمجموعة من هؤلاء الأطفال والذي يتضمن تقديم وجبات تفى باحتياجات  
الفرد التغذوية كمّاً ونوعاً لمدة شهر، وقدم لمجموعة ثانية برنامجاً تربوياً لمدة شهر  
يتضمن مواقف تعليمية مختلفة تدور حول مفاهيم التكيف والنشاط والتعاون  
والمشاركة، الطاعة، السلوك الاجتماعى المرغوب وهذه هى المفاهيم التى يمكن بها  
تطبيع السلوك وتنشئة الأطفال اجتماعياً، وقدم لمجموعة ثالثة البرنامجين معاً. وقيس  
للثلاث مجاميع مستوى الهيموجلوبين كمؤشر عن الحالة التغذوية للأطفال قبل وبعد  
البرنامج، كما تم قياس السلوك التكيفى لجميع الأطفال أيضاً قبل وبعد البرنامج،  
وذلك باستخدام مقياس السلوك التكيفى Richmond و Hicklighter (١٩٨٠)،  
والذى ترجمه وقتنه للهيئة المصرية عبد العزيز الشخصى (١٩٩٢) .. وقيست نسبة  
التكيف، وأظهرت النتائج أن الكسب فى الهيموجلوبين (شكل ١٠-٣) والتكيف  
(شكل ١٠-٤) كان أعلى فى المجموعة الثالثة عن المجموعتين السابقتين.





شكل (١٠-٣) متوسطات مقدار الكسب في اهيماجلولين للمجموعات الثلاث



شكل (١٠-٤) متوسطات مقدار الكسب في درجات السلوك التكيفي  
لأفراد مجموعات الدراسة

إن الهيموجلوبين يتأثر بالتغذية تأثرًا سريعًا ونقصه يسبب حالات مختلفة من الأنيميا بسبب نقص الحديد أو البروتين أو غيره من العناصر المرتبطة، وتكون الأنيميا -كما سبق- إما لصغر حجم كرات الدم الحمراء أو تضخمها أو لنقص عددها أو نقص تركيز الهيموجلوبين، وهذا كله يؤثر على الحالة التغذوية للفرد، إذ أن الهيموجلوبين عامل مهم في نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم المختلفة ومراكز توليد الطاقة لحيوية الفرد ونشاطه وإمداد المخ بالطاقة اللازمة لعمله، وهذا يؤثر على تعلم وتحصيل الفرد.

والنتائج السابقة تشير إلى زيادة الهيموجلوبين في المجموعة التي أعطيت البرنامج التغذوي التربوي عن المجموعة التي أعطيت البرنامج التغذوي فقط رغم أن الغذاء المقدم هو نفسه، وقد يرجع ذلك إلى أن البرنامج التربوي المصاحب للتغذية يساعد الأطفال على السلوك التكيفي مما ينعكس إيجابيًا على حالتهم النفسية، مما يساعد على زيادة العمليات الحيوية والبنائية، ويزيد من قدرة الفرد على تمثيل الغذاء والاستفادة منه، وقد ظهر هذا أيضًا واضحًا في المجموعة التربوية التي لم يقدم لها أي غذاء، ومع ذلك كانت هناك زيادة في مستوى الهيموجلوبين بعد البرنامج التربوي.

إن الناحية البيولوجية تتأثر وتؤثر في نمو الفرد وتكيفه، وكما سبق فإن، التغذية المتكاملة عناصرها تكون الناقلات العصبية للمعزومة وتنظم العمليات الحيوية للمخ، مما يجعل الفرد يستجيب للمثيرات الموجودة في البيئة استجابة سوية.

هذا يوضح ضرورة الاهتمام بالبرامج التغذوية مع "البرامج التربوية لأن التغذية عامل مهم في التعلم والسلوك التكيفي واندماج الفرد في المجتمع.

الباب الحادى عشر

**العلاج التغذوى**

**Nutrition Therapy**



## العلاج التغذوي Nutrition Therapy

### مقدمة :

كانت علاقة الغذاء بالمرض والعلاج معروفة منذ عهد قدماء المصريين ١٥٠٠ قبل الميلاد، فيذكر صلاح منصور (٢٠٠٠) أن المصريين كانوا يعرفون أن الإنسان يولد سليماً وأن المرض دخيل بسبب إما عدم صلاحية الغذاء أو نقصه أو خلل داخلي وفي إخراج، وكان يعطى المريض بعض مسهلات لمدة ثلاثة أيام، كما جاء في بردية إيبيرس فوائده نبات الخروع فى الشعر والجلد والإخراج.

إن النظرة إلى غذاء الإنسان وطعامه قد تغيرت، فكان يعتبر الغذاء مصدراً لسد احتياجات الإنسان من العناصر الغذائية اللازمة لمعيشته فقط، ولكن أصبح ينظر إلى الطعام الآن أنه غذاء ودواء، فأصبحت الأمراض المزمنة الآن مرتبطة بالتغذية سواء مباشرة أو مرتبطة مع غيرها من الأسباب، وقد كان، إلى وقت قريب يعتقد أن أمراضاً مثل أمراض القلب ومرض السكر وغيرها من الأمراض منتشرة فى الدول المتقدمة ولكن أصبح انتشار هذه الأمراض فى تزايد مستمر فى الدول المتقدمة والنامية على السواء، ويرجع ذلك إلى التغير فى سبل المعيشة بما فيها نمط استهلاك الغذاء والحركة والنشاط، فأصبح استخدام السكر يحل محل النشا فى عديد من الأغذية ويحل الشاي والمشروبات الغازية محل الفاكهة، وازداد استهلاك اللحوم الحمراء والدهون الحيوانية وانخفض استهلاك الفول والبقول والخبز الكامل، وبزيادة القدرة الشرائية ومع انتشار المدنية والحضارة وتقدم العلم ازداد الإنتاج مما أدى إلى زيادة الاستهلاك من الأغذية مع انخفاض استهلاك الطاقة فى الحركة والنشاط نظراً للميكنة السائدة الآن، سواء فى المواصلات والاتصالات أو فى العمل داخل وخارج المنزل، كما أن زيادة فترات مشاهدة التلفزيون مع تناول المسليات المتنوعة، كل هذا وغيره ساعد على تراكم الدهون نتيجة الطاقة المتناولة والزائدة عن حاجة الجسم، وما ينتج عن ذلك من اضطراب فى الميثابوليزم، وعلى الجانب الآخر فإن المدنية أدت إلى زيادة القلق والتوتر مما تسبب فى اضطراب هرموني وخلل فى عمل بعض الغدد، مما تسبب أيضاً فى اضطراب الميثابوليزم فأصيب الإنسان بالعديد من الأمراض التى تسمى الآن بأمراض العصر.

هذا مع التلوث البيئي؛ الهوائى والمائى والغذائى، واستخدام الألوان الصناعية وانتشار التدخين وغيرها من الأمور الضارة وذات التأثير السلبى على الإنسان... فأصبح سوء اختيار الغذاء مرتبطاً بالإصابة بالأمراض، كما أنه هو أيضاً وسيلة لتجنب العديد من هذه الأمراض ويساهم فى الشفاء منها.

وكما قال أحد المتخصصين (Jonathan Swift) :

"The best DOCTORS in the world are :

Dr. DIET,

Dr. QUIET &

Dr. MERRY"

فالإنسان يحتاج إلى الغذاء الصحى السليم، وهذا ليس قاصراً على الأطفال بل البالغين أيضاً حتى تستمر الحياة بدون مشاكل تغذية أو صحية.

وكما سبق ذكره فإن إنتاج الغذاء لا يكفى لمواجهة الطلب عليه بصفة عامة، وفى الدول النامية بصفة خاصة مما أدى إلى نقص غذاء الفرد وعدم توازنه. هذا ومع انخفاض الوعى الغذائى والجهل باختيار الأغذية المناسبة كمّاً ونوعاً، أصبح غذاء الإنسان غير مناسب حتى مع توافر القدرة الشرائية.

وبطبيعة الحال فإن استجابة الفرد طفلاً أو بالغاً لسوء التغذية يختلف عن الحالات التى يكون فيها الغذاء مناسباً لسد حاجات الفرد. ويحاول الإنسان أن يستجيب بطريقة تجنبه حدوث أى اضطرابات تدخله فى سلسلة من الأضرار.

ما هى هذه المحاولات التى يقوم بها الجسم ليتكيف للموضع الجديد ؟ كيف يستجيب الفرد لحالات نقص العناصر الغذائية ؟ وما هى الاضطرابات والأمراض التى قد يتعرض لها والمربطة بسوء التغذية ؟ وما هو النظام الغذائى الذى يقدم للعلاج لبعض الحالات المرضية من البعد التغذوى.. مع ملاحظة أنه يوجد بعض الحالات تستدعى الفحص الإكلينيكى وأداء بعض التحاليل البيوكيميائية وتناول الدواء مع هذا الغذاء، الأمر الذى يتطلب أن يجرى تحت إشراف أطباء ومتخصصين.

**أولاً : التكيف البيولوجى والمواءمة أو التأقلم :**

**Biological Adaptation and Accomodation or Acclimatization :**

التكيف مصطلح مستمد من علم البيولوجى، حيث يشير إلى توافق الكائن

الحى مع بيئته. وفى أثناء عملية التكيف يمكن أن يطرأ تعديل على نشاط الكائن الحى حتى يتلاءم مع بيئته المتغيرة أو قد تطرأ تغيرات أساسية تسهم فى بقاء النوع. ويقوم الجسم بتنظيم وظائفه الحيوية بواسطة الجهاز العصبى nervous system الذى ينظم كل أعمال وأنشطة الجسم بما فيها الجهاز الغدى الذى يفرز الهرمونات التى تنظم عمليات البناء والهدم فى الخلية، أى الميتابوليزم، ويعمل الجهازان فى تكامل تام من خلال مواد كيميائية تسمى بالنوروهرمونات neurohormones (هرمونات عصبية) مثل إفرازات الهيبوثالاميس التى تصل إلى مكان تأثيرها فى الغدد عن طريق الدم. وهذه الهرمونات العصبية من الهيبوثالاميس عامل مثير لإفرازات الغدد عن طريق الدم. وهذه الهرمونات العصبية من الهيبوثالاميس عامل مثير لإفرازات الغدد releasing factor أو عامل مانع للإفراز inhibitory factor. كما يتحكم الهيبوثالاميس فى تنظيم البيئة الداخلية للجسم وحفظ التوازن الداخلى عن طريق إرسال إشارات عصبية للاستجابة لأى حادث فى البيئة. ورغم تأثير الهرمونات الغدد الصماء على النشاط العصبى فى المخ إلا أن المخ هو المسيطر على كل أنشطة الجسم (Hardin ١٩٦١، فؤاد قلادة ٢٠٠٢).

### **تنظيم التفاعلات الحيوية داخل الخلية :**

إن تنظيم أى تفاعل حيوى هو التحكم الذاتى الذى يحدث فى الجسم نتيجة لأى تغير يحدث... وهذا التنظيم يتم إما عند بداية التفاعل أو عند نهايته.. أى عند نقطة يكون فيها نشاط الإنزيم المساعد لإتمام هذا التفاعل هو العامل المحدد لسرعة هذا التفاعل.. ويتم التنظيم إما لفترة قصيرة بواسطة مركبات صغيرة تحد من نشاط الإنزيم بدون أى تغيير فى كمية بروتين الإنزيم، أما التنظيم لفترة طويلة فيتم بواسطة تغيير فى كمية بروتين الإنزيم، إما زيادة بناء هذا البروتين أو تقليل هدمه.


### **ميكانيزمات الجسم لمواجهة الظروف غير الطبيعية :**

إن العمليات المنظمة هى تفاعلات مستمرة سريعة نسبياً ولازمة للمحافظة على وظائف الجسم وتركيب أنسجته فى صورة طبيعية، أما إذا نقص أحد عناصر التفاعل فإنه يحدث تغيير سريع فى الميتابوليزم. فإذا واجه الإنسان أى تغيير فى كمية أو نوعية العناصر الغذائية المتناولة فإنه يمكن إحداث تغييرات فى الميتابوليزم، حتى يمكن

تمثيل الغذاء بكفاءة دون حدوث إضرار للجسم وهذا ما يعرف بالتكيف adaptation البيولوجى. أما فى المواءمة accomodation فإنه قد يعمل الجسم على إحداث تعديل فى سير الميتابوليزم على حساب احتياجات أخرى قد تضر بالجسم.


أى أن الفرد يلجأ للتكيف عند عدم ملائمة الاستجابة، وهذا يكون مثيراً لحدوث التكيف والوصول للمستوى الطبيعى. ويمكن اعتبار التكيف والحالة الطبيعية مفهومان لموضوع واحد لأن الجسم يمكنه أن يتكيف طالما هو فى حالة طبيعية. وعن طريق التكيف يمكن للجسم أن يحتفظ بحالته الطبيعية. وهنا يستخدم الجسم المخزون فى الجسم من عناصر غذائية.

أما إذا لم يتمكن الجسم من أداء وظائفه فى نطاق الحدود الطبيعية، فإن الجسم يدخل فى حالة المواءمة أو التأقلم نظراً للنقص الغذائى وفى مخزون الجسم. وإذا استمرت الظروف غير مناسبة فإنه يدخل فى الحالة المرضية. ولتوضيح ذلك :



وتتم هذه المراحل فى دورة لها إيقاع (شكل ١١-١).





### شكل (١١-١) الدورة التي يمر بها الجسم في حالة الظروف غير الطبيعية

ويمثل التكيف أهمية خاصة بالجسم نظراً لأنه يعمل على ثبات الجسم واتزانه لمواجهة أى نقص غذائي. وفي أثناء التكيف تحدث تغيرات فسيولوجية فى أنظمة الجسم وبيولوجية خلوية لمواجهة مصادر الخطر للإنسان حتى يمكنه ليس فقط أن يعيش بل يستمر فى الحياة تحت ظروف بيئية قاسية (Stroev، ١٩٨٩). وتعمل التغيرات الفسيولوجية التى تتم فى الدورة الدموية أو الجهاز العصبى على تسهيل حصول الخلايا والأنسجة على مستلزماتها من العناصر الغذائية والأكسجين اللازمة لنشاطها وفى نفس الوقت يحدث تكيف داخل الخلية لمواجهة التغيرات الحادثة حتى تستمر الأنشطة الحيوية للخلية.

وعملية التكيف قد تكون قصيرة المدى وهذه خاصة بتعديل سريع فى الميتابوليزم عند ابتداء حدوث أى ضغوط خارجية وقد يتم ذلك بواسطة تغير فى النشاط الهرمونى العصبى neurohormonal على جدار الخلية لتغيير فى مساميته أيضاً تغيير فى النشاط الإنزيمى وهذا بغرض استمرار حيوية الخلية ونشاطها.

أما التكيف طويل المدى فهو يتم عن طريق تأثير هرموني عصبى كمثير لتخليق إنزيمات وغيره من البروتينات التى تؤدى وظائف معينة فى الجسم كما أن عملية تخليق البروتينات اللازمة تعمل على إحداث تغيرات مختلفة فى النظام المتبادل وهذا يساعد على استمرار نشاط الخلية لمواجهة الظروف غير العادية. وإذا لم تتمكن الخلية من تخليق هذه البروتينات فإن الخلية تفشل فى التكيف وهنا قد تقوم بالمروءة والتعرض للمرض.

### **التكيف فى حالة نقص الطاقة فى الغذاء :**

عند نقص الطاقة المتأولة فإنه يمكن أن يستهلك الفرد هذه الطاقة بكفاءة دون المعاناة من أى ضرر يحيط بالجسم مثل تعديل فى النشاط الجسمى وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، هذا هو التكيف. أما إذا كان النقص كبيراً فلا بد من إحداث تغيير فى الوزن أو تعديل فى تركيب الجسم... أو تغيير فى سبل استخدام الطاقة فى الأنشطة الاجتماعية (Bengoa ١٩٨٩) وهذه هى المروءة.

فى حالة الصيام أو الجوع يقوم الجسم بالتنظيم الذاتى للطاقة، وفى هذه الحالة ينخفض الجلوكوز فيقوم الجسم بتحليل جليكوجين الكبد<sup>١</sup>، glycogenolysis إلى جلوكوز لاستخدامه، كما يقوم الكبد بتكوين مواد كيتونية تستخدمها العضلات فى توليد الطاقة. وفى حالة الجوع الشديد يمكن للمخ استهلاك هذه المواد الكيتونية أيضاً لتوليد الطاقة.

وفى أثناء الجوع أيضاً تحلل الدهون lipolysis لتنتقل الأحماض الدهنية لاستخدامها فى توليد الطاقة كما ينشط تكوين الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية gluconeogenesis مثل الأحماض الأمينية والجليسرول. أما فى حالة الشبع ينشط بناء الجليكوجين glycogenesis من الجلوكوز، كما ينشط بناء الدهون lipogenesis.

### **أمثلة للتكيف فى حالة نقص بروتين الغذاء:**

#### **١- ميتابوليزم الاليومين:**

يعتبر الاليومين من أجسـن الأمثلة للتكيف عند نقص البروتين وذلك لأنه

حساس لنقص بروتين الغذاء ويوضح جدول (١١-١) سرعة بناء وهدم الاليومين لأطفال يعانون من نقص البروتين بعد إعطائهم وجبات مرتفعة ومنخفضة من البروتين المشبع على فترات ومقارنتهم بأطفال يتمتعون بحالة تغذية جيدة.

جدول (١١-١) سرعة بناء وهدم الاليومين

اليومين ملجم/ كجم / اليوم				البيان
٢٤-١٧	٢٤-١٧	١٧-١٠	١٠-٠	عدد الأيام
منخفض	عالي	منخفض	عالي	مستوى البروتين في الغذاء
				أطفال في حالة تغذية جيدة
٢٣٦	١٣٨	١٤١	٢٥٢	بناء
١٥٦	١٤٠	١٧١	٢١٩	هدم
				أطفال في حالة تغذية سيئة
٢٨٨	٨٧	١٠١	٢٣٣	بناء
١٧٨	١٣١	١٧١	١٦٦	هدم

توضح البيانات حساسية بناء الاليومين تبعاً للوارد من الأحماض الأمينية كما يتأثر سرعة هدمه كذلك تبعاً لحالة الفرد التغذوية.

## ٢- بناء كارنتين Carnitine :

إن مركب الكارنتين كما سبق ذكره من المركبات النيروجينية اللازمة لأداء أعمال مهمة للجسم منها أكسدة الأحماض الدهنية داخل الخلية - حيث يعمل على نقل هذه الأحماض إلى الميتوكوندريا وأن نقص هذه المادة يعمل على تراكم الدهون وخصوصاً في الكبد. ويتركب الكارنتين من الأحماض الأمينية lysine و methionine . وقد أجريت تجربة على فيران بتغذيتها على جلوتين gluten لمدة ٥٦ يوماً مع إضافة الحمض الأميني lysine بمستويين مختلفين لأن الجلوتين فقير في هذا الحمض ويوضح جدول (٢٠١١) نتائج التجربة على وزن الحيوان وصورة الدم ومحتوى الكارنتين.

جدول (١١-٢) أثر تغذية الجلوتن المضاف له lysine على وزن الفيران  
وصورة الدم ومحتوى الأنسجة من الكارنتين

البيان	الوجبة		
	جلوتن + lysine % ٠,٨	جلوتن + lysine % ٠,١	جلوتن
الميموجلولين جرام٪	٢٤٨,١	٨٨,٥	٤٧,٣
الميماتوكريت٪	١٣,٦	١١,٨	١١,٣
بروتين البلازما جرام٪	٤١,٨	٣٨,٠	٣٦,٧
	٦,٨	٥,٣	٤,٨
العضلات	١١٤,٠	٩٣,٠	٧٧,٠
القلب	١٥٩,٠	١٠٩,٠	١١٤,٠
الكبد	٢٧,٠	٣٥,٠	٣٩,٠

يوضح الجدول استجابة بعض أجزاء الجسم لخفض بناء بعض مركبات الجسم عند نقص اللايسين Lysine.

### المواءمة

ومن أمثلة المواءمة هو ما يحدث فى ميتابوليزم الحامض الأمين تريتوفان Tryptophan وهو من الأحماض الأمينية الأساسية. وهو كما سبق يدخل فى بناء الأنسجة وصيانتها كما أنه يدخل فى تكوين مادة خماسى هيدروكس تريتامين 5-OH Tryptamin وهى مادة لازمة لتكوين السيروتونين Serotonin وهو أحد الموصلات العصبية neurotransmitter اللازمة لوظائف المخ كما أنها توجد فى الصفائح الدموية فعندما يتعرض الفرد لجرح تنهشم الصفائح الدموية وتخرج هذه المادة وتوقف النزيف عن طريق أنها تعمل على انقباض الأوعية الدموية.

كما أن tryptophan يمكن أن يتحول إلى النياسين niacin بنسبة ٦٠ : ١ فى حالة نقص هذا الفيتامين فى الغذاء. ويقوم هذا الفيتامين بالعديد من الوظائف من بينها تكوين المرافقات الإنزيمية NAD و NADP وهى لازمة لإتمام العمليات اللازمة لتوليد الطاقة للجسم.

وفي حالة نقص النياسين فى غذاء الإنسان فإن tryptophan يتحول إلى نياسين للمساعدة فى انطلاق الطاقة اللازمة لاسمرار الحياة وهذا على حساب الوظائف الأخرى لـ tryptophan من البناء والضيانة مما قد يؤدى إلى أضرار جانبية وقد تكون بالغة.

### **ثانيًا استجابة الفرد لنقص الغذاء والعناصر الغذائية :**

تتغير استجابة الفرد تبعًا لنقص العناصر الغذائية، سواء كان طفلًا أو بالغًا، وقد تغيرت النظرة من حيث ربط أعراض نقص الغذاء التى تظهر على الفرد وبين تحديد مسبباتها من العناصر الغذائية. وذكر Michael و Gordes (١٩٩٥) أنه عندما يتعرض طفل لـ نقص فى أى عنصر غذائى فإن استجابته تتبع أحد نمطين:

#### **النمط الأول Type I :**

يستمر الطفل فى النمو - وهنا يستهلك المخزون من هذا العنصر فى جسمه - ثم يبدأ بنقص أداء الجسم للوظيفة أو الوظائف المرتبطة بهذا العنصر حتى يستنفذ العنصر - أى أن استجابة الطفل فى هذه الحالة هو استمرار النمو مع ظهور أعراض نقص محددة ومرتبطة بنقص العنصر وهذا السلوك يسمى بالنمط الأول للاستجابة.

#### **النمط الثانى :**

يقف نمو الطفل أى فشل النمو وهنا يبقى المخزون فى جسمه من هذا العنصر متاحًا لأداء وظائف الجسم المختلفة أى أن سرعة النمو تنخفض بدون ظهور أعراض نقص محدودة وهذا السلوك يسمى بالنمط الثانى Type II.

ولذا يهتم المتخصصون بدراسة هذا الموضوع لأنه دائمًا يعتقد أن نقص أى عنصر معين يسبب نمط السلوك الأول، كما يعتقد أيضًا أن نمط السلوك الثانى أى فشل النمو يرتبط دائمًا بحالة نقص البروتين والطاقة PEM فى حين قد يكون فشل النمو ناتجًا من سبب آخر غير الأسباب التى تؤدى إلى PEM، أى نقص أى عنصر غذائى آخر غير المسبب لحالة PEM وهذا لا يؤخذ فى الاعتبار فلا يتم العلاج طالما أن التشخيص غير سليم وتبعًا لذلك تقسم العناصر الغذائية حسب نمط الاستجابة إلى قسمين (جدول ١١-٣).

جدول (٢١-٣) توزيع العناصر الغذائية حسب استجابة الطفل لنقصها

النمط الأول		النمط الثانى	
(استمرار النمو وظهور أعراض نقص محددة)		(وقف النمو وظهور أعراض نقص غير محددة)	
١- الحديد	١٠- البيروكسين	١- البوتاسيوم	٦- الفوسفور
٢- النحاس	١١- النياسين	٢- الصوديوم	٧- الأكسجين
٣- المنجنيز	١٢- الكربالامين	٣- المغنسيوم	٨- الماء
٤- اليود	١٣- الفولاسين	٤- الزنك	٩- الطاقة
٥- السليسيوم	١٤- فيتامين C	٥- البروتين	
٦- الكالسيوم	١٥- فيتامين A	النيروجين	
٧- الفلورين	١٦- فيتامين E	الثريونين	
٨- الثيامين	١٧- فيتامين D	اللايسين	
٩- الريبوفلافين	١٨- فيتامين K	الكريت	
		الهيكل الكربونى	
		للأحماض الأمينية	
		الأساسية	

وتقوم عناصر المجموعة الأولى بوظائف معينة فى الميتابوليزم داخل الجسم. ونقصها يؤدى إلى ظهور أعراض معينة مثل نقص الحديد يسبب أنيميا، نقص الثيامين يسبب البرى-برى، نقص النياسين يسبب البلاجرا، نقص فيتامين C يسبب الأسقربوط، نقص فيتامين A يسبب Xerophthalmia، نقص اليود يسبب جويتر. أى أن نقص عناصر المجموعة يمكن تشخيصه بسهولة ويتم ذلك من خلال عدة طرق مثل قياس تركيز العنصر فى نسيج معين، أو قياس بروتين أو إنزيم معين يعتمد على هذا العنصر، أو قياس الوظيفة الميتابولية أو الفسيولوجية فمثلا فى الأنيميا وهى نقص الحديد يمكن تقدير النقص عن طريق تقدير كرات الدم الحمراء أو قياس الفرتين ferritin أو ترانسفيرين Transferrin أو السروتوبورفورين protoporphrin،

وكذلك فى اليود فنقصه يسبب مرض الجربتر هنا نقيس اليود أو هرمونات الغدة الدرقية التى يدخل فى تكوينها اليود...

وحيث أن أعراض النقص معروفة فيسهل تشخيصها بواسطة الطبيب أو المختص فى التغذية ويوصف العلاج بضرورة وجود هذا العنصر فى الغذاء. أما نقص العناصر الغذائية فى المجموعة الثانية فإنها جميعاً تسبب نقص النمر، القزمية Stunting، الهزال وهنا لا يعرف الفرد ما سبب الهزال ؟ ....، ودائماً يقال هذا بسبب نقص كمية الغذاء المتناول أو نقص الطاقة أو البروتين..

والطفل فى هذه الحالة (النمط الثانى) يقف نموه مع احتفاظ أنسجته بالعنصر الناقص فى الغذاء ولذا فإن إخراج العنصر من الجسم ينخفض حتى حد أدنى وأيضاً بالنسبة لتركيز العنصر فى الأنسجة فيوجد حد أدنى ولكن مع استمرار عدم تناول العنصر فإن الجسم يبدأ فى هدم النسيج المحتوى على هذا العنصر وينطلق العنصر حتى يمكن للجسم استخدامه.. ولكن يتبع هذا خفض الشهية كما تسبب عملية هدم النسيج انطلاق العناصر الأخرى الموجودة به إلا أنها تخرج خارج الجسم أى أنها تفقد ولهذا عند العلاج لابد أن يعطى الفرد كل العناصر التى فقدها... ولذا ففى هذا النمط الثانى من الاستجابة لا تظهر أى أعراض على عضو معين إلا فى بعض الأعضاء أو الأنسجة التى تنقسم خلاياها بسرعة أو مرتبطة بتخليق أى مركب معين كما فى حالة الجهاز المناعى وأيضاً فى الأنسجة المخاطية المبطننة للقناة الهضمية - أى أن أعراض النقص تظهر على كل الأنسجة ومعظم الأعضاء.

وعلى هذا فليس من السهل تفسير كيف يموت كائن حى نتيجة نقص عنصر معين من المجموعة الثانية ومع ذلك قد يكون تركيز هذا العنصر فى الأنسجة طبيعياً؟، وهذا الكائن يمكن أن يموت لسبب آخر غير نقص هذا العنصر كما أن هذا الكائن يستجيب بسرعة لو أعطى كمية بسيطة جداً من هذا العنصر.

إن عناصر المجموعة الثانية تدخل فى بناء كل خلية بل وفى كل عمليات الميتابوليزم التى تتم فيها، أى أنها تدخل فى بناء الجسم وتكون مسئولة عن كل تفاعل فى الميتابوليزم مثل تخليق البروتين والأحماض النووية nucleic acids ولهذا فإن نقص

هذا العنصر يؤثر فى جميع العمليات الحيوية فى الجسم وتقل مقاومته للعدوى أو ظروف غريبة أو ضغوط ولا يتمكن الفرد من حفظ حالته الداخلية وتوازنه "milieu interieur"، وقد وجد El Hendy وآخرون (٢٠٠١) أن نقص الزنك فى غذاء الفئران النامية أدى إلى تغيرات متعددة فى أعضاء وأنسجة الجسم المختلفة مثل انخفاض وزن الجسم والأعضاء المختلفة وتغيرت صورة الدم من حيث محتواه من العناصر الغذائية المختلفة.

إن استراتيجية استجابة الفرد للتغيرات فى المتناول من العناصر الغذائية تختلف -فى النمط الأول فإن الجسم يحتفظ بجزء من العنصر المتناول ويمكن سحبه وقت الحاجة- بينما فى النمط الثانى فإن جزء من العنصر المتناول يدخل فى تجديد الأنسجة أثناء العمليات المرتبطة بدورة العنصر turnover أما الزيادة فتخرج خارج الجسم - وعندما ينخفض المتناول من هذا العنصر يقف النمو. ولذا يعمل الجسم على خفض إخراج العنصر من الجسم لأقل حد ممكن وفى خلال هذه المدة التى يتم فيها الاحتفاظ بالعنصر - لإعادة استخدامه re-use يقف النمو لأنه لا يتم إلا فى وجود مستوى معين من العنصر فى النسيج - ولذا يعمل الجسم على استعادة مستوى العنصر فى الأنسجة حتى يتمكن من النمو. ولذا فإن لجوء الجسم إلى وقف النمو يعتبر وسيلة لرفع مستوى المخزون من العنصر ويلاحظ أن جسم الطفل يقوم بكل عمليات الصيانة وتم بصورة طبيعية منفصلة عن النمو - وإذا استمر النقص فى العنصر ومع استمرار عمليات الصيانة فإن الطفل يتخلف فى وزنه كثيراً عن أقرانه حتى يصل إلى مرحلة فشل النمو.

وعلى هذا فإن فشل النمو يحدث نتيجة نقص أى عنصر من عناصر المجموعة الثانية. ولذا فإن العلاج يكون بإعطاء الطفل كل عناصر المجموعة الثانية بطريقة متزنة.

وتتم ميكانيكية إيقاف النمو بطرق عديدة منها خفض هرمون معين لازم للنمو، خفض تخليق البروتين... إلخ ومع ذلك لا يمكن تحديد سبب لخفض سرعة النمو - ولا يمكن ملاحظة أو تشخيص أى عرض من الأعراض الأخرى مع خفض أو وقف النمو. فمثلاً خفض النمو يحدث نتيجة نقص فى البروتين، الطاقة، الزنك، المغنسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم... إلخ كما أن الجهاز المناعى يتأثر وهذا يزيد من تعرض الفرد للعدوى.



ويلاحظ أنه عندما يكون النقص فى العنصر متوسطاً فإنه لا تظهر أعراض واضحة وعند استعادة تناول العنصر فإن الوزن يستعيد طبيعته.

أما فى حالة النقص الشديد فى العنصر فإنه يحدث نقص سريع فى العنصر. وفى البداية قد يرجع نقص الوزن إلى أى سبب آخر مثل الإسهال أو العدوى أو الطفيليات، وفى النقص المزمن يكون قصر القامة شائعاً أكثر من الهزال - وهذا يتوقف على شدة النقص ومدته.

وبالنسبة لتوازن المجموعة الثانية فإن الجسم يكون فى حالة سلبية ليس فقط فى عنصر واحد بل فى جميع العناصر - فمثلاً إذا لوحظ وجود توازن سالب فى النيتروجين فيمكن أن يتوقع وجود نقص فى غيره من عناصر المجموعة الثانية ولهذا فالعلاج يتطلب تناول كل عناصر المجموعة بغض النظر عن سبب التوازن السالب أو نقص الوزن.

وليس من السهل حدوث نقص فى عناصر المجموعة الثانية فى الإنسان البالغ عن طريق الغذاء بل لابد أن تكون لسبب آخر مرضياً - فمثلاً لا يحدث نقص فى عنصر الصوديوم فى الإنسان البالغ إلا إذا كان هناك فقد زائد عن طريق العرق أو الإسهال..

وحيث أن عناصر المجموعة الثانية تعتبر أساسية فى جميع العمليات الحيوية فى الحيوان والنبات على السواء فإن تركيز هذه العناصر يكون متقارباً فى الأغذية المختلفة. ولذا فلا يوجد أغذية ينقصها هذه العناصر ولذا تسمى Dietar Fellow Travellers.

كما سبق فإنه لا يمكن تحديد أى عنصر من عناصر المجموعة الثانية يسبب خفض النمو - ولكن فى حالة نقص الوزن بالنسبة للطول  $wt/ht$  أو القزمية short stature يسهل تحديد السبب ويمكن تحديد العنصر المسبب.


بالإضافة إلى فشل النمو فإن عناصر المجموعة الثانية تؤثر على الشهية - فمثلاً إذا كان هناك نقص فى الزنك فإن الطفل يستعيد شهيته إذا أضيف له الزنك فى غذائه ويزيد ما يتناوله من العناصر الأخرى مثل الطاقة والبروتين والبولتاسيوم.

أى أنه لا بد أن يحصل الفرد على كفايته من كل عناصر هذه المجموعة لاستعادة النمو أو الشهية ويشير Krebs وآخرون (١٩٨٤) أن العنصر الشديد النقص في هذه المجموعة هو الذى يحدد حالة الطفل وإن إضافته تحدد مدى رجوع الطفل لحالته الطبيعية مع وجود توازن في جميع عناصر المجموعة الثانية وقد ظهر أن الطفل لم يستعيد طبيعته إذا أعطى الطاقة والبروتين فقط مع تجاهل عناصر هذه المجموعة وخصوصاً البوتاسيوم والمغنسيوم والزنك والفوسفور.

في تجارب تقوية الغذاء وجد Gibson وآخرون (١٩٨٩) في كندا أن ٢٥٪ فقط من الأطفال في مرحلة النمو المميزة بالزيادة الكبيرة في الطول height spurt استجابوا لإضافة الزنك في الغذاء وأشار أن سبب عدم استجابة الأطفال أن نقص طول الطفل لم يكون راجعاً إلى نقص الزنك بل إلى نقص عناصر أخرى لم تؤخذ في الاعتبار مثل المغنسيوم والبوتاسيوم والفوسفور ولذا لا بد من توافر جميع العناصر بنسب متوازنة من عناصر المجموعة الثانية.

أما في حالة نقص عناصر المجموعة الأولى فإنه يحدث تغيرات بيوكيميائية دون حدوث أى أثر في المقاييس الجسمية. بينما نقص عناصر المجموعة الثانية يؤثر على المقاييس الجسمية دون حدوث تغيرات بيوكيميائية وطبيعية لا بد من إجراء كل المقاييس الأثرية بومترية والتقديرات البيوكيميائية عند تقدير الحالة التغذوية ويوضح شكل (١١-٢) مراحل الإصابة بالمرض.

والمتبع عادة أن دراسة المقاييس الجسمية تتم لمعرفة مدى انتشار النقص وسوء التغذية وعادة يعالج الأطفال بإعطائهم الطاقة وجميع عناصر المجموعة الأولى وأن نقصها واسع الانتشار دون الاهتمام بإعطائهم عناصر المجموعة الثانية المسببة لقصر القامة والزال.



شكل (١١-٢) مراحل الإصابة بالمرض

ويحظى مريض نقص الطاقة باهتمام خاص؛ فهي إن كانت تقع مع عناصر المجموعة الثانية إلا أنه يمكن اعتبارها تقع في مجموعة ثالثة خاصة وذلك لأن عناصر المجموعة الأولى لازمة للعمليات الحيوية وعناصر المجموعة الثانية لازمة لبناء وحدات الأنسجة - فإن الطاقة لازمة لإعطاء القوة والطاقة اللازمة لاتمام هاتين العمليتين الكبيرتين والطاقة ليست عنصر كباقي العناصر - فإنها مقياس للقيمة السعيرية للأغذية - ويلاحظ أنه يوجد نقص الطاقة في حالة المجاعات.

ومن جهة أخرى فإن نقص الطاقة المتكرر يكون راجعاً إلى فقد أو انخفاض الشهية وليس بسبب نقص الغذاء - أى أن نقص الطاقة ليس هو السبب الأساسى لحدوث سوء التغذية ولكنه سبب ثانوى تابعا لنقص عناصر المجموعة الثانية أو العدوى أو أى مرض يصيب الميتابوليزم. ولهذا فالعلاج لا يتم بإعطاء الطفل الغذاء الموجود بالمنزل ولكن بعلاج الشهية وهذا يتطلب الاهتمام برعاية الغذاء وليس بكميته فقط. ويمكن تقسيم الاستجابات لكل نمط كما في جدول (١١-٤).

### جدول (١١-٤) نمط الاستجابات تبعاً لنوع العنصر الناقص

#### حسب المجموعة التى ينتمى إليها

النمط الأول	النمط الثانى
١- يستمر النمو.	١- فشل النمو.
٢- ظهور أعراض محدودة.	٢- ظهور أعراض غير محدودة.
٣- ينخفض تركيز العنصر فى الأنسجة.	٣- لا يتغير تركيز العنصر فى النسيج.
٤- يوجد مخزون للعنصر فى الجسم.	٤- لا يوجد مخزون للعنصر فى الجسم.
٥- يتركز العنصر فى بعض الأنسجة.	٥- لا يتركز العنصر فى نسيج معين.
٦- تتأثر بعض إنزيمات معينة.	٦- يتأثر الميتابوليزم بصفة عامة.
٧- لا تتأثر الشهية.	٧- تنخفض الشهية.
٨- تركيز العنصر فى النسيج لا يتأثر بتركيز عناصر المجموعة الأولى الأخرى.	٨- يعتمد تركيز العنصر على تركيز باقى عناصر المجموعة الثانية.
٩- لا يتأثر تركيز العنصر بتغير حالة الميتابوليزم.	٩- ينخفض تركيز العنصر تبعاً لحالة الميتابوليزم.
١٠- نسبته فى الأغذية تختلف كثيراً.	١٠- نسبته فى الأغذية لا تختلف كثيراً.
١١- يمكن تشخيصه بالطرق البيوكيميائية.	١١- لا يحدث تغيرات بيوكيميائية.
١٢- تغير المقاييس الجسمية لا يظهر إلا فى مراحل متأخرة من النقص.	١٢- يمكن اكتشافه بتغير المقاييس الجسمية لأنها تظهر فى أولى مراحل النقص.

## ثالثاً : الاضطرابات والأمراض المرتبطة بسوء التغذية والعلاج التغذوي :

### مقدمة :

يؤدي سوء التغذية إلى اعتلال الصحة وخصوصاً إذا استمر لفترة طويلة، وتظهر الحالات المرضية ومنها الكساح، الاسقربوط، البربري، البلاجرا، نقص فيتامين A، الأنيميا، الجربق، الكواشيوركور، المراسمس. وعندما يبدأ سوء التغذية في وقت مبكر. ويستمر لفترة طويلة فإن الضرر يمتد إلى بناء العظام والمخ، وهذا يسبب ضرراً بالغاً.

وتعاني الدول النامية بانتشار حالات سوء التغذية؛ ففي إفريقيا يعاني ٣٠٪ من الأطفال من سوء التغذية، وعلى حسب تقدير WHO أن ١٠ مليون طفل تحت عمر ٥ سنوات يعانون من سوء تغذية شديد، ٩٠ مليون من سوء تغذية متوسط، وأن ٧٥٪ من وفيات الأطفال تحت عمر ٥ سنوات ترجع إلى سوء التغذية مصحوباً بأمراض معدية.

ويعر سوء التغذية بثلاث مراحل كما سبق، في المرحلة الأولى أى في مرحلة التكيف يستخدم الفرد المخزون من العنصر أو العناصر الغذائية في الأنسجة ولذا تعمل وظائف الخلية بصورة طبيعية وتستمر كذلك حتى ينفذ المخزون في الأنسجة. وإذا لم يحدث تحسن في الغذاء تستمر وظائف الخلية نتيجة دخولها في مرحلة المواءمة أو التأقلم ولكن دون ظهور أعراض مرضية واضحة. وإذا لم تتحسن الظروف فإن الجسم يدخل في مرحلة المرض وظهور الأعراض المرضية المتعلقة بنقص العنصر أو العناصر الغذائية المختلفة. ويمكن تصحيح الوضع بتناول العناصر الغذائية الناقصة والمسببة لهذه الأعراض المرضية، ويكون ذلك بتناول الأغذية الغنية في هذه العناصر. ومن أمثلة الاضطرابات والأمراض المرتبطة بسوء التغذية :

### - الكواشيوركور Kwashiorkor :

#### نقص بروتين الغذاء :

يصاب الطفل بالكواشيوركور عند فطامه بعد طول مدة رضاعة ويقدم له غذاء فقيراً في البروتين وخصوصاً الحيوانى، وهذا راجع إما إلى فقر أو إلى جهل الأمهات.

عندما تكون نسبة البروتين في الغذاء غير كافية لسد حاجة الفرد، فإن الخلايا ينقصها الأحماض الأمينية اللازمة للبناء، وتظهر هذه الحالة بوضوح في الطفل أثناء النمو حيث تقل سرعة نموه، ويختلف تأثير النقص في الأنسجة والأعضاء المختلفة حسب سرعة تجديد خلايا الجسم، فمثلاً خلايا الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء تتجدد كل يوم أو يومين بينما يصل عمر الكرات الدموية الحمراء ١٢٠ يوماً. أى أن أثر نقص البروتين يظهر بسرعة على الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء وعلى الغدد التي تفرز العصارات الهاضمة فيتأثر هضم الغذاء وامتصاصه ويصاب الفرد بالإسهال.

ومن أولى أعراض نقص البروتين في الجسم، فقد الماء والالكتروليتات، كما يتأثر الكبد في أداء وظائفه وتتراكم الدهون فيه، وتقل مقدرة الكبد في تكوين البيومين البلازما، وهذه تؤدي إلى انتشار الماء في الأنسجة وهو ما يعرف باسم حالة الاستسقاء ويلى ذلك فقد في عضلات الفرد، وتقل قدرته على إنتاج الكرات الحمراء ويصاب الفرد بالأنيميا. أما الجهاز العصبي فيتأثر إذا كانت حالة نقص البروتين شديدة ومزمنة.

ويعتبر تحليل بلازما الدم لمعرفة مستوى البروتينات، دليلاً على الحالة التغذوية للبروتين عند الفرد، والمستويات الطبيعية لبروتينات البلازما:

بروتينات البلازما (جم / ١٠٠ مل)

المتوسط	المدى	
٦,٨	٧,٨-٥,٨	البروتين الكلى
٤,٣	٥,٦-٣,٥	البيومين
٣,٢	٣,١-١,٦	جلوبولين
٠,٣	٠,٤-٠,٢	فيبرينوجين

وعندما يهبط مستوى الألبومين في البلازما إلى ٣,٥ جم/١٠٠ مل، فإن هذا دليل قاطع على سوء التغذية البروتين في الفرد، وفي الحالات الشديدة يهبط البروتين إلى ١,٥ جم/ ١٠٠ مل، أما مستوى الجلوبيومين فإنه لا يتغير وعادة يرتفع مستواه نظراً لحدوث حالات عدوى، في بعض الحالات تحدث نقص البروتين بالرغم من أن

مقدار البروتين المتناول مناسب، وذلك نتيجة لبعض الأمراض الباثولوجية الأخرى كما في حالة فقد البروتين في البول نتيجة لأمراض الكلى. أو فقد البروتين لحدوث نزيف أو عدم القدرة على بناء البروتين من الأحماض الأمينية نتيجة لمرض الكبد..

ويعتبر ضعف النمو من أهم مظاهر الإصابة بمرض الكواشيوركور، وهو يحدث كما في المراسم إلا أن الإصابة بالاستسقاء ووجود بعض الدهون تحت الجلد تقلل من مظاهر ضعف النمو، ويحدث الاستسقاء نتيجة نقص البروتين الغذائي كما يرجع إلى نقص الأملاح والماء في الوجبة، وهذا الورم قد يظهر في كل أجزاء الجسم بما فيها الوجه، ولكنه يظهر بشكل واضح في الأرجل، كما يتغير لون الجلد، ويفقد الشعر لونه ويتغير إلى اللون الأحمر، كما يتغير اللسان ويصاب الطفل بإسهال ويتأثر الكبد وتضعف العضلات وقد لا يتمكن الطفل من المشي أو الزحف، كما يصاب الطفل بالأنيميا نتيجة نقص البروتين والحديد وبعض الفيتامينات علاوة على نقص امتصاص العناصر الغذائية.

ويوضح شكل (١١-٣أ) صورة لطفلة مصابة بمرض الكواشيوركور، والشكل (١١-٣ب) صورة لنفس الطفلة بعد شهر واحد من العلاج.



شكل (١١-١٣) صورة لطفلة مصابة بمرض الكواشيوركور



شكل (١١-٣٣) صورة لنفس الطفلة بعد شهر واحد من العلاج



## ـ المراسمس marasmus :

### نقص البروتين والطاقة معاً فى الغذاء،

يصاحب أمراض سوء التغذية البروتينية -خصوصاً فى الأطفال- إما نقص السعرات الحرارية لغذاء الطفل أولاً يصاحبها نقص الطاقة، وعند دراسة حالات نقص البروتين والسعرات الحرارية Protein-Energy Malnutrition (PEM) نجد أنها تتدرج مثلما يتدرج تحليل الطيف الضوئى، فتبدأ بمرض نقص البروتين مع السعرات مع عناصر غذائية أخرى وتعرف باسم مراسمس Marasmus فى أحد أطراف الطيف، وتنتهى فى الطرف الآخر بحالة نقص البروتين الكمى والنوعى المعروفة بمرض الكواشيوركور.. وهاتان الحالتان هما طرفا الطيف، وبينهما حالات مختلفة من نقص البروتين والسعرات مع عناصر أخرى وأكثر الحالات البيئية المعروفة هو الكواشيوركور المراسمى Marasmic Kwashorkor وتأخر النمو المعروف باسم Nutritional dwarfism وحالة نقص البروتين مع السعرات الحرارية (PEM) من الحالات الخطيرة فى الدول النامية، فهى المسببة عن وفاة نصف الأطفال قبل سن الخامسة.

والتعبير مراسمس مشتق من كلمة يونانية معناها يفقد، والتعبير مراسمس غذائى Nutritional Marasmus يعادل الجوع Starvation عند الكبار، أما التعبير كراشيوركور فقد استخدم منذ ١٩٢٢، وهو مرض الطفل الثانى ومعناه ذو الشعر الأحمر. ويحدث نقص البروتين والسعرات الحرارية (PEM) عادة للأطفال تحت سن الخامسة، وقد يحدث للكبار ولكن بدرجة أقل، ويكثر المراسمس بين الأطفال تحت سن سنة، أما الكواشيوركور فيكثر بين الأطفال فى السنة الثانية.

ويحدث المراسمس خصوصاً بين الأطفال عندما تقل المسافة الزمنية بين الطفل والآخر أى عند سرعة تكرار الحمل وكذا عند الفطام المبكر المفاجئ المصحوب بتغذية غير سليمة و غير صحية، وخصوصاً إذا أعطى الطفل اللبن مخففاً جداً وبكميات صغيرة أى تكون التغذية ناقصة، السعرات الحرارية والبروتين بالإضافة إلى عدم نظافة المسكن ومكان إعداد الطعام، فتحدث النزلات المعوية بشكل مستمر، وينعكس الطعام عن الطفل ويعطى سرائل غير مغذية.

وحين يصاب الطفل بالمراسمى، فإنه يظهر عليه الهزال ويصبح وزنه أقل كثيراً من المعتاد بالنسبة للأطفال الأصحاء فى مثل سنه، يقل طوله وتنخفض درجة حرارته ويصاب بالإسهال، وتضعف عضلاته ويحف جلدّه وتقل شهيتته والشكل (١١-٤) صورة لطفلة عمرها ١٣ شهراً مصابة بمرض المراسمى قبل وبعد العلاج.



شكل (١١-٤) صورة طفلة (أ) مصابة بالمراسمى عمرها سنتين  
الصورة (ب) نفس الطفلة بعد علاج دام ١٠ شهور

أما الكواشيوركور المراسمى فإنه يتفشى فى الجهات التى ينتشر فيها حالة نقص البروتين والسعرات الحرارية (PEM)، وأعراضه خليط من الكواشيوركور والماراسمى، ويرجع إلى اختلاف نقص التغذية والمستوى الاجتماعى المنخفض والإصابة بالعدوى أو الطفيليات.

وعادة يدخل الطفل إلى المستشفى طلباً للعلاج من حالة (PEM) بعد أن تشد عليه الحالة، ولكن فى بعض الجهات التى يشيع فيها حالة (PEM) فإن انخفاض وزن الطفل أو قصر قامته الناتجتين عن نقص التغذية، لا يشكلان خطورة ولا يبرزان

المظاهر الأخرى لأعراض المرض؛ ولكن الأطفال فى هذه الحالة معرضون للإصابة بمرض الكواشيوركور المراسمى، إذا أصيبوا بأمراض مثل الحصبة أو السل أو الملاريا أو اضطراب الجهاز الهضمى أو أمراض الجهاز التنفسى، ولذا لابد من اكتشاف حالة نقص الوزن والطول بالنسبة للأطفال ميكراً، ويلاحظ أنه لابد من التفريق بين قصر القامة وصغر الحجم الناتج عن نقص التغذية وتلك الحالات الراجعة إلى الأمراض المختلفة الأخرى مثل الأمراض الكلوية أو الاضطرابات الهرمونية أو الخلقية... إلخ، ويمكن عن طريق معرفة التاريخ الغذائى والتاريخ الصحى والكشف الطبى التعرف على حالات (PEM).

وفى بعض الحالات يصاب الطفل بالإسهال عند بدء الفطام، وهو ما يعرف باسم إسهال الفطام Weanling diarrhea وهذه الحالة من الإسهال فى الطفل السليم صحياً أمرها بسيط ويمكن علاجها بسرعة. أما فى الأماكن المنتشر فيها مرض PEM فإنها قد تؤدى إلى الوفاة.

وفى حالات PEM يصاحب الأعراض سابقة الذكر اضطرابات فى ميثابوليزم العناصر المختلفة، فيتغير مستوى الأحماض الأمينية فى الدم، وكذا مستوى الاليومين والجلوبيولين فى الدم، وينخفض نشاط الإنزيمات، وتقل قدرة الكبد على ميثابوليزم الدهون، فتتراكم فى الكبد، وينخفض الجلوكوز فى الدم، وكذا الجلوكوجين فى الكبد، ويقل مستوى البوتاسيوم والمغنسيوم فى الجسم، وقد يتأثر مستوى الصوديوم، ويوضح الجدول (١١-٥) تركيب جسم الطفل فى حالة الصحة والإصابة بمرض (PEM).

جدول (١١-٥) تركيب جسم طفل عمره سنة  
في الحالة الطبيعية وفي حالة الإصابة بمرض (PEM)

الحالة الطبيعية	حالة الإصابة بمرض	
	كجم	%
وزن الجسم	١٠,٠	١٠٠
الماء	٦,٠	٨٠
بروتين	١,٧	١٧
دهن	١,٥	١٥
مواد معدنية	٠,٨	٨

ويلاحظ أن الطفل إذا كان يعاني لمدة قصيرة من حالة واحدة من حالات نقص البروتين والسرعات الحرارية فإنه يمكن شفاؤه، فيرجع إلى حالة النمو الطبيعي على أساس أن الوجبات الغذائية مناسبة، أما إذا كانت الحالة التي يعاني منها الطفل قد استمرت لمدة طويلة، فإنه يمكن شفاؤه ويصبح في حالة صحية جيدة ولكن حجمه ووزنه يظلان أقل من المعدل الطبيعي أما في الحالات الشديدة، فإن شفاء الطفل يصبح أمراً ليس بالسهل وقد أظهرت دراسات Garrow & Pike (١٩٦٧) التي أجريت في جامايكا أنه من بين ٣٤٣ طفلاً دخلوا المستشفى ويعانون من حالات سوء التغذية الشديدة أن ١٥٪ منهم توفى، وأن ١٢٪ كان شفاؤهم بطيئاً، وأن ٣٠٪ كان شفاؤهم بسرعة متوسطة وأن ٤٣٪ كان شفاؤهم سريعاً.

وقد تابع Garrow & Pike (١٩٦٧) الأطفال الذين تم شفاؤهم، ورأى أنهم قد وصلوا إلى معدل الوزن الطبيعي بعد سنوات تتراوح بين ٢، ١٠ سنوات، ولكن يلاحظ أن هناك حاجة إلى دراسات لمعرفة مدى شفاء بعض الأعضاء مثل الكبد والمخ في مثل هذه الحالات، إذا لوحظ أن حالات تليف كبد منتشرة بين المراهقين والبالغين في بعض الجهات المنتشرة فيها حالة PEM وقد يرجع هذا إلى أسباب أخرى مصاحبة لحالة (PEM) أما بخصوص المخ فقد أظهرت بعض الدراسات التشريحية التي أجراها Brown (١٩٦٥) أن حجم المخ يقل في حالة سوء التغذية.

وفي مدينة الإسكندرية، مستشفى الشاطبي الجامعي في دراسة أجرتها هدى بدوى (١٩٨١) على ٣٠٠ طفل في السن ما قبل المدرسة أصيبوا بسوء التغذية من البروتين والطاقة PEM بعد انقضاء فترات مختلفة على علاجهم دلت النتائج على أن متوسط أوزان الإناث والذكور تزيد بزيادة عدد السنوات التي قضاها بعد العلاج فيتمثل الأطفال للشفاء بزيادة الفترة المنقضية بعد العلاج وهذا يوضح ظاهرة اللحاق بالنمو.

ويعالج الحالات المختلفة لنقص البروتين والسعرات الحرارية بين الأطفال بتعاطي مصدر جيد للبروتين والطاقة ويعتبر اللبن خير مصدر لهذا، إلا أن بعض الأطفال يفضل في علاجهم اللبن الفرز لأنهم لا يستطيعون تحمل اللبن الكامل، ويمكن استعمال اللبن الفرز المخفف وبالكازين، وفي الجهات التي يقل فيها انتاج اللبن، فإنه يمكن استعمال خليط من بروتينات نباتية مدروسة على أسس علمية، ويمكن إعطاء الطفل بروتين حوالى ٣,٥ جم / كجم من وزنه فى اليوم، وللطفل الرضيع ٢,٣ جم / كجم من وزنه فى اليوم، والطفل الذى يعانى من اضطرابات هضمية يمكن أن يأخذ ١ جم / كجم / اليوم ويلاحظ أن ٣٠ ملليمتر من اللبن (أوقية) تحوى على ١ جم بروتين أى أن الطفل إذا أخذ ١٠٠ ملليمتر / كجم فى اليوم فإنها تكفى لأن تمدّه بحوالى ٣,٣ جم / كجم من وزنه فى اليوم.

وفي الحالات الشديدة، وفي حالات الأنيميا والقئ ينبغي تصحيح توازن الماء والألكتروليتات وميزان الحموضة والقلوية، وعادة يبدأ العلاج الغذائي فى اليوم التالى حيث يعطى الطفل وجبة اللبن أو الكازين، وفي بعض الجهات تستعمل الوجبة التالية: ٦٠ جم مسحوق لبن فرز، ١٥ جم زبدة، ٢٠ جم دقيق، ٢٥٠ ملليمتر ماء.

وينصح بإعطاء الأطفال عنصرى السليسيوم والكروميوم بفيد فى تحسن استجابة الأطفال للعلاج (كما سبق) وقد ظهر نقص هذين العنصرين فى دم الأطفال المصابين بحالة PEM.

## ٢- البدانة Obesity :

البدانة أو السمنة هي تراكم الدهون فى الجسم نتيجة زيادة السعرات التي تناولها الفرد عن احتياجه، وزيادة وزن الجسم بما يعادل ١٥-٢٠٪ عن المعدل

الطبيعى. وهى تزيد من قابلية الفرد للإصابة بالأمراض المختلفة، ومن بين الأعراض التى يتعرض اليدين للإصابة بها مرض السكر أو أمراض القلب أو ضغط الدم، وقد ترجع الإصابة بهذه الأمراض للكسل أو لأسباب وراثية. وتنتشر السمنة بين النساء فى الوطن العربى من ٤٠-٦٨٪، وفى مصر ٦٢٪.

وتظهر السمنة بتقدم العمر، حيث تقل حركة الفرد بما يؤدى إلى تكديس الدهون. عادة تحدث السمنة بين سن ٢٠-٥٠ سنة، ولكن بعد ذلك يحدث نقص فى الوزن، وفى الشخص العادى فإنه يمكن أن ينظم سرعة عمليات الميتابوليزم ويزيد احتراق الأغذية بدلاً من تراكمها، وهذا التنظيم الفسيولوجى يفقده الشخص البدين، وعادة يقل تحمل الفرد للجلوكوز glucose tolerance، وربما تكون هذه بداية الإصابة بمرض السكر.

وفى كثير من الحالات تحدث السمنة نتيجة فشل مزمن فى التوازن بين ما يتناوله الفرد من طاقة وبين ما يتم استهلاكه (Bray وآخرون ١٩٨٩). والسمنة قد تظهر كما سبق ذكره نتيجة الإفراط فى تناول الغذاء وما به من طاقة تزيد عن احتياج الجسم، وهنا يمكن أن يكون للوراثة دور فى ذلك حتى ولو كان النظام الغذائى الذى يتبعه الفرد مناسباً. وتذكر WHO / FAO (١٩٩٧) أن هناك أنواع من السمنة أو البدانة يلعب فيها تركيب الغذاء، وبخاصة الأغذية فى الدهون، دوراً رئيسياً.

وعلى أى حال فإن ضبط السمنة يكون عن طريق إحداث تغير فى مكونات النظام الغذائى أو تقليل كمية الطعام المتناولة أو زيادة أكسدة العناصر الغذائية.

ويلاحظ أن الفرد قد يكون وزنه أكثر من اللازم نتيجة تراكم الماء فى جسمه، ويمكن معرفة هل زيادة الوزن ترجع إلى دهون بتقدير أو قياس الدهن فى الجسم.

إن حدوث السمنة نتيجة تناول أطعمة تحتوى على مستوى مرتفع من الكربوهيدرات أصعب منه فى حالة ارتفاع مستوى الدهن فى الغذاء، وذلك لأن حجم أو كمية الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات أو الألياف، أكبر من الكمية المطلوبة من الأطعمة المرتفعة فى الدهون، كما أن سعة تخزين الكربوهيدرات فى

الجسم محدودًا، وكذلك مسارات التمثيل الخاصة بتحويل الكربوهيدرات إلى دهون محدودة وتحتاج إلى طاقة كبيرة. علاوة على ذلك فإن تناول الكربوهيدرات ينشط عملية أكسدها ويحافظ على توازنها في الجسم مجرد أن تمتلئ مخازن الجليكوجن (WHO / FAO ١٩٩٧).

كما أن الجسم يسيطر سيطرة تامة على توازن البروتينات، ويلاحظ أن مخزون الجسم من البروتينات لا يزيد إلا استجابة لمثيرات أخرى غير تلك الناتجة عن زيادة بروتينات الغذاء. وعادة فإن الزيادة من البروتين عن حاجة الجسم إلى البناء والصيانة تتحول إلى كربوهيدرات، ويساهم التوازن الموجب للبروتين في إجمالي توازن الطاقة، وذلك بنفس الطريقة التي يساهم فيها التوازن الإيجابي للكربوهيدرات.

أما بالنسبة للدهون فإن عدم التوازن المزمع بين ما يتناوله الفرد من دهن وما يتأكسد منه يؤدي إلى تغير مخزون الدهون في الأنسجة، وحتى يتجنب الإنسان تخزين دهن الطعام لابد أن يتم تأكسده للوصول إلى حالة ثبات في الجسم.

يلاحظ أن تأكسد البروتين والكربوهيدرات يتوقف على مقدار ما يتناوله الفرد منها بعكس الدهون، فإن ما يتأكسد لا يتأثر بما يتناوله منها، ولكن توازن الدهون يرتبط بتوازن الطاقة، فالتوازن السلبي للطاقة يؤدي إلى تنشيط تأكسد الدهون ويتم ذلك بالتمارين الرياضية، أو خفض المتناول من الدهون.

ويلاحظ أن تخفيف الوزن يكون مصحوبًا بميل إلى خفض تأكسد الدهون في الجسم، ولهذا يوصى Schutz وآخرون (١٩٩٢) أنه ينبغي أن يخفض مقدار ما يتناوله من الدهون بمعدل ٢٠ جم/اليوم/ ١٠ كجم تم إنقاصها من وزن الجسم، وذلك حتى لا يعاد اكتساب ما فقده الفرد من وزنه ثانيًا.

ولعلاج السمنة لابد من معرفة أسبابها: هل هي عوامل بيئية أو هرمونية أو نفسية، وعادة يفيد علاج البدانة بالمواظبة على التمرينات الرياضية غير المجهدة، والإقلال من تناول السكريات واللفطائر والدهون، وينصح بعدم إقلال البروتين في الغذاء مع الإكثار من الخضروات والاهتمام بالأحماض الدهنية الأساسية مما يعمل على خفض الوزن دون ضرر. ويلاحظ أن يكون خفض الوزن تدريجيًا لأن الإنقاص

العتيف فى الوزن ضار بالصحة، علامة على أن الأدوية التى تضعف الشهية أو التى تزيل السمنة، والتى يتناولها بعض الناس ضارة بالصحة. يراعى ألا يقل محتوى الوجبة عن ١٠٠٠ كالورى، ويفضل زيادة عدد مرات تناول الأكل مع تقليل حجم الوجبة.

### **٢- النحافة Underweight :**

النحافة عبارة عن مصطلح يدل على انخفاض وزن الجسم عن المعدل الطبيعى بما يعادل (١٥ - ٢٥٪) أو أكثر، وترجع النحافة إلى نقص فى كمية الغذاء مع القيام بمجهود شاق أو تمارين رياضية عنيفة أو فقد الشهية، أو إلى اضطرابات نفسية أو كثرة تناول المنبهات أو إلى حدوث اضطرابات فى الجهاز الهضمى، أو الإصابة بالمرض، أو عدم قدرة الفرد على تمثيل الغذاء.

ويتكيف الجسم لنقص الغذاء حيث يفقد جزءاً من خلايا الأنسجة النشطة، وبذا يقل احتياجه للطاقة، وحيث أن الجسم أصبح خفيفاً، فإنه يتطلب طاقة ميكانيكية أقل للحركة وتقل كل الحركات الإرادية.

ولابد أن يتناول الفرد كميات وافرة من الغذاء مع توافر السعرات فى الغذاء والعناية بالبروتين والفيتامينات والمواد المعدنية والمواد المائلة، مع الاهتمام بعلاج الأنيميا إن وجدت.

وفى حالات النحافة الزائدة الناتجة عن الجوع، فإن الفرد يفقد كل أنسجة التخزين، ويصبح الجلد شبه منفصل ويحدث نقص فى الأنسجة العضلية وحدث أديما، وفى الحالات الشديدة يقل وزن الأعضاء المختلفة ما عدا المخ، ويتغير تركيب الجسم، وتقل قدرته على تكوين الإنزيمات والهرمونات.

وتعالج حالة النحافة الشديدة بتناول كميات غير كبيرة من الغذاء بسبب بطء الجهاز الهضمى، مع الابتعاد عن التوابل، ويفضل تناول اللبن الفرز عن اللبن الكامل لأن إفراز ليبيز البنكرياس يكون ضعيفاً.

### **٣- أمراض القلب والأوعية الدموية Cardiovascular diseases :**


تشير أمراض القلب والأوعية الدموية إلى مجموعة من الاضطرابات تصيب القلب والأوعية الدموية بما فى ذلك أى عيب خلقى فى صمامات القلب أو أى تلف



فى عضلة القلب. ويشكل مرض الشريان التاجى معظم الوفيات نتيجة الإصابة بهذه الأمراض. وتشير Esminger وآخرون (١٩٩٥) أنه قد يحدث انخفاض دوران الدم فى أى جزء من القلب (ischmia) قد يسبب آلاماً شديدة فى الصدر، وقد ينتشر فى المناطق المحيطة. وهناك حالات لا يشعر بها المريض **silent attack** ولكنها ترك آثاراً سلبية على عضلة القلب، وإذا حدث هذا القصور فى ورود الدم إلى المخ يسمى **cerebrovascular disease** ويفقد المريض الإحساس والرعى، وهذا ما يعرف بالسكتة الدماغية.

وتحدث الذبحة الصدرية **angina pectoris** نتيجة نقص ورود الدم لعضلة القلب لمقاومة احتياجاته، وغالباً يحدث الألم عند القيام بمجهود أو فى حالة الإثارة العاطفية.

إن فكرة الناس عن أمراض القلب تنحصر فى التغير الكبير فى تجلط الدم وانسداد الأوعية الدموية والشعور بألم ينتهى بالموت. ولكن هذه هى المراحل الأخيرة من المرض، ولكن بالكشف المبكر يمكن حماية الفرد من كثير من المخاطر. ويحدث انسداد الشرايين **atherosclerosis** إما بواسطة الجلطة الدموية أو بواسطة تراكم الدهون كما فى شكل (١١-٥).



وعاء دموى طبيعى

ترسيبات دهنية على

انسداد الوعاء الدموى

جدار الوعاء الدموى

شكل (١١-٥) مراحل انسداد الوعاء الدموى

ويقوم القلب بضخ الدم تحت ضغط كبير إلى الشرايين المقواة جدرانها بألياف مطاطة وعضلات مرنة، وتنقبض الشرايين وتنبسط مع كل نبضة قلب، وبذا يصل ما فيها من عناصر غذائية إلى جميع أجزاء الجسم، ولذا فإن فقدان ليونتها يؤدي إلى قصور في الدورة الدموية، وغالباً ما يحدث انسداد الشريان التاجي قبل غيره.

ويعرض القلب للفشل heart failure عندما تضعف عضلة القلب لضخ كمية وافية من الدم إلى جميع الأنسجة كما فى حالة الإصابة بأمراض مختلفة، نقص فى العناصر الغذائية، تلف فى الصمامات، عدم انتظام نبض القلب، ارتفاع ضغط الدم، لزوجة الدم، ضيق فى الأوعية الدموية العمل الشاق...

ويتسم مرض القلب التاجي بانخفاض وصول الأكسجين إلى عضلة القلب وتتراوح أعراضه من حدوث الذبحة الصدرية إلى تليف عضلة القلب والموت المفاجئ. ويعزى السبب الرئيسى لهذا المرض إلى تصلب الشريان التاجي بسبب وجود جلطة مرتفعة فى محتواها من الدهون فى المنطقة المبطنه للشريان التاجي. وتبلغ نسبة الوفيات من مرض القلب فى العالم ٣٠٪.

### العوامل المسببة للأمراض القلبية والوعائية :

- ١- المجموعات العرقية ٤- التدخين
- ٢- محتوى الرجة الغذائية ٥- الهرمونات
- ٣- الحالة الصحية للفرد ٦- التوتر النفسى
- ٧- المهنة وظروف العمل.

### ١- المجموعات العرقية Ethnic groups :

أظهرت العديد من الدراسات التى أجريت على نطاق واسع أن انتشار أمراض القلب كان مرتبطاً بارتفاع تناول الأغذية الغنية فى الزبدة، الجبن، اللحم، السكر... فى حين وجد آخرون أن دولاً مثل جمهورية جورجيا فى روسيا وقبائل Masaic فى إفريقيا، وهم يتناولون أغذية غنية فى الدهون الحيوانية، والإسكيمو وهم يتناولون اللحوم والأسماك والحلوى؛ إلا أن المرض لم يكن واسع الانتشار.

وهذا يشير إلى أن المرض غير مرتبط بأسباب غذائية فقط، ولكن قد يوجد عوامل أخرى عرقية تتدخل في هذا الصدد (Ensminger وآخرون ١٩٩٥).

## ٢- محتوى الوجبة الغذائية Dietary components :

### - الكوليسترول :

كانت هناك محاولات عدة لدراسة ارتباط حالة تصلب الشرايين بكمية الدهون المتناولة. وقد توافرت منذ منتصف القرن العشرين وجود علاقة تربط بين ارتفاع مستويات كوليسترول الدم وارتفاع خطر الإصابة بمرض تصلب الشرايين وأن مستوى الكوليسترول ينخفض بارتفاع نسبة الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تساعد في التخلص منه بعد عمليات الميتابوليزم في صورة أحماض الصفراء (Goldsmith ١٩٦٢) كما وجد Keys وآخرون (١٩٨٦) أن السكان الذين يتناولون كميات مرتفعة من الدهون، وخاصة الدهون الحيوانية والكوليسترول، يتسعون بارتفاع نسبي في كوليسترول الدم وارتفاع معدل الوفيات بمرض القلب التاجي بالمقارنة مع السكان الذين يستهلكون الأطعمة المنخفضة في محتواها من الدهون.

ومستوى الكوليسترول المناسب هو ٢٠٠ ملجرام/ ١٠٠ مل دم، على ألا يزيد عن ٢٤٠ ملجرام / ١٠٠ مل دم، وإلا يعتبر مصدر خطر. وبالنسبة للجلسريدات الثلاثية فالمستوى المناسب هو ١٧٥ ملجرام/ ١٠٠ مل دم، وإذا زادت عن ٢٢٠ ملجرام/ ١٠٠ مل دم فإنها تعتبر مصدر خطر.

### - الليبوبروتينات :

تعمل الليبوبروتينات عالية الكثافة HDL على التقليل من خطورة الإصابة بمرض القلب، ويعتقد أنها تقوم بنقل الكوليسترول من أطراف الجسم إلى الكبد لمدمه (Rifkind و Gordon ١٩٨٩). ويشير Hall و Gyton (١٩٩٦) أن HDL أنها تلتقط الكوليسترول قبل ترسيبه على جدران الأوعية الدموية، ويفضل أن يكون مستواها أكثر من ٤٠ ملجرام/ ١٠٠ مل دم على ألا تقل عن ٣٥ ملجرام/ ١٠٠ مل دم. أما الليبوبروتينات منخفضة الكثافة LDL فإنها تقوم بنقل معظم كوليسترول الدم وتعتبر سبباً من أسباب تصلب الشرايين وقد عرف أيضاً أن LDL المتأكسدة ربما

هي السبب الرئيسي في تصلب الشرايين حيث تقوم الخلايا الأحادية (monocyte) بابتلاع LDL المؤكسدة بسهولة وتكون طبقات من خلايا رغوية تؤدي إلى تصلب الشرايين. ويفضل أن يكون مستوى LDL أقل من ١٦٠ ملجم/ ١٠٠ مل دم وإذا زادت عن ١٩٠ ملجم/ ١٠٠ مل فإنها تعتبر مصدر خطر.

### ٢- الأحماض الدهنية غير المشبعة :

لقد ظهر أن الأحماض الدهنية عديدة عدم التشبع PI/SFA وخصوصاً من عائلة w٣ قد يكون لها دور وقائي من الإصابة بمرض القلب (Renaud وآخرون ١٩٨٦)، وخصوصاً حامض Eicosapentaenoic، Docosahexaenoic، فهما يعملان على خفض مستوى الجلسريدات الثلاثية الليبوبروتينات منخفضة الكثافة جداً VLDL. وقد لوحظ انخفاض انتشار أمراض القلب بين السكان الذين يستهلكون السمك، وهو من المصادر الغنية بهذين الحامضين (Leaf و Weber ١٩٨٨).

وقد أظهرت نتائج التدخل أن النظام الغذائي المنخفض في الدهون الحيوانية والمرتفع في الدهون الغنية بالأحماض الدهنية عديدة عدم التشبع قد أدى إلى خفض الكوليسترول (Ferro-Luzzi وآخرون ١٩٨٤).

إن الأحماض الدهنية غير المشبعة تلعب دوراً في تنظيم مستوى كوليسترول حيث تعمل الأحماض أحادية عدم التشبع على خفض كوليسترول الدم. ما دون أن تؤثر على مستوى الليبوبروتينات الثقيلة، أما الأحماض الدهنية عديدة عدم التشبع فإنها تخفض من مستوى كوليسترول الدم مع عملها على خفض الليبوبروتينات الثقيلة، ولهذا ينبغي التوازن بين هاتين الفئتين من الأحماض الدهنية في غذاء الإنسان.

ويعمل حامض لينولييك Linoleic على خفض الليبوبروتينات منخفضة الكثافة، أما حامض الأوليك Oleic فتأثيره بسيط. ويشير Ferro-Luzzi وآخرون (١٩٨٤) أنه عندما تم لإحلال الدهن الحيواني محل زيت الزيتون والكروهيديرات قد أدى إلى ارتفاع ملموس في كوليسترول الدم وفي الليبوبروتينات المنخفضة الكثافة LDL وذلك في محاولات التدخل الغذائي. ومن جهة أخرى فقد أشار Fitro

وآخرون (٢٠٠٠) أن زيت الزيتون يحتوى على فينولات phenols تمنع أكسدة LDL وبهذا يحمى الفرد من الإصابة بأمراض القلب.

والأحماض الدهنية عديدة عدم التشبع، وخصوصاً EPA, DHA فوائد أخرى منها أنها تعمل على سلامة جدر الأوعية الدموية وإطالة الفترة اللازمة لتجلط الدم، كما أنها تكون الإيكوزانويدات eicosanoids المختلفة السابقة الذكر، والتي تعمل على خفض مستوى كولسترول الدم وخفض جميع الصفائح الدموية وسلامة الميتوكوندريا وتضاد فعل هرمونات الابينقرين والنورابنقرين اللذين يعملان على زيادة تحليل الدهون ورفع مستواها فى الدم، وأيضاً تعمل على تقليل أو منع تكوين بروتين Interleukine I الذى يعمل على زيادة تعرض الفرد للإصابة بأمراض عديدة منها أمراض القلب ومرض السكر وفقد الذاكرة.

#### **- الأحماض الدهنية المتناظرة (trans) :**

إن الأحماض الدهنية المتناظرة (trans) الناتجة من هدرجة الزيوت تودى إلى ارتفاع كولسترول الليبوبروتينات المنخفضة الكثافة فى بلازما الدم ولا تؤثر على كولسترول الليبوبروتينات المرتفعة الكثافة (HDL WHO/FAO ١٩٩٧). كما أنها تحل محل الأحماض الدهنية الأساسية فى جدار الخلية مما يودى إلى تغير الميتابوليزم وتؤثر على الإنزيمات المنتجة للإيكوزانويدات والتي لها دور فى خفض كولسترول الدم.

#### **- الأحماض الدهنية المشبعة :**

تعمل الأحماض الدهنية المشبعة على رفع كولسترول الدم لأنها تكون مع الكولسترول استر غير ذائب يسهل ترسيبه، إلا أن تأثيرها يختلف حسب طول السلسلة، ولكن أكثرها تأثيراً هو حامض البالميتيك palmitic وهو أكثرها انتشاراً أيضاً فى الأغذية (Sundram وآخرون ١٩٩٤).

أما حمض الاستاريك stearic فتأثيره حيادى (Kasta و Hayes ١٩٩٢) وقد يبدو أن هذا يرجع إلى تحويله إلى حامض oleic أسرع من غيره.

كما يختلف تأثير الأحماض الدهنية المشبعة باختلاف الجلسريدات الثلاثية من حيث مصدرها هل هى طبيعية أو مصنعة، لأن هذا يؤثر على نمط الأحماض الدهنية

الذى يؤثر بدوره على ميتابوليزم الليبوبروتينات والكولسترول (Kritchevsky ١٩٨٨).

ويلاحظ أيضًا أن تأثير هذه الأحماض الدهنية المشبعة يختلف باختلاف مستوى كولسترول الدم، حيث يزيد تأثيرها فى رفع كولسترول الدم إذا كان مستواه أكبر من ٤٠٠ ملجم/ ١٠٠ مل بعكس حالات المستوى الطبيعى للكولسترول. كما أن مصادر الطاقة فى الوجبة يؤثر على ميتابوليزم الكولسترول (Kritchevsky ١٩٨٨).

### - البروتين :

إن نقص البروتين قد يؤدى إلى رفع كولسترول الدم، فالبروتين يدخل فى تكوين الليبوبروتينات الهامة فى ميتابوليزم الكولسترول وحركة الدهون. فهو يحتوى على حامض الميثايونين methionine الذى هو مصدر مجموعة الميثيل methyl اللازمة لتكوين الفوسفوليبيدات والكارتين Carnitine وهى من المركبات اللازمة لميتابوليزم ونقل الدهون.

### - الفيتامينات والمعادن :

إن نقص هذه العناصر الغذائية مرتبط بالإصابة بأمراض القلب المختلفة مثل فيتامينات C, E ومركبات الكاروتين تقلل من نشوء وتطور تصلب الشرايين (Riemersme ١٩٩١)، فهى مضادات التأكسد التى تقلل من تأكسد الليبوبروتينات المنخفضة الكثافة LDL وكذلك تحمى الجسم من مخاطر البروكسيدات والشارد أو الأصول الحرة الضارة بالجسم.

كما يعمل فيتامين E مع السلينيوم على حفظ مستوى معين من مرافق إنزيم Q فى عضلة القلب الذى يدخل فى ميتابوليزم الطاقة، وعند نقصه تعجز الأنسجة عن توليد الطاقة اللازمة لها. كما أن نقص السلينيوم مرتبط بتلف الأوعية الدموية التى ترشح فى الأنسجة المحيطة (NAS ١٩٧٦).

كما أن نقص الكروميوم يعمل على سوء ميتابوليزم الكربوهيدرات والدهون، لأن الكروميوم مرتبط بزيادة فاعلية الإنسولين، ويتج عن ذلك ارتفاع الجلوسريدات الثلاثية فى الدم (Scheig ١٩٧٤). وتكثر هذه الحالات عند زيادة تناول السكر

المكرر، والدقيق الأبيض وغيره من الكربوهيدرات النقية جدًا، لأن هذا يؤدي إلى نقص الكربوميوم في هذه الأغذية وكثرة تناولها يؤدي إلى انخفاض المخزون منه في الجسم.

ولمعدان الآثار دور أيضًا؛ إذ لها وظائف عدة منها تنظيم ضربات القلب وضغط الدم ومنع التجلط وعدم التصاق الصفائح الدموية أو الكرات الدموية ولذا فإن نقصها يؤدي إلى خلل هذه الوظائف.

ويلاحظ أن ارتفاع مستوى الكالسيوم في الماء العسر قد يكون له آثار سلبية في زيادة نسبة الوفيات بأمراض القلب.

### ٣- الحالة الصحية :

إن السمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر من العوامل المساعدة للإصابة بأمراض القلب.

**٤- التدخين** يؤدي إلى زيادة الإصابة بأمراض القلب لأن تأثير أول أكسيد الكربون CO يؤثر تأثيرًا بالغًا في الأوعية الدموية ويعمل على خشورتها، مما يعمل على ترسيب أو تراكم الدهون. وللتيكوتين ضرر بالغ على عضلة القلب ويزيد من احتياجها للأكسجين، ويسرع من ضربات القلب.

**٥- ولهرمونات** أيضًا دور، وخصوصًا في الرجال وفي النساء بعد الوصول لسن اليأس، إذ تعمل الهرمونات الأنثوية على حماية المرأة من هذا المرض، ولذا تتساوى نسبة الإصابة لديهن مع الرجال بعد سن ٥٠ سنة.

كما أن هرمون الغدة الدرقية دور، حيث أن قابلية الفرد للإصابة تزيد بانخفاض هذا الهرمون.. كما أن زيادة هرمون الإنسولين عند بدء الإصابة بمرض السكر يساعد على ترسيب الدهون على جدر الأوعية الدموية.

**٦- التوتر النفسي** وما يؤديه من خلل في الهرمونات، ونوع العمل الذي يقوم به الفرد حيث أن المخترعات الحديثة أدت إلى إحلال العمل الميكانيكي محل العمل اليدوي فانخفض نشاط الجسم مما يزيد من تعرض الفرد للإصابة بالمرض. علاوة على متاعب المهنة وظروفها حيث قد يتعرض الفرد إلى غازات مثل ثاني أكسيد الكبريت والأبخرة الضارة.

ولا يُنسى عامل الوراثة؛ فقد لوحظ أن نسبة الوفيات بأمراض القلب بين الرجال في مقتبل العمر قد زادت في العائلات التي عُرف أنها تعاني من هذا المرض.

### **- التغذية في حالة مرضى القلب Cardiovascular Diseases :**

ينصح مرضى القلب وخصوصاً بين أفراد العائلات التي يكثر فيها هذا المرض بوجّه خاص من هم أقل من ٥٠ سنة من الرجال ويعانون من ضغط الدم والسمنة، فإنهم يتبعون نظاماً غذائياً معيناً تحت الإشراف الطبي على أن تحتوي وجباتهم على دهون بما لا يزيد عن ٣٠٪ من الطاقة الكلية للوجبة، على أن يكون ثلث هذه الطاقة من الأحماض الدهنية المشبعة من الأحماض الدهنية وحيدة عدم التشبع و  $\frac{1}{3}$  من الأحماض الدهنية عديدة عدم التشبع على أن يكون نسبة  $w_6 : w_3$  تعادل ٤-٦ : ١. وتجنب الزيوت المهدرجة، ملح الطعام، السوائل والمنبهات، والتدخين. وعليه أن يتناول المواد النشوية محل السكرية كلما أمكن، وتجنب زيادة الوزن والإكثار من عدد الوجبات مع العمل على أن تكون الوجبة صغيرة، والإكثار من تناول الخبز الأسمر والسّمك والخضروات والفواكه والاهتمام بتناول الأغذية الغنية بالسليسيوم ومضادات التأكسد ومزاولة الرياضة وتجنب الانفعالات النفسية والعصبية وأيضاً تجنب التلوث البيئي.

### **السرطان Cancer :**

يعتبر مرض السرطان من أمراض العصر، وهو ثاني مرض مسبب للوفاة بعد أمراض القلب. وقد أدت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والغذائية أيضاً إلى زيادة انتشار هذا المرض في كل العالم المتقدم والنامي.

والسرطان مجموعة من حالات تتضمن نمواً غير محكم للخلايا في أنسجة الجسم المختلفة (الدم والنخاع... إلخ) وتبدأ بتكاثر غير طبيعي وسريع في أحد الخلايا، وتقوم هذه الخلايا السرطانية بمهاجمة الأنسجة السليمة وتحطّمها، وسبب الإصابة قد يختلف في كل جزء عن الجزء الآخر في الجسم.

بالإضافة إلى العوامل الوراثية والبيئية فهناك أسباب ترجع للتغذية مثل وجود مواد تسبب السرطان carcinogenic في الأطعمة قد تكون طبيعية أو نتيجة الطهي أو الحفظ...



وتلعب المواد الغذائية دوراً أيضاً في تنشيط المواد المسببة للسرطان مثل نواتج الأكسدة الزائدة peroxidation للدهون، المواد الملونة الصناعية، وكذلك تناول الدهون بكثرة والتدخين ... إلخ.

ابتدأت الدراسات على مرض السرطان وعلاقته بمستوى الدهون في غذاء الفيران والجربان منذ منتصف القرن العشرين حيث ظهر أنها تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي والجلد عند تغذيتها على مستويات مرتفعة من الدهون أكثر من الحيوانات التي تغذت على أطعمة منخفضة في الدهون، إلا أن هذه الدراسات لم تلقَ اهتماماً حتى ظهر من الدراسات الوبائية أن انتشار السرطان في مواقع مختلفة من الجسم كان أعلا في البلدان التي تعتمد في غذائها على أطعمة مرتفعة في الدهون (Carroll ١٩٧٥). كما أظهرت دراسات Sheppard و Prentice (١٩٩٠) أن تغير نمط الاستهلاك من الأطعمة منخفضة المحتوى من الدهون إلى الأطعمة مرتفعة المحتوى من الدهون يكون مقترناً بارتفاع في معدل الإصابة بمرض السرطان في مواقع مختلفة من الجسم بين المهاجرين من اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كما ظهر من دراسات Howe وآخرون (١٩٩٠) أن هناك علاقة إيجابية بين المتحصل عليه من الدهون المشبعة وبين الإصابة بسرطان الثدي بين النساء اللواتي تجاوزن سن الإنجاب. كما وجد أن هناك علاقة ارتباطية إيجابية بين سرطان القولون وبين تناول ممرضات أمريكيات خفيفات الدهون الحيوانية، والدهون المشبعة، والدهون أحادية الرابطة غير المشبعة، وإن كانت العلاقة غير دالة إحصائياً. ولكن أشار Willett وآخرون (١٩٩٠) أن هذه العلاقة نسبت إلى مساهمة الدهون الكلية في إجمالي طاقة الغذاء.

وقد أشارت Carroll (١٩٩٤) أنه يبدأ تأثير دهون الطام بشكل رئيسي خلال مرحلة التحفيز لبدء نشوء السرطان.

وفي الدراسات التجريبية على الحيوان، وجد أن المستويات المرتفعة من الدهون تؤدي إلى زيادة عدد الأورام في مرحلة التحفيز، وكذلك في حالة ارتفاع حامض اللينولييك Linoleic (٤-٨٪) مع ارتفاع نسبة دهون الطعام (٢٠٪) أما ارتفاع الأحماض الدهنية غير المشبعة من عائلة  $w_3$  فقد أدت إلى انخفاض الإصابة،

وأيضاً انخفاض طاقة الغذاء أدت إلى نتائج إيجابية (Ruebuck ١٩٩٢). كما لوحظ وجود علاقة ارتباطية عكسية بين حامض اللينولييك linoleic والإصابة بسرطان الجلد (Fischer وآخرون ١٩٩٢)، ويمكن منع حدوث سرطان الجلد بتقليل كمية طاقة الغذاء (Birt وآخرون ١٩٩٣).

وتوصل العلم الآن إلى معرفة مراد تعوق أو تعطل انتشار السرطان، مثل تناول بتاكاروتين أو فيتامينات A أو C, E والألياف الغذائية، كما سبق ذكره، والسليسيوم.

وينصح بالإكثار من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والألياف الغذائية ومصادر الفيتامينات السابقة الذكر، وأيضاً السليسيوم، والاعتدال في تناول الطاقة مع توازن مصادرها والإقلال من الدهون -مع التوازن بين أنواعها حسب درجة التشبع كما سبق- أو الأغذية المحفوظة أو المضاف إليها ألوان صناعية، ممارسة الرياضة وتجنب التوتر والتدخين.

وهناك محاولات كثيرة حول العالم لاستخدام الألوان الطبيعية بدلاً من استخدام الألوان الصناعية، فتمكن El Hendy وآخرون (١٩٩٦) من استخراج صبغات الألوان الخضراء من البقدونس، والحمراء من الكركديه، والصفراء من الجزر، كما أنتجوا ألواناً أخرى من مزج هذه الألوان معاً، واستخدموها في إعداد بعض الأغذية مثل الجيلي والكيك وبعض أنواع المخبوزات، وأعطت نتائج جيدة، بل تفوقت في الخصائص العضوية الحسية organoleptic والفيزيكية physical للمنتجات.

### **ارتفاع ضغط الدم Hypertension :**

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الصحية المرتبطة بغيرها من الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب والكلى... وينتشر ضغط الدم بين البالغين بنسبة ١٠-٢٠٪ في العالم، وتبلغ في مصر حوالي ٢٠٪.

ويعتمد ضغط الدم على قدرة عضلة القلب على الانقباض المستمر وعلى كمية الدم الموجود في الجهاز الدوري. كما يعتمد أيضاً على قطر الشعيرات الدموية، فإذا حدث لها ضيق فإنه يؤدي إلى زيادة مقاومة الدم المتدفق إليها من الشريان، وهذا يعمل على ارتفاع ضغط الدم.

يمثل الضغط رقمين الرقم الأعلى ويسمى بالضغط الانقباضى 'systolic وهو يمثل ضغط الدم عند انقباض البطين الأيسر للقلب واندفاع الدم بقوة إلى الشرايين، أما الرقم الأسفل فيمثل الضغط الانبساطى 'diastolic وهو يمثل ضغط الدم عند انبساط البطين الأيسر. ويعتبر الضغط الانبساطى معتدلاً بين ١٠٥ - ١١٤ مل زئبق، وإذا زاد عن ١١٥ مل زئبق يعتبر عالياً. وفى بعض الحالات يرتفع الضغط الانقباضى فقط فقد يصل إلى ١٦٠ مل زئبق بينما الضغط الانبساطى يكون ٩٠ مل زئبق.

وارتفاع ضغط الدم قد يكون ليس له سبب واضح، وسمى بارتفاع ضغط الدم الأولى، هذا ينطبق على ٩٠-٩٥٪ من الحالات، وهنا يكون العلاج التغذوى هو الأساسى.

أما ارتفاع ضغط الدم الثانوى فهو حالة تكون مصاحبة لحدوث حالات مرضية أخرى مثل أمراض الكلى أو ضيق الشرايين... إلخ. ودائماً يصاحب ارتفاع ضغط الدم صداع، وخصوصاً آخر النهار أو ليلاً مع عدم القدرة على التركيز. وتشير WHO/FAO (١٩٩٧) أن هناك علاقة أكيدة بين ارتفاع ضغط الدم وبين البدانة، وكذلك ملح الطعام.

وبالنسبة للبروتين فقد ظهر فى دراسة على النباتيين الذين يتصف غذائهم بارتفاع نسبة الدهون غير المشبعة إلى الدهون المشبعة أنهم يتميزون بانخفاض الدم بمقارنتهم بزملائهم غير النباتيين، ولكن لوحظ ازدياد تدريجى لضغط الدم بتناولهم البيض وتنفق هذه النتيجة مع ما لوحظ من انخفاض ضغط الدم لدى مجموعة يعانون من ارتفاع طفيف فى ضغط الدم نتيجة اتباعهم نظام غذائى نباتى (Margetts وآخرون ١٩٨٦). وأشار Sacks وآخرون (١٩٨٧) أن استبدال الدهون المشبعة بكاربوهيدرات أو حامض لينولييك لم يُعطِ دائماً نتائج مرغوبة.

أما بالنسبة للدهون فإن الدراسات التى أجريت كانت نتائجها متضاربة ولكن التعديل الذى يجرى على دهون الغذاء بهدف تخفيض دهون الدم يؤثر بطريقة غير مباشرة على ضغط الدم إذ يؤدى إلى إبطاء عملية تصلب الشرايين. وتنازل مستويات مرتفعة من الأحماض الدهنية غير المشبعة يؤدى إلى انخفاض ضغط الدم

المرتفع، إلا أن هذه النتيجة ليست حاسمة إذا قورنت بنتائج تقييد تناول الصوديوم أو تخفيف الوزن.

### **التغذية فى حالة ضغط الدم Hypertension :**

تجنب تناول ملح الطعام والمشروبات الكحولية والمنبهات وتقليل المتناول من الطاقة والدهون، على أن تحتوي الأغذية على الأحماض الدهنية غير المشبعة من عائلتى  $w_3$ ,  $w_6$  ، مع الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات، مع تجنب الانفعالات النفسية أو زيادة الوزن، وتجنب التدخين وممارسة الرياضة والإكثار من الأغذية الغنية بالكالسيوم والعمل على تخفيض الوزن. وحديث بالذكر أن نسبة الإصابة تتراوح بين ١٠ - ٢٠٪ فى العالم وفى مصر حوالى ٢٠٪ والكويت ١٦٪ والبحرين ١٧٪.

### **مرض السكر Diabetes Mellitus :**

ينتشر مرض السكر فى دول العالم النامى وزيادة مستمرة، إذ أنه وثيق الصلة بالتحضر والتمدن. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بمرض السكر وصل إلى ٤٠ مليون فرد (زهير السباعى ١٩٩٥).

ومرض السكر حسب WHO (١٩٨٠) هو حالة مزمنة لارتفاع نسبة الجلوكوز فى الدم نتيجة لعوامل بيئية أو وراثية وغالباً ما تتضافر مع بعضها. وقد يرجع ارتفاع السكر فى الدم إما إلى عدم إفراز الإنسولين وهو الهرمون المنظم لمستوى جلوكوز الدم من خلايا بيتا فى البنكرياس، أو إلى زيادة العوامل التى تضاد مفعوله أو عدم حساسية مستقبلات الإنسولين لدخول الخلايا... وهذا يودى إلى حدوث خلل فى ميثابوليزم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون... وأعراض مرض السكر الرئيسية تشمل الغيبوبة الكيتونية فى الدم ketoacidosis وغيبوبة السكر diabetic coma وتلف الأوعية الدموية للكلية ولشبكية العين، بالإضافة إلى أضرار فى الجهاز العصبي الطرفى وزيادة احتمالات الإصابة بتصلب الشرايين.

وينقسم مرض السكر حسب ADA (١٩٩٨) إلى أربعة أنواع :

١- النوع الأول : Type I Diabetes وفيه يحدث تدمير لخلايا بيتا فى البنكرياس وعادة يودى إلى نقص مطلق فى الإنسولين.

٢- النوع الثانى : Type II Diabetes ويتراوح هذا النوع ما بين زيادة فى مقاومة الإنسولين مصحوب بنقص نسبي للإنسولين إلى النقص الشديد فى إفراز الإنسولين مصحوب بمقاومته.

٣- أنواع أخرى من مرض السكر متعلقة بأمراض البنكرياس، إما خلل جينى genetic defects فى خلايا بتا بالبنكرياس، أو فى عمل الإنسولين، أو أمراض خاصة فى إفراز البنكرياس الخارجى exocrine أو الداخلى endocrine أو تأثير أدوية أو عدوى ....

#### ٤- سكر الحمل Gestational Diabetes Mellitus :

ولعلاج مرض السكر فإن الطريق المثالى هو الذى يمنع أو يقلل حدوث الآثار الحادة للمرض وإلى تأخير ظهور بعض التأثيرات المزمنة، بل وتجنب حدوث نسبة كبيرة من المضاعفات (Guyton ١٩٨٢، UKPDS ١٩٩٨، سحر البساطى ٢٠٠٠).

ويشكل النظام الغذائى الركيزة الرئيسية لعلاج مرض السكر لتهيئة الفرصة للعلاج الدوائى لتفكيكه ولتجنب الكثير من المخاطر. ويجب أن يبنى النظام الغذائى لمريض السكر على الاحتياجات الغذائية للمريض ونسب العناصر الغذائية فى الوجبة (ADA ١٩٩٩، Mohan و Raghavan ١٩٩٩).

#### وتتميز محتويات الوجبة على :

- **الطاقة** : إن الاهتمام بالمحتوى الكلى للطاقة فى وجبة مريض السكر يقع فى المرتبة الأولى، ويجب أن يبنى على أساس الوزن المثالى للمريض والذى يقل بنسبة ٥٪ عنه فى الفرد العادى (ADA ١٩٩٩). لأن هذا يؤدي إلى خفض وزن المريض البدن حيث أنه يعمل على التحكم فى جلوكوز الدم ويزيد حساسية الإنسولين ويحسن من صورة الدم المتعلقة بتركيز الليبوبروتينات والذى يشمل خفض الليبوبروتينات المنخفضة جداً VLDL والخفيفة LDL وزيادة المرتفعة HDL. علاوة على أن خفض الوزن يؤدي إلى زيادة الاستفادة من البروتين وتحسين وظائف الجسم،

وخصوصاً الرئتين، وخفض ضغط الدم المرتفع ويقلل من مخاطر العمليات الجراحية (Kissehah و Scheman ١٩٩٨).

ويفضل أن تحتوى الوجبة على البروتين بنسبة ١٢-٢٠٪ على ألا يزيد عن ذلك حتى لا يحدث أى ضرر للكلى (Brunner ١٩٨٢) ويوصى Raghavah و Mohan (١٩٩٩) أن تكون معدل البروتين للبالغين ٠,٨ ٪ كجم وزن الجسم على أن يكون بين ٠,٤-٠,٨ كجم / وزن الفرد بالنسبة مريض الكلى (Wylie ١٩٩٨)، وأن تشكل الكربوهيدرات ٦٠٪ من الطاقة Morrison و Harlo (١٩٩٦) لأنها تزيد من ميثابوليم الجلوكوز داخل الخلية، ويزيد معدل تكوين الجليكوجين وتحليله فى الكبد والعضلات، ويفضل أن يستمد ٣ الكربوهيدرات من الخبز الأسمر و ٣ من الخضروات و ٣ من الفاكهة. ويراعى التقليل من الدهون وخصوصاً المشبعة على ألا تزيد عن ٣٠٪ مع الاهتمام بتناول الألياف من ٢٠ - ٢٥ جم، ولا تتعدى ٥٠ جم/ اليوم لأنها علاوة على أنها مسئولة عن زيادة حجم الوجبة، فإنها تنظم هضم وامتصاص الكربوهيدرات مما يؤدي إلى ارتفاع تدريجى فى السكر وليس مفاجئاً. وقد وجدت عراطف شاهين (١٩٨٥) وإيزيس نوار وآخرون (١٩٩٦) أن إضافة الردة بنسبة ٢٠٪ إلى الخبز والكيك والمخبوزات الأخرى أدى إلى خفض تدريجى لجلوكوز الدم. هذه الوجبة المرتفعة فى الألياف والكربوهيدرات والمحدودة فى الدهون تقلل من الاحتياج للإنسولين وتزيد من حساسيته فى جدر الخلايا والأنسجة وتخفيض كولسترول الدم.

وينصح بتعدد عدد الوجبات اليومية من ٥-٦ وجبات مع مزاوله الرياضة وتجنب زيادة الوزن والتدخين والتوتر والانفعال النفسى.

#### قرحة المعدة gastric ulcer :

#### قرحة الاثنى عشر doudenal ulcer :

تعتبر القرحة من أمراض العصر والمدنية الواسعة الانتشار ويصاب بها الفرد الفرد نتيجة تآكل أو ثقب فى الغشاء المخاطى المبطن للمعدة والأمعاء وإن كان هناك اعتقاد بأنها نتيجة التآكل أو الهضم الذاتى للغشاء المخاطى بفعل حامض

الهيدروكلوريك و/ أو إنزيم الببسين ولكن لايزال المرض غير معروف الأسباب. وهناك بعض عوامل تساعد على حدوثها مثل التدخين، كثرة شرب الشاي والقهوة، تناول المواد الحارة والقابضة، عدم مضغ الطعام جيدًا، عدم الانتظام فى تناول الطعام، كثرة تناول الأسيرين، أدوية الروماتيزم، التوتر النفسى، الإجهاد العقلى، بعض أنواع الجراثيم *Helicobacter-pylori*.

ومع الراحة التامة والعلاج بالأدوية لتخفيف الأعراض، ويقوم على ثلاثة أسس:  
أ - معادلة حامض الهيدروكلوريك الذى تفرزه المعدة باستمرار، وهذا يتأتى بالتغذية على فترات قصيرة.

ب- تقليل إفراز الحامض وحركة المعدة، وهذا يتأتى عن طريق تناول كميات معتدلة من اللبن ومنتجاته والبيض والقشدة والزبدة والزيت، مع تجنب التوابل وخصوصًا الحارة، والمشروبات الكحولية والغازية والمنبهة. وتجنب الأطعمة المولدة للغازات مثل البصل، الكرنب، البقول، الخيار لأنها تسبب الانتفاخ الذى يزيد من الشعور بالألم.

ج- تجنب التأثيرات الكيميائية والميكانيكية، وهذا يتأتى عن طريق تناول المواد سهلة الذوبان فى الماء أو المستحلبة مع تقليل الفواكه والخضر الطازجة وتجنب التدخين، وعلى أى حال يجب أن تكون الوجبات الغذائية محتوية على جميع العناصر الغذائية اللازمة. ويلاحظ أن نواتج هضم الدهون فى الاثنى عشر يخفز من إفراز هرمون الانتروجاسترين الذى يقلل من إفراز العصارة المعدية، ولكن ينصح بتجنب الأطعمة المقلية.

## - النقرس Gout :

ينتج النقرس نتيجة لتغير ميتابوليزم قواعد purines فى الدم ويتسبب ملح هذا الحامض مع الصوديوم، ويسبب آلامًا فى المفاصل وأطراف العضلات مع ألم. ويتكون حامض اليوريك إما عن طريق الغذاء أو نتيجة تحلل purines داخليًا، وقد يرجع ذلك لأسباب وراثية أو السمعة أو كثرة تناول الدهون واللحوم والمخ والكبد والفول والعس، وقد يصاب به الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

ومرض السكر وأمراض القلب واضطراب الغدة الدرقية لأنه قد يزيد من إفراز حامض اليوريك أو يعطل من إخراجها عن طريق الكلى. كما يزيد فى الرجال عن النساء، وتصاب به المرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

وعادة تظهر الأعراض إذا ارتفع مستوى حامض اليوريك عن ٦ ملجم/ ١٠٠ مل دم عند الرجال، و ٥ ملجم/ ١٠٠ مل دم عند النساء.

وينصح بتناول الخضروات والفاكهة لأنها تساعد على تقليل تكوين حامض اليوريك، وشرب كميات كبيرة من السوائل لأنها تساعد على تخفيف البول، ومنع تكوين حصوة فى الكلى نتيجة ترسيب حامض اليوريك.

تناول المواد النشوية وتقليل تناول الدهون، تجنب تناول الأغذية الغنية بالبيورين مثل المخ والكبد والكلى والسردين المقلب والعدس والفاصوليا وخلاصة اللحم. العمل على تقليل الوزن وتجنب التدخين والضغوط النفسية والإجهاد والمشروبات الكحولية.

#### - تليف الكبد Liver Cirrhosis :

يحدث تليف الكبد نتيجة تكوين نسيج ليفى به ندب، ويؤدى ذلك إلى فشل الكبد عن القيام بوظائفه الحيوية. ويتم تليف الكبد تدريجياً، ويشعر الفرد بفقد الشهية وانخفاض شديد فى الوزن وبروم الساقين.

ويحدث المرض لأسباب عديدة منها سوء التغذية، وخصوصاً فى البروتين، وتراكم الدهون بالجسم، وكثرة تعاطى المشروبات أو الإصابة بفيروس الكبد B, C أو الإصابة بالبلهارسيا حيث تصل البويضات للكبد وتستقر فى الأوعية الدموية للكبد، وكذلك وجود سموم فى الطعام من بينها، بل أهمها، الأفلاتوكسين aflatoxin، كما يحدث تليف الكبد عند انسداد أوردة الدم نتيجة الإصابة بأمراض القلب، أو إصابة الجهاز المناعى (Knapp ١٩٩٠).

وينصح بتناول أغذية غنية فى النشا والبروتين بمعدل ١,٢ جم / كجم وتصل الطاقة المتناولة يومياً إلى ٢٠٠٠ كالورى، والاعتدال فى تناول الدهون، ولابد من تناول الفيتامينات خصوصاً A ومجموعة B. وتجنب الأغذية المالحة، وتجنب التدخين وزيادة الوزن.



## الحساسية Allergy :

نتج الحساسية نتيجة لامتنصاص كميات ضئيلة من البروتين غير المهيضم وتفاعله مع الأنسجة الحساسة لهذا الجسم، ويحدث الامتنصاص عن طريق الجهاز الهضمي أو عن طريق الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي، وقد يحدث الامتنصاص عن طريق الجلد، وتكثر الحساسية بين الرضع والأطفال. وقد ظهر أن البيض واللبن من أكثر الأغذية المسببة للحساسية، وقد يرجع ذلك إلى أنهما من الأغذية التي تعطى مبكرًا للطفل، وقد تختفى هذه الحساسية بعد حوالي ٥ سنوات، وقد يصاب الفرد بالحساسية نتيجة استنشاق الهواء المحمل بحبوب اللقاح والأتربة، وهناك أنواع متعددة للحساسية:

هناك الحساسية الجلدية وبعضها وراثي وبعضها غير وراثي :

فالحساسية الوراثية قد تصيب الأغشية المخاطية للقناة الهضمية وترجع أسبابها إلى أكل غذاء معين، وقد تصيب الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي بسبب الهواء المحمل بذرات من الغذاء، والروائح الغذائية الطيارة. وقد تصيب الجلد بسبب تناول أنواع معينة من الأغذية، وقد يصاب الفرد بالحساسية نتيجة تناول مستحضرات علاجية قد تسبب حالة الحساسية.

أما الحساسية غير الوراثية فقد ترجع إلى الحقن بحقن تحوي مستخلصات الأعضاء مثل الكبد أو فاكسينات الفيروس، وتتميز هذه الأنواع من الحساسية بأنها حالات تشبه الصدمة.

وهناك حساسية غير وراثية وغير جلدية ومسبباتها غير معروفة، وأكثرها شيوعًا ما يؤثر على الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي، وترجع إلى تعاطي الأطعمة المحتوية على العامل المسبب للحساسية، وهناك أطعمة تسبب الحساسية في الإنسان البالغ، وأشهرها الذرة و"مح"، وهناك أيضًا أطعمة مثل اللحوم الحيوانية والبحرية والفواكه والخضروات والمكسرات والشيكولاتة والكافور وعسل النحل وغيرها. وعلاج هذه الأنواع من أمراض الحساسية هو الامتناع عن الأطعمة المسببة للحساسية أو عن العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض.

## هشاشة العظام Osteoporosis :

يحدث نتيجة نقص فى كتلة العظام وعدم تعويض الكالسيوم المفقود فى الدم، وتكون هشّة عرضة للكسر. ويحدث هذا المرض إما نتيجة نقص تناول الكالسيوم، وزيادة تناول الأغذية المرتفعة بالبروتين والملح لأنها تعمل على فقد الكالسيوم مما يودى إلى انخفاض كثافة العظام، انخفاض الحركة لأن النشاط والحركة تعمل على تقوية العظام، وأيضاً زيادة التدخين، ونقص إفراز هرمون *estrogene* فى المرأة، وتناول المشروبات الكحولية.

وينصح بتناول الأغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين D, C وتناول كميات معتدلة من الفوسفور والبروتين، والإقلال من تناول ملح الطعام حتى لا يزيد خروج الكالسيوم مع إفرازات الكلى ومزاولة الرياضة وتوازن الوجبة الغذائية.

## تسوس الأسنان Dental caries :

يقصد بتسوس الأسنان هو ظهور أعراض مرضية فى الأسنان يصحبها تغير فى نسيج السن تودى إلى حدوث تجويف، ويعمل على حدوث التهابات فى اللثة والقم واللوزتين والمفاصل والكلى...

وينتشر تسوس الأسنان وخصوصاً بين الأطفال، ويتراوح ما بين ٠,٣ - ٥٠٪ بين أطفال الدول العربية ويكثر فى الحضر عن الريف.

ومن أسباب تسوس الأسنان هو مهاجمة الميكروبات للسنّة لأسباب لازالت غير معروفة، وقد تكون نتيجة تحوّل السكر إلى مواد حامضية تسبب إذابة طبقة المينا وتلف طبقة العاج، ويوصل الجراثيم إلى لب السن تحدث التهاباً مؤلماً. ويعتبر الغذاء الغنى فى السكر، وخصوصاً السكر الذى يضاف للغذاء من أسباب التسوس... ويزيد التسوس بزيادة كمية السكر المتناولة مثل الحلويات مع قلة تناول الخضروات والفواكه، وكذلك تركيب السن من حيث انخفاض صلابتها، خشونة العاج، التهاب اللثة، ووجود شقوق وحفر فى السن، بالإضافة إلى نوع اللعاب من حيث لزوجته وضعف قلوبته، كلها من العوامل التى تساعد على تسوس الأسنان.

ولهذا ينصح بالاهتمام بتناول الأغذية الغنية فى الكالسيوم والفوسفور وفيتامين D والأغذية الغنية أيضاً بفيتامين A, B, C، والفولورين وأيضاً الأغذية البروتينية لضمان سلامة تكوين الأسنان، مع الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه، وتنظيف الأسنان بعد كل وجبة، ويفضل استعمال معجون الأسنان المحتوى على فلورين.

## مرض فقدان الذاكرة Alzheimer's Diseases :

سمى هذا المرض باسم الطبيب الألماني Alois Alzheimer الذى كان أول من شخص هذا المرض على أحد مرضاه عام ١٩٠٦. ومن خصائص هذا المرض انخفاض القدرة العقلية وكثرة النسيان وعدم التمكن من عمل بعض العمليات الحسابية، وأحياناً فقدان القدرة المكانية وقدرة تحديد الزمن. وتنتشر هذه الحالة بين النساء أكثر من الرجال وعادة تظهر بين الأفراد الذين تخطوا السبعين عاماً وقد تظهر قبل ذلك. وتشير Ensminger وآخرون (١٩٩٥) أن ظهرت بعض حالات اضطراب فى الكيمياء العصبية وأن هناك نقص فى الناقل العصبى استيل كولين والمعروف بدوره فى التعلم والتذكر. وقد ينتج هذا المرض نتيجة التهاب فى المخ، فقد ظهر من الدراسات التشريحية تكون مادة interleukin IB سابقة الذكر مركزة فى مناطق المخ

الثالفة (Simopoulos و Robinson ١٩٩٩).

وقد يكون للتلوث البيئى دور فى ذلك فقد أشار Alfrey و Zatta (١٩٩٧) أن التلوث بالألومنيوم يؤثر فى شكل الخلايا العصبية ونشاط الإنزيمات وتكوين الناقلات العصبية. كما وجدت وفاء فرس (٢٠٠٢) أن تغذية الفيران على غذاء مرتفع فى الألومنيوم أدت إلى صغر مخ الفيران وظهور تراكمات وتجمعات فى الوصلات العصبية وانخفاض عدد الناقلات العصبية وتدهور فى ميتوكوندريا المخ.

ويرصى بتناول الفيتامينات وخصوصاً الكولين الذى يتكون منه الناقل العصبى استيل كولين وكذلك: النياسين الذى ينشط الدورة الدموية فى المخ ومعادن الآثار. وكذلك الاهتمام بأن يتناول الأحماض الدهنية من عائلة  $w_3$  فقد وجد Kalmijn وآخرون (١٩٩٧) فى دراسة على ٩٠٠ رجل مسن فى هولندا أن كثرة تناول السمك كان وقاية لهم من الإصابة بمرض فقدان الذاكرة على أن تكون متوازنة مع الأحماض الدهنية من عائلة  $w_6$  (Simopoulos و Robinson ، ١٩٩٩). كما وجدت وفاء فرس (٢٠٠٢) أنه أمكن تقليل التدهور الناتج فى مخ الفيران من الألومنيوم بتغذيتها على مزيج من  $w_6$ ،  $w_3$  وفيتامين C وماغنسيوم مع الانشغال فى النشاط والعمل المناسب.



الباب الثاني عشر

# الغذاء الصحي

Healthy Food



## الغذاء الصحي

## Health y Food

مقدمة :

كما هو معروف أن التغذية عامل مهم لصحة الإنسان وكما يقول Brundland<sup>(١)</sup> (١٩٩٩) :

Nutrition is a key universal factor that affects and defines the health of all people.

فهناك صلة وثيقة بين التغذية والصحة من منظور حقوق الإنسان -فالتغذية تحدد صحة الإنسان- فإن إتمام عمليات الميتابوليزم طبيعياً يتطلب تناول الغذاء الصحي السليم المحتوى على العناصر الغذائية المناسبة من ناحية الكم والنوع ليتمكن جسم الإنسان من النمو والتطور والعمل والنشاط ومقاومة الأمراض المعدية وغيرها من الأمراض الأخرى والتمتع بصحة جيدة وسلامة الحالة الاجتماعية والعاطفية والمعرفية. هذا يتطلب التخطيط السليم للوجبات المحتوية على كل العناصر الغذائية اللازمة، وفى صورة متوازنة.

### تخطيط الوجبات : Meal Planning

#### الوجبة الغذائية :

تميز الوجبة الغذائية بخصائص معينة من حيث مكوناتها وطرق إعدادها ومكان تناولها طبقاً للعادات الغذائية ولنوع الأطعمة وأسلوب العمل اليومي، وكذا المستوى الاقتصادي والاجتماعي. فمثلاً وجبة الإفطار تختلف فى مكوناتها تبعاً لمكان تناولها، فهي فى المنزل تختلف عما يتناوله الطالب فى المدرسة أو الموظف فى مكان عمله. وبينما وجبة الغذاء تمثل الوجبة الرئيسية فى المدينة، نجد أن وجبة العشاء هى الوجبة الرئيسية فى القرية.

وتعرف الوجبة الصحية بأنها تلك الوجبة التى تمد الفرد بالعناصر الغذائية الأساسية وبكميات تكفى لسد  $\frac{1}{3}$  حاجة الجسم باعتبار أن الإنسان يتناول ٣ وجبات فى اليوم.

---

Brundland, G. (1999). Nutrition Health And Human Rights. UN Forum on<sup>(١)</sup> Nutrition, SCN, New (19 - 21).

ولسهولة اختيار الأغذية، عملت قوائم تقسيم الأغذية إلى مجاميع بحيث تشمل كل مجموعة الأغذية المتشابهة إلى حد ما فيما تحتويه من عناصر غذائية، وهذه يمكن الاسترشاد بها عند تخطيط الوجبات.

هناك التقسيم الثلاثي الذى يقسم الأغذية إلى ثلاثة مجموعات وأيضاً التقسيم الرباعي Basic Four Food Groups وآخر يشمل سبع مجموعات غذائية Basic Seven Food Groups ويوجد تقسيم يشمل أحد عشر مجموعة غذائية، أما التقسيم الأهمى فيشمل ستة مجموعات غذائية.

### **أسس تخطيط الوجبات الغذائية :**

يجب الإلمام بشروط تكوين الوجبات الغذائية، وتتلخص فى الآتى :

١- تقدير احتياجات الجسم من العناصر الغذائية (ملحق ١) طبقاً للسن والجنس ونوع المجهود والحالة الصحية، وكذا الظروف الجوية.

٢- تقدير احتياجات الطاقة اليومية طبقاً للتوصيات الغذائية.

٣- تقدير احتياجات البروتين اليومية طبقاً للتوصيات الغذائية.

٤- طرح الطاقة المقابلة لكمية البروتين من الطاقة الكلية والناتج من السعرات يوزع بين الكربوهيدرات والدهون على أن تكون الطاقة المستمدة من الدهون فى حدود ٢٠-٣٠٪ من الطاقة الكلية والباقي للكربوهيدرات.

٥- المجاميع الغذائية والتنوع الغذائى.

٦- الأغذية الموجودة والمتوفرة طبقاً للموسم، مع الأخذ فى الاعتبار أسعار الأغذية.

٧- الحالة الاقتصادية (داخل الأسرة) والحالة الاجتماعية (العادات والتقاليد).

بالإضافة إلى ما سبق، هناك بعض النقاط تعتبر هامة عند تخطيط الوجبات، منها:

١- النظافة والخلو من الشوائب والميكروبات المرضية والسموم.

٢- أن تكون رائحة الوجبة جيدة.

٣- أن يكون مظهر الغذاء جيداً ولونه زاهياً، ويفضل تحضيره قبل الاستهلاك مباشرة وتقديمه فى صورة جيدة مبهجة.

٤- القابلية للهضم، مع احتوائه على كمية مناسبة من الماء والألياف لمنع الإمساك.

٥- التنوع حتى يفى باحتياجات الجسم من المكونات الضرورية، وحتى لا يعمل الفرد فالتشويق والتغيير فى تقديم الوجبة من الأشياء التى تزيد من التقبل على الطعام.



## تقسيم الأغذية :

التقسيم الثلاثي :

فيما يلي التقسيم الذي يضم المجموعات الغذائية إلى ثلاثة فقط (جدول ١٢-١):

### ١- مجموعة أغذية الطاقة :

- وتشمل المواد الكربوهيدراتية (نشوية - سكرية) مثل الخبز - الأرز - المكرونة - القمح - الذرة.

- المخبوزات والسكريات، وتشمل السكر - العسل - المربي.

- الدرنات، وتشمل بطاطس - بطاطا - قلقاس.

- المواد الدهنية (دهون - زيوت).

### ٢- مجموعة أغذية البناء :

- وتشمل المواد البروتينية (حيوانية، نباتية) لحوم حمراء وبيضاء، أسماك - ألبان ومنتجاتها - بقول - مكسرات - بيض.

### ٣- مجموعة أغذية الوقاية :

- وتشمل الخضار والفاكهة (فيتامينات - أملاح - ألياف).

أمثلة تكرين الوجبات طبقاً لتقسيم مجموعات الأغذية. جدول (١٢ - ١).

جدول (١٢-١) أمثلة للأغذية طبقاً لمجموعات الأغذية

الطاقة كالورى	التركيب الكيميائي %			كميات الغذاء	المجموعات الغذائية اللازمة
	كربوهيدرات	دهن	بروتين		
					مجموعة الوقاية :
١٦	٣	-	١	١٠٠ حرام	١- خضار ورقية
٤٤	١٠	-	١	١٠٠ حرام	٢- موالح
٣٢	٦	-	٢	١٠٠ حرام	٣- خضار وفاكهة أخرى
					مجموعة البناء :
١٦٢	١٠	١٠	٨	٢٥٠ حرام	٤- ألبان ومنتجاتها
٣١٤	-	١٤	٢٢	١٠٠ حرام	٥- لحوم أسماك
					بيض - بقوليات ومنتجاتها
					مجموعة الطاقة :
٢٤١	٥٠	١	٨	١٠٠ حرام	٦- حبوب ومنتجاتها
٩٠	-	١٠	-	١٠ حرام	٧- دهون وزيوت
٧٩٩	٣٩	٣٥	٣٢	٧٦٠	المجموع

## التقسيم الرباعي :

وفيه قسمت الأغذية إلى مجاميع groups بحيث تشمل كل مجموعة الأغذية المتشابهة إلى حد ما في محتواها من العناصر الغذائية، وهى : مجموعة اللبن ومنتجاته، مجموعة الأغذية البروتينية، مجموعة الخضروات والفواكه، ومجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها (جدول ١٢-٢).

جدول (١٢-٢) المجاميع الغذائية الأربعة

ملاحظات	الكمية الموصى بها	المجموع الغذائية
الكوب يعادل ١ لتر ويمكن استبدال اللبن بحوالى ٣٠ جم حبن أو كوب زبادى أو لبن رائب	٢-٣ كوب ٣-٤ كوب ٤ كوب ٢ كوب ٣ كوب ٤ كوب	مجموعة اللبن، منتجاته أطفال أقل من ٩ سنوات أطفال من ٩-١٢ سنة أطفال فى سن البلوغ كبار السن الحوامل المرضعات
تقدم يوميًا	قطعة لحم بحجم الكف أو بيضة واحدة أو حجم ثلثى كوب من البقوليات المطبوخة (١/٢ طبق) أو سمكة متوسطة الحجم	مجموعة اللحوم والسمك والبيض والبقول
تقدم بمعدل ٤ وحدات يوميًا بما يعادل ١/٢ طبق خضار + ثمرة موالح + ثمرة فاكهة + درنة بطاطس. وتقدم الخضروات الورقية ٣-٤ مرات فى الأسبوع	* خضروات وفواكه خضراء أو صفراء (وحدة واحدة) * موالح أو كرنب (وحدة واحدة) * بطاطس وخضروات وفواكه (وحدتين)	مجموعة الخضروات والفواكه
* الشريحة = ١/٢ رغيف * الرحدة = ١/٢ - ٢/٣ طبق من الحبوب المطهية	* أربعة شرائح من الخبز أو المخبوزات المصنعة * وحدة من الحبوب المطهية * أرز، مكرونة، قمح	مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها

ويلاحظ فى التقسيم الرباعي للأغذية أنه لم تذكر الدهون أو الزيوت كمجموعة غذائية، حيث أنه اعتمد على تناولها عادة ضمن أغذية الإنسان، فبعض الأغذية تحتوى على الدهون كاللحوم والألبان والبيض، كما أن الدهون والزيوت

تضاف أثناء إعداد وطهى بعض الأطعمة بهدف جعلها أكثر استساغة. وعموماً فالدهون والزيوت تعتبر مصدرًا هاماً للطاقة، علاوة على الأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهون.

### التقسيم السباعى :

أما المجمامع الغذائية السبعة، فهى أكثر تفصيلاً، حيث تقسم بمجموعة الخضروات والفواكه إلى ثلاثة مجاميع تختص واحدة منها بالخضروات الخضراء والصفراء كمصدر لفيتامين (A)، ومجموعة ثانية خاصة بالمواالح والطماطم كمصدر لفيتامين (C)، ومجموعة ثالثة تضم باقى الخضروات والفواكه والبطاطس، هذا بالإضافة إلى مجموعات اللبن والبروتين والخبز والحبوب سابقة الذكر، وهناك مجموعة سابعة خاصة بالدهون. (جدول ١٢-٣).

### التقسيم إلى ١١ مجموعة غذائية :

أما التقسيم الذى يشمل أحد عشر مجموعة غذائية، فتضم :

مجموعة اللبن ومنتجاتها - مجموعة السمك واللحم والدواجن - مجموعة البيض - مجموعة البقول والمكسرات - مجموعة الخبز والدقيق ومنتجاتها - مجموعة المواالح والطماطم - مجموعة الخضروات الخضراء والصفراء - مجموعة البطاطس - مجموعة الفواكه والخضروات الأخرى - مجموعة الزيوت والدهون - مجموعة السكريات والحلوى.

أى أن فى هذا التقسيم، قسمت مجموعة البروتينات إلى ثلاثة أقسام :

قسم يشمل البروتينات الحيوانية من لحوم ودواجن وأسماك وآخر يشمل البقول والمكسرات، أما البيض فخصصت له مجموعة خاصة نظراً لتميزه بوجرد نسبة من بعض العناصر، وكذا مجموعة الخضروات فقد خصصت لها أربع مجاميع، كما خصص للسكريات مجموعة، وللدهون مجموعة. ويلاحظ أن استعمال هذه القائمة الأخيرة لاختيار الأطعمة يؤدى إلى ضمان أكثر لوجرد كل العناصر الغذائية فى الوجبات، ولكن كثرة عدد المجمامع يجعل من الصعب تذكرها.

جدول (١٢-٣) المجاميع الغذائية السبعة

العناصر ال لائفة الموجودة ليها	ما يلزم الفرد يومياً	المجموعة
(مولد) فيتامين (A)، حامض الاسكوربيك والحديد	واحد أو أكثر من إحداها	خضروات خضراء وصفراء
حامض الاسكوربيك فيتامينات B، معادن الحديد وسليولوز	واحد اثنان أو أكثر	المواخ والطماطم البطاطس وباقي الخضر والفواكه
كالسيوم - ريبوفلافين - بروتين - فوسفور	الأطفال : ٢ - ٣ كوب الكبار : ١ - ٢ كوب	اللبن ومنتجاته
بروتين - فوسفور - حديد فيتامينات B	- نصيب من اللحم أو الدواجن يومياً - ٤ بيضات أسبوعياً، كما يمكن استعمال البقول محل البروتينات الحيوانية	اللحوم والدواجن السماك والبيض والبقول
ثيامين - نياسين ريبوفلافين - حديد كربوهيدرات - سليولوز فيتامين (A) - ودهون	٣ شرائح ٢ - ٣ ملعقة	خبز - دقيق حبوب ومنتجاتها زبدة وقشده

وعادة يضيف الفرد سكريات وحلوى لاستكمال ما يلزمه من الطاقة.

**المرشد الغذائي الهرمى :**

تبدأ بقاعدة الهرم على النحو التالى، وفيه تنقسم المجاميع الغذائية إلى ستة  
مجاميع (شكل ١٢-١).

## A Guide to Daily Food Choices

Fats, Oils, and Sweets

مجموعة الزيوت والدهون والسكريات  
القدر الضئيل

Milk, Yogurt,  
Cheese Group

مجموعة الألبان ومنتجاتها  
٢ - ٣ وحدات

Vegetable Group

مجموعة الخضروات  
٣ - ٥ وحدات

Fruit Group

مجموعة الفواكه  
٢ - ٤ وحدات

Bread, Cereal, Rice, Pasta Group

مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها  
٦ - ١١ وحدة

Key المفتاح

□ Fat (naturally occurring and added) دهون (طبيعية مضافة)

■ Sugars (added) سكر مضاف



شكل (١٢-١) المرشد الغذائي اليومي - الهرم الغذائي

١- مجموعة الخبز ومنتجاتها : ويتناول الفرد فيها من ٦ - ١١ وحدة، وفقاً لاحتياجاته.

وتتضمن المخبوزات المصنعة والمكرونات والأرز والخبز ومنتجاته، والمربى والعسل، ويتخلل هذه المجموعة سكريات إما مضافة أو موجودة طبيعياً في الأغذية.

٢- مجموعة الفواكه : وتشمل جميع أنواع الفواكه. ويتناول الفرد منها ٢- ٤ وحدات يومية وفقاً لاحتياجاته.

٣- مجموعة الخضروات : ويتناول الفرد منها ٣ - ٥ وحدات.


٤- مجموعة اللحوم وبدائلها : وتشمل اللحوم الحمراء المختلفة والدواجن والأسماك والبقول الجافة والبيض والمكسرات. ويتناول الفرد منها ٢- ٣ وحدات وفقاً لاحتياجاته اليومية.

٥- مجموعة اللبن ومنتجاته : وتشمل اللبن والزبادى والجبن والآيس كريم، ويتناول الفرد منها ٢- ٣ وحدات يومياً.

٦- مجموعة الدهون والسكريات : وتشمل الزيت والزيوت والسكريات والدهون، قد تكون طبيعية موجودة بالغذاء (كما هو موضح بالرسم) أو مضافة إلى الأغذية. أما السكريات هنا فتكون مضافة، ويتناول الفرد منها القدر الضئيل بقدر المستطاع من هذه المجموعة.

### **بديلات الطاقة :**

ويوضح شكل (١٢-٢) بديلات الطاقة التى تعطى حوالى ٨٠ سعراً، يمكن الاسترشاد بها جميعاً فى تكوين الوجبات. ويوضح جدولاً (١٢-٤) و(١٢-٥) بعض بديلات الطاقة والبروتين المتكافئة.



\* عن وزارة الصحة - معهد التغذية

شكل (١٢-٢) بديلات الطاقة

جدول (١٢-٤) بديلات الطاقة المتكافئة

كل كمية تعطى ٢٥٠ سعراً

الوحدة	الكمية بالجرام	الصنف
رغيف ربع	١٥٠	خبز بلدى أسمر
نصف كوب كبير	١٠٠	دقيق قمح
نصف كوب كبير	١٠٠	أرز جاف
كوب	١٠٠	مكرونة جافة
٥ ثمرات متوسطة الحجم	٤٠٠	بطاطس
٦ ملاعق كبيرة	١٠٠	سكر
طبق صغير	١٢٥	عسل أسود
٢ ثمرة	٣٠٠	بطاطا جافة
٢ ملعقة كبيرة	٤٠	زيوت نباتية

جدول (١٢-٥) بديلات البروتين المتكافئة

كل كمية تعطى حوالى ١٨ جرام بروتين

الوحدة	الكمية بالجرام	الصنف
حجم بيضتين	١٠٠	لحم مشفى
ربع فرخة	١٠٠	فراخ مشفية
سمكة متوسطة	١٠٠	سمك مشفى
حجم ٣ بيضات	١٢٠	جبن أبيض كامل الدسم
حج بيضة ونصف	٧٠	جبن رومى
حجم بيضتين	١٠٠	جبن قريش
كوبان ونصف كبيران	٤٥٠	لبن حليب
طبق كبير	٧٥	فول جاف
عدد ٤	١٤٠	بيض بلدى
سبعة مكائيل ونصف	٧٥	لبن جاف
طبق كبير	٧٥	بقول جافة
رغيف ونصف	١٨٠	خبز بلدى



## أمدالة للأغذية وبديلاتها<sup>(١)</sup> :

يقصد ببدائل الأغذية كمية الأغذية المختلفة التي تعطى نفس القيمة السعرية.

أولاً : معادلات الأغذية التي تحتوى على بروتينات حيوانية أو نباتية وكل

وحدة تحتوى على حوالى ٢٢٠ كالورى :

أ - أغذية قليلة الدهن :

- ١- ٢٥٠ جم سمك بلطى أو دنيس مسلوق أو مشوى
- ٢- ٣٠٠ جم سمك موسى أو مرجان ٢٠٠ جم سمك مياس مسلوق أو مشوى
- ٣- ٢٢٠ جم حبن قريش
- ٤- ٢/٣ كروب عدس أصفر مطبوخ بدون دسم
- ٥- كروب عدس بحبة مطبوخ بدون دسم
- ٦- كروب فول نابت أى عشرة ملاعق كبيرة

ب- متوسطة الدهن :

- ١- ١/٤ فرخة مسلوقة أو مشوية
- ٢- ١٤٠ جم لحم بتلو مسلوق أو مشوى
- ٣- ١٠٠ جم علبه تونة
- ٤- ١٠٠ جم سردين علب مصفى الزيت
- ٥- ١٥٠ جم سمك بورى مسلوق، أو مشوى

ج- كثيرة الدهن :

- ١- ٧٥ جم لحم ضانى مسلوق أو مشوى (غير الضلوع)
- ٢- ٧٥ جم لحم بقرى معلب
- ٣- ٦٠ جم سجنق مسلوق
- ٤- ٦٠ جم جبنة شيدر
- ٥- ١٢٠ جم جبنة دمياطى
- كروب فول مدمس مطبوخ - ٢ ملعقة زيت صغيرة

---

(١) كلية الطب - جامعة الإسكندرية.

٧- ٩ طعمية متوسطة

٨- ٤ بيضة متوسطة مسلوقة

ثانيًا : معادلات الأغذية المحتوية على بروتينات حيوانية أو نباتية وكل وحدة تحتوي على ١٠٠ كالورى :

- ١- كوب لبن بدون دسم ٢٥ - ٦ جم جبنه شيدر  
٢- ٢/٣ كوب لبن بقرى ١/٣ - ٧ كوب عدس أصفر مطبوخ بدون دسم  
٣- ١/٣ كوب لبن جاموسى ١/٢ - ٨ كوب فول مدمس (٥ ملاعق كبيرة + ملعقة زيت صغيرة)

٤- ١٠٠ جم جبنه قريش ١/٢ - ٩ كوب عدس بحبة مطبوخ

٥- ٥٠ جم جبنه بيضاء ٢ - ١٠ بيضة متوسطة

ثالثًا : معادلات الأغذية الدهنية وتعادل كل واحدة منها ١٠٠ كالورى

- ١- ملعقة زيت كبيرة ٤ - ٣٠ جم قشطة  
٢- ملعقة مسلى كبيرة ٥ - ٨ زيتونة أسود متوسطة الحجم  
٣- ١٢ جم زبدة ٦ - ١١ زيتونة أخضر متوسطة الحجم

رابعًا : معادلات الفواكه وكل وحدة تحتوي على ٥٠ كالورى

- ١- برتقالة صغيرة أو كوب عصير ٢- تينة متوسطة الحجم  
٣- جوافه واحدة متوسطة الحجم ٤- كمثرى واحدة صغيرة الحجم  
٥- نصف موزة ٦- نصف كوب فراولة  
٧- نصف بطاطا متوسطة ٨- اثنتين بلح طازج أو أمهات  
٩- عدد ٤ مشمش متوسطة ١٠- ١٢ حبة عنب أو ١/٤ فنجان عصير  
١١- نصف برتقال بسرة ١٢- نصف مانجو  
١٣- نصف جريب فروت ١٤- ١٥٠ جم بطيخ  
١٥- ٢٠٠ جم شمام

خامسًا : معادلات، أغذية كربوهيدراتية وكل وحدة ٧٥ كالورى:

- ١- ١/٤ رغيف بلدى ٥- ٥ ملاعق صغيرة سكر ناعم أو ٥ قطع سكر ماكينة صغيرة

- ٢- ١/٨ رغيف فينو  
٣- ٢٠٠ جرام نوست أو ٢ شريحة  
٤- ١/٢ كوب أرز مطبوخ (٤,٥ ملعقة  
كبيرة)  
٥- كوب لوبيا أو بسلة مسلوقة

سادساً : معادلات خضروات وكل وحدة تحتوى على ٥٠ كالورى :

أ - ٢٠٠ جم بها ٥٪ كربوهيدرات :

- باذنجان بلدى أبيض أو أسود - بامية - جرجير - خرشوف - قرنبيط - خس -  
خيار - سبانخ - طماطم - فاصوليا خضراء - فلفل رومى - كوسة  
ب- ١٠٠ جم أو ١/٢ كوب مسلوقة تحتوى على ١٠٪ كربوهيدرات :

بسلة خضراء - بصل بحيرى - بصل صعيدى - ملوخية - جزر بلدى - فول  
بلدى أو رومى أخضر

ج - ٥٠ جم تحتوى على ٢٠٪ كربوهيدرات :

بطاطا - بطاطس - قلقاس

**أمثلة لأكلات يومية مختلفة فى محتواها من الطاقة:**

أولاً: غذاء يعطى ١٥٠٠ سعر حرارى فى اليوم الكامل تقريباً :

غذاء	كالورى
رغيف بلدى	٢١٠
١/٣ كوب لين جاموسى	٨٣
٥٠ جم جبنة	١٠٠
٢ وحدة خضار + سلطة	١٢٠
فاكهة - ٣ وحدة	١٥٠
لحم - ٢ وحدة	٤٤٠
زيت - ٢,٥ ملعقة كبيرة	٢٢٥
٤ ملاعق سكر صغيرة	٦٤
	١٤٩٢

موزعة كالآتى، ويمكن أن تستخدم المعادلات :

غذاء	غذاء	فطار
عشاء	غذاء	فطار
١/٤ رغيف	١/٤ رغيف	١/٤ رغيف
وحدة خضار + سلطة خضراء	وحدة خضار	١/٣ كوب لبن
وحدة لحوم غير سميكة	وحدة لحم غير سميكة	٥٠ جم
وحدة فاكهة	سلطة خضراء	شاي + سكر
الدهنيات المصرح بها ٢,٥ ملعقة كبيرة	٢ وحدة فاكهة	
٤ ملاعق سكر		

ثانيًا : غذاء يعطى ٢٠٠٠ كالورى فى اليوم الكامل تقريبًا :

غذاء	كالورى
٢ رغيف عيش	٦٢٠
$\frac{1}{2}$ كوب لبن جاموسى	١٢٤
٥٠ جم جبنة	١٠٠
٣ وحدة خضار + سلطة	٥٠
فاكهة - ٤ وحدة	٢٠٠
لحم - ٢ وحدة	٤٤٠
٣ ملاعق زيت كبيرة	٣١٥
٥ ملاعق سكر صغيرة	٦٤
	٢٠١٣

موزعة كالآتى، ويمكن استخدام المعادلات :

غذاء	غذاء	فطار
عشاء	غذاء	فطار
كالغذاء ماعدا الجبن $\frac{1}{2}$ رغيف	رغيف	$\frac{1}{2}$ رغيف
يراعى :	وحدة خضار	$\frac{1}{2}$ كوب لبن جاموسى
الدهون المصرح بها طول اليوم	وحدة لحوم	٥٠ جم جبنة
والسكر المصرح به طول اليوم	وحدتين فاكهة	شاي - سكر
	سلطة	

ثالثاً - غذاء يعطى ٢٥٠٠ كالورى فى اليوم الكامل تقريباً :

غذاء	كالورى
١/٢ رغيف عيش	٧٨٠
٢ كوب لبن جاموسى	٢٤٨
١٠٠ جم جبنة	٢٠٠
نخيار ٤ وحدة + سلطة	٢٠٠
لحم ٢ وحدة	٤٤٠
فاكهة ٤ وحدة	٢٠٠
٤ ملاعق زيت كبيرة	٣٦٠
٥ ملاعق سكر صغيرة	٨٠
	<u>٢٥٠٨</u>

فطار	غذاء	عشاء
١/٢ رغيف	رغيف	رغيف
كوب لبن	٢ وحدة خضار	دهون المصرح به يومياً
٥٠ جم جبنة	وحدة لحوم	والدهون ٤ ملاعق كبيرة زيت
٤ ملاعق كبيرة عدس	وحدتين فاكهة	والسكر ٥ ملاعق صغيرة
١/٣ ملعقة زيت صغيرة		
شاي + سكر		

#### التوازن الغذائى Dietary Balance :

يتناول الإنسان الغذاء كى يحافظ على صحته، لتستمر الحياة والحركة والنشاط إلا أن هذا الغذاء لابد أن يكون مناسباً من حيث الكمية والنوع كى يؤدى وظائفه على أكمل وجه، فإن النقص أو الزيادة فى أى عنصر بالنسبة لاحتياج الإنسان من جهة وبالنسبة لغيره من العناصر الأخرى قد يؤدى إلى حالات من عدم التوازن بين العناصر الغذائية تعطل أو تزيد من حدوث بعض العمليات والتفاعلات الحيوية داخل الجسم قد تضر الجسم بصورة أو بأخرى، ولهذا ينبغي أن يكون هناك استيفاء لحاجة

الإنسان من العناصر الغذائية المختلفة مع التوازن بين العناصر الغذائية بعضها البعض حتى تؤدي وظائفها بالصورة وبالمستوى المطلوب للجسم، ولهذا ينبغي توفير التغذية المتوازنة للجسم.

التغذية المتوازنة **Balanced Nutrition** : هي إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية الأساسية بالكميات والنوعيات والنسب المناسبة حتى يكون بنية الجسم طبيعياً ويقوم بوظائفه بطريقة طبيعية كما يسمح للجسم بتخزين كميات مناسبة من هذه العناصر الغذائية في أنسجة الجسم لوقايتها من التعرض لحالات سوء التغذية، والمعروف أنه لا يوجد غذاء أو طعام واحد يحتوي على كل العناصر الغذائية، فكل غذاء أو طعام ينقصه واحد أو أكثر من عنصر غذائي، ولهذا لا يمكن الوصول إلى التغذية المثالية إذا اعتمد الفرد على غذاء أو طعام واحد، ولهذا ينبغي خلط أو دمج مجموعة من الأغذية والأطعمة حتى يمكن الحصول على وجبة متوازنة من الناحية التغذوية.

إن الوجبة المتوازنة **Well-balanced** دائماً تكون واقية **Protective** من أي ضرر يحيط بالجسم أو يحدث داخل الجسم، إن كثيراً من الحالات الضارة تكون عادة مرتبطة بالتغذية السيئة **Malnutrition** سواء أكان زيادة أو نقصاً عن حاجة الجسم، كما أظهرت العديد من الدراسات أنه عندما ارتفعت نسبة الأغذية التي تؤكل طازجة بدون طهو مثل السلطة الخضراء أو الفاكهة في غذاء الأفراد المدخنين فإن ذلك أدى إلى تجنبهم التدخين، كما ظهر أنه عندما كانت الوجبات محتوية على أغذية أختيرت عشوائياً بدون تخطيط وكان ينقصها العديد من مجموعة فيتامينات **B** والزنك أدى هذا إلى زيادة رغبتهم في التدخين وخصوصاً مع شرب القهوة.

إن عملية هضم الغذاء وامتصاص نواتج الهضم تحتاج إلى توازن في بعض العناصر بعضها لبعض ويوجد أمثلة كثيرة لتأثير عمليتي الهضم والامتصاص نتيجة لزيادة بعض العناصر بالنسبة لغيرها، فمثلاً إذا كنا نعتبر أن وجود الألياف في الغذاء لازم لإسراع عملية الهضم وتنظيمها إلا أن زيادتها عن الحد اللازم تعيقها.

بالإضافة إلى ذلك فإن التوازن بين الأحماض الأمينية يلعب دوراً في امتصاصها مما قد يؤدي إلى حدوث نقص في بعضها وقد يؤثر في عملية بناء البروتين أو بناء هرمون معين أو ناقل عصبي معين **Neurotransmitter**، والمعروف أن هذه

النواقل العصبية لازمة لعمل المخ والجهاز العصبى مثل Serotonin الذى يتكون من الحامض الأمينى Tryptophan فإذا لم يمتص هذا الحامض الأمينى نتيجة وجود أحماض أمينية أخرى منافسة فإن تكوين Serotonin يتأثر.

علامة على ذلك فإن هناك بعض مضادات الفيتامينات مثل المادة البروتينية avidin الموجودة فى زلال البيض والتي تعيق الاستفادة من فيتامين Biotin ولكن يمكن تثبيط هذه المادة عن طريق المعاملة الحرارية للبيض نتيجة لتغير طبيعة هذه المادة.

هذا يوضح أهمية الحرص عند اختيار غذاء لفرد على أن يكون هناك توازن بين العناصر الغذائية مع خلوه من المواد الضارة أو تلك التى تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو المثبطة للإنزيمات ... إلخ.

ويمكن التوصل إلى الوجبة المتزنة باتباع عدة مراحل تلخص فى التعرف على الاحتياجات الغذائية اليومية للفرد مع معرفة محتوى الأغذية والمأكولات من العناصر الغذائية حتى يمكن اختيار الأغذية المناسبة هذا مع التأكد من سلامة الفرد صحياً.

### ومن جوانب التوازن الغذائى :

- التوازن بين العناصر الغذائية المولدة للطاقة وهى الكربوهيدرات والدهون والبروتينات.
- أن يكون هناك نسبة معينة وهى الأكبر من الكربوهيدرات فى صورة أغذية نشوية أما الباقى فيمكن أن يكون من أغذية سكرية.
- عند اختيار الأغذية البروتينية يراعى أن يكون هناك توازن بين البروتين النباتى والبروتين الحيوانى على أن يكون غط الأحماض الأمينية الداخلة فى تكوين الوجبة مناسباً.
- بالنسبة للأغذية الدهنية لابد أن يكون هناك توازن مناسب من الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة سواء وحيدة عدم التشبع أو عديدة عدم التشبع.
- لابد أن تفى الوجبة الغذائية باحتياجات الفرد من الفيتامينات والعناصر المعدنية حتى يمكن أن يكون هناك توازن بين بعض الفيتامينات إلى بعضها وإلى بعض العناصر المعدنية، حتى يمكن أن تتم العمليات الحيوية للجسم بطريقة طبيعية تفسى باحتياجات الجسم.

- لابد من توفير القسط الوافر من الماء، مع خلط الغذاء من أى مادة تعيق عمليات الهضم والامتصاص والميتابوليزم.

**أولاً :** التعرف على الاحتياجات الكلية للطاقة الغذائية اليومية للفرد عن طريق معرفة السن، الجنس، الوزن، الطول ونوع العمل الذى يؤديه الفرد سواء أكان عملاً خفيفاً أو متوسطاً أو ثقيلاً، مع أخذ الظروف الجوية فى الاعتبار وأيضاً الحالة الصحية والنفسية للفرد ويمكن حساب الطاقة الكلية :

- إما من الجداول الخاصة أو بمعدل خاص بالكالورى / وزن الجسم / اليوم.

- تحسب نسبة الطاقة المستمدة من كل عنصر من العناصر المولدة للطاقة كما يلى :

١٠ - ٢٠ ٪ كالورى مستمدة من البروتين.

٢٠ - ٢٥ ٪ كالورى (تزداد ٣٠٪ للطفل والرياضيين) مستمدة من الدهن.

٥٥ - ٧٠ ٪ كالورى مستمدة من الكربوهيدرات.

**مثال :** شخص يحتاج إلى ١٨٠٠ كالورى فى اليوم.

يكون توزيع مصادر الطاقة الكلية كما يلى :

$$\text{يستمد من البروتين} = \frac{10 \times 1800}{100} = 180 \text{ كالورى}$$

$$\text{يستمد من الدهن} = \frac{20 \times 1800}{100} = 360 \text{ كالورى}$$

$$\text{المجموع} = 180 + 360 = 540 \text{ كالورى}$$

$$\text{يستمد من الكربوهيدرات} = 1800 - 540 = 1260 \text{ كالورى}$$

- تترجم هذه الطاقة إلى عناصر غذائية :

$$180 \div 4 = 45 \text{ جم بروتين}$$

$$360 \div 9 = 40 \text{ جم دهن}$$

$$1260 \div 4 = 315 \text{ جم كربوهيدرات}$$

- تختار أنواع الأغذية حسب محتواها من العناصر الغذائية ويمكن الاستعانة بجدول

تحليل الأغذية (ملاحق ٤، ٥، ٦) على أن تفى باحتياجات الفرد ويمكن أن تقسم على ثلاثة وجبات على أن تفى كل وجبة بثلاث احتياجات الفرد أو أن كل من



وجبتى الفطار والعشاء تفى بربع الاحتياجات اليومية وأن وجبة الغذاء تمد الفرد بالباقي أى نصف الاحتياجات.

وكما هو معروف فإن التوازن بين العناصر المولدة للطاقة مفيد للجسم حتى يودى كل عنصر وظائفه على الوجه الأكمل أى أن الكربوهيدرات تكون هى المصدر الرئيسى للطاقة وفى نفس الوقت تكون كمية الكربوهيدرات كافية لإتمام احتراق الدهون إلى طاقة مع ثانى أكسيد كربون وبخار ماء فلا تحدث حالة الحموضة الكيتونية Ketosis التى تتكون فى حالة نقص الكربوهيدرات فلا يتم احتراق الدهون وتكوين مواد كيتونية مثل حامض acetoacetic acid وغيرها مما يغير من درجة حموضة الدم (pH) ولا تكون مناسبة لعمل الإنزيمات وغيرها وهذا ينتج عنه تعطيل أو تغيير فى التفاعلات البيوكيميائية من حيث السرعة والكمية والنواتج مما قد يكون له آثار ضارة بالجسم، كما أن نقص الكربوهيدرات يودى إلى استخدام البروتين فى توليد الطاقة وينتج عن ذلك تولد مواد نيتروجينية مثل حامض البوليك واليوريا وهذه لا بد من التخلص منها عن طريق الكلى أى إجهادها علاوة على أنه مصدر غير اقتصادى للطاقة، وكذلك حرمان الجسم من الأحماض الأمينية وخصوصاً الأساسية وينتج عن ذلك فشل النمو والصيانة.

أما فى حالة زيادة تناول الكربوهيدرات فإنه يودى إلى ارتفاع الوزن والبدانة مما قد يودى إلى مخاطر الإصابة بمرض السكر، الأوعية الدموية، القلب والضغط ... إلخ، وفى نفس الوقت تكون كمية البروتين المتناولة غير كافية لسد حاجة الجسم من الأحماض الأمينية اللازمة للبناء والصيانة، كما أن كمية الدهون تكون أقل من الاحتياج فلا تفى باحتياج الجسم من الأحماض الدهنية الأساسية كما أن هذا يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية الذائبة فى الدهون مثل فيتامينات A,D,E,K.

- تختار الكربوهيدرات على ألا تزيد نسبة الطاقة المستمدة من السكريات أو الحلوى أى السعرات الجوفاء (Empty Calories) عن ١٠ ٪ من الكالورى المستمدة من الكربوهيدرات أى أنه فى هذا المثال :

$$١٢٦٠ \text{ كالورى} \times \frac{1}{100} = ١٢٦ \text{ كالورى مستمدة من السكريات}$$

أى تعادل :

$$١٢٦ \div ٤ = ٣١,٥ \text{ جم سكر أو حلوى}$$

فإذا كان مقدار الأغذية الكربوهيدراتية = ٣١٥ جم

وأن ٣١,٥ جم سكر أو حلوى

إذن الأغذية النشوية = ٣١٥ - ٣١,٥ = ٢٨٣,٥ جم أغذية نشوية.

- تختار الأغذية البروتينية على أن تكون النسب المفضلة المقترحة هي ٢٥ - ٤٠ ٪ من مصادر حيوانية والباقي أى ٦٠-٧٥ ٪ من مصادر نباتية وهذا لضمان أن يحصل الجسم على كل الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة له وتقليل تحويلها إلى الأحماض الأمينية غير الأساسية وذلك لأنها تدخل فى تكوين مركبات هامة فى الجسم مثل دخول الحماض الأمينية glycine لتكوين الهيموجلوبين، والسلسلة الببتيدية الثلاثية glutathione وهى كمادة مضادة للتأكسد، وحامض الهيوريك Hippuric acid الذى يعمل على تخليص الجسم من المواد الضارة إلى البول، أحماض وأملاح الصفراء، وهى تساعد فى هضم الدهون وفى هدم الكولسترول كما أن حمض الجلوتاميك glutamic وحامض الاسبرتيك aspartic يدخلان فى العديد من عمليات الميتابوليزم، كما أن حامض الـ glutamic الذى يساعد على تخليص المخ من المواد النتروجينية الضارة، والحامض الأميني أرجينين arginine يدخل فى تكوين دورة اليوريا، وهى تعمل على تخليص الجسم من المواد النتروجينية الضارة، وكذلك الحماض الأمينية الهستيدين histidine لتكوين مادة histamine وهى تساعد على إفراز العصير المعدى. ولذا فإن نقص الأحماض الأمينية غير الأساسية يستلزم تكوينها من الأحماض الأمينية الأساسية على حساب وظائفها.

فإذا كان فى المثال السابق يحتاج الفرد إلى ١٨٠ كالورى مستمدة من بروتين

فيكون من البروتين النباتي :

$$١٠٨ \text{ كالورى} = \frac{٦٠ \times ١٨٠}{١٠٠}$$

$$\text{أى } ٢٧ \text{ جم بروتين نباتي} = ١٠٨ \div ٤$$

$$١٨٠ - ١٠٨ = ٧٢ \text{ كالورى}$$

$$٧٢ \div ٤ = ١٨ \text{ جم بروتين حيواني}$$

وينبغي أن يكون نمط الأحماض الأمينية الأساسية Essential Amino Acid

Pattern مناسباً يفى باحتياجات الجسم دون أن يزيد واحد أو أكثر من الأحماض

الأمينية فيؤثر على الاستفادة من أحماض أمينية أخرى وذلك حتى لا تحدث حالة عدم التوازن بين الأحماض الأمينية ويمكن دراسة نمط الأحماض الأمينية كما سبق ذكره، فإن عدم توازن الأحماض الأمينية قد يؤدي إلى زيادة الاحتياج من أحماض أمينية أخرى وخصوصاً في حالة نقص بروتين الوجبة. بالإضافة إلى أن زيادة أحد الأحماض الأمينية تؤدي إلى آثار ضارة سامة مثل ظهور زوائد في العين، الكبد، البنكرياس، ضعف النمو ومن هذه الأحماض histidine, tyrosine, tryptophan, cyteine, methionine وأقل الأحماض الأمينية ضرراً هي valine, isoleucine وتقع باقي الأحماض كما يلي leucine, lysine, arginine, phenylalanine ثم أخيراً threonine. كما أن هناك تضادة للأحماض الأمينية بمعنى أن زيادة أحد الأحماض الأمينية يضاد آخر مثل زيادة leucine تقلل من الاستفادة من isoleucine أو valine، و lysine مع arginine. وأيضاً زيادة الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتشعبة تقلل من امتصاص tryptophan ونفاذه خلال جدار المخ Blood Brain Barrier (BBB) فيقل تكوين serotonin الموصل العصبي ذى التأثير المهدئ للألم أو التعب.

وكما هو معروف أن الإنسان يشعر بالتعب نتيجة لتراكم حامض اللاكتيك  $\text{CH}_3\text{-CHOH-COOH}$  وهذا يعمل زيادة حموضة الوسط pH نتيجة وجود أيونات الهيدروجين، ولهذا فإن تناول شرب أى مادة قلوية التأثير مثل مادة البيكربونات تعمل على معادلة الحموضة وتحويل حامض اللاكتيك إلى حامض بيروفيك ( $\text{CH}_3\text{-Co}$ ). Pyruvic ( $\text{COOH}$ ) - وهنا يدخل حامض البيروفيك فى دورة حامض الستريك Citric acid cycle وتنطلق الطاقة اللازمة.

- من حيث الأغذية الدهنية نختار خليط من الأغذية على أن يكون ٣/١ الاحتياج من دهون وحيدة عدم التشبع، ٣/١ الاحتياج من دهون عدم التشبع، ٣/١ الاحتياج من دهون مشبعة.

ففى المثال السابق :

$$٣٦٠ \text{ كالورى} \times \frac{٣}{١} = ١٢٠ \text{ كالورى}$$

$$\text{أى } ١٢٠ \div ٩ = ١٣,٣ \text{ جم دهن}$$

أى أن ١٣,٣ جم دهن من دهون وحيدة عدم التشبع مثل زيت الزيتون


١٣,٣ جم دهن من دهن عديدة عدم التشبع مثل زيت فول الصويا، زيت الذرة

١٣,٣ جم دهن من دهن مشبعة مثل الزبدة  
وهذا يتم لضمان أن يكون مستوى الليبيدات فى الدم مناسباً كما سبق.  
بالنسبة للفيتامينات :

يجب التعرف على الاحتياجات من الفيتامينات حتى لا يتناول الإنسان من أى فيتامين ما يزيد أو يقل عن احتياجه، مما قد يضر بالجسم أو على عضو معين أو على تفاعلات مختلفة، وكما هو معروف أن الأغذية النباتية تحتوى على جميع الفيتامينات باستثناء فيتامين A وفيتامين D حيث يوجدان فى الأغذية الحيوانية وتحتوى الأغذية النباتية على مولد فيتامين A ويمكن للجسم تحويله إلى الفيتامين، كما أن مولد فيتامين D يوجد تحت الجلد ويمكن أن يتحول إلى الفيتامين بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

ويلاحظ أن الفيتامينات تفقد أثناء عمليات تداول الأغذية من نقل وتسويق وإعداد وطهى وتصنيع وتخزين ويلاحظ أن الفيتامينات التى تذوب فى الدهن أكثر ثباتاً، أما الفيتامينات التى تذوب فى الماء فإنها تفقد عن طريق الذوبان فى ماء غسل الخضروات أو النقع وخصوصاً إذا لم يستخدم ماء النقع، وأيضاً تفقد أثناء الطهى والتعرض لدرجات حرارة عالية والأكسدة والتعرض للضوء أو الحموضة أو القلوية. ينبغي التعرف على الاحتياجات اليومية من العناصر المعدنية ومصادرها وعلاقتها لبعض، وعلاقتها ببعض العناصر الأخرى حتى يمكن الاستفادة من هذه المعادن.

وبصفة عامة فإن دراسة الاحتياجات الغذائية ينبغي أن يكون مصححاً بدراسة الحالة الصحية والنفسية للفرد من جهة، وأن يعرف الغذاء المتاح تناوله فى العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ... إلخ، حتى يكون تخطيط الوجبات مناسباً سليماً ليتم الوصول إلى حالة من التوازن المتناول من العناصر الغذائية وبين الاحتياجات الغذائية كما يظهر فى شكل (١٢ - ٢).



شكل رقم (١٢ - ٢) التوازن بين المتناول وبين الاحتياجات الغذائية



الباب الثالث عشر

## دراسة الحالة التغذوية

THE ASSESMENT OF NUTRITIONAL STATUS





## دراسة الحالة التغذوية

### THE ASSESMENT OF NUTRITIONAL STATUS

تعتبر دراسة الحالة التغذوية من الأمور الهامة فى الدول، وذلك للتعرف على المستوى الغذائى الذى له تأثير مباشر على كفاءة الفرد وإنتاجيته للعمل، وهناك من المعلومات التى تعتبر مفيدة فى هذا الشأن مثل بيانات عن الإنتاج الزراعى والتسويق والتخزين والصادرات والواردات وحفظ وتصنيع المحاصيل، حتى يمكن التعرف على متوسط نصيب الفرد فى الدولة أو البيئة هذا بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالبيانات الاجتماعية والاقتصادية والقوة الشرائية والعادات الغذائية والأمراض المنتشرة الطفيلية المعدية.

يتضمن قياس الحالة التغذوية الفحوص الإكلينيكية والاختبارات البيوكيميائية ودراسة المقاييس الجسمية والإحصاءات الحيوية والمسوح الغذائية.

#### الفحص الإكلينيكي Clinical Examination :

يمكن أن نفرق بسهولة بين الشخص ذى المستوى الغذائى الجيد، وغير الجيد من حيث المظهر الخارجى للعين والشعر والجلد ومدى يقظة الشخص، ولكن توجد درجات مختلفة للحالات الإكلينيكية. وقد يكون من الصعب التمييز بينها وتحديد أيا من ملاحظاتها خصوصاً فى الحالات الخفيفة وتعتبر الفحوص الإكلينيكية من الاختبارات الهامة التى يحسن القيام بها عند إجراء المسح الغذائى وتحديد أمراض سوء التغذية عندما تكثر حالات سوء التغذية أو نقصها، فإنه ينبغى دراسة الحالات على عينة كبيرة من الشعب تمثل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والعمر والجنس.

وقد صممت لجنة مشتركة من WHO, FAO سنة ١٩٥٩ بطاقة يسهل ملؤها ويدون فيها اسم المفحوص وسنه وجنسيته وحالته الاقتصادية والاجتماعية، ويتم تقدير طوله ووزنه وحالة الشعر من حيث اللون والملبس والجلد وحالته وخصوصاً على الأذرع والرقبة والصدر والأطراف، وحالة العينين والفم من حيث وجود شقوق حول الفم، ولون اللسان وحالته من حيث وجود التهاب وحالة اللثة والأسنان ومدى انتظامها والغدة الدرقية، وهل هى طبيعية أم متضخمة تضخماً بسيطاً أم ظاهراً، وتقدر

نسبة الهيموجلوبين وكما يدرس الهيكل العظمي، وهل يوجد تقوس في الأرجل أو انتفاخ في المفاصل وأى ملاحظات أخرى.

### **الاختبارات البيوكيميائية Biochemical Investigations :**

أظهرت الدراسات أن أعراض نقص العناصر الغذائية تحدث على خطوات فأول مرحلة تقل نسبة تركيز العنصر في أنسجة الجسم، ويكون هذا مصحوباً بنقص في وجود العنصر أو أحد نواتج ميتابوليزم العنصر Metabolite في الدم أو البول، ويلى ذلك ظهور الأعراض الخاصة بنقص هذا العنصر، وتنتج هذه الحالة نتيجة نقص تناول العنصر في الغذاء أو في امتصاصه أو سوء الاستفادة منه، ويلاحظ أن خطوات الميتابوليزم تتم بواسطة إنزيمات خاصة، وقد استغل المشتغلون في التغذية هذه الظاهرة في تقدير الحالة التغذوية وذلك إما بقياس تركيز العنصر أو نواتج الميتابوليزم في الدم أو البول أو قياس مدى نشاط إنزيم معين.

توجد تغيرات بيوكيميائية واضحة في الأفراد الذين يعانون من سوء التغذية أو نقصها وهذه تسبق الأعراض الإكلينيكية إلا أنها أحياناً لا تتساوى في تغيرها مع هذه الأعراض الإكلينيكية وأحياناً تكون التغيرات غير محددة أو واضحة في خطوات، بل تظهر تدريجياً، وعموماً فهذه التغيرات البيوكيميائية تعكس الحالة التغذوية، ويمكن عن طريقها التعرف على الأشخاص أو الجماعات التي يكون غذاؤها فقيراً في أحد العناصر ولكن يصعب تفسير نتائج هذه الاختبارات عند غياب الأعراض الإكلينيكية وتوجد الآن أجهزة أوتوماتيكية تمكن من إجراء التحاليل على عينات صغيرة جداً (Microanalysis) من الدم والبول في وقت واحد.

ولقياس الحالة التغذوية للبروتين تقدر كمية البروتين في البلازما، ولكن هذه لا تدل على حالة تغذية البروتين، كما أنها لا تدل على نوع البروتين الذى يتناوله الفرد ويمكن قياس مستوى الأحماض الأمينية في الدم أو البول للحصول على نتائج أكثر دقة وقد وجهت عناية خاصة لدراسة مستوى الحامض الأمينى Hydroxyproline في البول حيث ظهر أنه يقل في حالة سوء تغذية البروتين والطاقة (PEM) نتيجة لهدم الكولاجين.

ويستعمل التوازن النيتروجينى لقياس الحالة الغذائية للبروتين، وقد استعملت هذه الطريقة أساساً لتقدير متطلبات الجسم من البروتين.

أما بالنسبة لفيتامين A فإنه يقدر فى الدم ونسبته من (٣٠-٥٠) ميكروجرام/ ١٠٠ مل دم. فإذا قل من ٢٠ ميكروجرام فإنه يدل على نقص فى فيتامين A المخزون فى الكبد ولكن حيث أن الجسم يخزن فيتامين A فى الكبد، فإن مستوى هذا الفيتامين فى الدم لا يدل على مستوى الفيتامين المتناول حديثاً.

ويقدر فيتامين C فى الدم ومستواه فى الدم من (٠,٦-١,٤) ميكروجرام/ ١٠٠ مل دم وهذا يدل على مستوى كفايته فى الغذاء (حوالاً ٧٠ مجم) أما إذا قل عن ٢,٠ مجم/ ١٠٠ مل دم، فإنه يدل على أن مستواه فى الغذاء يقل عن ٢٥ مجم. كما يمكن تقدير فيتامين C فى الكرات الدموية البيضاء، فهى طريقة أدق من السابقة (٢٠-٣٠ مجم/ ١٠٠ مل) ويقدر الثيامين فى الدم، (ومعدله الطبيعى ٥ ميكروجرام / ١٠٠ مل) كما يمكن تقدير حامض البيروفيك فى الدم كدليل على الحالة الغذائية للثيامين حيث يرتفع عند نقص الثيامين فى الغذاء، وتقدر الحالة الغذائية للريبوفلافين بتقدير نسبته فى البول، ولكن يمكن للبكتريا الموجودة فى القنسة الهضمية أن تكون الريبوفلافين أما بالنسبة للنياسين فإنه يتم تقدير نواتج الميتابوليزم كدليل على الحالة الغذائية مباشرة.

#### دراسة الإحصاءات الحيوية Vital Statistics :

تحتفظ كثير من الدول ببعض الإحصاءات التى يمكن التعرف بها على الحالة التغذوية للشعب، وأكثرها استعمالاً هى نسبة وفيات الرضع والأطفال فى الألف فى عمر سنة وأيضاً وفيات الحوامل وتنخفض النسبة فى الدول ذات الحالة التغذوية الجيدة التى زادت فيها العناية بالأمومة والطفولة. وقد أصبح من المقاييس الدقيقة للحالة التغذوية فى أى بلد النظر فى نسبة الوفيات فى الألف بين الأطفال حديثى الولادة Neonatal Mortality وهم فى سن أقل من شهر، والولادات الميتة Stillbirth وهناك كثير من العوامل التى تؤثر فى نسبة الوفيات قبل وبعد الولادة مثل الحالة التغذوية للأم وخاصة أثناء الحمل، والعوامل الوراثية، ومدى التعرض للعدوى، والأمراض المعدية ومدى الرعاية الطبية.

وعادة تكثر حالات سوء التغذية بين سن الأطفال من ١-٤ سنة، وقبل التعرف على المضادات الحيوية كانت بعض الأمراض المعدية مثل الحصبة والسعال الديكى والسل الرئوى من الأسباب الرئيسية للوفيات.

وإذا ظهر انخفاض فى نسبة وفيات الرضع والأطفال حتى سن ٤ سنوات فى جهة من الجهات فإنه يدل على تحسين الحالة التغذوية وبالعكس فإن ارتفاع هذه النسبة يدل على أنه يوجد انخفاض فى مستوى التغذية.

#### دراسة المقاييس الجسمية Anthropometric Measurements :

إذا لم يحصل الأطفال على الغذاء الكافى، فإن نموه لا يكون مناسباً. إن قياس الأطوال والأوزان فى الأطفال فى أعمار مختلفة وكذا البالغين يمكن أن يستعمل كدليل على الحالة التغذوية وقد أمكن استعمالها بنجاح ويجرى الآن تقدير لأوزان الأطفال فى المستشفيات والوحدات الصحية للتعرف على الأطفال ذوى الحالة الغذائية غير المناسبة ويمكن إجراء الفحوص الطبية على الأطفال منخفضى الأوزان، ويلاحظ أنه توجد هناك عوامل بجانب الغذاء تؤثر فى الوزن مثل العوامل الوراثية، ويعتبر تقدير الطول مع الوزن من أنسب المقاييس التى تعتبر مفيدة كما أن هناك مقاييس جسمية تتضمن قياس محيط الرأس ومحيط الصدر والذراع والأرجل، كما يمكن قياس الدهون تحت الجلد بواسطة أجهزة خاصة فى أماكن مختلفة من الجسم ويمكن Dumin و Womersley (١٩٧٤) من حساب نسبة الدهون فى الجسم باستخدام مجموعة الأربعة مقاييس biceps و triceps و subscapular و supra-iliac للإناث والذكور فى أعمار مختلفة (ملحق ٢).

كما أن المقاييس الأنثروبومترية (الأرقام القياسية أو المرجعية فى ملحق ٣).

#### أولاً: بالنسبة للأطفال :

١- يستخدم تصنيف الطفل حسب حالته التغذوية باستخدام تصنيف Gomez (١٩٥٦) وهو على أساس النسبة المئوية من الوزن القياسى بالنسبة للعمر weight for age كما فى جدول (١٣-١).

جدول (١٣-١) تصنيف الأطفال حسب Gomez

النسبة المئوية للوزن من الوزن القياسى	تصنيف الطفل
٩٠٪ أو أكثر	١- طبيعى
٧٥-٩٠٪	٢- سعى التغذية درجة أولى
٦٠-٧٥٪	٣- سعى التغذية درجة ثانية
أقل من ٦٠٪	٤- سعى التغذية درجة ثالثة

## ٢- تصنيف Wellcome :

يستخدم الوزن بالنسبة للعمر وتتضمن وجود الأديما حتى يمكن التمييز بين الكواشيتيور كور والمراسم. جدول (١٣-٢) و يقيس وزن الطفل بالنسبة للوزن المتوقع.

جدول (١٣ - ٢) تصنيف Wellcome للأطفال

النسبة المئوية للوزن من الوزن القياسي		الأديما	
		موجودة	غائبة
٦٠-٨٠٪		كواشيتيور كور	نقص وزن
> ٦٠٪		كواشيتيور كور مراسم	مراسم

## ٣- تصنيف Waterlow (١٩٧٢) :

يستخدم فيه مؤشر الوزن مقابل الطول ومؤشر الطول مقابل الوزن كما في جدول (١٣-٣).

جدول (١٣-٣) تصنيف Waterlow للأطفال

الوزن مقابل الطول درجة النحافة				الوزن مقابل العمر درجة التقزم
> ٧٠٪	٧٠-٨٠٪	٨٠-٩٠٪	< ٩٠٪	٪
(٣)	(٢)	(١)	(صفر)	الدرجة
نحيف		طبيعي		< ٩٥٪ الدرجة = صفر
				٩٥-٩٠٪ الدرجة = ١
				٨٥-٩٠٪ الدرجة = ٢
نحيف متقزم		متقزم		> ٨٥٪ الدرجة = ٣

وقد وضع Gibson (١٩٩٠) عدة مؤشرات عن الحالة التغذوية في جدول

(١٣-٤).

جدول (١٣-٤) تجميع عدة مؤشرات والحالة التغذوية<sup>(١)</sup>

المؤشرات	الحالة التغذوية
١- وزن منخفض/ الطول وزن منخفض/ العمر + طول طبيعي/ العمر وزن منخفض/ العمر + طويل/ العمر وزن طبيعي/ العمر + طويل/ العمر	حاليًا غذاؤه غير كاف حاليًا غذاؤه غير كاف حاليًا غذاؤه غير كاف
٢- وزن طبيعي/ الطول وزن منخفض/ العمر + طول منخفض/ العمر وزن طبيعي/ العمر + طول طبيعي/ العمر وزن مرتفع/ العمر + طول مرتفع/ العمر	قصير - غذاؤه مناسب طبيعي طويل - غذاؤه مناسب
٣- وزن مرتفع/ الطول وزن طبيعي/ العمر + طول منخفض/ العمر وزن مرتفع/ العمر + طول منخفض/ العمر وزن مرتفع/ العمر + طول طبيعي/ العمر	حاليًا غذاؤه أكثر من اللازم + قصير بدين غذاؤه أكثر من اللازم - ليس بالضروري بدين

ثانيًا: بالنسبة للبالغين :

يجب على الفرد أن يحتفظ بوزن جسمه مناسبًا لأن وزن الجسم يؤثر على قدرة الفرد ومدى استمتاعه بالحياة فنقص الوزن يؤدي إلى سوء التغذية وبالتالي قصور في التجديد والصيانة وقلة النشاط والقدرة على العمل والتفكير، وقد تحدث اضطرابات أخرى إذا ما اشتدت الحالة كما أن زيادة الوزن صورة من صور سوء التغذية ويترتب عليها مشاكل صحية كثيرة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر... إلخ وتعد السمنة من نشاط وحيوية الشخص.

وطبقًا لتقرير FAO (١٩٩٥) فيجب ألا يكون الإنسان بدنيًا أو نحيفًا. ولكن كيف يتم تحديد ذلك؟ وهناك عدة طرق لتقسيم الوزن المناسب للشخص منها.

ce. Gibson, 1990. Principles of Nutr. Status. Oxford Univ.Press N. Y.

## ١- طريقة Baldwin :

وهي من أقدم الطرق لتقييم وزن الجسم - وما زالت تستخدم - وفيها يطرح (١٠٠) من الطول بالسنتيمتر والناتج يعادل الوزن الأمثل للجسم، وبالنسبة للإناث يطرح ١٠٥ سم.

للرجال الطول سم - ١٠٠ = الوزن كجم، وبالنسبة للإناث الطول سم - ١٠٥ = الوزن كجم.

وتقيم أوزان الجسم ١.٥ يلي:

< ١٢٠٪ بدين

١١٠٪ - < ١٢٠٪ زائد الوزن

٩٠٪ - < ١١٠٪ الوزن المناسب

٨٠ - ٩٠٪ منخفض الوزن

> ٨٠٪ نحيف

## ٢- معامل وزن الجسم أو مؤشر كتلة الجسم (BMI) Body Mass Index

وهو مقياس للبدانة أو السمنة أو النحافة ويحسب كما في المعادلة التالية

$$\text{معامل وزن الجسم} = \frac{\text{الوزن بالكيلوجرامات}}{(\text{الطول بالمتر})^2}$$

وإذا كان معامل وزن الجسم للشخص البالغ (فيما عدا المرأة الحامل) هو:

- أقل من ١٨,٥ يكون الشخص ناقصاً في الوزن (نحيفاً)

- من ١٨,٥ إلى ٢٥ يكون الشخص طبيعياً

- من ٢٥ إلى ٣٠ يكون الشخص زائداً عن الوزن

- أكثر من ٣٠ يكون الشخص بديناً.

ويمكن استخدام جدول (١٣-٥) لحساب معامل وزن الجسم للبالغين على

أساس المعادلة السابقة. ويوضح العمود الأول الطول بالسنتيمتر (سم). وبين العمود

الثاني والثالث والرابع الأوزان المقابلة إلى معامل وزن الجسم ١٨,٥، ٢٥، ٣٠ على

التوالي.

ولتقييم وزن شخص ما، يُحدد طوله من العمود الأول، ويقارن وزنه بالأوزان

المذكورة في الأعمدة الثلاثة التالية على طول هذا الخط فإذا كان الوزن أقل من

المذكور في عمود الـ (١٨,٥) فيكون الشخص ناقص الوزن (نحيفاً). أما إذا وقع

الوزن بين الوزنتين في العمودين (١٨,٥) و(٢٥) فإن معامل وزن الجسم يكون في

المدى الطبيعي. وإذا كان الوزن أكثر من الرقم فى عمود الـ ٢٥ فإن الشخص يكون زائد عن الوزن. وإذا كان الرقم أكثر مما فى عمود الـ (٣٠) فإن الشخص يكون بدينًا (FAO ١٩٩٥).

جدول (١٣-٥) معامل وزن الجسم إلى الطول للبالغين

الوزن (كجم)			الطول (سم)
معامل وزن الجسم			
٣٠	٢٥	١٨,٥	
٦٤	٥٣	٣٩	١٤٦
٦٥	٥٥	٤١	١٤٨
٦٨	٥٦	٤٢	١٥٠
٦٩	٥٨	٤٣	١٥٢
٧١	٥٩	٤٤	١٥٤
٧٣	٦١	٤٥	١٥٦
٧٥	٦٢	٤٦	١٥٨
٧٧	٦٤	٤٧	١٦٠
٧٩	٦٦	٤٩	١٦٢
٨٢	٦٧	٥٠	١٦٤
٨٣	٦٩	٥١	١٦٦
٨٥	٧١	٥٢	١٦٨
٨٧	٧٢	٥٣	١٧٠
٨٩	٧٤	٥٥	١٧٢
٩١	٧٦	٥٦	١٧٤
٩٣	٧٧	٥٧	١٧٦
٩٥	٧٩	٥٩	١٧٨
٩٧	٨١	٦٠	١٨٠
٩٩	٨٣	٦١	١٨٢
١٠٢	٨٥	٦٣	١٨٤
١٠٤	٨٦	٦٤	١٨٦
١٠٦	٨٨	٦٥	١٨٨
١٠٨	٩٠	٦٧	١٩٠
١١١	٩٢	٦٨	١٩٢

#### المسح الغذائى Dietary Survey :

يجرى المسح الغذائى بغرض معرفة مقدار ما يتناوله الأفراد من الأغذية المختلفة، ومنها نحسب مقدار ما يتناوله الفرد من العناصر الغذائية، وتقارن بالمقررات



الغذائية، ويفضل أن يجرى المسح الغذائى مصاحباً للفحوص الإكلينيكية والاختبارات البيو كيميائية.

وتجمع البيانات الغذائية من عينة الأفراد المختارة، إما عن طريق استبيان Questionnaire يرسل إلّا أفراد العينة، ويتبع هذا فى الدول المتقدمة، وعادة يطلب من ربة الأسرة أن تملأ استمارة تتضمن معلومات عن أفراد الأسرة والجنس والعادات الغذائية لكل فرد وكمية الغذاء المستهلكة فى وجبة، أو تجمع البيانات عن طريق التعرف على التاريخ الغذائى Dietary History، ويمكن للأخصائى المتمرن أن يجمع معلومات كافية عن التغذية من ربات الأسر فى وقت قصير، على أن يكون الباحث عنده معلومات كافية عن العادات الغذائية واللغة والأغذية الموجودة.. إلخ، أو أن تجمع المعلومات بواسطة الباحثين يومياً أثناء إعداد الطعام وتناوله، حيث تسجل كميات الأغذية المستهلكة والمتبقية، وذلك على مدى أسبوع لتغطية التغيرات فى الوجبات اليومية خلال الأسبوع، ولو أنه فى بعض الجهات الفقيرة التى يتكرر فيها الغذاء كثيراً، يكفى يومين إلى ثلاثة، ويحسب الغذاء المستهلك للفرد كما يلى:

$$\frac{\text{الغذاء المستهلك بواسطة الفرد} - (\text{الغذاء الباقى مضافاً إليه الغذاء المفقود} \times 2)}{\text{عدد الأيام} \times \text{عدد الأفراد}}$$

هذا بالنسبة للبالغين، أما بالنسبة للفئات الحساسة فتجمع معلومات خاصة بهم. وبعد جمع المعلومات الخاصة يحسب مقدار ما يستهلكه الفرد من العناصر الغذائية من جداول تحليل الأغذية، (ملاحق ٤، ٥، ٦) ويفضل أن تكون محلية، على أن تعرف نسبة الفقد من العناصر الغذائية أثناء الإعداد والطهى، أو تجمع عينات من الأطعمة، وتحلل كيميائياً، ويفضل إجراء التحليل كل موسم، ويمكن الحكم على الحالة الغذائية للفرد يومياً، وقد وضع ICNND سنة ١٩٦٣ دليلاً للحكم على الحالة الغذائية بالنسبة للعناصر (جدول ١٣-٦).

### قوائم التوازن الغذائى :

ويمكن تقييم غذاء الشعب على مستوى الدولة بتقدير متوسط نصيب الفرد Food balance Sheets حيث يقدر كمية الغذاء الناتج فى فترة زمنية غالباً ما تكون هذه الفترة طوها سنة، ويضاف إليها المستورد، وكذا المضاف فى المخازن فى أول

الفترة، يطرح منها الباقي فى آخر العام والصادرات والمستعمل فى التقاوى، وغذاء الحيوانات والطيور، وكذا فى الصناعات الغذائية، ثم يقسم الباقي على عدد من أفراد الشعب مضروباً فى عدد أيام السنة، وهذه الطريقة تساعد فى معرفة مدى كفاية الانتاج وما تحتاجه البلاد من الاستيراد، كما تستعمل أساساً لوضع سياسة الدولة الغذائية، والتنبؤ بكميات الأغذية التى ستننتج فى الأعوام التالية. ومعرفة التطور فى الاستهلاك، كما يمكن إجراء مقارنات متوسط استهلاك الفرد فى غذاء معين فى الدول المختلفة. ولكن يلاحظ أن هذا المتوسط يمثل متوسط تقديرى ويعتمد على تساوى نصيب الفرد فى الدولة وهذا غير ممكن كما أنه لا يبين استهلاك الفرد فى الفئات الحساسة المختلفة أو حسب الجنس أو الدخل أو المجهود أو المستوى الاجتماعى.

جدول (١٣-٦) دليل الحكم على مدى مناسبة مستوى دخل الفرد من العناصر الغذائية بالنسبة لشخص عمره ٢٥ سنة وطوله ١٧٠ سم ووزنه ٦٥ كجم

العناصر	مستويات الدخل من العناصر الغذائية			
	ناقص	منخفض	مقبول	مرتفع
نياسين (مجم/يوم)	٥,٠ >	٩ - ٥	١٠-١٤	١٥ <
ريوفلافين (مجم/يوم)	٠,٧ >	١,٩-٠,٧	١,٤-١,٢	١,٥ <
ثيامين (مجم/١٠٠ سعر)	٠,٣ >	٠,٢٩-٠,٢	٠,٤-٠,٣	٠,٥ <
حامض اسكوربيك (مجم/يوم)	١٠,٠ >	٢٩-١٠	٤٩-٣٠	٥٠,٠ <
فيتامين A (ميكروجرام ريتينول/يوم)	٦٠٠ >	٧٤٩-٦٠٠	١٤٩٩-٧٥٠	١٥٠٠ <
كالسيوم (مجم/يوم)	٠,٣ >	٠,٣٩-٠,٣	٠,٧-٠,٤	٠,٨ <
حديد (مجم/يوم)	٦,٠ >	٨-٦	١١-٩	١٢ <
بروتين (مجم/كجم من وزن الجسم)	٠,٥ >	٠,٩-٠,٥	١,٤-١,٠	١,٥ <

# المراجع



## مراجع الطبعة الأولى

### أولاً : المراجع العربية

- إليزيس نوار (١٩٧٥) : الاقتصاد المنزلى ودوره فى تنمية المرأة بالمجتمعات المستحدثة. شئون تكوين وتنمية المجتمع.
- سيد مرعى (١٩٧٤) : الطعام الرخيص - هل انتهى عصره. سلسلة أقرأ، العدد ٣٨٥، دار المعارف - مصر.
- محمد مختار الجندى (١٩٦٧) : التغذية الصحية، دار المعارف - مصر.
- مصطفى صفوت محمد وعمر البسيونى وزويل ومحمد حسيب رجب (١٩٦٥) تغذية الإنسان. دار المعارف - مصر.
- يسرية عبد المنعم (١٩٧٥) دراسة تحليلية لبعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية على تقبل الزوجات العاملات بجامعة الإسكندرية لبعض الأغذية المحفوظة. رسالة ماجستير فى الاقتصاد المنزلى - كلية الزراعة - جامعة الإسكندرية.

### ثانياً : المراجع الإنجليزية

- Albanese, Higgins, Hyde & Orto, (1963). J. Clin. Nutr., 4 : 161.
- Albanses, Holk, Irby, Snyderman & Lein, (1947). Bull. John Hopkins Hos., 80 : 149.
- Albrink, Fitzgerald & Man, (1958). Metabolism, 7 : 162.
- Albert & Kealing, (1952). Endocrinology, 51 : 427.
- Alderberg, D. & L. Schaefer, (1959). Am. J. Med., 26 : 1.
- Aldelstein, S. & R. Vallee, (1962). In Mineral Metabolism, Vol 2 pt. B.P. 371. N.Y. Acad. Press.
- Alfin-slater, Afterwood, Wells, & Deuel, (1954). Arch. Biochem. Biophys., 52 : 180.
- Alfin-Slater, R.B. & L. Afterwood, (1968). Physiological Rev., 48 : 758.
- Allison, J.B. (1955). Biol. Evaluation of Proteins., Physiol. Rev. 35 : 664.
- Almquist, (1951). Am. Rev. Biochem., 29 : 314.
- Altman, P. & D. Dimer, (1968), Metabolism, FASED, Maryland.
- Anter, M.A., Ohlson, M.A. & R. E. Hodges, (1964), Am. J. Clin. Nutr. 14: 169.
- Anter, M.A. & M. Ohlson, (1965), J. Nutr. 85 : 829.

- Amstain, (1955). The Biochem. of Vit. B<sub>12</sub>, Cambridge Univ. Press.
- Banerjee, Deb. & Belavady, (1952), J. Biol. Chem., 195 : 271.
- Baylor, Van Alstine, Hautmann & V. Basset, (1950), J. Clin. Invest., 29 : 1167.
- Bearn, A. (1951). Wilson's Disease, Am. J. Clin. Nutr., 9 : 695.
- Bergström & Samuelsson, (1965). Am. Rev. Biochem., 34 : 594.
- Best & Huntsman, (1932), J. Physiol., 78 : 415.
- Best,-----, (1935), J. Physiol., 83 : 255.
- Best, C. & N. Taylor, (1951). The Physiol. Basic of Med. Practice, 7<sup>th</sup> ed., William & Wilkins Co. Baltimore.
- Beveridge, J., W. Connell & C. Roluson, (1963). Effect of the Level of the Dietary Protein with and without Added Cholesterol on Plasma Cholesterol Level in Man, J. Nutr., 79 : 286.
- Black, Kleiber & Smith, (1952). J. Biol. Chem., 197 : 365.
- Bloomfield, (1964). J. Lab. Clin. Med., 64 : 613.
- Bogert, J., G. Briggs & D. Calloway, (1973). Nutrition and Physical Fitness, Saunders Co. Philadelphia.
- Bosshardt & Barnes, (1950), J. Nutr., 40 : 595.
- Blen & Stammers, (1951). Lancet, 1 : 1137.
- Bradley, J., (1959). N.Y. Acad. Sci., 72 : 854.
- Brecler & Hoekstra, (1966). J. Nutr. 90 : 301.
- Bresnan, R. (1966). Protein Quality of Opaque-2 Maize for Children, in Prot. of High Lysine Conf. Purdue Univ., Washington, D.C.
- Brook, J. (1964). In Proceeding of the 6<sup>th</sup> International Congress of Nutr., P. 105., Edited C.F. Mills & R. Pasemore, Edinburgh, Livingstone.
- Broughton, Stewart, R.A. Antons, L. Eales & J. Brock, (1956). Lancet, 2: 521.
- Brown, R. (1965). East Afr. Med. J., 11 : 584.
- Brown, Hansen, Burr & McQuarrie, (1938). J. Nutr., 16 : 511.
- Callender, S., (1965). In Symposium on Disorders of the Blood, p. 84., Edinburgh, Royal College of Physicians.
- Cannell, R. (1950). Recent Advances in Nutr. with Particular Ref. To Protein Metab., Univ. of Kansas, Press, Lawrence, p. 27.

- Carpenter, K., (1960). The Estimation of the Available Lysine in Animal-Protein Foods, *Biochem. J.*, 77 : 604 - 610.
- Castle, W., (1955). *New Engl. J. Med.*, 249 : 603.
- Chan, H., (1968). *Brit. J. of Nutr.*, 20 : 747.
- Charalapons, Wahl & Ferguson, (1961), *J. Biol. Chem.*, 236 - 225.
- Cheldelin, V., Woods, A. & R. William, (1913). Losses of B- Vit. Due to Cooking of Foods, *J. Nutr.*, 26 : 477.
- Chow & Stone, (1957). *Am. J. Clin. Nutr.*, 5 : 431.
- Copp, D., Cameron, E., Cheney, B., Davidsod, A. & K. Henze, (1964). *Endocrinology*, 70 : 638.
- Clark, H. (1966). Opaque -2 Corn as a Source of Protein for Adult Human Subjects, in *Proc. of High Lysine Cons. Purdue Univ. Washington, D.C.*
- Cleave, T.E. & G.D. Campbell, (1956). *Diabetes, Coronary Thrombosis & the Saccharine Disease*, Bristol, Wrieght.
- Crawford, M., J. Gardner & J. Morris, (1968). *Lancet*, 1 : 827.
- Crawhill, J.E. Scowen & R. Watis, (1959a). Conversion of Glycine to Oxalate in Primary Hyperoxaluria, *Lancet*, 2 : 805.
- Crawhill------(1959b). Conversion of Glycine to Opalate in a Normal Subject, *Lancet* 2 : 810.
- Creer, (1962). *Rec. Prog. in Hormon Res.*, 18 : 187.
- Dalhman, T. & L. Friberg, (1954). *Acta Pharm. Toxicol.*, 10 : 199.
- Daniel, V. (1966). The Effect of Sup. Apoor Kaffir Diet with L-lysine and DL-threonine, *J. Nutr. Diet.*, 3: 10 - 14.
- Dawber, T., Moore, F. & G. Mann, (1957). *Am. J. Pub. Health*, 47, p. 4.
- Davidson, S. & R. Passmore, (1970). *Human Nutrition and Dietetics*, The English Book Society & R. S. Levingstone LTT.
- Dayton, Hashimoto, Dixon & Pearce, (1946). *J. Lipid Res.*, : 103.
- De Langen, C. (1954). Rosal Metab. And Sodium Chloride, *Acta. Med. Scand.*, 10 : 257.
- De Langen.----- Sodium Chloride in Geographical Patholo. and its Influence on the Capillary System, *Acta. Med. scand.*, 149 : 75.

- Dept. of Health and Social Security. (1969). Rev. Publ. Health. Med. Sub  
London, No.120, p. 243.
- Danton, A. & C. Eivahjan, (1954). Biol. Chem., 206 : 449.
- Denel, Roe & Alfin-Slater, (1954). J. Nutrition, 54 : 193.
- Doll, R. & A. Hill, (1964). Brit. Med. J. 1 : 1399.
- Dowdle, E. Schachter, D. & H. Shenker, (1960). Am. J. Phys., 198 : 609.
- Dubnoff, (1950). Arch. Biochem., 27 : 466.
- Du Vigneaud, Dyer & Kies, (1939). J. Bio. Chem., 130 : 325.
- Du Vigneaud-----, (1942 - 43). Harvey, Lecture, 38 : 39.
- Dueul Jr. & R. Reiser, (1955). Vit. and Horm., 13 : 29.
- Dyke, Della, Vida & Delikat, (1942). Lancet, 2 : 278.
- FAO, (1957). Protein Req. Nutr. Studies, No. 16, Rome.
- FAO, (1965). Protein Req. Rep. of a Joint FAO / WHO Exp. Group, FAO Nutr.  
Meeting Rep. Ser. No. 37, Rome.
- FAO, (1970). Amino Acid Contents of Foods & Biol. Data on Protein, Rome.
- FAO, (1973) Nutrition Newsletter, Vol. 11, No. 4.
- FAO / WHO, (1974). Handbook of Human Nutr. Req. FAO Nutr. Ser. No. 28 &  
WHO Mono. Seri. No. 61, Rome.
- Fenlon, F., (1940). Vitamin C Retention as a Criterion of Quality and Nutritive  
Value in Veg., JADA, 16 : 524.
- Friberg, L., (1959). Arch. Ind. Health, 20 : 401.
- Frost, (1949). In Protein and Amino Acid Nutr., A. Albanese (ed.) N. Y. Acad.  
Press, pp. 225 - 279.
- Garrow, J. & M. Pike, (1967a). Brit. J. of Nutr., 21 : 155.
- Garrow-----, (1967b). Lancet, 1 : 1.
- Galante, L., T. Damundson, E. Watthows, A. Tye, E. William, N. Woodhose  
& I. MacIntyre, (1968). Lancet, 2 : 537.
- George, Haan & Fisher, (1962). Lancet, 1 : 1300.
- Gleim, E., D. Tressler & F. Fanton, (1944), Ascorbic Acid, Thiamin, Riboflavin  
and Carotene Content of Asparagus and Spinach in the Fresh,  
Stored and Frozen States before and after Cooking Food Res. 9 :  
471.



- Glinsmann, W. & W. Mertz, (1965). *Metab. Clin. Expt.*, 15 : 510.
- Goldberg, A., (1961). *Scot. Med. J.* 6 : 697.
- Goldsmith, G., H. Sarett, U. Register & J. Gibbons, (1952). Studies of Niacin Req. in Man, *J. Clin. Invest.* 31 : 533.
- Goldsmith, G. A., (1962). Mechanisms by which Certain Pharmacologic Agents Lower Serum Cholesterol *Fed. Pro.* 21 : 81.
- Goldsmith, G. A., (1969). Highlights on the Cholesterol for Diets & other Sclerosis Problems, *J. Am. Med. Assoc.* 176 : 783.
- Gordon, J. & I. Noble, (1959). Effect of Cooking Method on Veg., *JADA*, 35 : 578.
- Graham, G., A. Cordany & J. Bartl, (1964). *Proc. 6<sup>th</sup> Intern. Cong. Nutr.*, Edinburgh, E. & S. Livingstone, P. 523.
- Greer, (1956). *J. Am. Chem. Soc.*, 73 : 1260.
- Greer, (1957). *Rec. Prog. in Hormone Res.*, 13 : 17.
- Gubler, C., (1956). Absorption & Metabolism of Iron *Sci.*, 123 : 87.
- Gupte, J., A. Dakroury, A. Harper & C. Elvehjem, (1958). *J. Nutr.*, 62 : 253.
- El-Baghdadi, B., I. Nawar & F. Kelada, (1974). Influence of a Protein-rich Supp. on Hp Level of Post Natal Blood Loss, Its Palatability Testing by Professionals. *Bull. High Inst. Public Health*, In Press.
- El-Masry, E., (1973). Preparation of Supp. Meals for Infants, M.S. Thesis, Faculty of Agr., Alexandria University.
- Engelberg, (1956). *J. Biol. Chem.* 222 : 601.
- Eppright, E., M. Pattison & H. Parbour, (1963). *Teaching Nutrition*, The Iowa State Univ. Press, Ames, Iowa.
- Hadji Markos, D. & Bomhorst, (1958). The Trace Elements and its Influence on Dental Caries Susceptibility, *J. Ped.*, 52 : 275.
- Hansen, Hoggard, Bseloche, Adam & Weise, (1958). *J. Nutr.*, 66 : 365.
- Hansen & Wiess, (1963). *Pediatrics*, 31 : 171.
- Harper, H., (1965). *Review of Physiological Chemistry*, Lange Medical Publications, California.
- Harper, A., (1965). Balance and Imbalance of Amino Acids, *Am. N.Y. Acad. Sci.*, 69 : 1025 - 1041.

- Harrison & Harrison, (1950). J. Biol. Chem., 185 : 857.
- Harrison & Harrison, (1953). Yale J. Biol. and Med., 34 : 273.
- Harris, R. & H. Losecke, (1960). Nutritional Evaluation of Food Processing,  
John Wiley & Sons, N.Y.
- Heard, (1964). Carbohydrate & Protein Sump. Carbohydrate & Nutr. Proc.  
Nutr. Soc., 23 : 110.
- Heaton, F. & P. Fonman, (1965). Lancet, 2 : 59.
- Heunamen, Carroll & Albright, (1956). J. Clin. Invest., 95 : 1229.
- Hess, (1920). Scurvy. Past and Present, Philadelphia & Febigen.
- Hewston, E., R. Dawson, L. Alexander & E. Keile, (1948), Vitamin and Mineral  
Content of Certain Foods as Affected by Home Preparation, U.S.  
Dept. Agr. Misc. Publ. No. 678.
- Hodges, R.W, Bean, A. Ohlsen & R. Bleiler, (1962a). Factors Affecting Human  
Antibody Response, IV Pyridoxine Def., Am. J. Clin. Nutr. 11 : 180.
- Hodges, R. -----, (1962b). Factors Affecting Human  
Antibody Response. V. Combines Def. of Pantothenic Acid &  
Pyridoxine, Am. J. Clin. Nutr., 11 : 178.
- Hodges, H., (1964). In Mineral Metabolism, Vol 2, Part A., p. 573, ed. C. Conon  
& F. Bronner, N.Y. Acad. Press.
- Hodges & Krehl, (1965). Am. J. Clin. Nutr., 17 : 337.
- Hogan & Parrol, (1939). J. Biol. Chem., 128 : 46.
- Holghira, Ogata, Takeda & Sunda, (1960). J. Biochem., 47 : 139.
- Hollingsworth, D. E., & J.P. Greaves, (1967). Am. J. Clin. Nutr., 26 : 65.
- Holt, L., P. Gyorgy, E. Pratt, S. Snyderman, & W. Wallage, (1960). Protein and  
Amino Acid Req. in Early Life, N.Y. Acad. Press.
- Holt, L. & S. Snyderman, (1961). The Amino Acid Req. of Infants, J. Am. Med.  
Assoc., 175 : 100.
- Hopkins, L. & A. Majaja, (1966). Fed. Proc., 25 : 303.
- Horowitz, M., (1955). Niacin - Tryptophan Relationship in the Dev. of Pellagra,  
Am. J. Clin. Nut., 4 : 241.

- Horwitt, M., C. Harvey, G. Duncan & W. Wilson, (1956). Effects of Limited Tocopherol Intake in Man with Ref. to Aryth. Hemol. and Lipid Oxi., *Am. J. Clin. Nutr.*, 4 : 408.
- Horwitt, M., C. Harvey, B. Catwry & L. Witting, (1961). Polyunsaturated Lipids and Tocopherol Req., *JADA*, 38 : 234.
- Horwitt, M., B. Century & A. Zeman, (1963). Erythrocyte Survival time and reticulocyte Level after Tocop. Dep. in Man, *Am. J. Clin. Nutr.*, 12 : 99.
- Howe, E., G. Jansen & E. Godlian, (1965). Amino Acid Supp. of Cereal Grains as Related to World Supp., *Am. J. Clin. Nutr.*, 16 : 315- 329.
- Hunter, D., (1935). *The Disease of Occupation*, London, English University Press.
- IONND, (1963). *Manual for Nutrition Surveys*, 2<sup>nd</sup> ed., Washington.
- ILO, (1974). *Jobs Versus People*, Geneva.
- Iron, T., (1974). *Elementary Physi. J.*, Wiley & Sons, N. Y.
- Irwing, (1957). *Calcium Metabolism*, N.Y., Wiley.
- Irwin, M. & M. Hegsted, (1971). A Conspectus of Research on Amino Acid Req. of Man, *J. Nutr.*, 101 : 541 - 565.
- Jansen, C., (1962). *J. Nutrition*, 76 : Sup. No. 1.
- James, L. & Wedd, (1957). *Biochem. J.*, 63 : 699.
- Johnson, (1963). *J. Nutrition*, 8 : 40.
- Kagan, B., J. Heas, E. Lundeen, K. Shafer & C. Stigall, (1953). *Pediat.*, 15 : 373.
- Kah, A. & L. Chagial, (1955). Nutritional Evaluation of Foodstuffs Ascorbic Acid Content of Common Veg., *Pakistan J. Sel. Res.*, 7, 64 (*J. Sel. Food Agr.* 9, Abst, ii 84).
- Kannel, W., T. Dawber, A. Kagan, N. Revotskie & J. Stokes, (1961). *Am. Intern. Med.*, 55 : 83.
- Keys, Viranco, Minon & Mendoza, (1934), *Metabolism*, 3 : 195.
- Kinley & Kranse, (1959). *Proc. Soc. Exp. Bio. and Med.*, 102 : 353.
- Kirk, Metheny & Reynods, (1962). *J. Nutr.*, 77 : 448.
- Kleiber, M., (1947). Body Size and Metabolic rate, *Phys. Rev.*, 27 : 510 - 541.

- Koch, Weser & Popper, (1949). J. Lab. and Clin. Med., 34 : 1764.
- Kohman, E., (1944). JADA, 120 : 839.
- Kramer & Levine, (1953). J. Nutrition, 50 : 149.
- Krebs, H., (1964). In Mammalian Protein Metabolism, Vol. 1, p. 125 (ed.) H.N. Munro and J. Allison, N. Y. Acad. Press.
- Kuo & Bassett, (1965). Am. Int. Med., 62 : 1199.
- Kuppuswamy, S., M. Serenivasan & V. Subramanyam, (1957). Ind. C. Med. Res. Pec. Ser. No. 33.
- Lembach & Charalopoulos, (1966). J. Biol. Chem., 241 : 395.
- Levin, Johnson & Albert, (1957). J. Biol. Chem., 228 : 15.
- Levine & Gordon, (1941). J. Clin. Invest., 20 : 209.
- Leverton, R., W. Johnson, J. Paur & J. Allison, (1956). J. Nutr., 5 : 219.
- Ling & Chow, (1952). J. Biol. Chem., 198 : 439.
- Mao Millan & Sinclair, (1958). In Essential Fatty Acids, H.M. Sinclair (Editor), London, Butterworth, 4 : 208.
- Mann, O., (1953). Scand J. Clin. Lab. Invest., 5 : 75.
- Mann, G., R. Shaffer & A. Rich, (1965). Lancet, 2 : 1308.
- Margosches, M. & B. Valle, (1957). J. Am. Chem. Soc., 79 : 483.
- Martin, Mann, Winkler & Peters, (1944). J. Clin. Invest, 23 : 824.
- McCane & Widdowson, (1942). J. Physiol, 101 : 44.
- McCollum, E. (1957). A History of Nutrition, Houghton, Mifflin Co., Boston.
- McDonald, (1965). Am. J. Clin. Nutr., 16 : 458.
- Mertz, W. (1967). Fed. Proc. 26 : 186.
- Mertz, W., E. Roginski & K. Schwabe, (1961). J. Biol. Chem., 236 : 318.
- Miller, D., (1956). J. Sci. Food Agr., 7 : 337.
- Mitchell, H., (1964). Comparative Nutrition of Man and Domestic Animals, Acad. Press., N.Y.
- Mitchell, H. & M. Bert, (1954). The Determination of Metab. Nutr., J. Nutr., 52 : 483 - 497.
- Mitchell, H. (1964). Comparative Nutrition of Man and Domestic Animals, Vol 2, Acad. Press, N.Y.

- Mitchell, H. & R. Biock, (1946). Some Rel. between the Amino Acid Contents of some Proteins and their Nutritive Value for the Rat, *J. Biol. Chem.*, 163 : 599 - 620.
- Mitchell, H., E. Snell & R. Williams, (1941). *B. Am. Chem. Soc.*, 63 : 2284.
- Montgomery, R., (1962). *Arch. Dis. Child.*, 37 : 383.
- Moore, F., (1955). In *Modern Trends in Blood Diseases*, pp. 103 - 199, ed. J.F. Wilkinson, London, Butterworth.
- Moore, T., (1975). *Vitamin A*, London, N.Y.
- Moore, C. & R. Dubach, (1956). *Metabolism and Req. of Iron in the Hum.* *JAVA*, 162 : 697.
- Moore-----, (1962). *Iron in Mineral Metab.*, vol. J. PT. B. Acad. Press, N. Y.
- Morimoto, K, Matsumuro, H. & M. Shimizu, (1959). Loss of Vitamin C by Home Cooking, *J. Sc. and Food Agr.*, 11, Abst. ii, 724.
- Munsell, H., F. Streightoff, B. Bendor, & M. Orr, (1949). Effect of Large-scale Method of Preparation on the Vitamin Content of Food, III Cabbage, *JADA*, 23 : 420.
- National Acad. of Sci., (1964). *Eval. of Protein Quality*, NRC, Pub., 1100 Washigton D.C.
- Nawar, I., (1973). Effect of Egyptian Cooking Methods on the Nutritive Value and Palatability of Food Studies on the Effect of Cooking on Ascorbic Acid, *Alexandria J. Agr. Res.*, 21 : 327.
- Nawar, I., H. Clark, R. Picket & D. Hegsted, (1970). Protein Quality of Selected Lines of Sorghum Vulgare for the Growing Rat Nutr., *Ref. Int.* 1 : 75 - 81.
- Nile Co. for Pharmaceuticals, (1974). *Superamine, A New Precooked Food Rich in Protein Particularly Adapted for Weaning Period*, Egypt.
- Nour, S., (1968). *Studies of Effect of Marketing, Storage, Preparation and Methods of Cooking on Some Nutrients of Egyptian Vegetables*, M.S. Thesis, Faculty of Agriculture, Alexandria Univ.
- O. Dell, B. Elsden, D. Thomas, J. Partridge, S. Smith R. & R. Palmer, (1966). *Nature*, 209 : 401.

- Oldham, H. & B. Sheft, (1950). Effect of Calorie Intake on Nitrogen Utilization during Pregnancy. *JADA*, 27 : 847.
- Oliverona, George & Broström, (1961). *Fed. Proc.*, 10 : 928.
- Oliver, M. & G. Boyd, (1958). *Vitamins and Hormones*, 16 : 147.
- Orr, M. L. & B. K. Watt, (1957). Amino Acid Content of Foods, Home Ec. Research Rep. No. 4, Washington.
- Oski & Barness, (1965). *Am. J. Dis. Child.*, 67 : 104
- Panennangalore, M., M. Guttikar, M. Narayan, D. Rajalkshmi & M. Swaminathan, (1965). Studies on Processed Protein Based on Blends of Groundnut, Bengal Gram, Soybean and Sesame Flour Fortified with Vit. and Men. III Supp. Value to a Poor Ind. Kaffir Corn Diet, *J. Mut. Diet.* 2 : 28 - 33.
- Parsons, Jr., W.B. (1960). The Effect of Nicotine Acid on Serum Lipids., *J. of Clin. Nutr.*, 8 : 471.
- Platt, B. & D. Miller, (1959). *Pro. Nutr. So.*, 18.
- Platt, B., Miller, D. & B. Payne, (1960). Protein Values in Human Nutr. London, Churchill
- Platt, Hoard, Stewart, (1964). In the Role of the Gastrointestinal Tract in Protein Munnro, H., N. Blackwell, Oxford, p. 227.
- Peife. & Holman, (1959). *J. Nutr.*, 63 : 155.
- Pellet, Pand, S. Shadsrevian, (1970). Food Composition Tables for Use in the Middle East, Amer. Univ. Beirut.
- Prazad, A., (1967). *Fed. Proc.*, 26 : 181.
- Raben, (1949). *Endocrinology*, 45 : 296.
- Randle, Garland, Hales & Newshime, (1963). *Lancel*, 1 : 785.
- Renal Stones, Magnisium and Vit. B<sub>6</sub> in rats, *Nutr. Rev.* (1961) 19 : 306.
- Robinson & Jennings, (1965). *J. Lipid Res.*, 6 : 222.
- Robinowitz & Zierler, (1963). *Nature*, London, 199 : 913.
- Roginski, E. & W. Martz, (1966). 7<sup>th</sup> Inter. Cong. Nutr. Hamburg. W. Germany Abst., p. 263.
- Rose, G., W. Thomson & R. William, (1965). *Brit. J. Med.*, 1 : 1531.

- Rose, W., Wixom, R., Lookhart, H. & G. Lombert, (1955). *J. Biol. Chem.*, 217: 987.
- Rosenheim, O. & J. Drummond, (1920). *Lancet*, 1 : 862.
- Roth, Glick, Yalo & Berson, (1963), *Science*, 140 : 987.
- Sanger, F. (1959). *The Chem. of Insulin Science*, 129 : 1843.
- Sauberbick & Baumann, (1948). *J. Biol. Chem.*, 176 : 165.
- Schawrz, K. & C. Foltz, (1957). Selenium as an Integral Part of Factor 3 Against Dietary Necrotic Liver Degeneration, *J. Am. Chem. Soc.*, 79 : 3292.
- Schwarz, K. & W. Mertz, (1959). *Arch. Biochem. Biophys.*, 85 : 292.
- Scrimshaw, N. & R. Bressani, (1951). A Veg. Protein Mixture for Human Consump. *Fed. Proc.* 20 : Supp. 7 : 80 - 81.
- Scrimshaw, N., M. Bohar, D. Willson, R. Dolcone & R. Bressani, (1960). The Dev. of Incop. Mix. in Meeting Protein Needs for Infants and Young Child., NAS NRC Pub., 842.
- Sherman, H (1959). *Vit. and Horm.*, 8 : 85.
- Shohl & Wolbock, (1935). *J. Nutr.*, 11 : 275.
- Sinclair, H. M., (1948). The Assessment of Human Nutriture. In Harris, R. S. & K. V. Thiamann (eds.); *Vitamin and Hormones*, 6 : 101 - 162, N.Y. Academic Press.
- Sognnass, R. & H. Shaw, (1952). Salivary and Pulpal Contrib. to the Radio Phosphorus Uptake in Enamel and Dentine, *J. Am. Dent. Gasoc.*, 44 : 489.
- Sleele, J. (1952). *J. Biol. Chem.*, 198 : 237.
- Snell & Peterson, (1940). *J. Bact.*, 30 : 273.
- Stanbury, (1966). *Familial Goller in Metabolic Basis of Inherited Diseases*, 2nd Ed., N.Y. McGraw-Hill Book Co. Inc.
- Stokand & Manning, (1938). *J. Biol. Chem.*, 125 : 687.
- Stucki, W. & A. Harper, (1962). Effect of Altering the Ratio of Indispensable Amino Acid in the Diets for Rats, *J. Nutr.*, 62 : 278.
- Swendseid, Harris & Tuttle, (1962). *J. Nutr.* 77 : 391.
- Tank, G. & C. Starvick, (1960). Effect of Naturally Occuring Selenium and Vanadium on Dental Caries, *J. Dental Res.*, 39 : 473.

- Thompson, J., (1965). *Pro. Nutr. Soc.*, 24 : 160.
- Thomson, A. & W. Billez, (1957). *Brit. Med. J.*, 1 : 243.
- Tiller, J., R. Schilling & J. Morris, (1968). *Brit. Med. J.*, 4 : 407.
- Tipton, I., H. Schroeda, H. Perry & M. Cook, (1963). *Health Phys.*, 11 : 403.
- Tucker & Eckstein, (1937). *J. Biol. Chem.*, 121 : 479.
- Tuttle, Swendseid, Mulcare, Griffith & Basset, (1957). *Metabolism*, 6 : 564.
- Underwood, E. (1962). *Trace Elements in Human and Animal Nutr.*, 2nd Ed. N.Y. Acad. Press.
- Vilter, Glazer, Muelle, Jarrold, Sakuvai & Will, (1953). *Lab. and Clin. Med.*, 42 : 959.
- Vilter, R., J. Willis, T. Wright & D. Rullman, (1963). Interrelationship of vit. B<sub>12</sub> Folic Acid and Ascorbic Acid in the Megaloblastic Anemias, *Am. J. Clin. Nutr.*, 12 : 130.
- Vivian, (1964). *J. Nutr.*, 82 : 395.
- Wagle, Melita & Jhonson, (1957). *Arch. Biochem., Biophys.*, 70 : 619.
- Walker, A., (1950). *Lancet*, 2 : 244.
- Walker, G. & M. Potgieter, (1956). Effect of Salt on Ascorbic Acid in Cabboge, *JADA*, 32 : 820.
- Wallerstein, Harris & Gabuzds, (1952). *Proc. Am. Fed. Clin. Res. Abs.*, 119.
- Waterlow, J. & M. Stephens, (1957). Human Protein Rep. Conference, Sponsored by FAO / WHO, J. Macy Jr. Found. N.Y., p. 136.
- Welch & Nichal, (1952). *Ann. Rev. Biochem.*, 21 : 633.
- Wertz, A., M. Derby, Y. Ruttenberg & G. French, (1959). Urinary Excretion of Amino Acid by the Same Women during and after Pregnancy, *J. Nutr.*, 63 : 583.
- Whedon, G., (1961). In *Proc. of 6<sup>th</sup> Inter. Cong. of Nutr.*, p. 425, ed. Mills and Passmore, Edinburgh, Linvingstone.
- Whik, A., P. Handler & E. Smith, (1964). *Principles of Biochemistry*, McGraw-Hill Book Comp., N.Y.
- Widdowson, E., (1965). *Lancet*, 2 : 1099.
- Widdowson, E., R. McCane, G. Harrison & A. Sutton, (1963). *Lancet*, 2 : 1250.



- WHO, (1956). What it is, What it Does, How it Works. Leaflet, Geneva.
- Wilkins, Dewitt & Bronte-Stewart, (1962). Canad. J. Biochem. Phys., 40 : 1091.
- William, R. & J. Ensink, (1966). Secretion, Fate and Actions of Insulin and Related Products, Diabetes, 15 : 613.
- Wilson, E., K. Fisher & M. Fuqua, (1950). Principles of Nutrition, John Wiley & Sons, N.Y.
- Witten, P. & R. Holman, (1952). Polyethanoic Fatty Acid Metabolism, pt., 6, Effect of Pyridoxine on Essential Fatty Acid Conversion, Arch. Biochem Biophys., 4 : 266.

## المراجع التي أضيفت للطبعة الثانية

### أولاً : المراجع العربية

- المنظمة العربية للتنمية الزراعية، (١٩٩٢). الكتاب السنوى للإحصاءات الزراعية للأعوام ٨٤ - ١٩٨٥.
- إيزيس نوار، سهير نور، منى بركات، (١٩٩٠). الغذاء والتغذية، قسم الاقتصاد المنزلى، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية.
- إيزيس نواز، سهير نور، إيمان إسماعيل، (١٩٩٦). التغذية ونمط التفكير والتعلم لعينيتين من تلاميذ المرحلة الإعدادية بمدىنتى الإسكندرية وجدة، مجلد مؤتمر الجديد فى الاقتصاد المنزلى ودوره مع الجمعيات الأهلية فى التنمية المتواصلة، جامعة الإسكندرية.
- إيزيس نوار، سهير نور، سمير حلمى، عواطف شاهين، (١٩٩٦). إعداد وتقييم أغذية خاصة بمرضى السكر غير المعتمدين على الإنسولين باستخدام ردة القمح ومسحوق الترمس، مجلد مؤتمر الاقتصاد المنزلى، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية.
- إيزيس نوار، مديحة الطليباوى، نجوى غراب (١٩٩٦). برنامج تغذوى تربوى لتحقيق تكيف الطفل المتخلف عقلياً. وثائق المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للطب والقانون، الإسكندرية.
- إيزيس نوار، تسبى محمد رشاد، (١٩٩٧). أساسيات الغذاء والتغذية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.
- إيزيس نوار، سهير نور، سهير محمد أحمد، حسن عبد الرؤوف، (١٩٩٩). أساسيات تغذية الإنسان، قسم الاقتصاد المنزلى، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية.
- إيزيس نوار، (٢٠٠٢). آفاق الاقتصاد المنزلى ودوره فى تنمية المجتمع بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، مجلد مؤتمر الاقتصاد المنزلى، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية.
- تسبى محمد رشاد، إيزيس نوار، (٢٠٠٠). التقنين الغذائى وإدارة الوجبات، مطبعة نور بالإسكندرية.
- زهير أحمد السباعى، (١٩٩٥). طب المجتمع حالات دراسية. الدار العربية للنشر والتوزيع.

- سحر محمد البساطى، (٢٠٠٠). فاعلية بعض الأعشاب والنباتات الطبية شائعة الاستخدام فى تحكم مستوى جلوكوز الدم للفئران المصابة بمرض السكرى. رسالة دكتوراه. قسم الاقتصاد المنزلى، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية.
- سمير حلمى، (١٩٨٤). أُمريض أنت بالسكر، شركة نوفو بكونبهاجن ومكاتبها بالقاهرة والإسكندرية.
- سهير نور، منى بركات، إليزيس نوار، (١٩٩٠). الاقتصاد الأُسرى، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية.
- صلاح مراد، (١٩٨٩). أنماط التفكير والتعلم لمعلمى المرحلة الابتدائية فى جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية، مجلد كلية التربية، جامعة المنصورة، العدد ١٢، الجزء الأول.
- صلاح منصور، (٢٠٠٠). الطب عند الإغريق فى مصادر الإغريق القديمة، الإسكندرية.
- عبد الوهاب كامل، (١٩٩١). علم النفس الفسيولوجى، مكتبة النهضة العربية، القاهرة.
- فؤاد قلادة، (١٩٩٣). تخطيط المناهج وبناء الإنسان، كلية التربية، جامعة طنطا.
- فؤاد قلادة، (٢٠٠٣). الإيقاع الحيوى ودوره فى التعليم والتعلم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.
- مختار سالم، (١٩٨٧). أعشاب لكنها دواء، دار المريخ للنشر، الرياض.
- مدحت حسن خليل محمد، (١٩٩٧). الغدد الصماء، العين، دولة الإمارات العربية.
- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، (١٩٩٢). النشرة الإحصائية.
- منظمة الصحة العالمية / منظمة الأغذية والزراعة، (١٩٩٧). دور الدهون والزيوت فى تغذية الإنسان، سلسلة دراسات الأغذية والتغذية رقم ٥٧ روما.
- منى بركات، إليزيس نوار، سهير نور، (١٩٩٢). التغذية وتقييم الوجبات، قسم الاقتصاد المنزلى، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية.
- نجوى محمد غراب، (١٩٨٨). دراسة المشكلات الأسرية من الأطفال المتخلفين عقلياً بمدينة الإسكندرية، رسالة ماجستير - قسم الاقتصاد المنزلى، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية.

- وفاء مسعود فرس، (٢٠٠٢). رسالة دكتوراه، قسم الاقتصاد المنزلي، كلية الزراعة،  
جامعة الإسكندرية.

### ثانياً : المراجع الأجنبية :

- Amer. Diet. Assoc., (1990). Position Statement Nutr. Recomm. for Ind. with Diabetes, Mellitus Diabetic Care, 13: 18: 25.
- Amer. Diet. Assoc., (1998). Nutr. Recomm. and Principles for People with Diabetes, Mellitus Diabetic Care, 21 (1): 532 - 35.
- Amer. Diet. Assoc., (1999). Diabetic Care, 22 (1) : 42 - 45.
- Anderson GH., and Li ET, (1987). In. J. Obesity, 11, Supp. (3): 97-108.
- Armstrong B., van Merwyk AJ., et al, (1977). Am. J. Epid., 105: 444-9.
- Arrieta AC., Zaleska M., et al, (1992). J. Pediat., 121 (1): 75 - 8.
- Ashley DV., (1986). Int. J. Vit. Nutr. Res. Supp., 29 (1) : 27 - 40.
- Barnes J. and Barnes N. (1992), J. Cardio Pharma, 19 supp. (6): 563-71.
- Bastick RM, Potter J.D, et al., (1993). Cancer Res., 15: 4230 - 7.
- Bayne KC., Boucher BJ., et al, (1997). Diabetologia, 40 (3) : 344 - 7.
- Bengoa J., Torun M., and Scrimshaw N., (1989). Food and Nutr. Bull., 11: 4 - 20, UNU.
- Birt DF., Pinch.H.-J, et al, (1993). Cancer Res., 53 (1) : 27 - 31.
- Brane J. and Brane N., (1992). J. Cardio Pharm., 19 sup. (6) : 563- 71.
- Bray GA, York D., et al , (1989). Vitamins and Hormones, 45 : 1 - 125.
- Boucher B.J., Mannan N., et al, (1995). Asian Dieb., 38: 1939-45.
- Bourre J.M., François M., et al., (1989). J. Nutr., 119: 1880 - 92.
- Brown A. and Pike C., (1975). Nutrition An Integrated Appr., McMillan Co., NY.
- Brunner BM, Meyer TW, et al, (1982). N. Eng. J. Med., 307 (11): 652-9.
- Byrne J., Baxter D. et al., (1991). Neural and Molecular Bases of Nonassoc. and Assoc. Sci., 627 : 124 - 49.
- Cai J., Ren G., et al., (1994). Chief Ho TSA, Chih, 14(4) : 203 - 6.
- Carlson SE, Cooke RJ, et al., (1992). Lipids, 27: 901 - 7.
- Carper J., (1987). Total Nutr. Guide, Bantam Books, Toronto.
- Carper, J., (2001). The Miracle Brain, Harper Collins Publ., NY.
- Carroll KK., (1994). In Carroll and Krilchevsky (eds.) Nutr. and Disease Update, Cancer AOCs Press, Ill. USA.

- Carroll KK., (1995). Cancer Res., 31: 3374 - 83.
- Chan H., (1968). Brit. J. of Nutr., 20 : 474.
- Chaney R., and Ross M., (1966). Nutrition, Houghton Mifflin Co., NY.
- Clara B., Young B et al, (1984). The Low Fat Low Cholesterol Diet, In Niwa  
IA, Nur SF, and Barakat MD., 1990, Food and Nutrition,  
Alexandria University.
- Crane PK., (1968). Digestion and Absorption of Carbohydrates, in Carbohydrate  
Metabolism and its Disorders, Acad. Press, NY.
- Craviotti J., Declicardie E., et al., (1996). Pediatrics, 2 Supp. (1) 319 - 372.
- Crawford MA, Doyle W, et al., (1989). J. of Inter. Med., 225 (1) 159-69.
- Crawford MA., Costeloe K., et al., (1997). Am. J. Clin. Nutr., 66: 1032S- 1041  
S.
- Coursin D., (1972). Nutrition and Brain Dev. in Infants, Merrill-Palmer  
Quarterly, 18(2) : 177 - 202.
- Dalal BB, Chatterjee AK, et al, (1987). J. Vit. Nutr. Res., 57: 305 - 10.
- Dawson H., Harris S., et al., (1997), Amer. J. Clin. Nutr., 65: 167 - 71.
- Drake IM, Davies M.J., et al., (1996). Carcinogenesis, 17, 559 - 62.
- Dumin, J., Womersley, J., (1974). Brit. J. Nutr., 32: 77 - 79.
- Ehnholm C., Huttunen JK., et al., (1982). New Engl. J. Med., 307 (14): 850 - 5.
- El Hendy H., Amed S., El Sawy and El Masry E., (1996). Proceed. Conf.  
Toward An Edu. Prod. Port Said.
- El Hendy HA., Youssef, MI., and Abo El Naga, (2001). Toxicology, 167: 163-  
170.
- Elie NY, and Shenour J., (1977). Prospectives, 7 (1) : 3 - 13.
- Erasmus U., (1995). Fats That Heat, Fats That Kill, Alive Books, Burnaby,  
Canada.
- Esminger AH, Esminger ME, et. al., (1995). The Concise Encyclo. of Foods and  
Nutrition, CRC Press London.
- Galli C., and Socini A., (1983). Proc. of Amer. Oil, Chem. Soc. Conf., Chicago,  
16: 278 - 301.
- Gann P., Hennekens CH, et al., (1996). Cancer Epid. Biomaker Prev., 5(2): 121-6.
- Gartner C., Stahl W., et al., (1997). Am. J. Clin. Nutr., 66: 116 - 22.
- Gibson P., (1990). Principles of Nutr. Status, Oxf. Univ. Press, NY.
- Gibson R., Vanderkooy P, et al., (1989). SCN. 49: 1266 - 70.
- Giovannelli G., Lavelli V , et al., (1999). J. Sci. Food Agric, 79: 1583-88.

- Giovannucci E., Ascherio A., et al., (1995). J. Natl. Cancer Inst., 87: 1767- 67.
- Gomez F., Ramos E., et al., (1956). J. Trop. Med., 2: 77.
- Gordon D.J. and Rifkind BM, (1989). New Eng. J. of Med., 321:1311-16.
- Graafins WC., Lips P., et al., (1997). J. Bone Miner Res., 12 (8) : 1241-5.
- Grundy SM, and Denke SM., (1990). J. Lipid. Res., 31: 1148 - 72.
- Gunnell, D.J., Frankel S.J., et al., (1998). Am. J. Clin. Nutr., 67: 1111-8.
- Gyton AC., (1982). Human Physiology and Mechanisms of Diseases, Saunders WB. Co. Philadelphia.
- Gyton AC., (1987). Human Physiology and Mechanisms of Diseases, Saunders WB. Co. Philadelphia.
- Gyton A., and Hall J., (1996). Med. Physiology, Saunders Co. Philadelphia.
- FAO / WHO, (1992). Nutr. and Dev. A Global Assess., FAO, Rome.
- Ferro-Luzzi A., Strazzullo P., et al., (1984), J. Clin. Nutr., 40 (5): 1027- 37.
- Fischer SM., Leyton J., et al., (1992). Cancer Res., 52 (7): 2049 S - 545.
- Fryburg DA., Mark R.J., et al., (1995). Yale J. Biol. Med., 68: 19-23.
- Hansen BC, (1988). Diabet Care, 11 (2) 183 - 8.
- Hansen H., (1994). Nutr. Rev., 50 : 162 - 7.
- Hardin G., (1961). Biology Its Principles and Implications, Freeman Co. London, UK.
- Harper AE., Mille RH, et al., (1984). Ann. Rev. Nutr., 4: 409 - 454.
- Hasselmo M., (1995). Behavioral Brain Res., 67 (1) : 1 - 27.
- Hatcher M., (1983). Whole Brain Learn, The School Adminis., 40(5):8-4.
- Hayes CE, Cantorna MT., et al., (1997). Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 216: 21-7.
- Hegsted DM., (1969). Health In the World, Nutrition Today, 4:1.
- Himsworth Sir. Harold, (1968). What Nutr. Really Means, Nutr. Today, 3: 18-20.
- Hilakivi-Clarke L, Onojafe I, et al., (1996). Life Sci., 85: 1653-60.
- Horrobin DF., (1996). Succiell Biochem., 25: 109 - 115.
- Houch and Barr., (1977). In Nour SF., Barakat. MO. and Nawar IA. (1990). Family Economics, Dept. Home Ec., Alex. Univ., In Arabic.
- Howe GR., Hirohata T., et al., (1990). J. Natl. Cancer Inst., 82 (7) : 561 - 9.
- Huang YS, Wainwright PE, et al., (1993). Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 204 (1) : 54 - 64.
- Hull D. and Segall M., (1965). J. Physiology, 181 : 458 - 467.
- Hull D., (1966). Brit. Med. Bull., 22 : 92 - 6.

- Hunter DJ., Manson JE., et al., (1993). *N. Eng. J. Med.*, 329 : 234 - 40.
- Jelliffe, D., (1966). *The Assessment of the Nutritional Status of the Community*, Mono. Ser. No. 53, WHO, Geneva.
- Johnson WR., (1985). *Concentrating on the Brain.*, *The Sci. Teacher*, 33-37.
- Jonas WB, (1997). *Nature Medicine*, 3: 824 - 7.
- Kalmijn S., Feskens M., et al., (1997). *Amer. J. of Epidem.*, 145 (1): 33-41.
- Katsuki H., (1996). *Subcell Biochem.*, 25 : 298 - 311.
- Key A., (1980). *Nutr. Rev.*, 38: 279 - 307.
- Key A., Menotti A., et al., (1986). *Amer. J. Epid.*, 124(6) : 903 - 15.
- Kinsella JE, Lanoue L., et al., (1995).
- Kissebah A. and Schectman G., (1988). *Diabet Care*, 11 (2) : 129 - 42.
- Knapp HR., (1990). *Hypertension In Present Knowledge in Nutrition* Brown (ed.).
- Koletzko B., Thiel J., et al., (1992). *The J. of Ped.*, 120 (4): S62-S70.
- Krebs N., Hambidge K., et al., (1984). *Am. J. Dis. Child.*, 138 : 270-73.
- Kruglikov R., Orlova N., et al., (1991). *Deiatelnosti Imeni Pavlov*, 4(2): 359-63.
- Kushi LH, Fee RM, et al., (1996). *Am. J. Epid.*, 144(2): 165 - 74.
- Lagseth, L., *Oxidants, Antioxidants & Disease Prevention*, Belgium International Life Science Institute.
- Leaf A. and Weber PC., (1988). *J. of Med.*, 318: 549 - 57.
- Leatham J., (1968). *Protein Nutr. and Free Amino Acids Patterns*, Rutgers Univ. Press., N.J.
- Lederberg J., (1968). *Health in The Word of Tomorrow*, Third PAHO / WHO, Sci. Publ. No. 175.
- Lenton JK., Therriault H., et al., (1999). *Carcinogenesis*, 20: 607 - 13.
- Louheranta AM, Turrepeinen AK., et al., (1999). *Metabolism*, 84: 870-5.
- Li Et and Anderson, *Life Sci.* 34: 2453 - 60
- Margettes BM, Beilin L.J., et al., (1986). *Brit. J. Med.*, 293: 1468 - 71.
- Markides M., Neumann M., et al., (1994). *Am. J. Clin. Nutr.*, 60 : 189 - 194.
- Mariotti F., Mahe S., et al., (2000). *Am. J. Clin. Nutr.*, 72 (4) : 954 - 62.
- Martinez ME., Giovanucci EI., (1996). *J-Natl. Cancer Inst.*, 88 (19) : 1375 - 82.
- McGror M., Powell S., et al., (1991). *Lancel*, 335: 1-5.
- Mensink RP., and Katan MB., (1990). *Eu. J. Med.*, 323: 439 - 45.
- Messer H., Armstrong WD., et al., (1973). *J. Nutr.*, 103: 1319 - 62.
- Monsen ER, Halberg M., et al., (1978). *J. Am. Clin. Nutr.*, 31: 134 - 41.

- Michael H. & F. Gordon, (1995). Specific Deficiencies Versus Growth Failure, SCN, Vol. 12, 10 -14.
- Morgan BL., (1987). Nutrition Prescription, Grown Publ. Inc. NY.
- Morrison G. and Hark L., (1996). Medicinal Nutr. and Disease, Blackwell Su. Inc., NY.
- Morrow JD., Morre KP., et al., (1993). J. Lipid Mediators, 6: 416 - 20.
- Murry BK, Granners DK., et al., (1993). Harper's Biochem., Biochem and Med., Appleton and Lang., California.
- Muszbek L., and Laposata M., (1993). J. Biol. Res., 268 : 18243 - 8.
- NAC, NRC., 1976.
- Nat'n Acad. of Sci., 1100, (1964). Evaluation of Protein Quality, Washington DC.
- Neuringer M., Anderson G.J., et al., (1988). Ann. Rev. of Nutr., 8: 517 - 41.
- NIH Consen. Confer., (1993). J. Am. Med. Assoss., 269 : 505 - 10.
- Nuttal FQ, (1993). Diabetes, 42: 503 - 8.
- Oelzner P. Müller A., et al., (1998). Aheum. Arth. Caleif. Tissue. Int. 62 (3) : 193 - 8.
- Olson RE., (1998). J. Nutr. 128 : 439S - 443 S.
- Oshima S., Ojima F., et al., (1996). J. Agric. Food Chem., 44 : 33 - 61.
- Pappalardo G., Maiani G., et al, (1997). Eur. J. Clin. Nutr., 51(10) 661-6.
- Pellet, S., (1992). Food & Nutr. Bulletin, 17 : 212.
- Peitzsch RM and McLaughlin S, (1993). Biochem. 32: 10436 - 43.
- Peng Y., Tews JK., et al., (1972). Am. J. Physiol., 222: 314 - 21.
- Peters JC., and Harper AE, (1982). Physiol. Behave. 27: 287 - 9.
- Peters JC, Nemetz DJ et al., (1983). Nutr. Rev. Int., 27. 407 - 19.
- Peters JC., and Harper AE, (1985). J. Nutr. 115: 382 - 98.
- Petridou E., Koussum N., et al., (1998). Brit. J. of Nutr., 79 : 407 - 12.
- Pike RL., and Brown M., (1984). Nutr. An Integ. App., John Wiley and Sons, NY.
- Prentice RL., and Sheppard L., (1990). Cancer Causes and Control, 1: 81- 97.
- Pritchard RS, Baron JA., et al., (1996). Stockholm, Sweden Cancer Epidemiol. Biomakers Prev. 5(11) : 897 - 900.
- UK. Prospective Diabetes Study Group, (1998). Lancet, 33 (352) : 837 - 53.
- Raghavan S. and Mohav., (1999) J. Nutr. Dietet., 36: 193 - 7.
- Ramakrishna T., (1999). Physiol. Res., 48(3) : 175 - 85.



- Rao SV., Rao NN., et al., (1964). J. Nutr., 120: 52 - 63.
- Rawls RL., (1978). Eng. News, 56(4) : 27 - 30.
- Raygoda M., Cho E., et al., (1998). J. Nutr. 128: 2505 - 11.
- Renand S., Morazain R., et al., (1986). Athero. 60(1): 37 - 48.
- Riemers RA., Wood DA., et al., (1991). The Lancet, 337 : 1 - 5.
- Ritcher G. and Segal M., (1993). Annal of NY Acad. Sci., 695: 254-7.
- Ritchie J., (1967). Learning Better Nutrition, Geneva, 7 - 15.
- Roebuck BD., (1992). Lipid, 27: 804 - 6.
- Rothman KJ., Moore LL., et al., (1995). N. Eng. J. Med., 333: 1369 - 73.
- Rouch C., Nicolaidis S., et al., (2001). Neurosci, 4(1): 63 - 73.
- Sack FM., Stampfer MJ., et al., (1987). J.Am. College of Nutr., 6:179-85.
- Scheig R., (1974). Disease of Lipid Metabolism, In Duncan's Disease and Rosenberg, Saunder's Co. Philadelphia.
- Schoenthaler SJ., and Bier D., (2000). Med., 6: 7 - 17.
- Schutz Y., Tremblay A., et al., (1992). Am. J. of Clin. Nutr., 55: 670-74.
- Schwarz K., and Malin DB, (1972). Bioinorg. Chem., 1: 355 - 62.
- Schwauzer GN., (1978). Trace Elements Nutr. and Cancer. Prespec. of Preven. Inorganic and Nutr. Aspects of Cancer, Plenum Press, NY.
- Scrimshaw N., (1968). Child Dev. and Family Life, 15(4): 375 - 88.
- Seidell JC., and Flegal KM., (1992). Brit. Med. Bull., 53: 238 - 52.
- Simopoulos, AP. and Robinson J., (1999). The Omega Diet., Harper Pers. Publ. NY.
- Sinclair HM., (1948). The Assess. of Human Nutriture. In Nawar IA., Food and Nutrition, (1975), Dar El Matbouat El Gedida, Alexandria, in Arabic.
- Spallholz, JE., (1989). Nutr. Chem. and Biol., Prentice Hall., NJ.
- Stahl W., and Sies H., (1996)., Arch. Biochem. Biophys., 33, 6: 1 - 9.
- Stecker T., and Sahgal A., (1995)., Behavioral Brain Res., 67(2): 165-99.
- Story M., (1985). J. Am. Diet. Assoss., 86 : 517 - 520.
- Stroev EA., (1989). Biochemistry, MIR., Publ. Moscow.
- Tamatani M. Morimoto S., et al., (1998). Metabolism, 47(2): 195 - 9.
- Taylor JA., Hirvonen A., et al., (1996). Cancer Res., 56(18) : 4108-10.
- Torrance E., Taggart W., et al., (1948). Human Inform. Proc. Survey, Bensville, In Scholastic Testing Serv. : 27 - 29.
- Trevathen N., (1990). The Brain, Bentam Book, NY.

- The World Bank, (1985). World Development, 11.
- Yokogshi H., Iwata T., et al., (1986). J. Nutr., 117 : 24 - 47.
- Young LC., Brown CC., et al., (1990). Hum. Exp. Toxicol., 9: 165 - 70.
- Waterlaw, J., (1972). Classification and Definition of PEM, Brit. Med. J., iii, 566.
- Waterlaw, J., (1988). Linear Growth Retardation in Less Developed Countries, Nutr. Workshop 14 NY, Rover Press, 7-10 Nestle.
- Watson KE., Abrolat ML., et al., (1997). Circulation, 96(6): 1755 - 60.
- Willet WC., Stampfer MJ., et al., (1990). New Engl. J. of Med., 323 (24)-72.
- WHO, (1976). Methodology of Nutr. Surv. Report, Joint FAO/UN/CEF, WHO Exp. Comm. Tech. Rep. Ser. 593.
- WHO, (1985). Energy and Protein Req. Rep. of A Joint FAO/WHO/UNU Cons. Tech. Rep. Ser. 724.
- WHO, (1989). Expert Committee on Diabetes Milletus, 2<sup>nd</sup> Report, Geneva.
- Wood DA., Butter S., et al., (1987). Lancet, 1: 117 - 83.
- Wurtman RJ., (1987). Ann. NY. Acad. Sci., 49(3):179 - 90.
- Zaha PF., Alfrey AC., (1997). Aluminium Toxicity in Infants Health and Disease, World Sci., NJ.
- Zhang S., Tang G., et al., (1997). Am. J. Clin. Nutr., 66 (3) : 626 - 32.

الملاحق



ملحق (١) : العناصر الغذائية اليومية الموصى بها للحفاظ على صحة جيدة لجميع الأصحاء المأثلة عام ١٩٨٩<sup>(١)</sup>

مقايير النسبية										مقايير النسبية									
مقايير النسبية										مقايير النسبية									
النوع	الجنس	العمر	الوزن	الارتفاع	الكتلة	الكتلة	الكتلة	الكتلة	الكتلة	النوع	الجنس	العمر	الوزن	الارتفاع	الكتلة	الكتلة	الكتلة	الكتلة	الكتلة
الذكور	الذكور	الذكور	الذكور	الذكور	الذكور	الذكور	الذكور	الذكور	الذكور	الذكور	الذكور	الذكور	الذكور	الذكور	الذكور	الذكور	الذكور	الذكور	الذكور
10	40	5	6	40	300	400	0.3	23	0.3	5	6	0.4	0.3	30	35	30	35	30	35
15	50	5	6	40	300	400	0.5	35	0.5	6	6	0.5	0.4	35	40	35	40	35	40
20	70	10	10	80	800	800	0.7	50	1.0	9	9	0.8	0.7	40	15	15	15	15	15
20	90	10	10	120	800	800	1.0	75	1.1	12	12	1.1	0.9	45	20	7	10	500	24
30	120	10	10	170	800	800	1.4	100	1.4	13	13	1.2	1.0	45	30	7	10	700	28
40	150	15	12	270	1200	1200	2.0	150	1.7	17	17	1.5	1.3	50	45	10	10	1000	45
50	150	15	12	400	1200	1200	2.0	200	2.0	20	20	1.8	1.5	60	65	10	10	1000	59
70	150	15	10	350	1200	1200	2.0	200	2.0	19	19	1.7	1.5	70	10	10	10	1000	58
70	150	15	10	350	800	800	2.0	200	2.0	19	19	1.7	1.5	60	80	10	5	1000	63
70	150	15	10	350	800	800	2.0	200	2.0	15	15	1.4	1.2	60	80	10	5	1000	63
45	150	12	15	280	1200	1200	2.0	150	1.4	15	15	1.3	1.1	50	45	3	10	800	46
50	150	12	15	300	1200	1200	2.0	180	1.5	15	15	1.3	1.1	60	55	8	10	800	44
55	150	12	15	280	1200	1200	2.0	180	1.6	15	15	1.3	1.1	60	60	8	10	800	46
55	150	12	15	280	800	800	2.0	180	1.6	15	15	1.3	1.1	60	65	8	5	800	50
55	150	12	10	210	800	800	2.0	180	1.6	13	13	1.2	1.0	60	65	8	5	800	50
60	175	15	30	300	1200	1200	2.2	400	2.2	17	17	1.6	1.5	70	65	10	10	800	60
75	200	19	355	355	1200	1200	2.6	280	2.1	20	20	1.8	1.6	95	65	12	10	1300	63
75	200	16	310	310	1200	1200	2.6	260	2.1	20	20	1.7	1.6	90	65	11	10	1200	62

Recommended Dietary Allowances 10th Edition (1980), Food and Nutrition Board, National Academy of Sciences-National Research Council, Washington, DC

تابع مكاليف (R) الكميات الموصى بها من الفيتامينات (RDA ، ١٩٨٠)

محتوى فيتامين mg	الفيتامينات الكبرى في غذاء										فيتامينات قليلة في الدم				عنصر (سنة)	هذه
	C Mg	B <sub>12</sub> mcg	تولامين mcg	B <sub>6</sub> mg	D <sub>3</sub> mg	B <sub>2</sub> mg	B <sub>1</sub> mg	K mcg	E mg	D mcg	A mg RE	نقص	انقار	تكرار	فوت	ملاحظات جوانب
١	٢٠	٠.٢	٢٠	٠.٢	٠	٠.١	٠.٢	٠	٢٠	٢٠	٢٠	٠.٥-١.٥	١.٥-٢.٥	٢-٣	١١-١٥	١٠-٢٥
٢	٢٥	٠.٤	٢٥	٠.٤	١	٠.٢	٠.٤	١٠	٢٠	٢٠	٢٥					
٣	٣٠	٠.٦	٣٠	٠.٦	٢	٠.٣	٠.٦	٢٠	٣٠	٣٠	٣٠	١-٢	٢-٣	٣-٤	٤-٥	٥-١٠
٤	٤٠	١.٠	٤٠	١.٠	٣	٠.٤	١.٠	٣٠	٤٠	٤٠	٤٠					
٥	٥٠	١.٤	٥٠	١.٤	٤	٠.٥	١.٤	٤٠	٥٠	٥٠	٥٠	١-٢	٢-٣	٣-٤	٤-٥	٥-١٠
٦	٦٠	١.٨	٦٠	١.٨	٥	٠.٦	١.٨	٥٠	٦٠	٦٠	٦٠					
٧	٧٠	٢.٢	٧٠	٢.٢	٦	٠.٧	٢.٢	٦٠	٧٠	٧٠	٧٠	١-٢	٢-٣	٣-٤	٤-٥	٥-١٠
٨	٨٠	٢.٦	٨٠	٢.٦	٧	٠.٨	٢.٦	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠					
٩	٩٠	٣.٠	٩٠	٣.٠	٨	٠.٩	٣.٠	٩٠	٩٠	٩٠	٩٠	١-٢	٢-٣	٣-٤	٤-٥	٥-١٠
١٠	١٠٠	٣.٤	١٠٠	٣.٤	٩	١.٠	٣.٤	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠					
١١	١١٠	٣.٨	١١٠	٣.٨	١٠	١.١	٣.٨	١١٠	١١٠	١١٠	١١٠	١-٢	٢-٣	٣-٤	٤-٥	٥-١٠
١٢	١٢٠	٤.٢	١٢٠	٤.٢	١١	١.٢	٤.٢	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠					
١٣	١٣٠	٤.٦	١٣٠	٤.٦	١٢	١.٣	٤.٦	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١-٢	٢-٣	٣-٤	٤-٥	٥-١٠
١٤	١٤٠	٥.٠	١٤٠	٥.٠	١٣	١.٤	٥.٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠					
١٥	١٥٠	٥.٤	١٥٠	٥.٤	١٤	١.٥	٥.٤	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١-٢	٢-٣	٣-٤	٤-٥	٥-١٠
١٦	١٦٠	٥.٨	١٦٠	٥.٨	١٥	١.٦	٥.٨	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠					
١٧	١٧٠	٦.٢	١٧٠	٦.٢	١٦	١.٧	٦.٢	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١-٢	٢-٣	٣-٤	٤-٥	٥-١٠
١٨	١٨٠	٦.٦	١٨٠	٦.٦	١٧	١.٨	٦.٦	١٨٠	١٨٠	١٨٠	١٨٠					
١٩	١٩٠	٧.٠	١٩٠	٧.٠	١٨	١.٩	٧.٠	١٩٠	١٩٠	١٩٠	١٩٠	١-٢	٢-٣	٣-٤	٤-٥	٥-١٠
٢٠	٢٠٠	٧.٤	٢٠٠	٧.٤	١٩	٢.٠	٧.٤	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠					
٢١	٢١٠	٧.٨	٢١٠	٧.٨	٢٠	٢.١	٧.٨	٢١٠	٢١٠	٢١٠	٢١٠	١-٢	٢-٣	٣-٤	٤-٥	٥-١٠
٢٢	٢٢٠	٨.٢	٢٢٠	٨.٢	٢١	٢.٢	٨.٢	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠					
٢٣	٢٣٠	٨.٦	٢٣٠	٨.٦	٢٢	٢.٣	٨.٦	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	١-٢	٢-٣	٣-٤	٤-٥	٥-١٠
٢٤	٢٤٠	٩.٠	٢٤٠	٩.٠	٢٣	٢.٤	٩.٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠					
٢٥	٢٥٠	٩.٤	٢٥٠	٩.٤	٢٤	٢.٥	٩.٤	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	١-٢	٢-٣	٣-٤	٤-٥	٥-١٠
٢٦	٢٦٠	٩.٨	٢٦٠	٩.٨	٢٥	٢.٦	٩.٨	٢٦٠	٢٦٠	٢٦٠	٢٦٠					
٢٧	٢٧٠	١٠.٢	٢٧٠	١٠.٢	٢٦	٢.٧	١٠.٢	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	١-٢	٢-٣	٣-٤	٤-٥	٥-١٠
٢٨	٢٨٠	١٠.٦	٢٨٠	١٠.٦	٢٧	٢.٨	١٠.٦	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠					
٢٩	٢٩٠	١١.٠	٢٩٠	١١.٠	٢٨	٢.٩	١١.٠	٢٩٠	٢٩٠	٢٩٠	٢٩٠	١-٢	٢-٣	٣-٤	٤-٥	٥-١٠
٣٠	٣٠٠	١١.٤	٣٠٠	١١.٤	٢٩	٣.٠	١١.٤	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠					

ملحق (٢) :

PERCENTAGE OF BODY FAT BASED ON FOUR SKINFOLD MEASUREMENTS \*

Skinfolds (mm)	Males (age in years)				Females (age in years)			
	17-29	30-39	40-49	50+	16-29	30-39	40-49	50+
13	4.8	—	—	—	10.5	—	—	—
20	8.1	12.2	12.2	12.6	14.1	17.0	19.8	21.4
25	10.5	14.2	15.0	15.6	16.8	19.4	22.4	24.0
30	12.9	16.2	17.7	18.6	19.5	21.8	24.5	—
35	14.7	17.7	19.6	20.8	21.5	23.7	26.4	—
40	16.4	19.2	21.4	22.9	23.4	25.5	28.2	30.3
45	17.7	20.4	23.0	24.7	25.0	26.9	29.6	31.9
50	19.0	21.5	24.6	26.5	26.5	28.2	31.0	33.4
55	20.1	22.5	25.9	27.9	27.8	29.4	32.1	34.6
60	21.2	23.5	27.1	29.2	29.1	30.6	33.2	35.7
65	22.2	24.3	28.2	30.4	30.2	31.6	34.1	36.7
70	23.1	25.1	29.3	31.6	31.2	32.5	35.0	37.7
75	24.0	25.9	30.3	32.7	32.2	33.4	35.9	38.7
80	24.8	26.6	31.2	33.8	33.1	34.3	36.7	39.6
85	25.5	27.2	32.1	34.8	34.0	35.1	37.5	40.4
90	26.2	27.8	33.0	35.8	34.8	35.8	38.3	41.2
95	26.9	28.4	33.7	36.6	35.6	36.5	39.0	41.9
100	27.6	29.0	34.4	37.4	36.4	37.2	39.7	42.6
105	28.2	29.6	35.1	38.2	37.1	37.9	40.4	43.3
110	28.8	30.1	35.8	39.0	37.8	38.6	41.0	43.9
115	29.4	30.6	36.4	39.7	38.4	39.1	41.5	44.5
120	30.0	31.1	37.0	40.4	39.0	39.6	42.0	45.1
125	30.5	31.5	37.6	41.1	39.6	40.1	42.5	45.7
130	31.0	31.9	38.2	41.8	40.2	40.6	43.0	46.2
135	31.5	32.3	38.7	42.4	40.8	41.1	43.5	46.7
140	32.0	32.7	39.2	43.0	41.3	41.6	44.0	47.2
145	32.5	33.1	39.7	43.6	41.8	42.1	44.5	47.7
150	32.9	33.5	40.2	44.1	42.3	42.6	45.0	48.2
155	33.3	33.9	40.7	44.6	42.8	43.1	45.5	48.7
160	33.7	34.3	41.2	45.1	43.3	43.6	45.8	49.2
165	34.1	34.6	41.6	45.6	43.7	44.0	46.2	49.6
170	34.5	34.8	42.0	46.1	44.1	44.4	46.6	50.0
175	34.9	—	—	—	—	44.8	47.0	50.4
180	35.3	—	—	—	—	45.2	47.4	50.8
185	35.6	—	—	—	—	45.6	47.8	51.2
190	35.9	—	—	—	—	45.9	48.2	51.6
195	—	—	—	—	—	46.2	48.5	52.0
200	—	—	—	—	—	46.5	48.8	52.4
205	—	—	—	—	—	—	49.1	52.7
210	—	—	—	—	—	—	49.4	53.0

\*Measurements made on the right side of the body, using biceps, triceps, subscapular and suprailiac skinfolds.

From Durnin, J. V. G. A., and Wormersley, J.: Body fat assessed from total body density and its estimation from skinfold thickness measurements on 481 men and women aged from 16-72 years. Br. J. Nutr., 32 77, 1974.

ملحق (٣) متوسط الطول والوزن للأطفال حتى ٦ سنوات<sup>(١)</sup>

الاناث		الذكور		السن
متوسط الوزن كجم	متوسط الطول سم	متوسط الوزن كجم	متوسط الطول سم	
٣	٥١ر٤	٣ر٢	٥١ر٢	صفر - ١ شهر
٤ر٢	٥٥ر٨	٤ر٤	٥٦ر٩	١ - ٢ ..
٤ر٨	٥٧ر٧	٥ر٢	٥٩ر٦	٢ - ٣ ..
٥ر٢	٥٩ر٩	٦ر١	٦١ر٩	٣ - ٤ ..
٦ر١	٦٢ر٨	٦ر٤	٦٤ر٢	٤ - ٥ ..
٦ر٨	٦٥ر٣	٦ر٩	٦٥ر٩	٥ - ٦ ..
٧ر٢	٦٧ر٠	٧ر٥	٦٧ر٥	٦ - ٧ ..
٨ر١	٦٨ر٢	٧ر٨	٦٨ر٧	٧ - ٨ ..
٨ر٥	٦٩ر٦	٨ر٥	٧٠ر٦	٨ - ٩ ..
٨ر٨	٧٠ر٩	٨ر٦	٧١ر١	٩ - ١٠ ..
٩ر٤	٧٢ر٥	٩ر٤	٧٤ر٠	١٠ - ١١ ..
٩ر٣	٧٢ر٢	٩ر٦	٧٤ر٩	١١ - ١٢ ..
١٠ر٨	٨٢ر٢	١١ر٧	٨٣ر٢	١٢ - ١٣ ..
١٢ر١	٨٧ر٢	١٢ر٨	٨٨	١٣ - ١٤ ..
١٤ر٣	٩٦ر٢	١٥ر٠	٩٧	١٤ - ١٥ ..
١٦ر٥	١٠٣ر٨	١٧ر٠	١٠٠	١٥ - ١٦ ..
١٨ر٣	١١٠ر٧	١٨ر٨	١١٠ر٧	١٦ - ١٧ ..
٢٠ر١	١١٧ر٢	٢٠ر٦	١١٦ر٨	١٧ - ١٨ ..

<sup>(١)</sup> إليزيس نوار وتسي رشاد (١٩٩٧).



تابع ملحق رقم (٣) الأوزان المثالية للرجال بالنسبة لأطوالهم

الوزن بالكيلوجرام	الطول بالسنتيمتر	الوزن بالكيلو جرام	الطول بالسنتيمتر
٦٧,٨ - ٦٤,٦	١٦٧	٥٤,٩ - ٥٤,٩	١٤٥
٦٨,٤ - ٦٥,٢	١٦٨	٥٥,٠ - ٥٣,٤	١٤٦
٦٩,١ - ٦٥,٩	١٦٩	٥٥,٥ - ٥٣,٩	١٤٧
٦٩,٩ - ٦٦,٦	١٧٠	٥٦,١ - ٥٣,٥	١٤٨
٧٠,٦ - ٦٧,٣	١٧١	٥٦,٧ - ٥٤,٠	١٤٩
٧١,٣ - ٦٨,٠	١٧٢	٥٧,٢ - ٥٤,٥	١٥٠
٧٢,١ - ٦٨,٧	١٧٣	٥٧,٧ - ٥٥,٠	١٥١
٧٢,٨ - ٦٩,٤	١٧٤	٥٨,٣ - ٥٥,٦	١٥٢
٧٣,٦ - ٧٠,١	١٧٥	٥٨,٩ - ٥٦,١	١٥٣
٧٤,٣ - ٧٠,٨	١٧٦	٥٩,٤ - ٥٦,٦	١٥٤
٧٥,٠ - ٧١,٦	١٧٧	٥٩,٩ - ٥٧,٢	١٥٥
٧٥,٧ - ٧٢,٤	١٧٨	٦٠,٥ - ٥٧,٩	١٥٦
٧٦,٤ - ٧٣,٢	١٧٩	٦١,١ - ٥٨,٦	١٥٧
٧٧,١ - ٧٤,٢	١٨٠	٦١,٦ - ٥٩,٣	١٥٨
٧٧,٨ - ٧٥,٠	١٨١	٦٢,٢ - ٥٩,٩	١٥٩
٧٨,٥ - ٧٥,٨	١٨٢	٦٢,٨ - ٦٠,٥	١٦٠
٨٠,٢ - ٧٦,٥	١٨٣	٦٣,٥ - ٦١,١	١٦١
٨١,٩ - ٧٧,٢	١٨٤	٦٤,١ - ٦١,٧	١٦٢
٨٢,٦ - ٧٨,١	١٨٥	٦٤,٧ - ٦٢,٣	١٦٣
٨٣,٣ - ٧٨,٩	١٨٦	٦٥,٤ - ٦٣,٩	١٦٤
		٦٦,٠ - ٦٣,٥	١٦٥
		٦٦,٦ - ٦٤,٠	١٦٦

تابع ملحق (٣) الأوزان المثالية للإناث بالنسبة لأطواهن

الطول بالسنتيمتر	الوزن بالكيلوجرام	الطول بالسنتيمتر	الوزن بالكيلوجرام
١٤٠	٤٧٩ - ٤٧١	١٥٥	٥٣١ - ٥٣٧
١٤١	٤٨٥ - ٤٧٦	١٥٦	٥٣٧ - ٥٦٣
١٤٢	٤٨٩ - ٤٨١	١٥٧	٥٤٣ - ٥٧٠
١٤٣	٤٩٧ - ٤٨٧	١٥٨	٥٤٩ - ٥٧٦
١٤٤	٤٩٣ - ٤٧٠	١٥٩	٥٥٥ - ٥٨٢
١٤٥	٤٩٨ - ٤٧٥	١٦٠	٥٦٢ - ٥٩٠
١٤٦	٤٨٠ - ٥٠٣	١٦١	٥٦٩ - ٥٩٧
١٤٧	٤٨٦ - ٥١٠	١٦٢	٥٧٦ - ٦٠٤
١٤٨	٤٩٠ - ٥١٦	١٦٣	٥٨٣ - ٦١٣
١٤٩	٤٩٨ - ٥٢٣	١٦٤	٥٨٩ - ٦١٨
١٥٠	٥٠٤ - ٥٢٩	١٦٥	٥٩٤ - ٦٢٤
١٥١	٥١٠ - ٥٣٥	١٦٦	٦٠١ - ٦٣١
١٥٢	٥١٥ - ٥٤٠	١٦٧	٦٠٧ - ٦٣٧
١٥٣	٥٢٠ - ٥٤٥	١٦٨	٦١٤ - ٦٤٤
١٥٤	٥٢٥ - ٥٥٠	١٦٩	٦٢١ - ٦٥١

تابع ملحق (٣) الأوضاع الميشنية للأوزان للذكور حسب العمر<sup>(١)</sup>

Age (yrs)	Percentiles for Weight (kg)					
	5	10	25	50	75	90
Male children						
0.0-0.5	4.4	4.8	6.2	7.2	8.2	9.7
0.5-1.0	7.6	7.8	8.7	9.9	10.6	11.8
1.0-1.5	8.5	9.5	9.6	10.3	11.3	12.6
1.5-2.0	10.6	11.0	11.6	12.2	13.2	13.9
2.0-2.5	11.0	11.3	11.9	12.7	13.2	14.0
3	12.8	13.2	13.8	14.5	15.8	17.0
4	13.5	14.4	15.2	16.8	18.2	19.7
5	14.9	15.2	17.2	18.5	21.1	22.9
6	17.1	17.5	18.7	20.2	22.5	24.5
7	18.5	18.8	20.7	21.9	24.4	26.0
8	20.4	21.4	23.3	24.9	27.5	32.5
9	19.1	19.8	23.8	28.3	35.5	39.8
10	25.6	26.4	27.3	30.4	33.3	39.5
11	27.2	27.6	30.4	33.0	38.0	45.1
12	29.7	31.2	33.0	37.6	44.2	51.1
13	32.1	33.0	36.9	43.8	49.5	53.8
14	34.7	37.4	42.4	46.2	54.8	58.7
15	41.2	42.9	48.9	54.7	58.8	63.4
16	43.9	48.4	51.6	59.2	69.0	81.2
17	46.5	49.6	56.2	60.6	74.8	80.9
18	48.3	48.3	58.0	62.4	69.0	77.6
19	53.5	56.0	59.6	69.3	75.6	78.8
Male adults						
20-29	56.2	57.7	62.0	71.5	78.7	91.9
30-39	54.0	59.8	65.4	74.6	81.6	88.8
40-49	57.3	60.4	67.3	74.4	83.3	90.3
50-59	55.3	59.0	65.1	74.2	82.2	88.0
60-69	49.7	57.9	63.6	72.5	82.1	88.1
70+	52.4	56.6	60.6	68.7	77.6	84.7

تابع ملحق (٣) الأوضاع المثبينة للأوزان للإناث حسب العمر<sup>(١)</sup>

Age (yrs)	Percentiles for Stature (cm)					
	5	10	25	50	75	90
Female children						
0.0-0.5	52.5	56.0	60.1	62.0	63.5	65.5
0.5-1.0	65.4	67.0	69.5	73.0	75.0	78.3
1.0-1.5	71.5	74.1	76.6	78.6	79.9	82.8
1.5-2.0	70.7	75.7	81.3	83.4	86.5	87.1
2.0-2.5	81.4	81.8	83.5	87.7	88.4	91.2
3	84.7	86.0	90.1	94.0	96.5	99.7
4	94.5	95.6	99.7	102.3	104.5	106.8
5	101.4	102.5	103.0	105.5	111.2	114.1
6	104.5	107.7	111.4	114.4	116.3	118.7
7	104.6	108.0	113.3	116.0	121.3	125.3
8	114.2	117.3	120.7	125.6	128.8	134.4
9	120.0	122.9	127.5	130.3	132.6	136.0
10	129.3	130.6	133.9	137.6	141.7	142.7
11	130.0	132.4	139.2	142.9	148.2	151.2
12	135.5	137.3	141.3	145.5	153.9	158.6
13	145.1	146.4	151.1	154.4	160.4	163.7
14	147.4	148.2	152.3	157.1	160.5	165.3
15	150.9	154.2	154.9	158.8	161.0	165.7
16	149.7	152.5	155.9	160.5	164.4	169.2
17	153.2	153.3	156.0	159.9	162.9	164.9
18	146.0	153.2	157.1	159.8	165.6	167.4
19	149.0	155.0	156.3	160.7	163.0	163.9
Female adults						
20-29	150.9	153.0	157.1	160.3	165.4	169.2
30-39	149.2	150.9	155.5	160.4	164.5	167.7
40-49	149.6	151.9	154.8	159.1	163.8	168.7
50-59	148.6	150.0	155.3	159.1	163.9	167.8
60-69	147.3	149.4	152.9	156.0	160.9	165.4
70+	144.0	146.3	149.9	155.2	158.7	162.5

<sup>(١)</sup> Gebson, 1990.

تابع ملحق (٣) الأوزان المثالية بالنسبة للأطوال للأفراد من الجنسين

Height (cm)	'Ideal' Weights (kg) for Females			'Ideal' Weights (kg) for Males		
	Small Frame	Medium Frame	Large Frame	Small Frame	Medium Frame	Large Frame
148	46.4-50.6	49.6-55.1	53.7-59.8			
149	46.6-51.0	50.0-55.5	54.1-60.3			
150	46.7-51.3	50.3-55.9	54.4-60.9			
151	46.9-51.7	50.7-56.4	54.8-61.4			
152	47.1-52.1	51.1-57.0	55.2-61.9			
153	47.4-52.5	51.5-57.5	55.6-62.4			
154	47.8-53.0	51.9-58.0	56.2-63.1			
155	48.1-53.6	52.2-58.6	56.8-63.8			
156	48.5-54.1	52.7-59.1	57.3-64.1			
157	48.8-54.6	53.2-59.6	57.8-64.6			
158	49.3-55.2	53.8-60.2	58.4-65.3	58.3-61.0	59.6-64.2	62.8-68.3
159	49.8-55.7	54.3-60.7	58.9-66.0	58.6-61.3	59.9-64.5	63.1-68.8
160	50.3-56.2	54.9-61.2	59.4-66.7	59.0-61.7	60.3-64.9	63.5-69.4
161	50.8-56.7	55.4-61.7	59.9-67.4	59.3-62.0	60.6-65.2	63.8-69.9
162	51.4-57.3	55.9-62.3	60.5-68.1	59.7-62.4	61.0-65.6	64.2-70.5
163	51.9-57.8	56.4-62.8	61.0-68.8	60.0-62.7	61.3-66.0	64.5-71.1
164	52.5-58.4	57.0-63.4	61.5-69.5	60.4-63.1	61.7-66.5	64.9-71.8
165	53.0-58.9	57.5-63.9	62.0-70.2	60.8-63.5	62.1-67.0	65.3-72.5
166	53.6-59.5	58.1-64.5	62.6-70.9	61.1-63.8	62.4-67.6	65.6-73.2
167	54.1-60.0	58.7-65.0	63.2-71.7	61.5-64.2	62.8-68.2	66.0-74.0
168	54.6-60.5	59.2-65.5	63.7-72.4	61.8-64.6	63.2-68.7	66.4-74.7
169	55.2-61.1	59.7-66.1	64.3-73.1	62.2-65.2	63.8-69.3	67.0-75.4
170	55.7-61.6	60.2-66.6	64.8-73.8	62.5-65.7	64.3-69.8	67.5-76.1
171	56.2-62.1	60.7-67.1	65.3-74.5	62.9-66.2	64.8-70.3	68.0-76.8
172	56.8-62.6	61.3-67.6	65.8-75.2	63.2-66.7	65.4-70.8	68.5-77.5
173	57.3-63.2	61.8-68.2	66.4-75.9	63.6-67.3	65.9-71.4	69.1-78.2
174	57.8-63.7	62.3-68.7	66.9-76.4	63.9-67.8	66.4-71.9	69.6-78.9
175	58.3-64.2	62.8-69.2	67.4-76.9	64.3-68.3	66.9-72.4	70.1-79.6
176	58.9-64.8	63.4-69.8	68.0-77.5	64.7-68.9	67.5-73.0	70.7-80.3
177	59.5-65.4	64.0-70.4	68.5-78.1	65.0-69.5	68.1-73.5	71.3-81.0
178	60.0-65.9	64.5-70.9	69.0-78.6	65.4-70.0	68.6-74.0	71.8-81.8
179	60.5-66.4	65.1-71.4	69.6-79.1	65.7-70.5	69.2-74.6	72.3-82.5
180	61.0-66.9	65.6-71.9	70.1-79.6	66.1-71.0	69.7-75.1	72.8-83.3
181	61.6-67.5	66.1-72.5	70.7-80.2	66.6-71.6	70.2-75.8	73.4-84.0
182	62.1-68.0	66.6-73.0	71.2-80.7	67.1-72.1	70.7-76.5	73.9-84.7
183				67.7-72.7	71.3-77.2	74.5-85.4
184				68.2-73.4	71.8-77.9	75.2-86.1
185				68.7-74.1	72.4-78.6	75.9-86.8
186				69.2-74.8	73.0-79.3	76.6-87.6
187				69.8-75.5	73.7-80.0	77.3-88.5
188				70.3-76.2	74.4-80.7	78.0-89.4
189				70.9-76.9	74.9-81.5	78.7-90.3
190				71.4-77.6	75.4-82.2	79.4-91.2
191				72.1-78.4	76.1-83.0	80.3-92.1
192				72.8-79.1	76.8-83.9	81.2-93.0
193				73.5-79.8	77.6-84.8	82.1-93.9

ملحق (٤) : محتوى الأغذية من العناصر الغذائية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
١- الحبوب ومنتجاتها

Composition of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
1. Cereals and cereal products.

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Water g	Protein g	Fat g	Ash g	Fiber g	Carbohydrate g	Energy K.Cal	Vit. A I.U	Vit. B1 mg	Vit. B2 mg	Ascorbic Acid mg
1	Barley	<i>Hordeum Vulgare</i>	10101	9.9	8.8	1.6	2.2	7.0	77.5	360	0	0.25	0.08	0
2	Rice	<i>Oryza Sativa</i>	10102	0	7.4	0.6	0.7	0.5	80.1	355	0	0.06	0.04	0
3	Sorghum	<i>Sorghum Vulgare</i>	10103	10.5	8.8	3.6	1.8	2.2	75.3	369	0	0.18	0.05	0
4	Wheat	<i>Triticum Vulgare</i>	10104	12.4	11.8	1.8	1.9	2.4	72.1	352	284	0.61	0.12	0
5	Wheat Parboiled		10105	0	11.8	2.3	1.5	1.0	71.9	358	-	0.16	0.04	0
6	Kabbed Wheat		10106	0	10.8	1.7	1.4	2.1	74.5	360	-	0.37	0.12	0
7	Wheat Flour 72%		10107	0	11.4	10.2	1.3	0.5	76.6	359	0	0.07	0.05	0
8	Mاعزني		10108	0	9.8	11.7	1.1	1.3	76.1	361	0	0.06	0.06	0
9	Bulandy Baxoul		10109	0	35.8	8.5	2.1	1.4	52.2	262	-	0.27	0.75	0
10	French Bread		10110	0	31.4	8.7	1.2	1.6	57.1	274	-	0.10	0.08	-
11	White Bread		10111	0	31.4	8.2	1.3	1.8	57.3	274	-	0.10	0.05	-
12	Cookies		10112	0	24.0	9.6	10.5	0.7	55.2	354	-	0.10	0.11	-
13	Cakes		10113	0	23.9	8.4	8.8	0.9	58.0	344	-	0.09	0.12	-

Composit'ion of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
2. Legumes

تابع ملحق (٤): محتوى الأغذية من العناصر الغذائية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
٢- بقول

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Water %	Moisture %	Protein %	Fat %	Ash %	Fiber %	Carbonhydrate %	Energy K.Cal	Vit. A I.U.	Vit. B1 mg	Vit. B2 mg	Aromatic Acid mg
1	Broad Beans, Dry	Vicia Faba	10201	0	10.3	24.1	1.5	3.2	6.9	60.9	344	30	0.48	0.28	5
2	Broad Beans, Fresh	Vicia Faba	10202	70	77.3	5.7	0.4	1.0	2.4	15.6	87	115	0.22	0.15	27
3	Broad Beans, Dry, Crushed	Vicia Faba	10203	0	10.4	25.9	2.0	2.7	2.8	59.0	347	42	0.41	0.13	2
4	Germinated Broad Beans	Vicia Faba arithum	10204	10	61.0	10.4	0.7	1.2	2.9	26.7	151	12	0.20	0.12	2
5	Beans, French Common	Phaseolus Vulgaris	10205	0	10.8	22.1	1.4	3.5	4.2	62.2	342	0	0.58	0.16	2
6	Chick pea	Cicer arithum	10206	0	11.0	22.6	4.2	2.7	2.9	59.5	356	42	0.26	0.11	2
7	Chickpea	Cicer arithum	10207	10	8.6	17.3	4.2	3.3	5.3	66.6	366	35	0.41	0.39	2
8	Chickpea	Cicer arithum	10208	0	10.5	19.6	5.4	3.1	3.4	61.4	363	66	0.31	0.24	2
9	Cowpea	Vigna Sinensis	10209	0	11.3	23.0	1.2	3.1	4.7	61.4	340	10	0.48	0.21	2
10	Fenugreek seeds	Trigonella Foenumgraceum	10210	0	9.4	25.6	5.7	3.5	6.5	55.7	364	437	0.27	0.52	0
11	Lentils	Lens esculenta	10211	0	10.0	22.4	1.1	2.7	3.8	63.8	347	55	0.40	0.22	0
12	Lentils, potted	Lens esculenta	10212	0	11.5	22.9	0.7	2.3	2.1	62.6	340	86	0.41	0.18	0
13	Pean garden	Pisum sativum	10213	0	10.0	22.1	1.9	3.4	6.8	62.6	347	115	0.94	0.55	7





Composition of Foods, 100 Grams, Edible Portion,  
4. Vegetables

تابع ملحق (4): محتوى الأغذية من العناصر الغذائية / ١٠٠ غرام غذاء صالح للأكل

٤ - الخضراوات

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Moisture %	Water %	Protein %	Fat %	Ash %	Fiber %	Carbon-hydrate %	Energy K.Cal	Vit. A I.U	Vit. B1 mg	Vit. B2 mg	Ascorbic Acid mg
1	Artichokes	Cynara Scolymus	10401	52	85.8	3.5	0.2	1.1	2.0	9.4	53	150	0.07	0.06	11
2	Beet Root	Beta Vulgaris	10402	12	86.8	1.5	0.1	1.0	1.1	10.6	49	15	0.02	0.05	8
3	Cabbage, Common	Varicapitata	10403	25	91.6	1.3	0.2	0.7	1.2	6.2	32	32	0.07	0.06	48
4	Cariflower	Brassica oleracea var. botrytis	10404	28	91.5	2.3	0.3	0.8	1.0	5.1	32	12	0.05	0.06	67
5	Carrots	Corneus Carota	10405	5	89.4	1.2	0.2	0.8	1.0	8.4	40	1025	0.06	0.04	8
6	Celery	Apinum graveolens var. dulce	10406	33	85.2	0.9	0.2	1.3	0.7	12.4	55	185	0.04	0.05	7
7	Chard swiss	Beta vulgaris var. cicla	10407	17	91.2	2.3	0.4	1.2	0.9	4.9	32	6200	0.05	0.14	18
8	Coriander	Coriandrum Sativum	10408	12	88.5	3.7	0.6	2.0	1.7	5.2	41	1550	0.13	0.31	92
9	Cucumber	Cucumis Sativus	10409	25	95.0	0.7	0.1	0.5	0.6	3.7	19	280	0.04	0.05	9
10	Cucumber	Cucumis Elongatus	10410	22	95.4	0.4	0.1	0.5	0.2	3.6	17	240	0.04	0.04	8
11	Egg plant	Solanum melongena	10411	17	92.1	1.5	0.2	0.6	1.0	5.6	30	22	0.03	0.04	5
12	Egg plant	Solanum melongena	10412	14	90.4	0.8	0.2	0.8	1.4	6.8	36	25	0.04	0.04	6
13	Egg plant	Solanum melongena	10413	15	91.0	0.8	0.1	0.9	1.4	6.2	33	20	0.03	0.03	6
14	Fennugreek, Green	Trigonella Foeniculum	10414	30	86.6	0.5	0.5	1.5	1.4	7.9	57	2300	0.12	0.25	60

Composition of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
4. Vegetables Cont.

تابع ملحق (4): محتوى الأغذية من العناصر الغذائية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
تابع الخضراوات

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Water %	Water g	Protein %	Fat %	Ash %	Fiber %	Chlorophyll %	Energy K.Cal	Vit. A I.U.	Vit. B1 mg	Vit. B2 mg	Ascorbic Acid mg
29	Onions	Allium cepa	10429	8	83.9	1.2	0.2	0.7	0.7	14.0	63	30	0.03	0.04	7
30	Parsley Curly	Petroselinum Crispum	10430	45	84.6	3.3	0.4	2.2	1.3	9.5	55	4200	0.15	0.32	156
31	Pumpkin	Cucurbita moenchana Duch	10431	42	91.8	1.0	0.1	0.8	1.1	6.3	30	950	0.04	0.06	7
32	Radish, White	Raphanus Sativus	10432	28	91.6	1.4	0.1	0.9	1.0	6.0	31	9	0.02	0.04	30
33	Radish, Oriental	Sativus var. Longimanus	10433	20	94.0	1.2	0.1	0.7	0.8	4.0	22	12	0.03	0.04	24
34	Spinach	Spinacia Oleracea	10434	20	92.4	2.0	0.3	1.7	0.7	3.6	25	3600	0.10	0.19	55
35	Squash	Cucurbita pepo	10435	10	92.8	1.3	0.2	0.7	0.4	5.0	27	165	0.04	0.09	25
36	Tomatoes	Lycopersicon esculentum	10436	3	94.3	1.1	0.3	0.6	0.6	3.8	22	680	0.05	0.05	21
37	Turnip	Brassica campestris var. Rapae	10437	23	91.8	1.2	0.2	0.9	0.7	5.9	30	-	0.06	0.06	30
38	Watercress	Nasturtium Officinale	10438	10	88.9	2.9	0.6	2.0	1.2	5.6	39	2000	0.12	0.38	34

تابع ملحق (٤): محتوى الأغذية من العناصر الغذائية / ١٠٠ جم غذاء صالح للاكل  
تابع الحضرافات

Composition of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
4. Vegetables Cont.

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Water g	Protein g	Fat g	Ash g	Fiber g	Carbohydrate g	Energy K-Cal	Vit. A I.U	Vit. B1 mg	Vit. B2 mg	Ascorbic acid mg
15	Garden Rocket	Eruca Sativa	10415	35	89.9	2.5	0.5	1.7	1.0	36	1200	0.14	0.21	140
16	Garlic Bulbs	Allium Sativum	10416	5	62.3	5.6	0.3	1.5	1.2	146	-	0.22	0.07	5
17	Green Pepper Sweet	Capsicum Annum	10417	22	92.2	1.3	0.3	0.6	1.5	30	100	0.04	0.06	90
18	Jew's Mallow	Corchorus Olitorius	10418	70	83.9	5.0	1.0	2.3	1.5	60	4050	0.50	0.12	80
19	Jew's Mallow dried	Corchorus Olitorius	10419	0	1.3	28.0	5.7	12.9	8.4	172	10,680	1.80	0.90	10
20	Leeks, bulbs	Allium Kurrat	10420	65	93.9	1.8	0.3	1.1	0.9	22	530	0.04	0.11	29
21	Lettuce	Lactuca Sativa Var. Longifolia	10421	46	95.4	1.1	0.2	0.8	0.7	16	1050	0.05	0.07	10
22	Mallow	Malva Parviflora	10422	37	83.3	5.0	0.6	2.3	1.3	61	6500	0.12	0.16	34
23	Mint	Mentha spp.	10423	53	84.6	3.7	1.2	2.8	1.8	56	1300	0.09	0.22	26
24	Okra (Fresh)	Hibiscus Esculentus	10424	20	86.5	2.0	0.2	1.0	1.0	51	280	0.10	0.12	20
25	Okra (Dry)	Hibiscus Esculentus	10425	0	3.4	14.6	1.2	7.1	10.5	364	1500	0.51	0.60	0
26	Olive Green	Olea Europaea	10426	20	72.6	1.7	18.6	3.2	1.4	190	25	0.02	0.01	0
27	Olive Black	Olea Europaea	10427	20	72.0	1.9	22.1	2.7	1.4	212	8	0.02	0.01	0
28	Onions, Green	Allium Cepa	10428	46	86.6	1.3	0.2	0.5	0.9	53	46	0.01	0.05	11

قائمة ملحق (٤): محتوى الأغذية من العناصر الغذائية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
٥. Meat and Poultry Products

No.	Common Name	Code No.	Water g	Protein g	Fat g	Ash g	Fiber g	Carbo-hydrate g	Energy K.Cal	Vit. A I.U	Vit. B1 mg	Vit. B2 mg	Ascorbic Acid mg
1	Beef	10501	0	19.5	11.9	1.1	0	0	16.5	12	0.07	0.11	0
2	Brain	10502	0	10.4	8.5	1.2	0	0.6	121	500	0.18	0.24	12
3	Buffalo	10503	0	18.8	11.5	0.9	0	0	179	-	0.21	0.35	0
4	Canal	10504	0	19.6	20.3	1.2	0	0	261	45	0.38	0.76	0
5	Canned, Corned Beef	10505	0	24.8	11.8	1.5	0	1.9	213	0	0.02	0.18	0
6	Chicken	10506	0	19.6	7.8	1.0	0	0	149	22	0.13	0.18	3
7	Dried Meat	10507	0	28.6	5.8	8.7	1.6	10.3	208	75	0.15	0.27	0
8	Duck	10508	0	15.4	28.2	1.2	0	0	315	-	0.08	0.25	0
9	Goat	10509	0	18.4	10.2	1.1	0	0	258	-	0.18	0.26	0
10	Goose	10510	0	16.8	31.3	1.2	0	0	349	-	0.08	0.25	-
11	Heart	10511	0	16.5	4.3	1.0	0	1.7	112	18	0.32	0.92	5
12	Kidneys	10512	0	16.5	5.8	1.0	0	0.8	121	880	0.22	1.8	10
13	Lamb	10513	0	16.5	10.3	1.0	0	0	287	30	0.12	0.18	0
14	Liver	10514	0	18.5	4.0	1.6	0	5.4	132	40,000	0.26	2.7	25

Composition of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
Meat and Poultry products Cont.

تابع ملحق (4): محتوى الأغذية من العناصر الغذائية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
تابع اللحوم والدواجن

Common Name	Code No.	Waste		Water		Protein		Fat		Ash		Fiber		Carbon-hydrate		Energy		Vit. A		Vit. B1		Vit. B2		Ascorbic Acid	
		g	%	g	%	g	%	g	%	g	%	g	%	g	%	K. Cal	I.U	mg		mg		mg		mg	
Lung	10515	0		78.5	17.1	2.2	1.2	0	0	1.0	92	-	0.07	0.28	0										
Pigeon	10516	0		65.5	24.1	2.0	1.4	0	0	0	177	-	0.10	0.18	-										
Pork	10517	0		56.5	15.9	26.9	0.7	0	0	0	306	-	0.65	0.18	0										
Rabbit	10518	0		70.4	20.7	7.6	1.3	0	0	0	151	18	0.03	0.15	0										
Salami	10519	0		52.3	18.2	22.5	4.7	0	1.3	290	-	0.25	0.24	-											
Sausage, Beef	10520	0		51.9	12.4	27.8	2.4	1.3	4.5	318	-	0.05	0.11	0											
Spleen	10521	0		77.0	18.0	2.1	1.4	0	1.5	97	-	0.12	0.34	0											
Tongue	10522	0		67.0	16.8	14.6	1.0	0	0.6	201	-	0.12	0.28	0											
Turkey	10523	0		63.4	21.0	14.4	1.2	0	0	214	-	0.11	0.12	-											
Veal	10524	0		75.1	18.7	5.4	0.8	0	0	123	10	0.06	0.14	0											



Composition of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
7. Fish and sea foods.

تابع ملحق (4): محتوى الأغذية من العناصر الغذائية / ١٠٠ جم غذاء صالح الأكل  
٧- السمك والأغذية البحرية

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Waste %	Water %	Protein %	Fat %	Ash %	Fiber %	Carbon-hydrate %	Energy <sup>1</sup> K.Cal	Vit. A I.U.	Vit. B1 mg	Vit. B2 mg	Ascorbic Acid mg
1	Bream	Pagrus S.P.	10701	49	73.8	19.4	5.4	1.4	0	0	126	70	0.02	0.14	0
2	Cat fish	Bagrus Bagrid	10702	36	77.4	18.7	3.0	0.9	0	0	102	43	0.10	0.21	1
3	Cat fish	Calotes lacer	10703	57	80.5	17.4	1.0	1.1	0	0	79	57	0.15	0.15	0
4	Cat fish, fried		20704	49	73.5	21.9	2.8	1.1	0.3	0.7	114	65	0.05	0.10	0
5	Cat fish	Synodontis Scoll	10705	-	75.8	18.1	4.0	1.3	0	0.8	112	33	0.10	0.12	1
6	Cat fish bream	Akrotyrops spangier	10706	32	79.4	17.6	1.0	2.0	0	0	79	60	0.16	0.15	0
7	Lizard fish	Synodus SP.	10707	49	73.8	19.4	5.4	1.4	0	0	126	120	0.14	0.16	0
8	Lizard fish, fried		20708	20	44.4	30.3	14.4	6.9	0.5	4.0	265	134	0.08	0.10	0
9	Mullet	Mugil cephalus	10709	-	70.4	24.9	3.1	1.3	0	0.3	129	80	0.07	0.15	1
10	Mullet, fried		20710	57	58.7	25.1	13.4	2.3	0.2	0.3	222	93	0.05	0.10	0
11	Mullet, roasted		20711	42	69.8	26.0	2.7	1.2	0.2	0.2	127	105	0.05	0.09	0
12	Sardine	Sardinella	10712	44	71.8	21.4	5.1	1.4	0	0.3	13	44	0.11	0.08	0
13	Sardine, roasted		20713	40	53.9	40.2	1.9	2.3	0.4	1.7	183	52	0.07	0.07	0
14	Sardine, salted		20714	34	46.6	19.0	18.2	15.0	0	1.2	245	50	0.06	0.06	0

Composition of Foods, 100 grams, Edible Portion.  
7. Fish and sea foods. Cont.

تابع ملحق (٤): محتوى الأغذية من العناصر الغذائية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
تابع الأسماك والأغذية البحرية

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Waste g	Water g	Protein g	Fat g	Ash g	Fiber g	Carbohydric g	Energy K.Cal	Vit. A I.U.	Vit. B1 mg	Vit. B2 mg	Ascorbic Acid mg
15	Salted fish		20715	46	66.8	16.7	2.2	11.2	0	1.1	91.0	48	0.05	0.12	0
16	Salted fish		20716	52	56.4	21.7	6.0	15.7	0.2	0	141	52	0.06	0.11	0
17	Shrimp, boiled		20717	-	68.0	25.4	2.1	2.3	0	2.2	129	134	0.04	0.09	0
18	Sole, raw	Solea vulgaris	10718	42	75.5	21.3	1.6	1.6	0	0	100	90	0.11	0.15	1
19	Sole, fried		20719	33	46.4	23.0	16.0	3.0	0.5	11.1	236	105	0.06	0.10	0
20	Tilapia	Tilapia nilotica	10720	40	78.1	19.7	1.0	1.2	0	0	88	210	0.05	0.15	1
21	Tilapia, roasted		20721	53	71.5	24.1	2.6	1.0	0.1	0.8	123	226	0.05	0.09	0



Composition of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
8. Milk and Dairy Products.

تابع ملحق (٤) يحتوي الأغذية من العناصر الغذائية / ١٠٠ جم غداء صالح للأكل  
٨- اللبن ومنتجات الألبان

No.	Common Name	Code No.	Moisture %	Water %	Protein %	Fat %	Ash %	Fiber %	Carbohydrate %	Energy K. Cal	Vit. A I.U	Vit. B1 mg	Vit. B2 mg	Aromatic Acid mg
1	Buffalo Milk	10801	0	82.5	3.8	7.1	0.5	0	5.3	101	75	0.10	0.38	0
2	Cow Milk	10802	0	88.2	3.5	3.5	0.7	0	4.1	62	165	0.03	0.17	Trace
3	Cow Milk Powder	10303	0	2.4	26.6	27.4	4.8	0	38.8	508	1250	0.41	1.15	5
4	Fermented Milk	10804	0	84.6	4.8	0.8	0.8	0	9.0	62	95	0.02	0.12	0
5	Pasteurized Milk	10805	0	87.8	3.1	3.6	0.7	0	4.8	53	455	0.04	0.17	0
6	Yoghurt	10806	0	85.5	3.5	2.9	0.8	0	7.3	69	115	0.03	0.15	Trace
7	Cheese, Camembert	10807	0	32.4	27.0	28.2	4.3	0	8.1	395	815	0.02	0.66	0
8	Cheese, Cheddar	10808	0	32.6	34.4	28.2	3.5	0	1.3	397	1260	0.04	0.50	0
9	Cream	10809	0	56.2	2.3	37.2	0.50	0	3.8	359	1240	0.02	0.12	0
10	Cheese, Whole Milk	10810	0	52.4	16.8	20.5	6.8	0	3.5	265	550	0.08	0.37	0
11	Formetan	10811	0	22.1	21.4	35.9	9.6	0	11.0	450	1600	0.06	0.52	0
12	Cheese, Processed	10812	0	48.1	14.6	24.0	5.4	0	7.9	306	1500	0.03	0.04	0
13	Cheese, Soft	10813	0	58.4	17.8	9.6	11.8	0	2.4	167	310	0.10	0.37	0
14	Cheese, Skin Milk	10814	0	75.5	19.0	0.5	1.3	0	3.7	95	15	0.02	0.24	0

*Composition of Foods, 100 Grams, Edible Portion.*  
8. *Milk and Dairy products Cont.*

[illegible]



تابع ملحق (٤): محتوى الأغذية من العناصر الغذائية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
١٠- الفواكه

Composition of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
10. Fruits

No.	Common Name	Scientific Name	Code No	Moisture	Protein	Fat	Ash	Fiber	Carbo- hydrate	Baritz	Vit. A IU	Vit. B1 mg	Vit. B2 mg	Ascorbic Acid mg	
1	Apples	<i>Malus pumila</i>	11001	11	84.5	0.4	0.2	0.6	0.8	14.3	61	55	0.05	0.03	7
2	Apple Juice		11002	0	87.7	0.2	0	0.3	0.1	11.8	48	-	0.02	0.03	2
3	Apricots	<i>Prunus armeniaca</i>	11003	10	84.6	0.9	0.4	0.7	0.7	13.4	61	2550	0.04	0.06	12
4	Apricot Juice		11004	0	84.7	0.8	0.1	0.5	0.2	13.9	60	2500	0.04	0.03	5
5	Apricot dry		11005	0	24.0	4.5	0.6	3.1	3.2	67.8	295	8700	0.01	0.18	7
6	Banana	<i>Musa nana var. Kavendishi</i>	11006	33	75.2	1.3	0.3	0.9	0.6	22.3	97	160	0.04	0.05	8
7	Cantalupe	<i>Cucumis melo</i>	11007	42	90.8	0.8	0.1	0.6	0.4	7.7	35	2800	0.05	0.04	25
8	Dates (fresh)	<i>Phoenix dactylifera</i>	11008	15	70.0	0.9	0.2	0.7	0.9	28.2	118	15	0.05	0.06	11
9	Dates dried		11009	13	23.0	2.3	0.5	1.7	2.2	72.5	304	36	0.08	0.1	0
10	Figs	<i>Ficus carica</i>	11010	5	80.4	1.3	0.4	0.6	1.5	17.3	78	90	0.07	0.06	4
11	Fig dried		11011	4	22.3	4.1	1.1	2.2	5.7	70.3	308	78	0.12	0.11	3
12	Grapes	<i>Vitis vinifera</i>	11012	7	80.4	0.6	0.6	0.5	0.7	17.9	79	90	0.07	0.03	5
13	Grape juice		11013	0	82.7	0.3	0	0.5	0	16.5	67	18	0.03	0.03	3
14	Grape fruit	<i>Citrus Paradisi</i>	11014	37	88.7	0.6	0.1	0.4	0.4	10.2	44	65	0.03	0.02	35

Composition of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
10. Fruits Cont.

تابع ملحق (٤): محتوى الأغذية من العناصر الغذائية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
تابع القواكه

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Water %	Water %	Protein %	Fat %	Ash %	Fiber %	Carb. hydrate %	Energy K.Cal	Vit. A I.U	Vit. B1 mg	Vit. B2 mg	Ascorbic Acid mg
15	Grape fruit juice		11015	0	88.9	0.5	0.2	0.3	0.1	9.1	36	-	0.04	0.03	41
16	Guava	Psidium Guajava	11016	5	81.2	0.8	0.5	0.6	3.4	16.9	68	66	0.05	0.05	227
17	Lemon	Citrus Medica	11017	38	90.3	0.8	0.2	0.4	0.6	8.3	35	15	0.05	0.03	75
18	Lemon juice		11018	0	91.5	0.6	0.2	0.3	-	7.4	24	17	0.04	0.02	47
19	Lemon Sweet	Citrus Limetta	11019	36	90.1	0.6	0.3	0.4	0.7	8.6	26	0	0.04	0.04	50
20	Lime	Citrus aurantiifolia	11020	42	89.6	0.6	1.2	0.3	0.4	8.3	33	15	0.04	0.04	36
21	Lime Juice	Citrus aurantiifolia	11021	0	90.6	0.4	0.2	0.4	0.1	8.4	26	8	0.01	0.01	30
22	Mandarine	Citrus Reticulata	11022	31	86.9	0.7	0.2	0.5	0.9	11.7	46	45	0.09	0.04	26
23	Mango	Mangifera indica	11023	37	81.8	0.8	0.3	0.5	1.1	16.6	65	3750	0.04	0.04	30
24	Melon Sweet	Cucumis melo	11024	42	91.5	0.8	0.2	0.6	0.6	6.9	29	375	0.05	0.03	31
25	Mulberry	Morus nigra	11025	0	79.6	1.6	1.5	0.8	1.2	16.5	77	0	0.05	0.07	10
26	Orange	Citrus Siyensis	11026	28	85.5	1.1	0.3	0.4	0.6	12.7	52	215	0.08	0.04	55
27	Orange juice		11027	0	89.4	0.6	0.2	0.5	0.1	9.3	40	180	0.08	0.04	55
28	Peach	Prunus	11028	11	86.2	0.7	0.2	0.5	0.7	12.4	49	1050	0.04	0.04	15

تابع ملحق (٤): محتوى الأغذية من العناصر الغذائية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
تابع الفواكه

Composition of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
10. Fruits Cont.

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Water g	Waste g	Protein g	Fat g	Ash g	Fiber g	Carbo- hydrate g	Energy K.Cal	Vit. A I.U.	Vit. B1 mg	Vit. B2 mg	Ascorbic Acid mg
29	Peach juice	-	11029	87.3	0	0.5	0.2	0.6	0.5	11.4	49	600	0.02	0.03	5
30	Pears	-	11030	83.8	22	0.3	0.2	0.7	1.3	15.0	63	18	0.03	0.05	5
31	Persimmon	Diospyros Kak	11031	79.4	20	0.9	0.5	0.7	1.5	18.5	82	2500	0.05	0.03	12
32	Pineapple	Ananas comosus	11032	85.7	37	0.5	0.2	0.4	0.5	13.2	57	37	0.10	0.05	15
33	Pineapple juice	-	11033	85.4	0	0.3	0.2	0.3	0.1	13.8	58	40	0.06	0.03	8
34	Plum	Prunus domestica	11034	86.8	27	0.7	0.2	0.4	0.6	11.9	52	235	0.06	0.03	5
35	Pomegranate	Punica granatum	11035	80.7	48	0.7	0.4	0.6	2.1	17.6	77	-	0.06	0.02	6
36	Pomegranate juice	-	11036	84.2	0	1.0	0.1	0.4	0	14.3	62	-	0.04	0.02	8
37	Raisins	Vitis vinifera	11037	17.8	0	2.4	0.3	1.8	0.8	77.7	322	21	0.12	0.07	2
38	Raspberry	Rubus idaeus	11038	83.5	5	1.3	0.5	0.7	3.5	14.0	66	110	0.04	0.7	22
39	Spiked fig	Opuntia spp.	11039	86.5	42	1.3	1.3	0.3	6.5	10.6	59	52	0.03	0.04	18
40	Strawberry	Fragaria chiloensis	11040	90.3	7	0.8	0.4	0.6	1.2	7.9	38	52	0.04	0.05	52
41	Watermelon	Citrullus vulgaris	11041	92.8	48	0.4	0.1	0.4	0.4	6.3	28	450	0.03	0.04	10



Composition of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
12. Condiments  
تابع ملحق (٤): محتوى الأغذية من العناصر الغذائية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
١٢- التوابل

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Waste g.	Water g.	Protein g.	Fat g.	Ash g.	Fiber g.	Carbo- hydrate g.	Energy K.Cal	Vit. A I.U.	Vit. B1 mg	Vit. B2 mg	Ascorbic Acid mg
1	Cardamom	Elettaria Cardamomum	11201	0	12.6	12.0	4.1	6.4	14.3	64.7	345	-	2.5	1.13	-
2	Cinnamon	Cinnamomum zeylanicum	11202	0	7.8	4.0	2.0	4.8	24.1	81.4	360	0	0.08	0.35	0
3	Clove	Eugenia Caryophyllata	11203	0	8.0	6.5	8.3	7.0	8.5	70.2	382	0	0.14	0.26	0
4	Coriander	Coriandrum Sativum	11204	0	10.6	13.6	15.7	4.6	31.5	55.5	418	750	0.15	0.27	-
5	Cumin	Cuminum cyminum	11205	0	20.4	18.0	13.3	7.5	7.0	40.8	355	-	-	-	-
6	Ginger	Zingiber Officinale	11206	0	9.7	9.0	3.4	7.0	3.0	70.9	350	0	0.11	0.5	0
7	Mustard	Sinapis nigra	11207	0	7.8	24.6	6.7	4.0	16.3	56.9	386	-	-	-	-
8	Black Pepper	Piper nigrum	11208	0	10.5	14.7	4.6	4.5	5.1	65.7	363	0	0.05	0.02	0
9	Pepper red, Chilli	Capiscum frutescens	11209	0	11.8	15.6	7.7	7.0	18.1	57.9	363	-	0.03	0.81	-
10	Nutmeg	Myristica fragrans	11210	0	9.8	7.5	34.7	2.8	3.0	45.2	523	-	-	-	-
11	Thyme	Thymus vulgaris	11211	0	11.6	12.2	2.9	8.4	11.8	64.9	335	-	1.8	0.9	-





ملحق (٥) : محتوى الأغذية من العناصر المعدنية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
١- الحبوب ومنتجاتها

Mineral Content of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
I. Cereals and Cereal products.

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Na mg	K mg	Ca mg	Mg mg	Fe mg	Zn mg	Cu mg	P mg
1	Barley	Hordeum Vulgare	10101	347	299	54	52	4.1	2.3	0.38	201
2	Rice	Oryza Sativa	10102	11	127	22	30	0.8	1.2	0.08	103
3	Sorghum	Sorghum Vulgare	10103	10	385	30	134	5.0	4.2	0.08	250
4	Wheat	Triticum Vulgare	10104	10	315	35	118	2.8	3.8	0.36	412
5	Wheat Parboiled		10105	37	350	43	66	3.2	5.2	0.31	415
6	Robbed wheat		10106	22	370	41	66	3.0	3.5	0.38	320
7	Wheat flour 72% extraction		10107	4	110	15	22	0.9	1.5	0.13	90
8	Macaroni		10108	8	192	20	27	1.0	1.5	0.16	90
9	Bakaly Bread		10109	125	248	42	14	2.8	5.1	0.40	183
10	French Bread		10110	509	228	14	22	0.7	0.12	0.12	94
11	White Bread		10111	524	115	16	34	0.7	0.8	0.15	97
12	Cookies		10112	630	160	48	28	1.3	0.8	0.16	109
13	Cakes		10113	347	114	51	45	0.7	0.5	0.25	96

Mineral Content of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
2. Legumes.

تحتوي الأغذية من العناصر المعدنية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
٢- القول

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Na mg	K mg	Ca mg	Mg mg	Fe mg	Zn mg	Cu mg	P mg
1	Broad Beans, Dry	Vicia faba	10201	35	724	85	148	5.8	0.14	0.29	386
2	Broad Beans, Fresh	Vicia faba	10202	6	250	31	30	1.7	0.01	0.11	173
3	Broad Beans, Dry, Crushed	Vicia faba	10203	39	640	92	126	4.8	0.12	0.18	359
4	Germinated Broad Beans	Vicia faba	10204	14	290	34	59	2.3	0.10	0.12	154
5	Beans, French common	Phaseolus Vulgaris	10205	36	1270	148	142	6.2	2.50	0.78	415
6	Chickpea	Cicer arretinum	10206	15	815	144	127	6.0	2.18	1.20	380
7	Chickpea	Cicer arretinum	10207	50	962	127	122	6.7	4.7	1.25	412
8	Chickpea	Cicer arretinum	10208	34	855	155	130	5.8	3.4	1.30	430
9	Cowpea	Vigna Sinensis	10209	20	1213	104	136	6.8	2.10	0.46	347
10	Fenugreek seeds	Trigonella foenum-graecum	10210	53	966	194	55	16.3	6.30	0.40	165
11	Lentils	Lens esculenta	10211	30	725	48	86	9.3	4.20	0.25	327
12	Lentils, Potted	Lens esculenta	10212	41	765	70	82	8.8	2.20	0.35	330
13	Peanut garden	Pisum sativum	10213	11	790	42	125	5.6	3.80	0.54	557



Mineral Content of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
4. Vegetables.

تابع ملحق (٥) : محتوى الأغذية من العناصر المعدنية / ١٠٠ جم غذاء صالح الأكل  
٤ - الخضراوات

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Mo mg	K mg <sup>1</sup>	Ca mg	Mg mg	Fe mg	Zn mg	Cu mg	P mg
1	Vegetables	Cyathra Scalyanus	10401	32	450	5.5	10	1.2	0.05	0.01	96
2	Beet root	Beta vulgaris	10402	70	330	22	25	0.9	0.63	0.15	35
3	Cabbage, common	Var. capitata	10403	35	250	40	15	0.74	0.4	0.04	32
4	Cauliflower	Brassica oleracea Var.	10404	35	304	42	10	0.7	2.0	0.19	56
5	Carrots	Daucus Carota	10405	62	345	40	18	1.1	0.42	0.06	42
6	Celery	Apium graveolens var. dulce	10406	74	275	40	25	1.2	0.31	0.02	48
7	Chard swiss	Beta vulgaris Var. cicta	10407	164	450	85	27	1.7	2.4	0.11	32
8	Cornflower	Coriandrum Sativum	10408	54	366	144	9	1.5	3.1	0.07	64
9	Cucumber	Cucumis Sativus	10409	5	130	18	8	0.6	0.18	0.07	31
10	Cucumber	Cucumis Edongatus	10410	8	196	16	7	0.7	0.19	0.06	25
11	egg Plant	Solanum melongena	10411	7	280	15	14	0.54	0.54	0.06	22
12	egg Plant	Solanum melongena	10412	7	263	15	11	0.46	0.31	0.07	18
13	Egg Plant	Solanum melongena	10413	8	270	17	12	0.38	0.36	0.07	24
14	Peasgreen, Green	Trigonella foenum-graecum	10414	68	260	135	12	6.4	4.5	0.07	47

تابع ملحق (٥) : محتوى الأغذية من العناصر المعدنية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
تابع الخضراوات

Mineral Content of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
4. Vegetables Con.

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Na mg	K mg	Cu mg	Mg mg	Fe mg	Zn mg	Cu mg	P mg
15	Garden Rocket (ruka)	Eruca Sativa	10415	33	257	127	13	8.3	1.8	0.26	40
16	Garlic bulbs	Allium sativum	10416	22	515	34	30	1.6	0.72	0.22	168
17	Green Pepper Sweet	Capiscum Annuum	10417	45	195	15	14	0.9	0.04	0.10	25
18	Jew's Mallow	Carnehorus Olliorius	10418	180	32	370	17	5.6	0.13	0.04	55
19	Jew's Mallow Dried	Carachurus Olliorius	10419	1014	181	512	98	10.8	0.80	0.22	266
20	Leeks, bulbs	Allium kurrat	10420	18	270	87	15	1.2	1.4	0.03	35
21	Lettuce	Lactuca Sativa Var Longifolia	10421	10	125	28	10	1.4	0.15	0.08	22
22	Mallow	Malva Parviflora	10422	48	296	258	16	4.5	3.6	0.12	77
23	Mint	Mentha spp.	10423	2	160	160	48	0.9	0.4	0.14	74
24	Olva (Fresh)	Hibiscus Esculentus	10424	17	210	70	45	1.5	0.58	0.16	74
25	Olva (Dry)	Hibiscus Esculentus	10425	81	684	324	124	8.5	4.2	0.84	383
26	Olive green	Olea europaea	10426	4	145	72	34	1.8	0.6	0.24	20
27	Olive black	Olea europaea	10427	2	120	55	15	1.4	0.6	0.22	18
28	Onions, green	Allium cepa	10428	10	224	25	8	0.3	0.07	0.10	50

Mineral Content of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
4. Vegetables Cont.

تأليف المؤلف (٢٠) : تحتوي الأغذية من العناصر المعدنية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل

تأليف المؤلفات

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	No. mg	K mg	Ca mg	Mg mg	Fe mg	Zn mg	Cu mg	P mg
29	Onions	Allium Cepa	10429	13	139	35	12	0.5	0.10	0.15	56
30	Parsley Curry	Petroselinum Crispum	10430	30	723	210	39	5.1	1.0	0.18	54
31	Pumpkin	Cucurbita Alchorhiza Duch.	10431	2	290	25	15	0.7	0.24	0.12	31
32	Radish White	Raphanus Sativus	10432	18	292	22	12	0.8	0.17	0.11	27
33	Radish Oriental	Sativus Variegatum	10433	21	246	27	17	1.2	0.14	0.15	31
34	Spinach	Spinacia Oleracea	10434	58	540	93	54	3.2	0.20	0.19	17
35	Squash	Cucurbita Pepo	10435	6	200	25	12	0.30	0.19	0.05	31
36	Tomatoes	Lycopersicon Esculentum	10436	10	328	15	12	0.80	0.05	0.12	10
37	Turnip	Brassica Campestris var. Rapca	10437	48	270	36	10	0.50	0.15	0.05	33
38	Water Cress	Matricaria Officinale	10438	116	513	211	15	2.10	3.60	0.07	41

تابع ملحق (٥) : محتوى الأغذية من العناصر المعدنية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
٥- اللحوم والدواجن

Mineral Content of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
5. Meat and Poultry products

No.	Common Name	Code No.	Na mg	K mg	Ca mg	Mg mg	Fe mg	Zn mg	Cu mg	P mg
1	Beef	10501	72	375	15	22	3.4	4.8	0.10	174
2	Brain	10502	122	225	10	15	1.4	1.2	0.24	274
3	Buffalo	10503	63	270	25	30	4.2	3.6	0.24	180
4	Camel	10504	107	347	7	12	7.8	5.2	1.22	160
5	Canned, Corned Beef	10505	880	152	12	17	4.5	6.0	0.26	100
6	Chicken	10506	77	340	11	35	1.6	2.0	0.25	194
7	Dried Meat (Basterma)	10507	5200	185	60	36	10.8	7.8	0.72	318
8	Duck	10508	90	312	12	18	2.0	2.9	0.35	194
9	Goat	10509	53	286	12	14	2.3	2.4	0.08	150
10	Goose	10510	80	440	18	23	1.5	1.7	0.26	190
11	Heart	10511	90	210	12	17	3.6	1.8	0.41	188
12	Kidneys	10512	184	215	10	12	5.8	1.8	0.41	214
13	Lamb	10513	65	300	15	15	2.5	2.7	0.6	763
14	Liver	10514	80	302	10	14	7.0	4.1	2.2	286



Mineral Content of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
5. Meat and Poultry products Cont.

تابع ملحق (٥) : محتوى الأغذية من العناصر المعدنية / ١٠٠ جم غداء صالح للأكل  
تابع اللحوم والدواجن

No.	Common Name	Code No.	Na mg.	K mg.	Ca mg.	Mg mg.	Fe mg.	Zn mg.	Cu mg.	P mg.
15	Lung	10515	50	218	10	12	5.8	2.4	0.04	204
16	Pigeon	10516	58	275	27	20	2.2	2.4	0.31	176
17	Pork	10517	62	315	10	16	2.3	1.8	0.12	172
18	Rabbit	10518	72	345	15	30	2.6	1.6	0.22	234
19	Salami	10519	1250	122	10	7	2.6	1.3	0.46	200
20	Sausage, beef	10520	1130	175	44	16	1.7	1.8	0.26	172
21	Spleen	10521	108	415	9	11	10.6	2.4	0.12	218
22	Tongue	10522	88	304	10	12	2.6	1.2	0.05	174
23	Turkey	10523	70	321	15	20	1.8	2.1	0.18	220
24	Veal	10524	103	372	10	27	1.3	2.6	0.03	253

تابع ملحق (٥) : محتوى الأغذية من العناصر المعدنية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
٦- البيض

Mineral Content of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
6. Eggs.

No.	Common Name	Code No.	Na mg	K mg	Ca mg	Mg mg	Fe mg	Zn mg	Cu mg	P mg
1	Egg White (Hen)	10601	172	733	10	10	0.15	0.03	0.04	22
2	Egg Yolk (Hen)	10602	44	133	150	18	6.8	4.0	0.02	586
3	Duck's Egg	10603	205	233	58	18	3.5	3.4	0.03	277
4	Hen's Egg	10604	155	174	62	15	2.5	1.5	0.14	218

Mineral Content of broods, 100 grams, edible Portion.<sup>1</sup>  
7. Fish and sea foods Cont.

تابع ملحق (٥) : محتوى الأغذية من العناصر المعدنية / ١.٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
٧- الأسماك والأغذية البحرية

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Na mg	K mg	Ca mg	Mg mg	Fe mg	Zn mg	Cu mg	P mg
1	Bream	Pogonius SP.	10701	55	180	227	55	1.2	0.4	0.24	101
2	Cat fish	Begarus Bayad	10702	62	155	116	60	1.0	0.6	0.23	318
3	Cat fish	Charius laevis	10703	92	174	75	43	1.0	0.8	0.24	177
4	Cat fish, fried		20704	106	180	22	18	1.1	0.6	0.24	186
5	Cat fish	Synodontis scoll	10705	90	155	-	-	1.0	1.1	0.24	-
6	Golden Bream	Argyrus spinifer	10706	120	215	28	33	0.9	1.0	0.18	186
7	Lizard fish	Synodus SP.	10707	66	243	101	24	0.8	1.2	0.16	227
8	Lizard fish, fried		20708	75	250	128	45	0.9	1.2	0.18	192
9	Mullet	Mugil cephalus	10709	88	180	21	18	1.0	1.1	0.19	170
10	Mullet, fried		20710	96	200	50	22	0.7	1.1	0.20	121
11	Mullet, raw		20711	100	195	17	10	0.9	0.9	0.21	209
12	Sardine	Sardinella	10712	91	212	34	20	0.9	0.8	0.16	-
13	Sardine, roasted		20713	107	230	86	36	1.0	0.9	0.18	-
14	Sardine, salted		20714	1000	195	-	-	1.0	0.9	0.18	-

تابع ملحقي (٥) : محتوى الأغذية من العناصر المعدنية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
تابع الأسماك والأغذية البحرية

Mineral Content of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
7. Fish and sea foods Cont.

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Na mg	K mg	Ca mg	Mg mg	Fe mg	Zn mg	Cu mg	P mg
15	Salted fish		20715	1105	200	-	-	0.7	0.9	0.16	-
16	Salted fish		20716	1210	188	282	44	0.8	0.8	0.14	112
17	Shrimp, Boiled		20717	77	250	-	-	1.0	0.9	0.11	-
18	Sole, raw	Solea vulgaris	10718	85	210	152	38	0.9	1.0	0.12	52
19	Sole, fried		20719	99	225	-	-	1.0	1.0	0.16	-
20	Tilapia	Tilapia nilotica	20720	85	180	110	52	1.1	0.8	0.16	-
21	Tilapia, roasted		20721	95	205	-	-	1.1	0.9	0.18	125

Mineral Content of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
8. Milk and Dairy products

تابع ملحق (٥) : محتوى الأغذية من العناصر المعدنية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل

٨- اللبن ومشتقات الألبان

No.	Common Name	Code No.	Na mg	K mg	Ca mg	Mg mg	Fe mg	Zn mg	Cu mg	P mg
1	Buffalo milk	10801	50	160	180	17	0.20	0.40	0.01	92
2	Cow milk	10802	62	152	122	14	0.06	0.40	0.01	104
3	Cow milk powder	10803	395	1400	900	102	0.47	3.72	0.18	685
4	Fermented milk	10804	54	150	166	13	0.12	0.08	0.03	89
5	Pasteurized milk	10805	48	142	120	15	0.04	0.41	0.01	92
6	Yoghurt	10806	50	140	165	15	0.20	0.10	0.03	85
7	Cheese Camembert	10807	740	122	680	48	0.80	3.40	0.40	648
8	Cheese, cheddar	10808	548	90	715	42	0.90	0.36	0.04	512
9	Cream	10809	25	72	72	10	0.10	0.16	0.18	55
10	Cheese, whole milk	10810	485	142	565	10	0.20	0.36	0.44	294
11	Pancreatin	10811	2757	488	822	124	0.40	3.54	0.35	715
12	Cheese, processed	10812	1320	86	620	30	0.80	2.40	0.39	840
13	Cheese, salted	10813	4240	218	570	32	0.31	0.34	0.12	276
14	Cheese, skim	10814	45	115	88	10	0.33	0.43	0.49	174



تابع ملحق (٥) : محتوى الأغذية من العناصر المعدنية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل

*Mineral Content of Foods, 100 Grams, Edible Portion.*

[illegible]

تابع ملحق (٥) : محتوى الأغذية من العناصر المعدنية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
١٠- الفواكه

Mineral Content of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
10. Fruits

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Na mg	K mg	Ca mg	Mg mg	Fe mg	Zn mg	Cu mg	P mg
1	Apples	<i>Malus pumila</i>	11001	5	125	5	6	0.3	0.08	0.07	12
2	Apple juice	-	11002	3	105	8	6	0.3	0.03	0.4	10
3	Apricots	<i>Prunus Armeniaca</i>	11003	3	460	15	11	0.3	0.05	0.10	25
4	Apricot juice	-	11004	3	400	12	10	0.4	0.02	0.05	18
5	Apricots dry	<i>Prunus armeniaca</i>	11005	18	715	50	40	5.7	0.33	0.3	120
6	Banana	<i>Musa nana</i> Var. <i>Kavendishi</i>	11006	3	350	10	30	0.6	0.12	0.18	25
7	Cantalope	<i>Cucumis Melo</i>	11007	18	280	15	20	0.5	0.15	0.05	18
8	Dates fresh	<i>Phoenix Dactylifera</i>	11008	2	300	22	18	1.1	0.13	0.12	26
9	Dates dried	<i>Phoenix dactylifera</i>	11009	0	690	63	44	2.9	0.4	0.3	61
10	Figs	<i>Ficus Carica</i>	11010	4	180	42	25	0.7	0.22	0.05	28
11	Fig dried	<i>Ficus carica</i>	11011	33	701	130	65	3.5	0.9	0.4	80
12	Grapes	<i>Vitis Vinifera</i>	11012	5	242	17	9	0.6	0.09	0.12	22
13	Grape juice	-	11013	5	130	15	9	0.36	0.03	0.03	14
14	Grape fruit	<i>Citrus Paradisi</i>	11014	5	140	15	12	0.35	0.12	0.03	18



Mineral Content of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
10. Fruits Cont.

تابع ملحق (٥) : محتوى الأغذية من العناصر المعدنية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
تابع القواكه

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Mo. mg.	K mg.	Ca mg.	Mg mg.	Fe mg.	Zn mg.	Cu mg.	P mg.
15	Grapefruit Juice	-	11015	3	153	7	13	0.3	0.02	0.02	16
16	Grape	<i>Psidium Guajava</i>	11016	8	255	23	25	1.0	0.26	0.12	44
17	Lemon	<i>Citrus Medica</i>	11017	4	165	32	12	0.50	0.15	0.22	14
18	Lemon Juice	<i>Citrus Medica</i>	11018	1	152	15	8	0.22	0.11	0.10	10
19	Lemon Sweet	<i>Citrus Limetta</i>	11019	5	160	27	15	0.4	0.12	0.21	22
20	Lime	<i>Citrus aurantiifolia</i>	11020	5	140	29	11	0.7	0.24	0.23	20
21	Lime Juice	<i>Citrus aurantiifolia</i>	11021	2	95	8	9	0.3	0.12	0.01	12
22	Montanaine	<i>Citrus Reticulata</i>	11022	10	147	39	16	0.5	0.40	0.04	22
23	Mango	<i>Mangifera indica</i>	11023	10	200	15	8	0.5	0.18	0.11	15
24	Melon Sweet	<i>Citrus melo</i>	11024	10	270	15	8	0.4	0.18	0.12	14
25	Mulberry	<i>Morus nigra</i>	11025	12	236	55	17	2.8	1.3	0.22	35
26	Orange	<i>Citrus Sinensis</i>	11026	3	181	37	7	0.3	0.13	0.03	28
27	Orange Juice	-	11027	-	230	10	10	0.4	0.08	0.04	19
28	Peach	<i>Prunus</i>	11028	3	180	15	11	0.8	0.02	0.04	22

تابع ملحق (٥) : محتوى الأغذية من العناصر المعدنية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
تابع الفواكه

Mineral Content of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
10. Fruits Cont.

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Na mg	K mg	Ca mg	Mg mg	Fe mg	Zn mg	Cu mg	P mg
29	Peach juice	-	11029	3	200	7	8	0.4	0.01	0.02	20
30	Pear	-	11030	5	144	10	10	0.4	0.14	0.12	15
31	Persimmon	Diospyros kaki	11031	5	210	7	10	0.40	0.14	0.11	22
32	Pineapple	Ananas carnosus	11032	3	138	15	16	0.6	0.22	0.06	12
33	Pineapple juice	-	11033	2	145	14	14	0.4	0.6	-	10
34	Plum	Prunus domestica	11034	2	172	15	11	0.60	0.04	0.08	21
35	Pomegranate	Punica granatum	11035	5	280	5	8	0.26	0.14	0.20	30
36	Pomegranate juice	-	11036	2	190	13	10	0.22	0.12	0.1	35
37	Raisins	Vitis vinifera	11037	30	740	63	34	2.4	0.16	0.18	90
38	Raspberry	Rubus idaeus	11038	2	155	30	25	1.20	0.35	0.11	27
39	Spiced fig	Opuntia spp.	11039	5	150	50	18	1.4	0.72	0.24	35
40	Strawberry	Fragaria chiloensis	11040	2	185	26	15	0.90	0.10	0.11	24
41	Watermelon	Citrullus Vulgaris	11041	2	90	6	7	0.30	0.10	0.06	11



تابع ملحق (٥) : محتوى الأغذية من العناصر المعدنية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
١٢- التوابل

Mineral Content of Foods, 100 Grams, Edible Portion.  
12: Condiments

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Na mg	K mg	Ca mg	Mg mg	Fe mg	Zn mg	Cu mg	P mg
1	Cardamom	<i>Elettaria cardamomum</i>	11201	3	30	124	54	9.6	3.8	1.4	186
2	Cinnamon	<i>Cinnamomum zeylanicum</i>	11202	15	380	500	50	14.2	2.4	0.32	42
3	Clove	<i>Engelina caryophyllata</i>	11203	300	1200	690	250	5.4	3.5	0.4	80
4	Coriander	<i>Coriandrum sativum</i>	11204	35	1020	380	85	18.2	8.7	1.2	408
5	Cumin	<i>Cuminum cyminum</i>	11205	145	2150	1025	410	37.0	5.0	1.1	480
6	Ginger	<i>Zingiber officinale</i>	11206	30	1200	120	165	10.7	5.1	0.4	140
7	Mustard	<i>Sinapis nigra</i>	11207	240	1875	855	148	4.7	2.3	1.05	364
8	Black Pepper	<i>Piper nigrum</i>	11208	20	1400	360	155	12.5	1.4	1.2	185
9	Pepper red chilli	<i>Capiscum frutescens</i>	11209	15	2150	140	145	8.7	3.4	0.54	230
10	Nutmeg	<i>Myristica fragans</i>	11210	17	400	210	172	2.1	1.7	1.1	185
11	Thyme	<i>Thymus vulgaris</i>	11211	75	1000	2100	205	120	5.8	0.7	180

تابع ملحق (٥) : محتوى الأغذية من العناصر المعدنية / ١٠٠ جم غذاء صالح للأكل  
 ١٣ - مجموعات  
 13. Miscellaneous

No.	Common Name	Scientific Name	Code No.	Mo mg	K mg	Ca mg	Mg mg	Fe mg	Zn mg	Cu mg	P mg
1	Beer	-	11301	7.0	18.0	-	-	-	-	-	22
2	Coffee	-	11302	5.0	75	4.0	8.0	0.3	0.02	0.01	6
3	Hadewah Tehinih	-	11303	5.0	95	4.2	24	2.8	0.9	0.7	286
4	Haruy	-	11304	6.0	50	17	4.0	0.6	0.08	0.04	10
5	Jams	-	11305	14	90	16	9.0	2.0	0.03	0.2	10
6	Molloyes	-	11306	41	1400	290	85	7.2	0.5	1.8	75
7	Sesame	Sesamum Orientale	11037	55	560	980	174	12.6	3.6	1.3	515
8	Screen Lip	-	11308	14.0	2.0	3.0	-	-	-	-	-
9	Tea	Camellia Sinensis	11309	3.0	30	40	12.0	0.3	0.01	0.2	5
10	Tehinih	-	11310	15	166	92	44	8.6	1.4	0.8	865
11	Tomato Ketchup	-	11311	1030	360	20	22	0.9	0.04	0.10	40
















# الغذاء و التغذية



دكتورة

اليزيس مازر نوار

أستاذة ورئيس قسم الاقتصاد المنزلي سابقا  
كلية الزراعة - جامعة الاسكندرية

دار المعرفة الجامعية

الغذاء و التغذية

دكتورة ايزيس مازر نوار

دار المعرفة الجامعية

Bibliotheca Alexandrina



0634030